

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PHARMACOPOEIAS,
Württemberg

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30459783>

PHARMACOPOEA WIRTENBERGICA

IN
DUAS PARTES
DIVISA

QUARUM PRIOR
MATERIAM MEDICAM
HISTORICO-PHYSICO-MEDICE
DESCRIPTAM

POSTERIOR
COMPOSITA ET PRÆPARATA
MODUM PRÆPARANDI ET ENCHEIRESES
EXHIBET.

JUSSU
SERENISSIMI
DOMINI DUCIS
ADORNATA

ET
PHARMACOPOEIS WIRTENBERGICIS
IN NORMAM PRÆSCRIPTA.

ACCEDUNT
INDICES NECESSARIÏ.

EDITIO DENUO-REVISA AUCTA ET EMENDATA.

Cum Privilegio Seren. Elec. Saxon. & Seren. Ducis Wirtenberg.

STUTGARDIÆ
IMPENSIS HÆREDUM JOANNIS CHRISTOPHORI ERHARDI.
MDCCLXXXVI.

MEMORANDUM
FOR THE RECORD

DATE: MAY 2, 1900

MEMORANDUM FOR THE RECORD

RE: [illegible]

BY: [illegible]

FOR THE RECORD

DATE: [illegible]

BY: [illegible]

FOR THE RECORD

PRIVILEGIA.

I.

Der Durchlauchtigste Fürst und Herr, Herr Friedrich August, des heiligen Römischen Reichs Erz-Marschall und Churfürst zu Sachsen 2c. auch Buragraf zu Magdeburg 2c. haben auf Johann Christoph Erhards, gewesenen Buchhändlers in Stuttgart nachgelassener Erben beschehenes unterthänigstes Ansuchen gnädigst bewilliget, daß dieselben folgenden bereits von ihrem Erblasser unter Chur-Sächsischem Privilegio geführten Verlags-Artickel:

Pharmacopœa Württembergica,

unter Höchstgedachter Sr. Churfürstl. Durchl. Privilegio drucken, und führen lassen mögen, dergestalt, daß in dem Churfürstenthum Sachsen, desselben incorporirten Landen und Stiftern kein Buchhändler noch Drucker oberwehntes Buch, in den nächsten von unten gesetzten dato an, zehen Jahren, bey Verlust aller nachgedruckten Exemplarien und Dreißig Rheinischen Gold-Gulden Strafe, die denn zur Hälfte der Churfürstlich-Sächsischen Rent-Cammer, der andere halbe Theil aber ihnen Erhards in Stuttgart nachgelassenen Erben verfallen, weder nachdrucken, noch auch, da dasselbe an andern Orten gedruckt wäre, darinnen verkaufen und verhandeln, worgegen sie mehrgedachtes Buch, fleißig corrigiren, aufs zierlichste drucken und gut weiß Papier darzu nehmen zu lassen, auch so oft es aufgelegt wird, von jedem Druck und Format zwanzig vollständige Exemplaria in Sr. Churfürstl. Durchl. Ober-Consistorium ehe es verkauft wird, auf ihre Kosten einzuschicken schuldig, und dieß Privilegium niemanden, ohne höchstgedachter Sr. Churfürstl. Durchl. Vorwissen und Einwilligung zu cediren befugt seyn sollen. Gestalt sie bey solchem Privilegio auf die bewilligten zehen Jahre geschüzet und gehandhabet, auch, da diesem Jemand zuwider handeln, und sie um Execution desselben ansuchen würden, solche ins Werk gerichtet, und die gesetzte Strafe eingebracht werden soll. Jedoch daß sie, und zwar bey Verlust des Privilegii, die oben bestimmten Exemplaria, sowohl von iziger noch nicht vergriffenen Auflage als auch von jeder neuen Ausgabe dieses Buchs, zu der gesetzten Zeit wirklich und vollständig liefern. Inmittelst und zu Urkund dessen ist dieser Schein, bis das Original-Privilegium ausgefertigt werden kann, und statt desselben in Sr. Churfürstl. Durchl. Kirchen-Rath und Ober-Consistorio unterschrieben und besiegelt ausgestellt worden, welchen sie durch den bestalten Bücher-Inspectorn, Simon Gottlieb Mechau, denen Buchhändlern zu insinuiren, widrigenfalls die Insinuation vor null und nichtig erkannt werden soll. So geschehen zu Dresden, am 10. Januarii 1785.

(L. S.)

Friedrich Gottlob von Berlepsch.

Carl Gottlieb Rahn Secretarius.

II. Von

Von Gottes Gnaden, Wir Karl Friderich, Herzog zu
 Württemberg und Teck, auch in Schlessien zu Oels, und Bern-
 stadt, Graf zu Mompelgardt, Herr zu Heydenheim, Sternberg,
 Medzibohr, und des freyen Königlichen Burg = Lehen Auras,
 Ritter des Königl. Pohnischen weissen Adler = Ordens, Admini-
 strator und Ober = Vormunder ic. Büßen hiemit zu wissen, was massen
 Wir unserem Vormundschaftlichen Rath und Leib = Medico Dr. GESNER, auf sein
 beschehenes unterthänigstes Ansuchen, den Verlag des neuen *Dispensatorii*, ingleichen
 des neuen revidirten *Apotheker = Taxes* und *Ordnung*, in Compensationem seiner
 damit gehaltenen Bemühung gnädigst überlassen, und ein Privilegium darüber dergestalten
 gnädigst ertheilt haben, daß solches Werk nirgends im Land nachgedruckt, oder heimlich
 ohne dessen Vorwissen verkauft werden solle; da hingegen Er Leib = Medicus Dr. GESNER
 das *Dispensatorium*, und die *Ordnung* zwar in einerley Format, jedoch ein jedes separa-
 tim drucken, und so dann zum Behuf des Publici in einem leidentlichen Preiß debitiren
 zu lassen; wie Wir dann hiemit gnädigst verordnet haben wollen, daß bemeldtes *Dispen-
 satorium*, *Apotheker = Tax* und *Ordnung*, von niemand in dem Land, wer der auch
 seyn mag, nachgedruckt und verkauft, vielweniger unter dessen Nahmen falsche Exem-
 plaria ausgegeben, oder distrahirt werden sollen; befehlen auch hiemit allen und jeden
 in unserem Vormundschaftlichen Herzogthum und Landen wohnenden Buchdruckern,
 Buchführern, Buchbindern, und Buchverkäufern, bey Vermeidung ohnausbleiblicher
 Strafe, daß weder Sie selbst, noch sonst jemand von Unsern Vormundschaftlichen
 Unterthanen vorgemeldtes *Dispensatorium*, *Apotheker = Tax*, und *Ordnung* nachdru-
 cken, oder also nachgedruckt distrahiren, fail haben, und verkaufen, sondern solches
 Ihme Leib = Medico Dr. GESNER allein gnädigst gestattet, und verwilliget seyn solle.
 In Urkund dessen haben wir Uns eigenhändig unterschrieben, und Unser Fürstlich Secret-
 Insiegel hievor drucken lassen. So geschehen Stuttgarte, den 25. Nov. Anno 1740.

Carl Friderich, H. z. W. D.

(L. S.)

Vt. Hochstetter.

Cessio.

Extract aus dem Verlags = Accord, so den 1. Octobris 1741. zwischen dem Herzogl.
 Württemberg. Rath und Leib = Med. D. Gesner und dem seel. Buchhändler
 Christoph Erhard, geschlossen worden:

Art. 2. Dieses Werk übergeben Dieselbe (der *Autor*) in Verlag dem hiesigen Buchhänd-
 ler Christoph Erhard, mit allem Recht und Gerechtigkeiten, und mit Uebergebung
 des darauf erhaltenen Hochfürstl. gnädigsten *Privilegi*, dem Verleger als eigen.

Rath und Leib = Med. D. Gesner.

T. Christoph Erhard.



PRÆFATIO.

Post plures & heic legitime & alibi subreptitie nunc verbotenus nunc cum paucis aliquot immutationibus recusas hujus dispensatorii editiones defectus exemplarium novam Editionem iterum excudi jussit. Non est, cur de libro dudum cognito & in Germania, immo & extra eam, usitatissimo multa præfemur, attamen quædam omnino præmittenda & monenda sunt. Ante omnia notamus, nos non novum Dispensatorium conscribere, sed tantummodo dudum receptæ Pharmacopœæ Wirtembergicæ novam Editionem, suadentibus sic variis rationibus, adornare voluisse & debuisse, hinc interior totius libri structura medicamentorumque & simplicium & compositorum ordo sine immutatione permansit. Nihilominus cum inde a priore editione nunc tria lustra, intra quæ res medicamentaria diversimode aucta & emendata fuit, effluxerunt, varia addenda, rejicienda, immutatanda, monenda fuerunt. Hinc factum est, ut *in Parte prima* sic dicta simplicia continente omnia, quæ priores editiones continent retinuerimus, & insuper plura adjecerimus, inter quæ, quod non diffitemur, non pauca invenias, quæ inter pharmaca ægre sibi vendicant locum. Sed apud nos Pharmacopolæ præter medicamenta multa vendunt, quæ solummodo mechanicis usibus inserviunt, & quæ, nisi in Pharmacopolio invenias, frustra quæsiseris alibique. Ea quoque ex materia medica exesse non jussimus, quæ suam virtutem medicamentosam, neque gustui neque olfactui probant; non sine ratione suspicantes, posse & in ejusmodi simplicibus inesse virtutem nonnisi observationibus detegendam, quas subinde casus subministrat.

Pars altera composita & præparata eorumque modum præparandi continens haud minus revidenda & emendanda fuit. Inserebamus itaque medicamenta composita, suo quævis loco, recentius a variis auctoribus laudata & hætenus nondum in dispensatorio exstantia, quorsum

v. g. spectant, *Æthiops vegetabilis*; *Balsamus ophthalmicus*, *Balsamus saponis*; *Cauterium potentiale mitius ad instar Sutoriani*; *Electuarium Thebaicum*, *Lenitivum*; *Essentia Asæ fœtidæ*, *calami aromatici*; *Extractum Belladonnæ*, *Corticis Peruviani gummosum*, *Lactucæ sylvestris*: *Mercurius alcalisatus*; *Oleum Asphalti*; *Pilulæ majores Hofmanni*; *Pulvis Doveri*; *Sal essentiale Tartari*; *Spiritus salis Ammoniaci lacteus*; *Trochisci anthelmintici martiales*, *Trochisci temperantes* &c. Possent desiderari adhuc plura, sed modus servandus erat, nolimus dispensatorium universale dare, quin & studio quædam recentiora magnis laudibus excepta omisimus, v. g. Tincturam antimonii Thedenii, est enim, cur vehementer vereamur, ne pretiosum medicamentum ad præcepta Thedenii exacte paratum partibus antimonialibus careat & sic magnam istam spem fallat,

In multis præscriptionibus vel methodum præparandi ex doctrina & experientia recentiorum egregiorum chemicorum emendavimus, vel receptæ & hætenus usitatæ methodo aliam exquisitiorem addidimus. Exempla præbent *Butyrum Antimonii*; *flores Benzoes*, *salis Ammoniaci martiales*, *Zinci*; *Lac Sulphuris*; *Limatura Martis*; *Magnesia cum ejus calcinatione*; *Mercurius dulcis via humida præparatus*; *sal Cornu Cervi volatile*; *Sulphur Antimonii auratum*; *Sulphur Antimonii auratum liquidum*; *Tartarus emeticus* &c.

In nonnullis formulis, maxime usitatoribus, quasdam mutationes nobis facile permisimus, sic v. g. loco pretiosioris salis tartari & mercurii e cinnabari resuscitati sine detrimento efficaciae cineres clavellatos depuratos & mercurium destillatione depuratum, loco tincturæ cantharidum valde compositæ multo magis simplicem &c. posuimus. Expectassent forsitan rerum pharmaceuticarum censores, qui nostris temporibus haud pauci in reprehendendis & rejiciendis formulis receptis strenui & non sine singularis sapientiæ affectatione rigorosi dantur, ut multas alias formulas, quæ inefficacia, inconcinna, incongrua, absurda, nociva continent, emendassemus vel rejecissemus. Cogitavimus ipsi omnino de hac re & adeo non numerosas in hoc dispensatorio relictas formulas approbamus, ut potius in nos injuriosum existimemus, si forsitan quis nos his formulis in nostra praxi uti, earumve usui favere sibi persuadeat vel fingat. Certe longe alia causa subest; inserviit nempe dudum hoc Dispensatorium Lexici ad instar & medicis & pharmacopœis, qui plura & olim & nunc ex-

stan-

stantia dispensatoria sibi comparare nec volunt nec valent; Hi itaque formulas olim usitatas quin subinde multis encomiis ad coelum elatas facile deprehendunt & auctores intelligunt, qui ad ejusmodi formulas diversis titulis insignitas provocant. Hæc vera causa est, cur non mutavimus, cur non omnia incongrua rejecimus, attamen ipsis typis minoribus, quibus studio hujus furfuris præscriptiones distinximus, & notulis adjectis, vel & sæpe unico tantum verbulo addito, (v. g. ubi de pulvere epileptico ad Guttetam Riverii, de speciebus cordialibus temperatis & speciebus de gemmis, de auro fulminante, de ungula Alcis præparata, de aqua typhorum & è corde cervi & de aliis multis hujusmodi quisquiliis præscriptio exstat,) significavimus, quid de talibus compositis judicemus, & quod officinæ pharmaceuticæ egregie iis carere possint, hinc a Nostratis Ducatus pharmocœpis nequaquam, ut omnia & singula, quorum præscriptiones in Wirtenbergico dispensatorio exstant, medicamenta præparent, præparatave in officinis reponant, postulatur; satis superque est, ut composita majoribus typis excusa, maxime in minoribus urbibus prostant, quin & in his selectus Physico huic illive officinæ præposito liberaliter relinquitur, facile tempore solemnioris pharmacopoliorum visitationis conceditur atque a Visitatoribus efficacia & genuina medicamenta non eorum numerum respicientibus probatur. Accedit & hæc ratio, cur non omnes, cæterum nequaquam laudandas, compositiones e dispensatorio abesse jussimus, quod in frequenti urbe & in amplo Ducatus vel & aliarum regionum tractu non omnes medicinam facientes eandem de efficacia vel Vilitate hujus illiusve medicamenti sententiam foveant, hinc non evitabis, quin hic vel ille secundum antiquiorem formulam compositum pharmacum desideret, quod si vel non exstat vel aliter compositum est, & alium effectum producit, variis confusionibus, variis litibus vix extricandis, in ipsum forum, uti experientia docuit, influentibus variisque fraudibus ansam dat, ut omnino insigne discrimen sit utrum pro nosodochio vel instituto clinico, intra cujus angustos parietes medici, qui unicus præest, praxis restricta est, an pro amplioribus plures medicos, e diversis scholis egressos, alentibus regionibus dispensatorium adornetur, in quibus plura capita ergo plures sensus sunt, in quibus quædam variandi & eligendi libertas & requiritur & permittenda est, inde v. g. fyrupi, pulveres, essentiæ, pilulæ, emplastra præter necessitatem plura exstant.

P R Æ F A T I O.

Cæterum eo ipso, quod inconcinnas formulas sæpissime reprehendimus & atro carbone notavimus, fore speramus, ut successive magis magisque inepta & superflua pharmaca e nostris pharmacopoliis exulent. Fugavimus ipsi hac nova editione haud pauca, v. g. aquas ultra triginta e plantis mere viscosis non aromaticis destillatas, aquam caponis, spermatis ranarum &c. quippe non tantummodo inefficaces, sed & corruptioni obnoxias adeoque aqua pura fontana quidem pretiosiores sed nequaquam meliores, longaue asservatione sæpissime deteriores. Quod plura fugari potuissent, forsitan & debuissent, maxime in parte priore, concedimus facile, ast cogitandum, non materiam medicam selectam sed enumerationem corporum naturalium, quæ hinc inde in re medica adhibentur aut saltim allegantur, exhibendi animum fuisse, perpendendum & hoc est, utile esse tironi & Pharmacopœo & Medico plura talia corpora in promptu habere & cognoscere, atque tandem esse medicamentorum quasdam vicissitudines, ut ea, quæ dudum cecidere, renascantur & in honore sint, sive ut ea, quæ ex ipsa fere memoria debebantur & nauci æstimabantur, nunc iterum laudibus extollantur & sic encomiastas obtineant, uti antea obtrectatoribus vexata fuerunt, qualia exempla revera Viola tricolor, Viscus, Uva ursi, Meloe proscarabeus, olim scarabeus unctuosus dictus, Antihecticum Poterii præbent.

Dabamus Stuttgartiæ die XXXI. Martii MDCCLXXXVI.

SERENISSIMI DOMINI DUCIS WIRTEMBERGIÆ
REGNANTIS

Consilarii & Archiatri

Johannes Georgius Hopfengärtner.

Dr. Christianus Fridericus Jæger.



DE
NONNULLIS
LECTORIBUS & PHARMACOPOEIS,
SCITU NECESSARIIS.

Quantum interfit, ut in medicamentorum præscriptione omnia ad pondus & mensuram fiant, etiam hospiti in medicina notum est. Sunt enim pondera & mensuræ quasi regulæ & canones, secundum quas in medicamentorum compositione & medicina facienda, omnia ad æquitatem & pro intentione Medici ponderantur, ne vel excessu noceant, vel defectu peccent.

Necessu igitur esse putavimus, pondera & mensuras, quibus in Dispensatorio hoc nostro usi sumus, & quibus Medici in præscribendis formulis uti solent, adponere.

Libræ, ubi mentionem fecimus, libram medicam, quæ uncias pendet duodecim, intelligi volumus. Libra vero civilis nostra uncias habet sedecim.

Uncia una octo habet drachmas.

Drachma una tres habet scrupulos.

Scrupulus unus viginti habet grana.

Mensura nostra ordinaria Wirtenbergica pendet aquæ libras quatuor medicas, vel uncias quadraginta octo.

Mensuræ quadrans (ein Schoppen) libram unam facit medicam, vel uncias duodecim.

Herbæ quinque
capillares.

Flores quatuor
cordiales.

Semina quatuor
calida majora.

Semina quatuor
calida minora.

Semina quatuor
frigida majora.

Semina quatuor
frigida minora.

Quinque Genera
Myrobalanorum.

Adianti aurei

Capilli Veneris

Ceterach

Rutæ murariæ

Scolopendrii.

Borraginis

Buglossæ

Rosarum

Violarum.

Anisi

Carvi

Cumini

Fœniculi.

Ammeos

Amomi

Apii

Dauci.

Citrulli

Cucumeris

Cucurbitæ

Melonum.

Cichorii

Endiviæ five Scariolæ

Lactucæ

Portulacæ.

Belliricæ

Chebulæ

Citrinæ

Emblicæ

Indæ.

Fragmenta Lapidum
quinque pretioforum.

Granati
Hyacinthi
Sapphiri
Sardæ five Carneoli
Smaragdi.

Quatuor Aquæ
cordiales.

Buglossæ
Borraginis
Rosarum
Violarum.

Quatuor Aquæ
pleuriticae.

Cardui benedicti
Cardui Mariæ
Scabiosæ
Taraxaci.

Aquæ quatuor
catarrhales.

Farfaræ
Scabiosæ
Taraxaci
Veronicæ.

Quatuor Unguenta
calida.

Aggrippæ
Altheæ
Martiatum
Nervinum.

Quatuor Unguenta
frigida.

Album camphoratum
Infrigidans Galeni
Populeum
Rosatum Mesues.

Tria Olea Stomachica.

Abfinthii
Cydoniorum
Mastiches.

PHARMACOPOEÆ
WIRTEMBERGICÆ

PARS PRIMA

MATERIAM MEDICAM

EXHIBENS.

CONSPECTUS.

Classis I. REGNUM MINERALE.

Caput I. De Terris p. 1.

II. De Salibus nativis & artefactis. p. 3.

III. De Lapidibus vulgaribus & minus pretiosis. p. 5.

IV. De Lapidibus pretiosis. p. 8.

V. De Metallis, Mineralibus & Pigmentis. p. 10.

VI. De Marinis. p. 15.

Classis II. REGNUM VEGETABILE.

Caput I. De Radicibus. p. 18.

II. De Herbis & Foliis. p. 47.

III. De Floribus. p. 76.

IV. De Seminibus. p. 82.

V. De Fructibus, Baccis & Nucleis. p. 96.

VI. De Aromatibus. p. 106.

VII. De Corticibus. p. 111.

VIII. De Lignis & Viscis. p. 116.

IX. De Gummi & Resinis. p. 121.

X. De Resinis liquidis & Balfamis nativis. p. 130.

XI. De Succis condensatis & concretis. p. 133.

XII. De Fungis & Muscis. p. 138.

Classis III. REGNUM ANIMALE.

De Animalibus & eorum partibus. p. 140.

Appendix. p. 155.



CLASSIS PRIMA. REGNUM MINERALE.



CAPUT I. DE TERRIS.

Bolus alba, *Bol blanc*, *weisser Bolus*. Quicquid apud scriptores materiæ medicæ sub nomine boli occurrit, est argilla pinguis, quæ in aqua aliquo modo solvitur, & in igne in lapideam substantiam indurescit. Colore distinguimus diversas species. *Bolus alba virtutis est adstringentis & siccantis; nunquam interne, sæpius vero externe in usum vocatur.*

Bolus Armena, Armeniaca, Bol d'Armenie, Armenischer Bolus. Laudatur illa, quæ promptè linguæ adhæret; coloris pallido rubri, lubrica & impalpabilis, non arenosa est. Olim ex Oriente advehebatur, nunc etiam in Galliæ & Germaniæ nonnullis provinciis reperitur. *Adscribitur ei vis bezoardica, & notorie adstringit.*

Bolus rubra vulgaris, Bol rouge vulgaire, gemeiner rother Bolus. Advehitur ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi. *Raro a Medicis præscribitur; veterinariis vero, & ad Spiritus Nitri & Salis destillationem inservit. Hanc & præcedentem colorem à Marte habere, experimenta loquuntur.*

Creta alba, Craye blanche, weisse Kreide. Est terra alcalina, calx fossilis & nativa fere. Prostant præcipue Coloniensis, Campaniensis & Bologena. Laudatur, quæ alba, levis & non arenosa est. Cum Tartaro, qui vix, & in aqua ebulliente tantum, solubilis, cocta, illi salium alcalinorum solubilitatem conciliat. Ope cretæ aquam marinam potabilem reddere docuit in *Comment. Societ. Scient. Hartemens. P. II. Cl. Allemand*, quatuor pintis aquæ marinæ cretæ unciam unam addendo. *Acidum absorbet; usus tamen internus vix laudabilis.*

Lac Lunæ, Agaricus mineralis, Lait de Lune, Agaric mineral, Monmilch. Est creta friabilissima, levissima, quam aqua poros faxorum transiens solvit, atque intra rimas & cavernas montium deponit. Maximus ejus est proventus in Helvetia, in cavernis montis pileati sive fracti, & montis Wallenstock; reperitur etiam in caverna illa celeberrima Ducatus Wirtenbergici, quæ *Nebelloch* vocatur. *Virtutem habet absorbentem, & ad lactis augmentationem nutricibus (annon incongrue?) præscribitur.*

Lithomarga, Medulla faxorum, Moëlle de pierre, Steinmark. Substantia solida, coloris ut plurimum grisei, pinguis, lubrica; ex montibus Bohemiæ nobis advehitur. *Adstringentis saporis & virtutis est.*

Ochra, Ochre, Ocre, Ockergelb. Est terra martialis, coloris subflavi. *Pictoribus inservit.*

Rubrica fabrilis, Sinopis veterum, Craye rouge, Röthel-Stein. Est Ochreæ sive potius Margæ martialis species, Bolo durior, valde adstringens. Ex Episcopatu Salisburgensi & Ducatu Lotharingiæ magna in copia advehitur. *Raro tamen in usum medicum venit; cum melle rosato mixta ad Aphthas commendatur.*

Terra Japonica. Vide **Succi condensati.**

Terra Lemnia, Terre Lemnienne, ou de Lemnos, Lemnische Erde, Erde aus der Insel Lemnos. Coloris diversi, vel pallidi, vel flavofusci, vel rufescentis; nobis ex Turcia advehitur. Eligatur, quæ saponis instar, pinguis est, modicè adstringit, nec digitos colore inficit. Nonnihil salis volatilis, urinosi, olei bituminosi & salis marini largiri Geofroy adserit. *Virtute gaudet adstriktiva. Pulveres varios, Bezoardicos dictos, ingreditur, hodie vix amplius probatos.*

Terra sigillata alba Turcica, Terre sigillée blanche de Turquie, weisse Türkische Siegel-Erde.

Terra sigillata alba Goldbergensis, Axungia f. medulla lunæ, Terre sigillée blanche de Silesie, ou de Goldberg, weisse Schlesische Siegel-Erde.

Terra sigillata Melitensis, sive de Maltha, Terra St. Pauli, Terre sigillée de Malthe, Malthesische Siegel-Erde. Coloris albi, & plerumque effigie S. Pauli signata est. Uti reliquæ terræ sigillatæ, impalpabilis & pinguis esse debet. *Terræ sigillatæ albæ omnes viribus conveniunt, nec adeo, sicut rubræ, adstringunt.*

Terra sigillata rubra Turcica, Terre sigillée rouge de Turquie, rothe Türkische Siegel-Erde. *Hæc, & aliæ hujus coloris, cum Bolo Armena conveniunt.*

Terra sigillata Silesiaca grisea, vel lutea Strigonienensis, Axungia f. medulla Solis, Terre sigillée grise de Silesie, graue Schlesische gesiegelte Erde. Pinguis, minus friabilis, atque fabuli omnis experts, eligenda. *Viribus cum terra Lemnia convenit.*

Terra Tripolitana, Tripela offic. Tripoli, Tripel-Erde. Est terra argilloso-arenosa, martialis indolis. Coloris vel cinerei, vel lutei, vel albi. *Uusus potius est mechanicus, (maxime luteæ, quæ levis aut impalpabilis esse debet,) quam medicus.*

Terra viridis, Viride montanum, Chrysocola veterum, Terre verde, Verd de montagne, Chrysocolle, grüne Erde, Berggrün. Est ochra venerea. Est

Ex Hungaria nunc & Comitatu Tyrolienſi, olim ex Armenia adferebatur; eligenda; quæ ſaturitate viret. *Pictoribus inſervit potiffimum; Chirurghi vero etiam ad purganda & exſiccanda ulcera maligna ea uti poſſent.*

CAPUT II.

DE SALIBUS NATIVIS ET ARTE FACTIS.

Alumen crudum vulgare, album, glaciale, *Alum ou Alun blanc; vulgaire, gemeiner, weiffer Alaun.* Eſt ſal minerale, quod in Anglia, Suecia & Germania ex propria minera educitur. Paſſim invenitur etiam alumen nativum. Acidum Aluminis, cum Vitrioli acido, convenit; terra Aluminis, ſpecificæ, alcalinæ, argillacæ indolis eſt. *Uſus ejus eſt multifarius medicus, valide adſtringens; coagulans &, præcipue ſi Alumen uſtum adhibetur, exedens.*

Alumen Romanum, rupeum, rubrum, *Alum ou Alun Romain, de roche, rother Römischer Alaun.* Ex Italia advehitur, & prope *Tuſcan*, ex ſaxo calcinato, certis encheireſibus, extrahitur. Coloris roſei pallidi, & in cryſtallis eſſe debet; cum præcedente convenit. *Hodie Brünſwigii alumen roſeum a fratribus Gra-venhorſt paratur.*

Alumen ſaccharinum, ad præparata pertinet, & in parte poſteriori quærendum eſt.

Borax, Borax Veneta, Chryſocolla, Borax de Veniſe, Borrax, Borax. Eſt ſal, quod ex peculiari mixto ſalino, quod ex Orientalibus Indiis ſub nomine *Tinkal* advehitur, & noviter etiam in Helvetia inventum fuit, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligenda eſt alba, cryſtallina, levis, in igne facile fluens, atque vitreſcens. Curioſum eſt, Boracem, ad cujus ſolutionem viginti aquæ partes requiruntur, addito cremoris tartari duplo, pauca aqua ita ſolvi, ut ne formam quidem ſolidam amplius induat. *Incidit, attenuat, abſtergit, ſtimulat; urinam & menſtrua promovet, atque hoc ſcopo aliis calidis, ſanguinem commoventibus medicamentis præferri meretur. Doſis ſcrupulus unius vel drachma ſemis. Aurifabri borace ad aurum fragile, ductile reddendum, utuntur.*

Cineres clavellati, Sal alkali vulgare, Potaſſe, Vedaſſe, Cendre gravelée, Potaſche. Sunt ſal fixum lixivioſum, ex cineribus lignorum, præſertim duriorum, e. g. querni & fagini extractum & calcinatum, quod in magna quantitate e Moſcovia, Curlandia & Haſſia advehitur, atque etiam apud nos in ſylva martia paratur. Non purum eſt alkali, ſed ſal continet neutrum ſive medium, cum Tartaro vitriolato conveniens, quodque facile ſolutione & cryſtallificatione ſeparari poteſt. *Uſus cinerum clavellatorum eſt varius, & plurimus in arte tinctoria & vitriaria. In Medicina, ſi a terra & ſale neutro depurantur, loco ſalis tartari inſervire poſſunt. Salium alcalinorum fixorum omnium vis eſt acidum domans, glutinoſa dividens, exæſtuans, diuretica; externe, ſi ſoluta in forma fomenti applicentur, tumores lymphaticos & lacteos potenter reſolvens.*

Nitrum, Sal petræ, Nitre, Salpetre, Saliter, Salniter, Salpeter. Tam regno animali, quam vegetabili & minerali, originem debet. Magna ejus copia ex India Orientali quotannis advehitur. Elicitur apud nos, mediante aqua, ex terra
nitroſa;

nitrosa, quæ in hypocauftis & stabulis effoditur, atque urina, vel aliis excrementis animalium, a longo tempore imprægnata fuit. Solutio sive extractio, ob pinguitudinem nunquam in crystallos abit; hinc per lixivium, ex vegetabilium cineribus & calcæ viva paratum, depuratur, atque evaporata superflua aquositate, ad crystallisandum reponitur. Constat ex acido peculiari & alcali vegetabili. Eligendum album, purum, quod crystallos exhibet longas, sexangulares, prismaticas; carbonibus ignitis inspersum, absque crepitatione promptè deflagrat, atque in aqua facile dissolvitur. *Est medicamentum polychrestum, refrigerans, orgasmum sanguinis & bilis acrimoniam temperans, antispasmodicum, ischæmum & diureticum. Datur a granis quinque ad scrupulum unum & ultra. Usu nimio debilitatem, imprimis ventriculi, induxisse, experientia docuit.*

Sal Anglicum laxativum, Ebshamense, Natrum fontanum L. Sel d'Epson, Sel purgatif amer, Englisches Laxier-Salz. Olim ex fonte medicato Ebshamenfi in Anglia solum, aquam evaporando, parabatur; nunc etiam ex falis culinaris lixivio residuo, etiam apud nos Sulzæ ad Nicrum, certa encheiresi conficiunt. Advehitur nobis ex Anglia, ubi prope urbem Lemmington, quæ ad comitatum Southampton vel Hant-Shiere pertinet, magna ejus quantitas ex residuo lixivio a falis marini depuratione, paratur. Constat ex acido vitriolico & proprio terrarum alcalinarum genere, quod Magnesiâ dicunt albam. Eligitur album, siccum, purum, in aqua facillimè solubile. *Medicamentum est, album ciens, incomparabile, & secure etiam in febribus ab uncia ad unam semis in aqua solutum dari potest.*

Sal armoniacum, ammoniacum, Sel ammoniac ou armoniac, Salmiac. Sal est artificiale, ex stercore animalium & straminis fuliginè in placentas sublimata, paratum. Advehitur ex Ægypto, ubi magna quantitas hujus falis in provincia, quæ Delta vocatur, non procul ab urbe *Mensoura*, in pagis *Damire* paratur. Hodie in Anglia, Gallia & Germania copiose paratur, quin & nativum montes ignivomi & Calmucorum regio largiuntur. Constat ex acido falis & alcali volatili. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcalico statim odorem falis volatilil spargit. Datur & nativum, quod inter rariora numerandum. Vulgare hoc sal continet acidum falis communis, & alcali volatile urinosum. *Ufus illius est varius, tam medicus, quam mechanicus. Incidit, attenuat humores pituitosos, diaphoresin auget; a nonnullis pro specifico habetur antifebrili, & a scrupulo uno ad duos exhiberi solet.*

Sal Egranum, Sel purgatif d'Eger, Eger : Sauerbronnen : Salz. Paratur ex acidulis evaporatis. Seligitur album in crystalis. *Album leniter & absque torminibus laxat. Dosis drachmæ duæ ad sex. Datur aquas minerales bibentibus.*

Sal gemmæ, Sel gemme, mineral, fossile, de roche, Stein-Salz. Sal est fossile seu nativum, quod ex Polonia adfertur. Eligendum pellucidum, album. *Ufus est tam culinaris, quam medicus.*

Sal marinum, Sel marin, Meer-Salz. Eligendum purum, crystallisatum, cubicam figuram exhibens. *Sal culinare nostrum, fontanum, gemmæ, & marinum ejusdem sunt indolis, & non nisi puritate differunt; hinc etiam culinare illis substitui potest. Sal est condimentum ciborum universale, & vim habet incidentem, discutientem & diureticam.*

Sal Sedlizense, Sel purgatif de Sedlitz, Sedlizer Salz. Ex aquis mineralibus amaris Sedlizenfibus in Bohemia conficitur. Eligendum album, crystallisatum. *Cum Sale Anglico virtute laxativa convenit; in eo autem differt, quod illud acidum quoque Salis communis, hoc purius vitriolicum contineat. Siquidem affuso oleo vitrioli ex Sale Anglico Spiritus acidus fumans expellitur, ex Sale vero Sedlizenfi non ita.*

Soda Hispanica, Alumen Catinum, Soude d'Espagne, Soude en pierre, Spanisches Aschen-Salz. In glebis diversæ magnitudinis, coloris cinerei, ex Hispania advehitur. Paratur per incinerationem plantæ, quam *Kali geniculatum*, vel *Salicorniam* vocant. Planta nimirum exsiccata, in fasciculos collecta, in ferrea crate super foveam posita, comburitur, cineres inde orti, in fovea collecti, cooperiuntur, qui, successu temporis, in massam, duritie lapidem æmulantem, coeunt. Quæ massa diffracta, ubicunque divelitur. Præfertur Soda, quæ *Soude d'Alicante* vocatur, & ex portu Valentiniæ *Alicante* advehitur, quæ ex cœruleo cinerea, ficca & tinuens, intrinsecus & extrinsecus spongiæ instar porosa est. In aëre humescens, soluta foetens, crusta viridi obducta reprobatur. *Usus Sodæ in medicina nullus, nisi ad Sal Seignette; in arte vitriaria & tinctoria plurimus.*

Vitriolum album, Vitriol blanc, weisser Bitriol, Galizen-Stein, Augen-Stein. Apud Goslarienses, ex minera plumbi argentifera montis *Rammelsberg* elicitur. Modum parandi, *Schlüterus*, in elegantissimo opere de arte fusoria, *Schmelz- und Hüttenwerk*, describit, ferrum, cuprum & copiosam terram zinci habet. Sit, sacchari instar, album, & non nimis durum. *In collyriis adhibetur; mundificat, siccant & adstringit. Ob particulas cupreas interne sumtum vomitum ciet, & caute hoc scopo exhibendum.*

Vitriolum cœruleum, de Cypro dictum, Vitriol bleu de Chypre, blauer Bitriol, blauer Galizen-Stein. Artificiale, cupræ vel venereæ indolis est. Eligendum Sapphiri instar cœruleum, crystallisatum. *Virtutem habet septicam & adstringentem; raro vero in usum venit medicum, nisi externe, & ad pulverem sympatheticum.*

Vitriolum viride, Romanum, Hungaricum, Anglicum, Vitriol verd, Romain, d'Hongrie, d'Angleterre, Römischer, Ungrischer, Englischer, grüner Bitriol. Ferri dives est. Sit herbacei coloris & crystallisatum. Ex Hungaria & Anglia, nec non Episcopatu Salisburgensi, ubi tam e minera propria, quam ex pyrite calcinato conficitur, advehitur. Datur etiam nativum, quod in metallothecis adservatur. *Usus est mechanicus & medicus. Tartarus vitriolatus Tachenianus optime ex hoc Vitriolo paratur.*

Vitriolum vulgare, Vitriol d'Allemagne, vulgaire, gemeiner Bitriol, Kupferwasser. Coloris dilute virescentis, siccum & crystallinum esse debet, pariter cupri & ferri particeps est, & apud Goslarienses magna in copia paratur. *Tinctoribus usus est maximus; cum gallarum infusione mixtum, atramentum præbet scriptorium, & ad decoctum requiritur nigrum.*

CAPUT III.

DE LAPIDIBUS VULGARIBUS ET MINUS PRETIOSIS.

Ætites, Aquilæ lapis, Pierre d'Aigle, Adlerstein. Lapis quasi prægnans, alio, qui *Callimus* vocatur, in utero sonante. Differt a *Geode*, qui non sonat, & intus marga plenus est. Præfertur Orientalis, qui plerumque ovalis figuræ est & magnitudinis. *Usus ad partum promovendum ridiculus; cum vero martialis indolis est, vis adstringens omnibus innotescit.*

Alabastrum, Alabastrites, Albâtre, Alabaster. Est Gypsi purioris species, polituram admittens, plerumque albi coloris. *Vim habet refrigerantem, & ad unguentum alabastrinum requiritur.*

Alumen plumosum, plumeum, Trichites, Alum ou Alun de Plume, Federweiß. Asbesti est species, quæ ex Insulis Rhodo & Cræta advehitur. *Propter fibras acutas pungentes, & per affricationem cutem rubefacientes, unguentis ad membra tabida, admisceri a nonnullis solet.*

Alumen scissile, Lapis specularis, Talc transparent, Pierre spéculaire, Miroir d'Ane, Frauen-Glas, Frauen-Eis. Est Spatum seleniticum, lamellatum, vitri instar pellucidum. *Usus plurimus est mechanicus; ad pulverem Vienneensem album etiam requiritur.* Non confundendum est cum hoc lapide speculari **Vitrum Moscoviticum, Verre de Moscovie, Moscovitisches Frauen Glas,** quod in Gypsum per ignem non mutatur; sed pellucidissimum, lamellatum, igni resistit, & ad *Micarum* classem pertinet.

Amiantus, vide Asbestus.

Armenius lapis, Pierre Armenienne, Azur, Armenier-Stein, Bergblau. Opacus est, cœruleus, maculis nonnunquam argenteis, viridibus & nigris, intermixtus. *Minera est Veneris; inde etiam est virtus ejus purgans. Melius & securius ad pigmenta, quam in Medicina adhibetur. Probatur saturate cœruleus.*

Asbestus, Asbeste, Amiante, Stein-Glachs. Lapis est scissilis, & filamentosus, igni resistens. Veteres, indusia, aliaque ex hoc lapide præparare sciabant; quæ, ubi sordida igni tradebantur, pura evadabant. Fibras Alumine plumoso habet molliores, & optima ex Japonia & China advehitur. Amiantus & Asbestus passim ut synonyma occurrunt. Lapidis hujus varietates nonnullis imposuerunt, ut diversas statuerint species.

Bufonites, Bufonius lapis, Batrachites, Brontias, Chelonites, Crapaudine, Batrachite, Krötenstein. Lentem vitream simulat, una parte convexam, altera concavam. Coloris est ex fusco pallentis, aliquando fusci, interdum nigri, viridis, versicoloris. Sunt, qui distinctionem inter Bufonitam & Batrachitam faciunt, atque priorem a bufone, posteriorem vero fossilem & mineralem esse credunt. De utroque nullum est dubium, illos ad petrefacta, vel lapides sic dictos figuratos, pertinere. Haud raro in Daniæ regno reperitur. *Alexipharmaca, antepileptica & lithontriptica vendidatur virtus.*

Calaminaris lapis, Pierre Calaminaire, Calamine, Cadmie, Gallmen. Vocatur etiam *Cadmia fossilis.* Est minera terra sive Ochra Zinci coloris subflavi, rufescentis, nonnunquam grisei; eruitur ex fodinis propriis & metallicis, inprimis circa Aquisgranum magnus ejus est proventus. *Metallicæ indolis est; cum cupro enim fusus, non solum colorem ejus rufum in aureum mutat, sed & pondus auget & in orichalcum transmutat. In Medicina, ad collyria, emplastra & unguenta exsiccantia adhibetur.*

Calx, Lapis calcarius, Chaux, Pierre à chaux, Kalkstein. Calcinatus lapis, calx viva dicitur. Marmoris species est, siquidem ex quovis marmore, forti igne calcinato, calx viva producitur. *Varius ejus est usus in medicina. Cum salibus alcalinis, vel etiam cineribus mixta, dat lixivium forte, ex quo Lapis Causticus, vel Cauterium potentiale, paratur; item ad saponis confectionem, nec non ad aquæ calcis vi-*

væ præparationem, requiritur. Aqua multa lota atque edulcorata, Emplastrum defensivum ingreditur.

Cryſtallus montana, Cristal, Cristal de roche, Crystall, Berg-Crystall. Vitri instar transparens, dura, atque sexangularis esse debet; duritie a fluoribus, qui sæpius in metallifodinis reperiuntur, distinguitur. Variis in locis reperitur, imprimis ex Helvetia nobis adfertur. *Vis absorbens & specifica ad diarrhæas biliosas infantum à lacte coagulato ortas, merito in dubium vocatur.*

Glacies Mariæ vulgaris, Pierre speculaire, Miroir d'Ane, gemein Frauen-Eiß, Federweiß Glacies Mariæ, specularis Lapis & Selenites, multum inter se conveniunt, ut vix discerni possint. Multis in locis, etiam in Ducatu Wirtenbergico, reperitur; Coloris albicantis, figuræ rhomboideæ, scissilis. Præferatur clara & pellucida. *Calcinata, a veterinariis pecudibus ad calorem febrilem temperandum, exhibetur. Argentifabris ad polienda vasa inservit.*

Hæmatites, Pierre Hematite, Pierre sanguine, Ferret d'Espagne, Blutstein. Mineræ est Martis, colore obscure rubentis, saporis terrei adstringentis. Diversæ reperitur speciei, *fibris longioribus*, qui in usum medicum vocatur; *fibris brevioribus*, figura convexa, sicut granium humanum, qui germanis metallicolis Glasfopf audit; tertia species *Schistus* est, qui loco fibrarum lamellas, sicut Alumen scissile, habet. *Omnes virtute adstringente martiali pollent.*

Judaicus lapis, Phœnicites, Tecolithus, Pierre judaïque, Judenſtein. Lapis est variæ figuræ, ut plurimum olivaris, cum & sine petiolo. Colore est cinereo; duritie vix filici cedit, facile tamen in pulverem redigitur. Reperitur in Judæa, unde forsitan nomen accepit: tamen haud raro etiam in aliis obvius est provinciis. Ad petrefacta pertinet, & secundum modernorum sententiam, sunt radioli Echini marini petrefacti. *Adscribuntur huic & aliis ejusmodi petrefactis vis diuretica & absorbens.*

Lazuli lapis, Pierre d'Azur, Azur, Outre mer, Lasurſtein. Coloris debet esse cyanei, punctulis & flammulis, ac venis aureis, ornatus. Durior est armenio lapide. Eligitur pulchre, Sapphiri & Cyani florum instar, coeruleus; ex Oriente allatus, & in igne colorem non mutans; in usum trahitur medicum. Duplo vel triplo, salis alcali, igne forti fusus, in vitrum abit nigerrimi coloris. Quod phænomenon, uti reliqua recentiorum experimenta satis demonstrant, coeruleum lapidis hujus colorem non a cupro, sed a ferro suam originem ducere. Circumferuntur etiam nonnunquam a metallicolis vagabundis, lapides, coloris dilute violacei, striis aureis ornati, quos pro vero Lapide Lazuli vendere conantur. Sunt vero arsenicalis & martialis indolis; hinc pharmacopœi caveant, illos vero Lapidi Lazuli substituere. Quamvis non negandum, etiam vero eleganter carere officinas nostras posse. *Ingre-diens est Confectionis Alkermes, & ad melancholicos humores educendos commendatur. Pictoribus largitur colorem elegantissimum cœruleum, Ultramarinum dictum.*

Lyncis lapis, Belemnites, Ceraunius, Dactylus Idæus, Pierre de Lynx, ou Belemnite, Raſenstein, Luchſſtein, Donnerstein, Drudenſtein, Alpschoß. Figuræ & magnitudinis diversæ reperitur. Succini instar est diaphanus, & fere ejusdem coloris flavescentis, figuræ teretis, & dum corporibus duris affricatur, urinum graveolet. Ille, qui pyramidalis vel conii figura, coloris griseo-nigricantis & non pellucidus est, Belemnites stricte dicitur; ambo ex concharum & quidem Holoriorum familia, & inter petrefacta esse, certum est. *Virtute, cum lapide judaico, convenit. A plebe ad incubum & febres intermittentes commendatur.*

Magnes lapis, Pierre d'Aimant ou Aimant, Magnetstein. In ferrifodinis reperitur. Ferri colorem habet, & ferrum continet. Virtutes ad polos directivæ, ferrique ac arenæ martialis attractivæ, omnibus notæ. Quo validius ferrum attrahit, eo melior. *Usus in Medicina est rarus; emplastris siccantibus nonnunquam additur.*

Nephriticus lapis, Pierre Nephretique, Griesstein. Coloris obscure viridis, variis coloribus permixtus; semper quasi oleo inunctus videtur. Falso Jaspidium familiæ adnumeratur. Gypsum potius esse, instituta experimenta demonstrant. Affertur ex Hispania & Bohæmia. *Virtus quam veteres ei affinxerunt, ex nomine patet; interne dederunt a drachma dimidia ad integram, externe vel carpo, vel regioni renum, alligare jusserunt.*

Osteocolla, Ostéocolle, Beinbruch, Bruchstein. Tophus calcareus, cylindricus, perforatus. Ob figuram, ossa æmulantem fistulosam, ita vocatur, ossiumque fractorum coalitum promovere creditur. A nonnullis pro radice populi nigræ petrificata habetur. Coloris est albicantis & Coralli instar. In locis arenosis in Palatinatu, Silesia &c. reperitur. *Emplastris additur siccantibus & catagmaticis.*

Pumex, Pierre ponce, Bimsenstein. Eligendus est levis, albicans, & tritu facilis. Ab ignivomis montibus Ætna & Vesuvio ejicitur; reperitur etiam haud procul a Thermis Embesenibus. *Virtutem habet siccantem, adstringentem & mundificantem. Usus plurimus est ad dentifricia.*

Selenites, Selénite, Selenit. Lapis est figuræ & coloris varii. Igne calcinatus, gypseam indolem ostendit; nam cum acidis non uti calcareæ terræ effervescebat. Multis in locis reperitur, & varias sub se comprehendit species.

Silex, Caillou, Kieselstein. Omnibus notissimus. Laudatur e fluviis collectus. *Ad liquorem silicum requiritur.*

Smiris, Smyris, Emeri, Emeril, Schmergel, Schmirgel. Lapis est ponderosus, ferruginei coloris, ad nigredinem tendentis. Ex Hispania adfertur, & in ferrifodinis reperitur. *Usus est mechanicus, & raro vel nunquam in Medicina adhibetur.*

Spongiarum lapis, Pierre d'éponge, Schwammstein. In spongiis marinis reperitur. Est concretum tophaceum falsum, ordinario coloris griseo-albicantis & substantiæ friabilis. *Strumis opponitur, atque virtute gaudet diuretica & absorbente.*

Talcum, Stella terræ, Talc, Talch, Talck. Varii est coloris, lamellis molliusculis, tenuioribus, ad tactum quasi pinguibus, igni resistentibus, constans. Præfertur illud, quod Venetiis nobis advehitur, pingue & coloris viridescentis. *Usus est cosmeticus. Non nisi in mortario probe calefacto in pulverem teri potest.*

Vitrum Moscoviticum, vide Alumen scissile.

CAPUT IV.

DE LAPIDIBUS PRETIOSIS.

Amethystus, Ametiste, Amethyst. Gemma, violacei coloris, pellucida. Est Orientalis & Occidentalis. *Viribus conveniunt, & ebrietatem gestati arcere antiquitus credebantur.*

Carneolus, Sarda, Sardius lapis, Sardoine, Sardienne, Cornaline, Carniol, Carneol. Gemma est semidiaphana, carnis loturæ, five carni sanguinolentæ similis, unde nomen. Vero nomine est Achates rufescens. Nam reliquæ gemmæ figura polyhedra crySTALLINA distinguuntur. Optimus ex Sardinia insula adfertur; in Bohemia, Silesia, aliisque regionibus, etiam reperitur. *Sanguinis profluvia, tam interne sumtum, quam externe gestatum, sistere prætendunt.*

Chrysolithus, Topasius, Chrysopasius, Chrysolith, Topase ou Topaze, Chrysolith. Diaphana est gemma, luteo-viridescentis coloris, lævigatus aureo fulgore splendens. Advehitur ex Indiis; reperitur etiam in Bohemia. *Ad Epilepsiam & Phrenitidem laudatur.*

Granatus, Grenat, Granat. Gemma pellucida, saturate violaceo-rubri coloris. Ex Oriente advehitur; reperitur etiam in Bohemia, Hispania & Silesia. Apud nos Granati orientales minoris sunt pretii, quam Boji & Hispani. *Commendatur ad cordis palpitaciones, melancholiam & sanguinis sputum.*

Hyacinthus, Hyacinthe, Hyacinth. Gemma pellucida, ex flavo aut croceo colore rubens. Orientalis & Occidentalis habetur; præferenda tamen Orientalis. Vitro Saturni adulterata, facile distinguitur mollitie & pondere. *Adscribuntur vires antispasmodicæ & roborantes.*

Rubinus, Carbunculus, Rubis, Rubin. Gemma diaphana, pulchre rubens, duritie ab adamante secunda. Optimus ex Insula Ceylon adfertur. *Gestatus & intus haustus, venenis resistere, atque a peste præservare traditur.*

Sapphirus, Saphir, Sapphyr. Gemma pellucida, colore cœruleo, duritie ab adamante tertia. *Cordialis, alexipharmica & ophthalmica creditur.*

Smaragdus, Emeraude, Smaragd. Ad pellucidas pertinet gemmas; coloris est viridis, omnium gemmarum fragilissima. Orientalis est & Occidentalis; Occidentalis e Peru advehitur. *Alvi & sanguinis fluxum sistere, & in febribus pestilentialibus conferre perhibetur.*

Gemmis quidem eleganter officinas pharmaceuticas carere posse, siquidem omnes, tanquam lapides pyromachi, vix alium effectum, quam filex, in corpore humano præstent, plurimi contendunt; vitra enim quasi sunt indissolubilia, quæ vix aquis stygiis obediunt, unde facile etiam hospes in medicina perspicere potest, quid ab earum usu expectari queat. Verum cum a longo tempore in republica medica receptæ sint, eas quidem exulare nolimus; monemus tamen pharmacopœos, ut sibi prospiciant, ne pro genuinarum gemmarum fragmentis, fluores sive vitra, & gemmas artificiales, Saturno infectas, emant, quod quidem facile ex duritie, quam genuinæ sibi propriam habent, & qua falsæ distinguuntur, cognoscitur. Operam porro dent, ut gemmæ, non in mortariis æneis, sed ferreis, in pollinem subtilissimum terantur, antequam super porphyritem lævigentur. Præstat etiam, ante sic dictam præparationem, integras leviter calcinare, atque ignitas in aquam frigidam effundere, quam absque prævia hac calcinatione crudas terere.

DE METALLIS, MINERALIBUS ET
PIGMENTIS.

Antimonii Minera, Mine d'Antimoine, Spießglas-Erz. Eligenda ponderosa, striata, obscure cœrulei ac plumbei coloris. Adfertur ex Hungaria, quæ optima censetur; reperitur vero etiam multis in locis Germaniæ. Pro Antimonii diaphoretici præparatione expetitur, quod hinc albidius conficitur, si modo ab adherente sili-
ce vel spato prius purgetur.

Antimonium crudum, Stibium, Antimoine, Spießglas. Probatur, quod strias longas splendentes habet, & ex Hungaria advehitur. Olim pro veneno habebatur; a Kunckelio vero ab hac suspitione vindicatum, & in usum medicum vocatum est. Commendatur ab illo in morfulis ad scabiem, & dolores rheumaticos pertinaces. Usus in decoctis, nisi alcali fixum adjiciatur, vix probandus. A veterinariis, in equorum & pecu-
dum morbis, frequentius in usum trahitur, nec non ad varios labores chemicos expetitur.

Argentum foliatum, Argent fin en feuilles, geschlagen Silber, Silber-Blättlein. Fit laminas argenti, sæpius calefaciendo, & inter membranas interiores intestini recti bubuli, singulari methodo præparatas, mallei ope extendendo. Folia ad pilulas obducendas requiruntur, & admiscuntur pulveribus, splendoris gratia.

Argentum vivum, Mercurius vivus, Argent-vif, Mercure, Quecksilber. Est Semimetallum fluidum. Reperitur nativum, quod Mercurius virgineus vocatur; maxima vero pars ex minera destillatur. Largissimus mineræ & ipsius Mercurii virgi-
nei proventus est in Istria. Reperitur vero etiam in Hungaria, Transylvania & Ger-
mania. Optimus Mercurius vivus habetur virgineus, a nullo alio metallo vel semime-
tallo inquinatus. Fraus facile detegitur, si drachma una aut altera in cochleari ferreo carbonibus superimponitur; sic Mercurius in auras abit, atque metallum vel semime-
tallum, quo inquinatus fuit, relinquit. Variis usibus tam chemicis, quam medicis, &
mechanicis inservit.

**Arsenicum album, Arsenic blanc, weisser Arsenic, Maus- oder Rat-
fen-Gift.** Est concretum minerale, ex multa terra metallica & sale constans. Aci-
dum in eo peculiaris indolis invenerunt recentiores. Non solum ex minera arsenicali,
(Gift, Riesen) sed etiam ex mineris stanni, & cobalto pro cœruleo, in ustulatione ha-
rum minerarum, sub forma fumi albi, allium redolentis, expellitur, atque in camino,
peculiari modo in hunc finem constructo, dem Giftfang, capitur, & substantia pulve-
rulenta, coloris albi & cinerei, colligitur: qui pulvis a metallicolis, Giffenrauch &
Giftmehl, appellatur, & addita portione salis alcali sublimatur. Præsentissimum est
venenum; hinc caute cum illo versandum, & omnia ex illo præparata medicamenta
pro suspectis habenda, donec evidentius ostensum sit, posse salutarem reddi internum
arsenici usum. Odore allii, carbonibus inspersum, se prodit.

Arsenicum citrinum, sive flavum, Arsenic jaune, gelber Arsenic. Artificiale est concretum, & ex Arsenico albo, addita decima sulphuris parte, subli-
matione paratur. Causticum venenum est, paulo tamen, ob additum sulphur, mitius albo.

**Arsenicum rubrum, Arsenic ou Orpiment rouge, Réalgar, rother Ar-
senic, Mausegelb.** Pariter ex Arsenico albo & pyrite sulphureo sublimatur.

Pisto-

Pictoribus inservit. Datur etiam nativum, quod Risigallum seu Sandaracha Realgar vocatur.

Auripigmentum, Sandaracha Græcorum, Orpin, Orpiment, Opersment, Auripigment, Goldgelb. Est minerale nativum & fossile. Optimum censetur, quod ex Turcia advehitur, punctulis sive micis, velut aureis, nitet, & coloris citrini est. *Venenatum est, & ex arsenicalibus particulis, cum sulphureis mixtis, constat. A pictoribus expetitur, & iis, qui cuticulam depilandam curant. Cum calce viva Liquorem constituit illum probatorium vini Lythargyrio infecti, & atramentum sympatheticum. Auripigmentum ad rubedinem calcinatum, a veteribus Sandaracha vocabatur.*

Aurum foliatum, Or fin en feuilles, Or battu, geschlagen Gold, Goldblättlein. Eodem modo, quo Argentum foliatum, paratur, iisdemque usibus inservit.

Cadmia nativa, fossilis, metallica, Cobaltum, Cadmie metallique, Cobalt, Kobalt, Mücken- oder Fliegen-Stein, Arsenic-Stein. Minera est arsenicalis, & ab illa, quæ ad Smaltæ præparationem adhibetur, & non raro Argenti dives est, differt. Metallicolæ, hoc, vulgo Gistfiese; Cobaltum vero, ex quo, additis filicibus, & sale alcali, smaltum conficitur, Farben-Cobalt appellant, prius copiose in Misnia effoditur; posterius etiam in diversis Wirtenbergicis argentifodinis reperitur. *Ambo inter venena reponenda. Septicæ est virtutis cobaltum, & ad enecandas muscas in usum trahitur.*

Cerussa alba Norica, five potius Hollandica, Ceruse blanche, Blanc de plomb, weiß Bleyweiß. Factitium est, & calcinatione vaporosa mediante aceto, ex plumbo conficitur, & plus minus creta alba permiscetur. Eligenda alba & ponderosa. *Siccatur, adstringit & refrigerat; ad emplastra & unguenta requiritur, & pictoribus inservit.*

Cerussa citrina, Ceruse jaune, Bleygelb. Est calx plumbi, ad flavedinem calcinata. Citrini coloris esse debet. *A pictoribus expetitur.*

Cerussa Veneta, Ceruse de Venise, Benedisches Bleyweiß. In minoribus conis, quam cerussa alba advehitur, & olim Venetiis parabatur. Alba, & quæ gustu dulcis est, eligi debet. *A pictoribus, quia color ejus albus constantior, quam vulgaris illius Noricæ est, requiritur; præfertur tamen omnibus illa cerussæ species, quæ ex laminis plumbi paratur, & quam Schieferweiß appellant. Sicut reliqua producta ex plumbo, adstringit, reprimit & siccatur. Usus est in emplastris, unguentis & collyriis.*

Chalybis limatura, Limaille d'acier, Stahlfeil, Martis limatura, Limaille de Mars, ou de Fer, gefeiltes Eisen, Eisenfeil. Eligatur limatura chalybis, seu ferri puri, Venere non inquinati. Irritum est tentamen, limati ferri separationem, a Venere, ope magnetis suscipere; nam quamvis limatura Veneris & Martis singula seorsim limata & commixta, tali modo secerni possint; tamen id non succedit cum limatura fabrorum, multis miculis interspersa, quæ ex altera parte vel latere, ferreæ, ex altera autem cupreæ existunt, & sub una eademque portione lima abrasæ fuerunt. Quales propterea ex latere ferreo arripere solet magnes, licet ex altera parte vel latere, particula cupri illiquata adhæreat. Imo duplum Veneris, cum ferro fusum, magnetem sequi, *Henckelius observavit. Ad varios usus medicos & chemicos expetitur.*

Chrysocola, Viride montanum, Berggrün. Vide Terra viridis.

Chrysocola crySTALLISATA, factitia, est Borax. Vide Salia nativa.

Cinnabaris factitia, Cinabre ou Vermillon artificiel, Zinnober. Est compositum ex Mercurio & Sulphure. Videatur Pars posterior Pharmacopœæ Wirtenberg. ubi & *Cinnabaris Antimonii* fit mentio.

Cinnabaris nativa, Cinabre ou Vermillon mineral, Berg-Zinnober. Est minera Mercurii, nonnunquam Auri particeps, septem plerumque partes Mercurii & unam Sulphuris continet. Optima ex Transylvania, Hungaria & Japonia advehitur. Sit pura ab adhærentibus lapillis, spato & fabulo liberata, nec Risigallo inquinata. *Usus ejus est in Medicina, uti factitiæ; præstat vero, eam, antequam interne exhibeatur, sublimare.*

Cobaltum. Vide Cadmia nativa, fossilis, metallica.

Fel vitri, Recrementum vitri, Sal vitri, Anatron, Sel ou Fiel de verre, Glasgalle. Est spuma, aut materia recrementitia, in vitri fusione & præparatione, supernatans. Alcalicæ est prosapiæ, & ad neutrorum salium naturam proxime accedit. Sit album, leve, spongiosum. *Usus est ad dentifricia; vim habet diureticam.*

Ferri flores, Fleurs de Mars, Eisenblütze. Sunt concretum album, ex fodinæ & cuniculorum martialium parietibus exsudans, quod ramosas, Coralliorum instar, stirias ostendit, & ad stalactitas pertinet. Ex Styria afferuntur, nonnunquam etiam ejusmodi substantia in ferrifodina Wirtenbergica, prope civitatem Imp. Aalen, reperitur. *Adstringunt; parum vero martialis continent.*

Indigo, Indicus color, Inde, Indigo, Indig. Est præparatum artificiale, quod ex planta Anil & aliis plantis indigoferis in India tam Orientali, quam Occidentali, paratur. Optimæ notæ, coloris cœrulei parum diluti est, & præfertur obscuriori. Bonus porro censetur, qui aquæ supernatat. *Tinctioribus & pictoribus inservit; in Medicina rarus illius est usus; valde adstringit, & fluxiones alvi & lochiorum nimias sistit. In Ictero profuisse, fama est.*

Lacca Florentina, Lacque ou Laque fine de Florence, Florentiner Lack. Pigmentum est rubrum, ad purpureum colorem accedens, & ex Coccinella, vel etiam non raro ex ligno Brasiliensi, in lixivio cocto & alumine præcipitato, conficitur. *Adstringens est, & pictoribus inservit; in Medicina pro tingendis trochiscis Alkermes & ad pulveres dentifricos atque electuaria gengivalia, adhibetur. Eligatur colore pulchre rubens & levis.*

Lacca in globulis, Lacque colombine, Laque en boules, Rugellack. Uti modo dictum, ex ligno Brasiliensi, lixivio, alumine & creta paratur. Ad colorem dilute purpureum vergit. *Adstringit, & præter pictorios usus etiam ad dentifricos pulveres adhibetur.*

Lacca cœrulea, Tournesol en pâte, en pain, en pierre, Orseille, Lack-muß, blauer Lack. Sunt glebæ cubicæ siccæ, ex succo Heliotropii Tricocci, sive Ricinoidis *Tournesortii*, plantæ in calidioribus Europæ regionibus sponte nascentis, calce & urina paratæ. Adfertur ex Gallia & Batavia; laudatur illa, quæ colore pulchre cœruleo & levitate se commendat. *Tinctioribus & condita parantibus inservit.*

Lithargyrium auri, Lythargyrus, Litharge d'or, Goldglette. Est productum ex plumbo, & in purgatione argenti per plumbum acquiritur. Coloris est paulo rubicundioris, quam, quod sequitur, Lithargyrium Argenti; nimirum magis coctum seu calcinatum est, unde color saturatior.

Lithargyrium argenti, Lythargyrius, Litharge d'argent, Silberglette. Cum præcedente convenit, nisi quod coloris pallidioris. Facile plumbum ex ambo-
bus restitui potest. Plumbum in cupellatione, im *Abtreiben*, cuprum, quo argentum infectum est, absorbet, & cum illo, in hanc semivitream substantiam abit, unde Saccharum Saturni ex lithargyrio, a particulis cupreis inquinato, ad usus medicos, præsertim internos, non probatur. Præstat, quod ex puro plumbo acquiritur. Solutio lithargyrii, cupro inquinati, viridescit, quod cum illo, ex puro plumbo, non contingit. *Amorum usus est in Medicina, ad emplastra & unguenta conficienda; siccant & refrigerant.*

Marcasita, Marcasita argentea, sive Bismuthum, Etain de glace, Bismuth, Marcaffite, Bismuth, Bismuth. Est substantia metallica, quæ ex sua propria minera extrahitur, facile in pulverem teritur, & præ omnibus reliquis corporibus metallicis minori ignis calore funditur. Invenitur in argenti venis, & prope illas; in Misnia inprimis, nec non Ducatu Wirtembergico. Eligenda est alba, argentei coloris. A Zinco differt colore, pondere & fragilitate. *Usus est ad cosmetica & varia mechanica; Internus vero suspectus, quia Bismuthum arsenicalis indolis est, & plerumque, vel semper, cum cobalto pro cæruleo mixtum reperitur.*

Minera Martis solaris, Mine martial d'Hesse, Hefischer Eisen-Vitriols Rieß. Est minera martialis, ab omni venereo inquinamento libera, & ad classem pyritarum, quos vulgo *Wasserfiese* metallicolæ vocant, refertur. Ex obscuro glauca est, nitidis frustulis, instar mineræ Antimonii resplendet; saporis est vitriolacei. Latet plerumque in luto seu argilla, in frustis figuræ ovalis. In Hassiæ variis locis, præcipue vero juxta *Almerodam* pagum, invenitur. *Verum Vitriolum Martis exinde parari potest, & in substantia etiam, ubi alia martialia adhiberi solent, dari. Dosis grana decem ad viginti.*

Minium rubrum, Minium, Plomb rouge, Mennig, rother Meng, Mini. Est calx plumbi, ad rubrum hunc colorem reverberata. A minio vix differt *Sandix*, quæ nihil aliud est, quam Cerussa ad rubedinem calcinata. *Siccant & refrigerant; in Medicina ad emplastra & unguenta, in arte pictoria ad pigmenta Turcicum, præstantius ipso Norico, nostratibus usuali, usurpatur. Minium veterum nostra est Cinnabaris.*

Nihilum album, Pompholyx, Calamine blanche, Pompholyx, weißes Nichts. Est quasi flos plumbi, qui inter fusionem minerarum, & in reductione Lithargyrii & cineritiorum, ad latera camini sublimatur. Eligendum, quod album, leve, & impalpabile, atque acrimoniæ expers. *Ad collyria, emplastra & unguenta requiritur. Refrigerante & siccante gaudet virtute.*

Oleum Petræ album, Petroleum album, Pétrole blanc, ou Huile de pétrole claire, weiß Stein-Öel. Id, quod pelluciditate aquam æmulatur, & minus nauseosum odorem spirat, ex Oriente nobis adportatur; hujus vero in locum officinæ ut plurimum dilutius rubrum usurpare solent.

Oleum Petræ nigrum, Petroleum nigrum, *Pétrole noir*, *Huile de Gabian*, ou de pétrole noire, *Schwarz Stein-Öel*.

Oleum Petræ rubrum, Petroleum rubrum, *Pétrole rouge*, ou *Huile de pétrole rouge*, *roth Stein-Öel*. Ad regnum minerale referuntur; Petroleum enim est Naphta sive Bitumen liquidum, quod ex rimis rupium & terræ exstillat, & in fontibus aquæ innatans colligitur.

I. Album, ex Sumatra insula, Persia, & Modenensi Italiæ Ducatu,

II. Nigrum, ex Languedocia, ubi prope pagum *Gabian* reperitur, advehitur.

III. Rubrum, quod ex Sicilia & Italia venit, usitatissimum est. Destillatur etiam ex carbonibus fossilibus oleum, Petroleo simillimum, ubi primo album, postea rubrum, & ultimo ignis gradu, nigrum emprevmaticum foetidum prodit; quæ olea vix a nativo Petroleo distingui possunt, viribus etiam cum illo conveniunt. Eligatur Petroleum fluidum, spirituosum, odoris non ingrati, quod in spiritu vini non solvitur: hac enim nota ab illo distinguitur, quod in Hollandia ex oleo templino paratur, & pro Petroleo venditur. *Album & rubrum Petroleum calefaciunt, digerunt & resolvunt, atque nervoso generi conferunt; interne nunquam vel raro, quia sanguinem valde commovent, adhibentur; a quibusdam tanquam probatissimum anthelminticum commendatur Petroleum nigrum nativum, ad guttas tres vel sex interne exhibitum. Cum Petroleo convenit.*

Oleum terræ, *Huile de terre*, *Erð-Öel*, quod ante paucos annos ex India Orientali advehi coepit. Colore est rubrum, diaphanum, & odoris Petrolei, atque in nervorum affectibus externe adhiberi solet.

Orleana, Orlean, *Achiote*, *Orléan*, *Rocou*, *Roucou*, *Orlean*. Est sæcula granorum Bixæ, sive Mitellæ Americanæ maximæ tinctoriæ *Tournefort*. Ex America adfertur. *Refrigerat & adstringit; raro tamen in Medicina, sæpius vero a tinctoribus, ad pannos & lintea, colore aurantio inficiendos, expetitur. Eligenda levis, quæ neque nimium madida, neque tota exsiccata est.*

Sandaracha Græcorum, Risigallum, *Kauschgelb*. Vide Arsenicum rubrum.

Sandix, vide Minium.

Sulphur caballinum, *Souffre grossier*, *Rosß-Schwefel*. Sunt feces, quæ in rectificatione & purificatione sulphuris citrini remanent. *Pulverem equorum ingreditur.*

Sulphur citrinum, *Soufre jaune*, *commun*, *gelber Schwefel*. E pyrite, magno igne, expellitur. Largus ejus est proventus in Suecia, Germania, & ejus provinciis. Ducatus etiam Wirtembergicus non caret eo. Eligitur purum, citrinum. Reperitur etiam nativum, pellucidum & opacum. Constat acido vitriolico & parva portione principii inflammabilis. *Uusus est varius, tam medicus, quam mechanicus. Interne sumto adscribuntur vires aperientes, balsamicæ & alexipharmacæ; externe adhibitum siccat & repellit.*

Sulphur vivum griseum, *Soufre vis gris*, *lebendiger grauer Schwefel*. Reperitur in Islandia & Italia, inter Puteolos & Neapolin. Eligitur, quod purum, & arena non permixtum est. *Viribus cum antecedente convenit.*

Torna

Torna Solis rubra, Bezetta, Tournesol en drapeau, Farb = oder Schminke-Flecklein, Spanischer Flor. Sunt lintea, coccinella tincta. Eligenda pulchre rubra, & saturate tincta, quæ ex Turcia advehuntur. *Usus est in culinis, ad gelatinas, condita & liquores tingendos, & abusus ad fucos notissimus.*

Torna Solis coerulea, Bezetta coerulea, Tournesol bleu, blaue Farb-Flecklein. Sunt lintea, mixtura illa, ex qua Lacca coerulea paratur, tincta. *Ejusdem sunt usus in culinis, & apud conditores.*

Tutia, Thutia, Nihilum griseum, Cadmia, Botrytis, Tutia Alexandrina, Tutie, Tutia. Productum est metallicæ prosapiæ, & in fornacibus, ubi æs caldarium funditur, reperitur. Eligenda est densa, modice gravis, quæ fracta cinerea est. *Siccatur, detergit; usus est in collyriis. Ad unguenta ophthalmica & emplastra siccantia adsumitur. Cuprum colore tingit aureo.*

Viride æris, Ærugo, Æs viride, Verdet, Verd de gris, Grünspan, Spangrün, Spanisch Grün. Est factitium ex cupro, mediantibus vinaceis, corroso. Paratur in Gallia & Hispania. Eligendum, quod colore ad coeruleum vergit, & quod creta non adulteratum. *Septicum est, & ad Unguentum Ægyptiacum & alia requiritur. Internus usus semper noxius. Etiam a pictoribus, & aliis mechanicis, expetitur.*

Vitrum Venetum, Verre de Venise, Benedisches Glas. Artificiale est, ex arena vel filicibus, cum sale quodam alcalino, ex vegetabili regno, conflatum, omnibus notum. *Creditur anthelminthicum, cum melle umbilico superimpositum, sed falso. Si quis enim experimentum sequitur effectus, melli potius adscribendum erit, quam vitro.*

CAPUT VI. DE MARINIS.

Ambra grisea, Ambarum, Ambre gris, Ambra, Amber, graue Amber. Bituminis est species, ex venis alveisque terræ, in mare deposita, ubi quandoque a balænis deglutitur; ex earum enim intestinis non raro, sed nigricantis coloris & deterioris qualitatis, eximitur. Frustra nonnunquam monstrosa, & vix credibilis magnitudinis, passim in Indiis reperiuntur; *Kæmpferus* mentionem facit massæ Ambrae, in litore Japonico inventæ, libras Belgicas centum & triginta pendentis. Eligatur Ambra levis, odorata parum, & quæ, si candenti laminæ imponitur, gratum edit odorem, & parum, vel plane nihil, relinquit; quæ facile liquescit, & bene cohæret. Veteribus plane ignota fuit, & demum ab Arabibus in usum vocata est. Adulteratur glumis orizæ, in pollinem redactis, mastiche & ladano; fraus facile detegitur masticatione, solutione, combustionem super lamina ignita. *Calescit & resolvit, atque analeptica, cephalica, cordialis, & ad longævitatē facere censetur; nec non ad varia composita in pharmacia adhibetur.*

Asphaltum, Bitumen Judaicum, Asphalte, Bitume de Judée, Juden-Pech. Bitumen est solidum, nigrum, fragile, resplendens; odoris, dum accenditur, ingrati. Reperitur magna ejus copia in mari mortuo, & in Chinæ lacubus nonnullis. Conficitur ex hoc, cum pice mixto, Pisasphaltum. *Geofroy* describit Pisasphaltum nativum, & loca indicat, ubi invenitur. *Mundificat ulcera sordida; usus est in emplastris*

Et unguentis digestivis, Et ad Balsama tingenda adhibetur. Ingreditur etiam Theriacam; veteres eo ad condienda cadavera uti solebant.

Corallina, Muscus corallinus, marinus, Coraline, Mouffe marine, Corallen-Moos, Meer-Moos. Est planta, sub aqua rupibus marinis, conchis, & nonnunquam etiam coralliis adnascens, coloris albicantis, viridiusculi, grisei, saporis subfalsi, odoris ingrati pisculenti. Præfertur integra, & quæ sabulo & conchis variis non commixta est. Ex mediterraneo mari colligitur. *Anthelminticis, a nonnullis quoque emenagogis adnumeratur, Et a dimidia ad integram drachmam præscribitur.*

Corallium five Corallum album, Corail blanc, weisse Corallen. Est productum marinum, quod cum corallio rubro, præter colorem, per omnia convenit, nisi quod rarius est. *Corallium album officinale.* J. B. quod pro vero plerumque venditur, *Madrepore* vel *Coralliodis* est species, quæ in mediterraneo mari copiose reperitur, & cum Corallio vero albo viribus convenit. Crudum nunquam, præparatum autem sæpius in usum medicum vocatur.

Corallium seu Corallum rubrum, Corail rouge, rothe Corallen, Corallen-Zinzen. Est productum marinum, quod rupibus, & nonnunquam conchis adnata reperitur. Variis in locis, præprimis vero in mediterraneo mari ad littora provincie, Cataloniæ & Siliciæ oras, & non tam in fundo maris, quam in cavernis rupium, provenit, atque, non sicut plantæ sursum, sed ex superiore parte cavernarum deorsum, crescit. Eligitur pulchre rubens, & a fordibus liberum. *Usus Et virtutes inter præparata occurrunt.*

Corallium nigrum, Corail noir, schwarze Corallen. Rarum est, & ex India, ubi in Oceano Orientali circa Bantam reperitur, advehitur. *Usus in Medicina nullus.*

Pila marina, Sphæra marina, Sphæra Thalasia Galeni, Halcyonium rotundum, Pelote de mer, Meer-Ballen. Nondum constat, quæ earum origo sit; probabile videtur, concrementum esse, perpetuo fluxu maris & magnorum lacuum, e junco, pilis animalium marinorum, & non raro conchulis, cum spuma maris ita compactum. Ex dissolutis & agitatione maris conglomeratis tuberibus radicum *Zosteræ marinæ* L. formari Spielmannus asserit. Non eandem figuram habent; sunt enim aliæ prorsus rotundæ, aliæ depressæ vel oblongæ. Eligendæ sunt leves & siccæ, quæ odorem marinum spirant, recentes. *Exsiccandi Et calefaciendi vis adscribitur; tostæ pulverem strumalem ingrediuntur, Et a nonnullis pro anthelminticis habentur.*

Spongia marina, Eponge, Badschwamm. Dicitur etiam *fungus marinus.* Est productum maris molle, foraminibus pervium. In mari saxi, conchis, & aliis concretis adnascens. Eligantur Spongiæ albæ, foraminibus exiguis perviæ, leves. Per destillationem ex retorta, magnam quantitatem spiritus urinosi, & salis volatilis elargiuntur, quod illis, qui spongas Zoophyta esse credunt, pro argumento inservit. Magnus earum proventus est in mari mediterraneo. *Spongiarum usus est varius, tam chirurgicus, quam æconomicus; in medicina, tostæ ad pulverem strumalem requiruntur.*

Succinum, Electrum, Carabe, Ambarum, Glessum, Ambre jaune, Succin, Agtstein, Bernstein. Succino, omnibus cognito, solum fere Borussia regnum dives est. Colligitur enim ibi, non solum in littore maris Baltici, aut & ex ipso mari, piscando quasi hauritur, & vocatur *haustile*; sed effoditur etiam ex terræ visc-

visceribus, montibus & cavernis, littori illi propinquis, & in aliis regionibus, in Suecia, Sicilia, Gallia, & dicitur *fossile*. Licet de singulari ejus natura nondum satis clare constet; a vero tamen non multum aberrare videntur, qui putant, in eo componendo concurrere oleum bituminosum, petroleo non dissimile, ceu basin, & salem acidum vitriolicum sive sulphureum, una cum subtilissima terra & aquæ portione, & pro diversa horum ingredientium combinatione, succinum non solum generari solidum, sed & varie coloratum, album, quod reliquis præstare credunt, citrinum, nigrum, rubrum, plus minus opacum, transparens &c. Succinum in prima sua origine liquidum esse, testantur varia animalcula, quæ involuta in eo reperiuntur, uti muscæ, aranæ, culices &c. Characteres, quibus dignoscitur, sunt, quod igni impositum fumet, fluat, ardeat, quod ita tractatum odorem Succino specificum spargat, quod neque ab aqua sola, neque Alkohole solo, neque facile ab alio quocunque menstruo, si oleum Vitrioli excipias, perfecte solvatur, & quod electricitate sive vi attractiva gaudeat & emineat, quibus notis etiam a *fæctitio* illo & *spurio* Americano, *Gunni de Loock* alias vocato, quod vero etiam in destillatione Sal volatile non exhibet, discerni potest. *Laudatur tanquam resolvens, roborans, balsamicum, nervinum, diureticum medicamentum, & hinc multiplici usu inservit, tam interno in lymphæ vitiis, catarrhis, rheumaticis fluxionibus, pectoris atque capitis morbis, affectibus soporosis, convulsivis, nephriticis, urinariis, uterinis; quam externo in læsionibus maxime capitis & partium nervosarum atque tendinearum, uti & in suffitibus ad serosas congestiones resolvendas; unde etiam quam plurimas compositiones ingreditur.*

Adnumerantur a quibusdam marinis, quæ tamen ad regnum animale pertinent, ex. gr.

Blatta Byzantina, Unguis odoratus, Blatte Byzantine, Indianische wohlriechende Muschel-Schaalen. Sunt opercula muricis ramosi inodora. Odor enim, quem spirat conchylum cum vivo-incola recenter extractum, aliquot dierum spatio perit. *Ad suffitus, hystericis præsertim adhibetur, alvum laxare & lienis vitiis mederi, interne sumpta censetur.*

Dentalia, Syringites, Dentales, Zahn-Purpur-Schnecken. Canaliculi sunt striati, parum inflexi, in utraque parte obtusi; pollices duos vel tres longi, coloris pallido-grisei. Veteres credebant, esse dentes piscium, & hanc ob causam dentalii nomen imposuerunt. Hodie inter conchilia numerantur. A Rumphio *Solenes univalves*, ab aliis *Buccina* vocantur.

Entalia, Entalies, Zahn-Schnecken. A præcedentibus, non nisi magnitudine, differre, atque minora & acutiora esse, nonnulli perhibent. *Aldrovandus*, concharum marinarum, quas *Tellinas* cum *Entalibus* vocant, esse partes, scribit. Alii conchas Veneris parvas, quæ Porcellanæ appellantur, substituunt.

Margaritæ, Uniones, Perlæ officinis, Perles, Perlen. Sunt lapilli in conchis, quas Rumphius *Ostrea* vocat, ex eadem materia, quæ testæ generantur, producti, qui etiam nonnunquam in ipsis animalculis, quæ conchas inhabitant, inveniuntur. Species Ostrearum, in quibus reperiuntur, enumerat laudatus Rumphius: *Ostreum crasium*; *Ostreum saxatile*; *Ostreum placentiforme* sive *Ephippium*. Sunt vel Orientales vel Occidentales; priores sunt splendidiores, & ceteris præferuntur, ac circa insulam Ceylon, & in Sinu Persico, maximæ & optimæ habentur; posteriores sive Occidentales, quæ lactei quasi sunt coloris, & minus splendent, ex America advehuntur, & in multis Europæ locis, in Scotia, Silesia, Bohemia, etiam reperiuntur.

riuntur. Nonnisi minimæ *Textiles*, *Saat*, vel *Lothperlen*, *Perles à l'once*, *Semence des Perles* nominatæ in Pharmacopolia recipiuntur. *Sæpius in usum medicum vocantur*, & fere ad omnes pulveres pretiosos requiruntur. *Virtutes cordiales, absorbentes acidum & præcipitantes, censentur.*


Mater perlarum, Nacra perlarum five margaritarum, Nacre de Perle, Perlen-Mutter. Sunt conchæ, Ostrei placentiformis five Ehippii, quæ in mediterraneo mari & alibi inveniuntur, nec unquam veras margaritas includunt. *De præparatione & viribus videatur pars posterior Pharm. Wirtenb.*

Umbilicus marinus, Belliculus marinus, Faba marina, Nombriil marin, Meer-Bohnen, Nabel-Stein. Sunt opercula cochleæ lunaris, *Rumphii*, five cochleæ celatæ *Rondeleti*. Reperiuntur ad littora maris Adriatici. Habentur majores & minores, rubri & Cati oculum referentes. *Creduntur, umbilico impositi, colicos dolores sedare. Interne raro in usum venit; absorbet & adstringit. Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.*

Hoc caput de marinis plurimis forsan superfluum atque inconcinnum videbitur: cum omnia, quæ in illo continentur, vel ad regnum minerale, uti Ambra, Asphaltum, Succinum; paucissima, si ulla, ad regnum vegetabile; reliqua vero ad animale regnum referri potuissent ac debuissent; Maluimus tamen peculiarem classem illis assignare, & ordinem, in plurimis officinis a longinquo tempore introductum, servare, quam illum, unumquodque ad suum regnum relegando, præter necessitatem turbare.



CLASSIS SECUNDA. REGNUM VEGETABILE.



CAPUT I. DE RADICIBUS.

Rad. Acetosæ, Oxalidis, Acetosæ pratensis, C. B. Rumicis floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis, Linn. Racine d'Oseille, d'Oseille, d'Aceteuse, Sauerrampfer-Wurzel. Nascuntur in pratis, & verno tempore colliguntur. *Linguae gratum acorem imprimunt, & decoctæ rubrum aquæ colorem ab affusis acidis destrucibilem conciliant. Datur decoctum ad æstum febrilem temperandum.*

Acori veri, Calami aromatici officinarum, Racine de Calamus aromatique, ou d'Acorus véritable, Calmus, rechter Mcfermann. Indigenæ sunt; nascuntur ut plurimum in aquis stagnantibus. Colligendæ primo vere vel adulto auctumno. Vocatur etiam *Radix nautica*, ob eximium usum, quem navigantibus præstant. Utuntur ea, ut sibi vel nauseam arceant, vel præcaveant, ne aquidæ putridæ exitio sint. De Tartaris, extremæ Lithuaniae incolis, Clusius refert: quod radices Calami five Acori veri plerumque secum ferant,

terant, nec aquam ex paludibus prius bibant, quam in illa radix hæc infusa fuerit. Hinc Simon Pauli, viris castra sequentibus, Tartaros imitari, suadet. *Vires sunt alexipharmacæ, stomachicæ, carminativæ, balsamicæ, attenuantes & resolventes. Datur hæc radix sicca in pulvere a granis quinque ad decem, in infuso ad unciam dimidiam. Decoqui non debet. Acori Indici radicibus; quamvis sint odore fortiores facile carere possumus.*

Rad. Acori vulgaris, Pseudacori, Gladioli lutei. Ireos corollis imberbibus, petalis inferioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus, *Racine de faux Acorus, d' Acore bâtard, de Glayeul, Flambe batarde, Ufermann, gelbe Schwertelwurzel, falsche Acorus-Wurzel.* Ad aquaticas plantas pertinent. *Adstringunt, & in decoctis pro collutione oris, scorbuticis præscribuntur; alvum & urinas ducere a nonnullis perhibentur; recentes ad Electuarium diacori expetuntur. Datur in infuso vinoso ab uncia dimidia ad unciam unam.*

Alcannæ veræ, Ligustri Ægyptiaci, Lawsoniæ racemis inermibus, Linn. Orcanette du Levant, rothes Ægyptisches Kärberkraut, roth Mundholz. Ex Syria & Ægypto nobis adportatur. Saporem habet austerum, adstringentem. Colorem rubrum suppeditat. *Decoctum laudatur in aphtis fungosis infantum. Rarissime in pharmacopoliis occurrit.*

Alcæ vulgaris, majoris, Malvæ silvestris folio cannabino, Racine d' Alcée, de Mauve sauvage, Fellsch-Wurzel, Sigmars-Kraut, Sigmunds-Wurzel. Cum radicibus Malvæ conveniunt; commendantur etiam ad oculorum morbos, & veterinariis inserviunt.

Allii sativi, vulgaris, Allii caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspидatis, Linn. Ail, Knoblauch. Coluntur in hortis. *Vires sunt alexipharmacæ, diureticæ, anthelminticæ & carminativæ. Calculosis etiam prodest. Destillata oleum largitur in aqua subsidens, & penetrante odore suo omnia reliqua olea odorata superans.*

Altheæ, Bismalvæ, Ibisci, Malvavisci, Altheæ foliis simplicibus tomentosis, Linn. Racine de Guimauve, d' Althé, Eibisch-Wurzel, Althea-Wurzel. Planta colitur in hortis, ad Tanaim fluvium sponte crescit, floret Julio. Radices colliguntur autumno. Pharmacopœi Russici radicem Lavateræ Thuringicæ loco hujus radicis in officinis asservant. *Interne & externe adhibentur; vires sunt anodynæ & emollientes, & præcipue interne, ad pectoris & viarum urinarum affectus in usum vocantur. Externe, cataplasmatibus emollientibus & maturantibus adduntur.*

Amaræ dulcis, Dulc-amaræ, Solani scandentis, Solani caule perenni flexuoso, foliis superioribus hastatis, Linn. Racine de douce-amere, ou de Morelle rampante, Hirschkraut-Wurzel, Je länger, je lieber. *Tussientibus, asthmaticis, ictericis, & ab alto lapsis, in decocto commendantur. Viribus Pareiram pravam superare novissimis experimentis contendunt.*

Anchusæ, Anchusæ floribus puniceis, Buglossi arvensis annui, Anchusæ tinctoriæ, Linn. Racine d' Alkanna, de Buglose, ou d' Orchanette, rothe Schsenzungen-Wurzel. Ex Galliæ provinciis affertur,

unde etiam Monspeliaca vocatur. Eligendæ sunt radices parvæ fibrosæ, quæ colorem purpureum, in tota substantia magis diffusum, habent; majores intus albicant. *Requiruntur ad Unguentum rubrum potabile, & alia colore rubro tingenda. Spiritum salis armoniaci colore inficiunt amethystino.*

Rad. Angelicæ fativæ, Angelica foliorum impari lobato, Linn. Racine d'Angelique, ou du saint Esprit, Angelick-Wurzel, Heilig Geist-Wurzel, Engel-Wurzel, Brust-Wurzel. Colitur in hortis. Eligantur recentes, non cariosæ, & in loco sicco asserventur. *Vis alexipharmaca, stomachica, carminativa & uterina omnibus nota.*

Angelicæ silvestris, Angelica foliolis æqualibus, ovato lanceolatis serratis, Linn. *Racine d'Angelique sauvage, wilde Angelick.* Raro in usum veniunt; *virtutes antecedentibus haud inferiores prædicantur.*

Anthoræ, five Antithoræ flore luteo, Aconiti salutiferi, Anthoræ foliorum laciniis linearibus, ubique ejusdem latitudinis, Linn. *Racine d'Anthore, Giftheil-Wurzel, Herz-Wurzel.* E bulbis, olivæ magnitudinis, constant, foris fusci, intus albi coloris; gustu sunt amaræ, & sapore acres. Eligendæ recentes, vermibus non exesæ, vel cariosæ. Proveniunt in Alpibus, & aliis Tirolis & Helvetiæ montibus. *Non tantum adversus Napelli, sed & cætera quæcunque venena laudantur. Ob vim alexipharmacam, nonnulli Contrayervam germanicam appellant, & in morbis malignis exanthematicis, ad vermes & dolores colicos commendant. Sed cum sit aconitum, pro remedio suspecto haberi & circumspicte in usum vocari debet.*

Apii palustris, Paludapii, Hydroselini, *Racine d'Ache, d'Api, gemeiner Eppich, Wasser-Eppich.* Inter quinque radices aperientes majores referuntur. Alia etiam *Apii palustris* species, quæ *Sium* alterum a Dodoneo & *Cicuta aquatica* a Gesnero vocatur, reperitur, quæ vero venenata est, & non nisi foliis angustioribus ab officinali differt; securius igitur radices *Apii hortensis, Racine de Celeri, Garten-Eppich, Seleri,* quæ fere eandem vim habent, substituuntur.

Aquilegiæ, Aquilegia nectariis incurvis, Linn. *Racine d'Ancolie, Akeley-Wurzel.* Coluntur in hortis. Verno tempore effodiuntur. *Vim habent diureticam, alexipharmacam & aperitivam.*

Ari, Barbæ Aronis, Serpentariæ minoris, Dracontia minoris, Laphæ, Ari maculati, L. *Racine de pied de veau, Aron, Aron-Wurzel, Pfaffen-Pint, Teutscher Ingber, Zehrwurzel.* Promiscue diversæ species Ari in usum vocantur, quia eandem habent virtutem. Sunt vero *Arum vulgare non maculatum, maculatum maculis albis, maculatum nigrum.* Colligenda radix verno tempore. Recens valde acris est; majori dosi noxia, imo lethalis; exsiccata mitior, vix periculosa. Recens coctione in aqua multum, in aceto in integrum mitescit, ut etiam edulis sit. *Vires Ari sunt aperientes, incidentes, resolventes, attenuantes, abstergentes, diureticæ, & alvum laxantes. Ad membra paralytica & arthritide vexata externe in usum vocatur.*

Aristolochiæ Clematitidis rectæ, C. B. Saracenica, Aristolochiæ foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis, Linn. *Racine*

Racine d'Aristolochie clématite des vignes, de Rattelou, d'Ostroloche, de Sarrafine ou Sarazene, fleine Osterlucey-Wurzel. Tenuis est radix, & multis fibris dotata, saporis amari, acris, subadstringentis, odoris haud ingrati. Ex Hispania & Italia advehitur; nascitur etiam in vineis Alfatiae, & nonnunquam in nostris. *Præfertur a nonnullis reliquis Aristolochiæ speciebus, & essentia inde parata remedium creditur esse antipodagricum.* Diuturnum vero ejus usum tunicam villosam ventriculi destruere atque nocere, languore appetitus & totius corporis illato b. Bærhæve, monente Ill. Hallero, ob servavit.

Rad. Aristolochiæ fabacæ, Fumariæ radice bulbosa, rotunda, non cava, C. B. Pseudofumariæ, Racine d'Aristolochie petite ronde, fleine runde Hohlwurzel, Osterluceywurz. *Remissior & debilior est cava, majorem tamen vim habet exsiccantem & absorbentem; a Chirurgis pulverisata denudatis ossibus inspergitur; interne vinis medicatis additur; cachecticis, hydropicis & ictericis convenit.*

Aristolochiæ longæ veræ C. B. Racine d'Aristolochie longue veritable, lange Osterluceywurzel, lange Hohlwurzel. Specie, secundum Linnæum, a sequenti differt. Eligantur radices crassiores, non cariosæ, sed ponderosæ. Ex Hispania, ubi in vinetis & dumetis provenit, advehitur. *Odore, virtute & sapore amaro, cum reliquis Aristolochiæ radicibus conveniunt.*

Aristolochiæ rotundæ veræ, Aristolochiæ foeminæ Lugd. Aristolochiæ caule infirmo ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis, Linn. Racine d'Aristolochie ronde veritable, rechte runde Osterluceywurzel. Laudantur radices ponderosæ non cariosæ; advehuntur ex Gallia & Hispania. *Virtutibus conveniunt cum Aristolochiâ longa & rotundâ vera, ac ob vires alexipharmacas, Theriacæ ingredientia sunt; laudantur etiam uterinæ & vulnerariæ.*

Aristolochiæ rotundæ vulgaris, Fumariæ bulbosæ, radice cava majore, Fumariæ caule simplici diphylo, floribus subnudis, Linn. Racine d'Aristolochie ronde commune, Hohlwurzel, gemeine runde Hohlwurz, Herzwurz. Indigena est planta, & largus ejus proventus. *Viribus cum præcedentibus Aristolochiæ speciebus conveniunt, atque in ciendis mensibus, lochiis & sætum mortuum pellentibus commendantur.*

Armoracia, vide Raphanus rusticanus.

Arnica, Ptarmicæ montanæ, Calthæ vel Calendulæ alpinæ, Nardæ Celticæ alterius, Doronici Plantaginis folio, Doronici foliis caulinis oppositis, Linn. Racine de Betoine de montagne, Arnick, Mutterwurz, Wolverley, Lucians-Kraut, Engels-Tranch-Wurzel, Fallkraut-Wurzel. In pratis & locis humidioribus alpinis & montanis provenit; in Ducatu Wirtenbergico, non procul ab urbe Calwa, & aliis locis nascitur. *Ob virtutem resolvablem sanguinem grumosum merito panacea lapsorum vocatur. Non solum radix, sed plerumque tota planta in decocto exhiberi solet; quod decoctum in largiori dosi propinatum nonnunquam anxietates & vomitus creasse observatum est; hinc delicatioribus cum circumspectione præscribendum.* Folius

folius in Dysenteria, Diarrhæa colliquativa, febribus putridis, gangræna multis allegatis observationibus recentiores concelebrant.

Rad. Artemisiæ, Parthenii, Racine d'Armoise, Beyfuß, St. Johannis-Gürtel-Wurzel. *Radix in usum medicum raro vocatur; carbonibus vero Artemisiæ, qui nihil aliud, quam radices annosæ, demortuæ, a multis etiam celeberrimis practicis adscribuntur vires antepilepticæ. Colligendos esse hos carbones circa festum Johannis Baptiste, perhibent.*

Asari, Nardi rusticæ sive silvestris, Vulgaginis, Asari foliis petiolatis subcordatis, floribus trifidis, Linn. Racine de cabaret, d'Asarum, ou Oreille d'homme, Haselwurzel, wilder Nardus. *Est planta indigena, ac in silvis & dumetis, plerumque sub corylis invenitur, unde etiam nomen germanicum accepit; nam corylus Haselstaude audit. Vomitus excitare solent in substantia exhibitæ, in infuso, præprimis aquoso, rarius. Menses cient, vehementer purgant, & urinam movent; suspectis igitur non temere dari debent. A nonnullis ad quartanam commendantur, ante paroxysmum exhibendæ. Fortiori decoctione, vim emeticam & purgantem deponunt, atque diureticam & uterinam acquirunt. Hydropicis & phlegmaticis præ aliis conducunt; Melancholicis vero pessima symptomata excitasse, Hermannus tradit.*

Asparagi sativi, hortensis, Asparagi altilis, Asparagi caule herbaceo erecto, foliis setaceis, Linn. Racine d'Asperge, Spargel-Wurzel. *Coluntur in hortis, & radicibus quinque aperientibus majoribus, adscribuntur. Eligendæ carnosæ, primo vere collectæ. Aquæ cui incoquantur nonnihil acrimoniæ affricant.*

Asphodeli, Hastulæ regis, Asphodeli caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lævibus, Linn. Racine d'Asphodele, Goldwurzel, Affodilwurzel. *Quæ in officinis occurrunt radices Asphodeli, non sunt veri Asphodeli, sed Lilii floribus reflexis, aliis Martagon dicti, radices seu bulbi. Nascuntur in montosis silvis, & indigenæ sunt. Menstrua & urinam pellunt, interne sunt; externe emolliunt & maturant.*

Barbæ caprinæ, Barbulæ caprinæ, Ulmaræ, Reginæ pratorum, Filipendulæ foliolo impare majore trifido, Linn. Racine de barbe de chevre, de la Reine des prés, Geißbartwurzel. *Adstringunt & ad emplastrum contra rupturas requiruntur. Habentur a nonnullis alexipharmacæ, vulnerariæ, & decoctum in dysenteria & ad injectiones in ulceribus fistulosis commendantur.*

Bardanæ, Lappæ majoris, Personatæ, Arctii, Linn. Racine de Bardane, ou de Glouteron, grosse Klettentwurzel, Buzen-Klettentwurzel. *Eligantur radices juniores, non lignosæ. Ubique occurrunt. Habentur alexipharmacæ & sudoriferæ, atque in arthritide, lue venerea & mercurii in corpore delitescens ægritudinibus commendari solent. S. Pauli decoctum radicis Bardanæ, lignorum decocto præfert, præsertim in emaciatis, & raræ texturæ ægris.*

Been albi, sive Behen, Centauræ calyicibus squamatis, foliis radicalibus lyratis, pinnulis oppositis, caulinis alexipharmacis, Linn. Racine de Been blanc, weisser Behen, Wiederstoß, Gliedweich-Wurzel.

Secun-

Secundum *Rajum*, radices sunt *Jaceæ Orientalis* *Carthami* facie, flore luteo magno. Optimæ censentur radices majores, non cariosæ, amarore haud ingrato. *Adscribitur vis cordialis & alexipharmaca. Raro præscribuntur.*

Rad. Been rubri, Statices caule nudo ramoso, L. Racine de Been rouge, rothe Behenwurzel. Sunt *Limonii maritimi* majoris C. B. Optimæ censentur, quæ sunt colore saturato rubro, recentes, sapore adstringente, & subaromatico præditæ. *Exoticæ sunt, & easdem cum præcedentibus vires habent.*

Betæ rubræ, Rapi rubri, Bêterave, rothe Rüben. Coluntur in hortis, & siccatae raro in usum vocantur; recentium etiam usus magis culinaris, quam medicus est. *Succus vero præbet errhinum egregium; mucum prolicit absque sternutatione: hinc illis, qui obstructione narium vel coryza sicca laborant, imo ubi metus est oxæne, bonam opem præstent. Radix ano, suppositorii loco immissa, alvum stimulat.*

Bismalvæ, vide Rad. Altheæ.

Bistortæ, Serpentariæ vulgaris rubræ, Colubrinæ, Polygoni caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus, Linn. Racine de Bistorte, Schlangen- oder Natterwurzel, Wurmwurzel. Nascuntur in locis humentibus. Indigenæ sunt. *Manifeste adstringunt; vulnerariis & alexipharmacis adnumerantur.*

Borriginis, Buglossi latifolii, veri, urbani, Racine de Bourrage ou Bourrache, Borragen, Borretschwurzel Colitur in hortis. *Adscribuntur vires antimelancholicæ; rarus tamen earum est usus.*

Brittanica, Rumex aquaticus L. Patience d'eau, wilde Rhabarber. Radix fibrosa, magna, extus fusca, intus crocea, proprii sed hebetis odoris, saporis contra acris, amari adstringentis. Passim in aquis Europæ provenit. *Resolvit, roborat, leniter alvum ducit, obstructiones reserat, sanguinem purificat. Datur ad drachmas duas in aqua decocta. Ejus decocto etiam ulcera cacoëthica lavant.*

Brusci, Rusci myrtifolii aculeati, Myrtacanthæ, Rusci foliis supine floriferis nudis mucronatis, Linn. Racine de petit Houx, de Rusc, ou de Frélon, Bruschwurzel, Mausdornwurzel. Sunt albicantes, saporis ab initio subdulcis, postea amari. Copiose in Italia proveniunt. Radices Phalangii ramosi flore parvo nonnunquam in officinis pro his venduntur. *Diureticæ sunt, & radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.*

Bryoniæ, Vitis albæ, Vitis silvestris, Uvæ anginæ, Bryoniæ foliis palmatis utrinque calloso scabris, Linn. Racine de Bryone, de Couleuvrée, ou de Vigne blanche, Zaunrüben, Zaunrebenwurzel, Stickwurzel, Hundsfürbsentwurzel, a nonnullis etiam **weisser Enzian** vocantur. Radix prægrandis, rapæ instar, omnibus nota. Saporis est acris, amari, & nauseabundi. *Interne sumta, valide purgat, & serum educit; Anthelminticis nec non emmenagogis, adscribitur. Dosis in infuso scrupuli quatuor vel drachmæ duæ, in substantia scrupulus unus ad drachmam semis. Externe discutit & resolvit.*

Rad. Buglossi, Linguae bovis, Buglossi angustifolii, *Racine de Buglose, Schsenzungenwurzel.* Cum radicibus Borruginis conveniunt, & raro in usum vocantur.

Caa-apia, Caapeba, Cissampelos Caapeba L. Est radix pennam anserinam crassa, verrucosa, filamentis ad latera & inferius praedita; exterius e griseo flavescens, interius alba. Gustu est acris & vere ejusdem virtutis quae Ipecacuannae. Mitius tamen agit, & majori dosi, si vomitus excitare debet, exhibenda. *Indigenae plantam contundunt integram & succum expressum hauriunt, nec non vulneribus a colubris vel sagittis venenatis influctis instillant.*

Calami aromatici, Calmus. Vide Rad. Acori veri.

Calcitrapae, Centaureae calcitrapae, calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentalis, caule piloso, *Chausse Trappe.* Est radix cylindroidea, digitum crassa, sub cortice griseo substantiam albam includit, odoris vacuum, saporis levissimi. In Germania, Helvetia & Anglia ad vias crescit. *Corticis drachmam vino infusam & per plures menses assumtam Nephriticis opitulari asserunt, etiam contra febres intermittentes laudant.*

Capparis, vel Capparidis spinosae fructu rotundo minori, Capparis aculeatae, Linn. *Racine de Caprier, Capperwurzel.* Nascuntur copiose in Apulia. Eligendae albae, non cariosae. *Cortices saltim hujus radice in usum veniunt, & inter radices quinque aperientes minores numerantur. Spleneticis, hypochondriacis & arthriticis commendantur; usus est in infusis.*

Cardopatii, Cardopatiæ, Carlinæ humilis, Chamæleonis albi, Karlinæ, Carlinæ caule unifloro, Linn. *Racine de Carline, de Chardouffe, ou de Chardonnerette, Ebertwurzel.* Amant montosa & aprica; copiose in Ducatu Wirtenbergico reperiuntur. Saporis & odoris aromatici grati; *virtutis alexipharmacæ, carminativæ & stomachicæ sunt.*

Cardui benedicti, Cardui sancti, *Racine de Chardon benit, Char Dobenedicten-Wurzel, Spinnendistel-Wurzel.* Hortensis est planta. *Usus radice rarus in officinis; frequentior herbæ.*

Caroli Sancti, *Racine de St. Charles, St. Carls-Wurzel,* ob insignes facultates ita dicta. *Garcias ab Horto sequentibus verbis plantam describit: nostro lupulo similis est, & perticis se convolvit illius more, quibus si careat, humi spargitur & diffunditur. Folia etiam lupulo similia colore viridi sed obscuriore, odore gravi. Neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex quo aliae oriuntur digiti majoris crassitudine, colore candicantes. Cortex radicis, qui pro optima & medicinali parte plantæ habetur, facile abscedit, & odoris est aromatici, gustus amari, cum quadam acrimonia. Nascitur temperatissimis provinciæ Mechoacan locis, solo neque nimium sicco, neque nimium humido. Cortex hujus radice matutino tempore commanducatus multam pituitam, aliosque humores ex capite elicit, eamque ob causam rheumatismos, capitis dolores & defluxiones curat. Gingivis abscedentibus auxilio est, dentes stabilit, eosque a corruptione defendit ac liberat. In nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam & stomacho expellit. Menses movet, & ad Epilepsiam commendatur.*

Exhibetur tam in pulveris forma, quam in decocto. Dosis in substantia non definitur; parvam tamen esse debere, Auctor monet. Drachmas duas in tribus aquæ sextariis, ad dimidias coqui suadet, additis sub fine coctionis citri & cinnamomi corticibus. Decocti hujus sex uncias singulis diebus mane, addito saccharo sumere jubet.

Non semper tamen emeticum habere effectum, sed & per sudorem operari hoc decoctum, Monardes auctor est.

Rad. Caryophyllatæ vulgaris, Sanamundæ, Lagophthalmi, Geum urbanum L. Racine de Benoite, de Récise, de Galliot, Benedictwurzel, Weintwurzel, Nägelein-Benedictwurzel. Proveniunt in incultis, ad dumeta & juxta sepēs. Odorem spirant, & saporem aromaticum, caryophyllaceum; colorem intus habent carmesinum, & virtutem roborantem; cerevisiam ab acore præservant. Aphrodisiacæ, vulnerariæ, pectorales & uterinæ habentur. Recentiores contra febres cortici substituunt.

Cassummuniar, Risagon, M. Lond. R. Bringalle Indorum, Zedoaria, radice lutea Breyn. Prodr. an Zerum beth, seu Zingiber rubrum sylvestre Ternatense, Camell. Syllab. Stirp. Insul. Luzon. Racine de Cassummuniar, Cassummuniar, Cassamoniar, falscher runder Zittwer, Blockzittwer. Radix est tuberosa, ad digitum & amplius crassa. In taleolas transversim secta ad nos venit. Superficie laterali, circulis quasi geniculatis, uti Galanga, notatur. Foris est cinerea, intus flavescens, sapore subacri, amaricante, aromatico, odore fragrante. Ex India adfertur Orientali. Plantæ characterem Botanici hucusdum ignorant. Vires prædicantur nervinæ & confortantes; hinc in affectibus hystericis, colica, vertigine, apoplexia & motibus convulsivis commendatur. Dosis in substantia scrupulus semis ad drachmam semis.

Cavæ, vide Rad. Aristolochiæ rotundæ cavæ.

Chelidonii vulgaris majoris, Chelidoniæ majoris, Chelidonii pedunculis multifloris, Linn. Racine de grande Chelidoine, groß Schellkraut-Wurzel. Scatet tota planta succo acri luteo. Ictericis & hydropicis commendantur.

Chelidonii, sive Chelidoniæ minoris, Ficariæ minoris, Chelidonii rotundifolii, Ranunculi foliis cordatis angulatis petiolatis, Linn. Racine de petite Chelidoine, Feigwarzenwurzel, klein Schellkrautwurzel, Scharbocksfrautwurzel. Colligendæ primo vere. Spleneticæ & antiscorbuticæ habentur; recentes contusæ, cum pulpa pomorum & croco mixtæ, ad tumores & dolores hæmorrhoidum laudantur.

Chinæ, Chinnæ, Cinnæ, Smilacis caule angulato aculeato foliis dilatato-cordatis inermibus, Linn. Racine de Quinquina, d'Esquine, ou de Squine, Chinawurzel, Pockenwurzel. Planta a plerisque pro Smilacis specie habetur. Kæmpferus sub nomine Smilacis minus spinosæ, bacca sive fructu rubicundo, Japonensibus Sankira, officinis China dictæ, describit, atque in incultis locis, inter filices & vepres, luxuriari perhibet. Et hæc est China orientalis vera. Ex America aliam asportant, cujus planta sub eodem genere mi-

litat. Olcacatzan pahuatanica. *Hernand.* Jupicanga Brasiliensibus. *Pison. Hist. Bras.* Smilax aspera, fructu nigro, radice nodosa, magna, farinacea, *Sloane Catal. Pl. Jam.* Orientalis in Malabaria, Cuncan, China, aliisque regionibus; Occidentalis in Hispania nova, Peru & Brasilia nascitur. Eligantur recentes, non cariosæ, ponderosæ, foris fusci, intus ex albo rubescentis coloris. *Commendari solent Chinæ radices in morbis serosis, lue venerea, podagra & cæteris. Usus est in decoctis. Hodie non tanti æstimantur harum radicum virtutes.*

Rad. Cichorei hortensis, fativi, Seris fativæ, Racine de Chicorée, Wegwarten, Garten-Wegwarten, Hindläusten-Wurzel. Coluntur in hortis, atque primo vere, vel adulto autumno effodiuntur. Eligendæ sunt carnosæ, non lignosæ. *Ad hepatis & bilis vitia commendari solent, atque etiam in usum culinarium cedunt.*

Cichorei, Cichoreæ agrestis seu silvestris, Cichorii caule simplici, foliis dentato sinuatis, *Linn. Racine de Chicorée sauvage, wilde Wegwarten, Wegweiß, Hindläuf-Wurzel.* Crescunt juxta vias in campestribus. *Decoctis colorem reddunt, vario gradu coctionis, vel flavum, vel smaragdinum, & saporem amarum. Vires habent hortensis.*

Cipo de Cameras. Hujus radices *Acta phys. Med. N. C. Vol. I.* mentionem faciunt, & cum *Hypecacuanha* easdem vires adscribunt, mitiores tamen, & quod sine molestia operetur: addunt, quod coloris sanguinei, majoris etiam pretii. Forfan hæc radix est *Hypecacuanha flava* & species *Caa-apixæ*.

Colchici communis, autumnalis, Colchici foliis planis lanceolatis erectis, Linn. Mort aux Chiens, Tue-Chien, Chiennée, Colchique, Zeitlosen, Spinnblumen-Wurzel. In pratis copiose provenit; floret versus autumnum. Ab antiquissimis temporibus hæc radix pro venenatissima habita; seculo elapso a *Cl. Wedelio* ut amuletum contra pestem & alios morbos contagiosos corpori humano adplicata; novissime ad debellandos pertinacissimos diversi generis morbos interne propinata est. *Stærkius & alii Mel colchicum asthmaticis & hydropicis summopere commendant.*

Colombo. Taleolæ pollicares, irregulariter rotundæ five longitudinaliter sectæ, sub cortice rugoso bruneo medullam flavicantem, levissime striatam, laxiusculam concludunt, odore fere expertes, gustu amaro. Ex urbe Colombo Insulæ Ceylon advehitur. *Laudatur à viantiseptica, & roborandi ergo in cholera, vomitu, diarrhæa, dysenteria ad drachmam unam singulo trihorio, exhibetur.*

Colubrinæ. Vide **Rad. Bistortæ.**

Consolidæ majoris, Symphyti majoris, Symphyti foliis ovato lanceolatis decurrentibus, Linn. Racine de grande Consoude, d'Oreille d'Ane, Wallwurzel, Schwarzwurzel, Schmeertwurzel, Beinwelle. Sponte proveniunt in locis humidis, coluntur etiam in hortis. *Sunt admodum mucilaginosæ & adstrictivæ. Adduntur decoctis vulnerariis, & emplastris catagmaticis. Ad contusiones & suffusiones cataplasma ex radicibus multum laudatur.*

Contrayervæ, Drackenæ Cyperi odoris, Dorsteniæ scapis radicatis, Linn. Racine de Contrayerve, Peruvianische Giftwurzel.
Sunt

Sunt radices nodosæ & fibrosæ, coloris foris rufi, intus pallidi. Locus natalis est Peru, Mexico, nova Hispania, Vera Crux, Tabago & Insula St. Vincentii. Optimæ censentur radices recentes, ponderosæ, sapore subadstringente aromatico præditæ. Tam aqua pluviali, quam spiritu vini extractæ, tincturam exhibent rubram. *Contrayerva*, vocabulum Hispanicum, significat *contra venena*. Sunt alexipharmacæ, roborantes, sudorem movent, & specificæ ad dysenteriam malignam commendantur.

Rad. Contrayervæ novæ, albæ, majoris, Mexicanæ; Psoraleæ, foliis quaternis & quinis; Psoralea foliis digitato quinatis: foliolis inæqualibus, Linn. Racine de Contrayerve blanche de Mexique, weisse, grosse, Mexicanische Giftwurzel. Radix est digitorum vel pollicum duorum crassitie. Cortex est inæqualis, nodosus fusci coloris. Substantia radice alba cum medulla lignosa gustu deprehenditur aromatica subdulcis. Nascitur in Americæ meridionalis Provincia Gujana, & easdem habere perhibetur virtutes, quas *Contrayerva officinalis*.

Costi amari, officinalis, Comagenii, iridem redolentis, Racine de Costus amer, bittere Costuswurzel. *Costus Indicus, violæ martiæ odore.* Mus. Zeil. *Tsiana-Kua*, Hort. Malab. Part. II. tab. 8. *Chiansou*, Sinensium. Radices sunt solidæ, crassæ, oblongæ, interdum per medium dissectæ, foris cinerei vel pallidi, intus albicantis coloris, saporis aromatici, amaricantis, odoris ad Iridem Florentinam accedentis. *Costus*, olim ex Arabia & Syria advectus, Arabicus & Syriacus dicebatur; crescit vero etiam in nemoribus Malabariæ, Brasiliæ & Surinamæ. Planta est graminifolia, quæ florem in caulis foliosi vertice profert. Terminatur vero hic caulis capitulo piriformi imbricato; squamis ovatis, obtusis, concavis, e quibus exeunt flores candidi singuli. Perianthium parvum, tridentatum germini insidet. Petala sunt tria lanceolata, concava, erecta, æqualia. Nectarium monophyllum, magnum, oblongum, tubuloso-inflatum, ore ringens, bifidum in duo labia, e medio reflexum. Antheræ duæ parallelæ. Capsula feminalis subrotunda, trilocularis; semina plana triangularia.

Costi dulcis, Racine de Costus doux, süsse Costuswurzel. Ejusdem plantæ radicem esse, cujus descriptionem ex *Horto Cliffortiano Linnæi* modo dedimus, plurimi perhibent, & non nisi loco natali, & vetustate radice, differre; per vetustatem enim, non solum obscuriorem colorem, sed amaritudinem quandam contrahere, & tunc sub *Costi amari* nomine venire; recentes vero radices albicantes, *Costum dulce* exhibere solent. Tam *Costi amari*, quam *dulcis vires sunt stomachicæ, uterinæ, carminativæ & alexipharmacæ. Ad Theriacæ compositionem requiruntur; violaceo odore urinam inficiunt.*

Cucumeris silvestris, Cucumeris asinini, Elaterii, Momordicæ absque cirrhis, Linn. Racine de Concombre sauvage, Eselsfürbismurzel, Springfürbismurzel. Sunt radices rapi instar magnæ; coluntur in hortis; planta est annua. Ex fructu paratur *Elaterium*. Vehementer alvum movent, & raro interne, nisi hydropicis, præscribi solent; recentes ad Unguentum de *Arthanita* expetuntur.

Curcumæ, Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis, nervis lateralibus numerosissimis, Linn. Racine de Curcuma, Safran d'Indes,

d'Indes, Gilbwurz, Gelbsuchtwurz, gelber Ingwer. Mangella - Kua. H. M. Arabibus *Curcum*, aliis *Terra merita*. Radix Zingiberis facie, intus flavida; celeberrimo Boerhavia est *Cannacori radix crocea*. Ex India Orientali advehitur. Eligitur recens, ponderosa, non cariola, saporis aromatici. Incidit & resolvit, atque hydropicis & ictericis commendatur. Præter medicos usus etiam tinctoribus inservit. Indi, loco croci, ad cibos colore flavo inficiendos; Curcuma utuntur.

Rad. Cyclaminis, Arthanitæ, Panis porcini, Cyclaminis orbiculato folio interne purpurascens, Cyclamen foliis cordatis corolla reflexa, Linn. Racine de pain de pourceau, Schweinsbrod, Erdaßfel, Waldrüben, Erdscheibwurz. Radix colligenda autumnis. Saporem primo lingue mucilaginosum, dein acrem fervidum, imprimit. Potenter resolvit, & ob vim menses & factum pellentem, cum circumspeditione dari debet; recens ad Unguentum de Arthanita adhibetur.

Cynoglossæ majoris vulgaris, Cynoglossi sive Lingue caninæ, Cynoglossum foliis lanceolato ovatis tomentosis, corollis calicem æquantibus, Linn. *Racine de langue de chien, Hundszungentwurz.* Sponte proveniunt in locis aridis, & circa sæpes. Refrigerant & adstringunt, vulnerariis adscribuntur, & ad pilulas de Cynoglossis in officinis expetuntur. Sunt anodynæ, humorum acrimoniam mitigantes, & ad alvi fluxus, hæmoptysin &c. commendabiles. Pediculos pellere perhibentur.

Cyperi longi odorati, Cyperi odorati, Panicula sparsa speciosa, Cyperus culmo triquetris folioso, Panicula foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spiculis alternis, Linn. *Racine de Souchet long, lange Cyperwurz.* Vires sunt sequentis.

Cyperi rotundi, Orientalis majoris, C. B. Cyperi Syriaci & Cre-tici, Cyperus culmo triquetris subnudo, umbella decomposita, spiculis alternis linearibus, Linn. *Racine de Souchet rond, runde Cyperwurz.* Longus Cyperus in Gallia, præsertim in Provincia & Italia reperitur; rotundus vero ex Ægypto, & Orientalibus regionibus advehitur. Ab Ægyptiis *Hodweg* vocatur, & in lacubus, aliisque locis palustribus provenit. Alpin. Eligendæ sunt radices odoratæ, graves, non cariosæ. Ut plurimum ad odora menta Cyperi est usus; interne vero adhibitus, vim habet stomachicam, discutientem, & urinam moventem. Dosis in pulvere drachma semis.

Dentariæ majoris, Squamatæ, Squamariæ, Anblati, Plumbaginis foliis amplexicaulibus, Linn. *Racine de Dentaire grande, Schuppentwurz, Streubelwurz, Kreuzwurz.* Locos amant umbrosos, & primo vere colliguntur. Raro in usum vocantur. Aqua, inde destillata, antiepileptica habetur.

Dentariæ minoris, Dentariæ pentaphyllæ, Violæ dentariæ, Sanniculæ albæ, Symphyti dentarii, *Racine de Dentaire petite, Zahnwurz, weisse Steinbrechwurz.* Ex Helvetia adferuntur. Adstringunt & siccant; Herniosis & vulneratis commendantur.

Dentis Leonis, vide Rad. Taraxaci.

Rad. Dictamni albi, Diptamni officinalis, Fraxinellæ, Fraxini pumilæ,
Racine de Fraxinelle, weisser Diptam, gemeiner Diptam, Aschswurzel.
 Nascuntur in montosis Galliæ, Italiæ & Germaniæ locis. Eligantur radices albicantes, ab interiore parte lignosa liberæ, non cariosæ. *Alexipharmacæ potissimum & anthelminticæ habentur; ad Epilepsiam, menses & lochia pellenda commendantur.*

Dipsaci, Dipsaci fullonum, L. Chardon à foulons, Kartendistel, Subendistel. Radix alba, fibrosa, valde amara. Crescit in Europa temperata. *Nonnulli eam contra obstructiones abdominales decoctis admiscunt.*

Doronici, Doronici latifolii, scorpii radice, Romani, Doronici foliis cordatis obtusis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus, Linn. Racine de Doronic, Gensentwurzel, Schwindelwurzel. Proveniunt in montibus Helvetiæ, Tirolis, Styriæ & Austriæ. Eligantur, quæ sunt albicantes, saporis subdulcis, aromatici, acris, non cariosæ. *Specificum contra vertiginem habentur, & ad nonnullas compositiones pharmaceuticas expetuntur.*

Ebuli, Sambuci humilis, Sambuci agrestis, Chameactes, Sambuci caule herbaceo simplicissimo, Linn. Racine d'leble, d'Hieble, Attich, Ufer-Holunderwurzel. Cortices radice in usum vocantur, abjecta lignosa parte. *Vehementer purgant, & inter hydragoga numerantur.*

Ellebori albi, Veratri flore subviridi, Veratri caule ramoso, Linn. Racine d'Elleboire blanc, weisse Nieswurzel, Schampanierwurzel. Nascuntur in montosis & asperis locis Helvetiæ, Silesiæ, Austriæ & aliis Germaniæ provinciis. *Tournefortius distinctionem facit inter Elleborum & Veratrum: album potius Veratrum appellari debere censet, quod & Rajus monet. Differt enim ab Helleboro, quod corniculis careat, & semen habeat marginatum; ideo etiam, diversis nominibus hæc duo genera distinguenda esse, perhibent. Vehementer per superiora & inferiora purgant, etiam in parva dosi exhibitæ, & nonnunquam convulsiones excitasse, exempla prostant; proinde in substantia, nonnisi robustissimis, maniacis vel melancholicis, dari debent: sufficit grana sex vel octo pro una dosi præscribere; securius vino maceratæ, & vehementia orbatæ, ubi ad scrupulum unum ascendere licet, dantur. Usus frequentissimus vero Ellebori est in pulveribus sternutatoriis, sed & hic caute instituendus. Suibus etiam egregia est medicina. Succus Ellebori albi, vulneribus inditus, lethalis. Tela sive sagittæ, succo intincta, vulnera faciunt insanabilia, modo non lethalia. Hac radice sætum ex utero ejicere apud Kosacos mos est.*

Ellebori nigri, Hellebori nigri angustioribus foliis, flore roseo, Melampodii, Veratri, Hellebori scapo subnudo bifloro, foliis pedatis, Linn. Racine d'Elleboire noire, schwarze Nieswurzel, Christwurzel. Nascitur optimus Helleborus in Stiria. Eligendus radicibus fibrosis, longis, nigris, carnosus. Caveant Pharmacopœi, ne Helleborastrum, qui Hellebori albi est species, pro nigro vero emant. Folia Hellebori nigri veri sunt glabra, serrata, & separatim spectata, foliis lauri fere similia. Pharmacopœi substituunt nonnunquam, parvo, ut putant, vel nullo errore, radicem Ranunculi fœniculaeis foliis, Hellebori nigri radice. Linnæo vocatur hæc planta: *Adonis flore dodecapetalo, fructu ovato. Raro solus, nisi illis, qui absque febre delirant, in substantia,*
 H sed

sed plerumque in infusis & vinis medicatis, ad educendos humores melancholicos, præscribitur. Datur in substantia robustioribus, a granis quindecim ad drachmam dimidiam, in infuso ad drachmam integram, imo unam semis, exhibere licet. Sicut autem, quid veterum Elleborus, non certo constat; ita nec satis certa videtur laus a veteribus adscripta. Inprimis caveant Pharmacopœi a radice apud Materialistas & Rhizotomos passim obvia, quæ fibras habet tenuissimas, nigerrimas, gustantis linguam primum sapore non adeo ingrato, sed postmodum acri-nauseoso inficiente, & caput per aliquot horas imo integrum diem tentante.

Rad. Enulæ campanæ, Helenii, Elenii, Racine d'Aunée, d'Aune, d'Enule campane, Alantwurz. Vocatur etiam ab aliis *Panax Chironium*. Linnæo, *Aster foliis ovatis, rugosis, subtus tomentosis amplexicaulibus. Aster omnium maximus Raji.* Coluntur in hortis, effodiantur primo vere. Incidunt & resolvunt; alexipharmacæ, stomachicæ & pectorales sunt: Cum aqua, per vesicam destillatæ, oleum præbent butyraceum, & spermatis ceti instar foliaceum.

Eryngii, Lyringii, Acus veneris, Capituli Martis, Asteris inguinalis, Cardui volutantis aculeati, Eryngii foliis radicalibus pinnato tripartitis dentatis, Linn. Racine de Panicaut, ou de Chardon Roland, Mannstreu, Radendistel, Brackendistel. Vocantur in usum Eryngii vulgaris, campestris radices. Eligantur carnosæ. Radicibus quinque aperientibus minoribus adnumerantur; urinam cient, & venerem languidam stimulare creduntur.

Esulæ minoris, Tithymali Cyparissæ, Cupressini officinalis Linariæ admodum similis, Euphorbiæ foliis lanceolatis, umbella universalis polyphylla: partialibus trifidis triphyllis: propriis dichotomis, Linn. Racine de Tithymale, d'Esule, Wolffsmilchwurzel. Proveniunt copiose in locis sterilibus, incultis, aridis, circa vias. Succo scatent lactescente, acri, caustico. Eligantur cortices radicum. *Hydragogis adnumerantur; vehementer purgant, hinc per acida corriguntur atque mitigantur. Dosis a scrupulo uno ad duos, raro ad drachmam, in substantia; in infuso vero, ad drachmam unam ascendere licet, hac tamen præcautione, ut acido antea corrigantur, aceto vel succo citri.*

Farfaræ, Tussilaginis, Bechii, Ungulæ caballinæ, Tussilaginis scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis, denticulatis, Linn. Racine de Pas d'Ane, de Tussilage, Brand-Lattich, Huf-Lattichwurzel. Crescunt in locis humidis, circa rivos. Primo vere, dum florescere incipiunt, colligi debent. *Pectorales sunt, & phthysicis conveniunt; ex recentibus paratur Looch de Farfara.*

Filicis, Racine de Fougère femelle, Farnkrautwurzel. In usum vocari solet illa species, quam *Filicem majorem ramosam, sive fœminam radice repente* vocant. Linnæus in sua Materia medica *Filicem non ramosam dentatam sive Filicem marem* substituit. Colligi debent autumnali tempore. Ubique proveniunt, præcipue vero apud nos in silva martia largissimus earum est proventus. *Latis tæniis & lumbricis expellendis vel solæ, vel cum Æthiope minerali, & quovis laxante mixtæ, ad scrupulum unum vel drachmam dimidiam exhibitæ, inserviunt; commendantur in decocto etiam lienosis, calculosis & podagricis.*

Rad.

Rad. Filipendulæ, Oenanthes, Saxifragiæ rubræ, Filipendulæ foliis pennatis: foliolis uniformibus, Linn. An Molon Plinii? Racine de Filipendule, de Saxifrage rouge, de Fougère aquatique, rothe Steinsbrechwurzel. Proveniunt in pratis & pascuis montosis. Vocatur etiam planta, *Filix florida, Osmunda, Wasserfarn.* Præter vires aliarum filicis specierum, huic præprimis virtus vulneraria attribuitur, atque ex alto lapsis, læsis & ruptis commendatur; sanguinem enim coagulatum dissolvere creditur. Bœcler. Sic etiam ad fluorem album, & a *Sylvatico* ad epilepsiam laudatur. *Rajus* pro specifico ad rachitidem vel in decocto, vel in forma pulveris exhibitam, habet. *Hist. Plant.*

Fœniculi, Fœniculi vulgaris, Anethi fructu ovato, Linn. Racine de Fenouil, Fenchel-Wurzel. Seruntur in hortis, & altero post factionem anno effodiuntur. Pars radicis corticosa in usum vocatur. *Radicibus quinque aperientibus majoribus adscribuntur.*

Fragariæ, Fragulæ, Fragariæ vulgaris, Fragariæ flagellis reptantis, Linn. Racine de Fraïsier, Erdbeer-Kraut-Wurzel. Sponte in silvis proveniunt. Autumnali tempore colligendæ sunt. *Vim habent subadstringentem; adduntur decoctis vulnerariis. Aquam decoctæ rubedine inficiunt.*

Fraxinellæ vide Rad. Dictamni albi.

Galangæ, ad Aromata referuntur.

Gentianæ albæ, Cervariæ albæ, Laserpitii latifolii, Linn. große weisse Hirschwurzel. Radix magna, crassa, fibrosa, albicans, intus alba, rugis circularibus distincta, ramosa, odorifera, aromatica, amaricans. Altiorum montium progenies, passim per Europam occurrit. *Stomachico & alexipharmaco scopo a rusticis ad infusa recipitur. Veterinariis maxime in usu est.*

Gentianæ cruciatæ, Gentianæ minoris, Racine de Gentiane Croisette, Modelgeer, Kreuzwurzel. Indigenæ sunt. *Incidunt, abstergunt, aperiunt, menses provocant, febribus medentur, lumbricos enecant, atque vulnerariæ sunt.*

Gentianæ majoris, luteæ, Gentianæ veterum, Gentianæ corollis rotatis, verticillatis, Linn. Racine de Gentiane, Enzian, Genzian, Bitterwurzel. Copiose in Helvetia proveniunt, etiam in Ducatu Wirtenbergico, in silva nigra, & alpibus nostris, largus earum est proventus. Eligendæ sunt ponderosæ, carnosæ, non cariosæ. *Alexipharmacæ, roborantes & stomachicæ sunt.* Gentiana rubra nisi colore magis pallido nihil differt.

Gentianæ Indicæ, Racine de Gentian d'Indes, Indianischer Enzian. Sub hoc nomine a Lusitanis radix quædam geniculata, pallide flavescens, variis nodulis ac circulis instar Hypecacuanthæ calamistrata, ante aliquot annos ex America allata fuit. Tantæ & tam penetrantis aromaticæ, neutiquam tamen ingrata, amaritudinis deprehenditur, ut gentiana nostra, centaureum minus, colocynthis, aliaque amara cum hac collata, (sed nostro palato nunquam est oblata,) insipida ac inertia vocari mereantur.

De charactere botanico nihil nobis constat. *Laudatur adversus omnium malæ moratarum febrium indolem, atque unicum hujus radicis scrupulum, ad febrile fermentum*

tum ex visceribus excutiendum, plus efficere, quam plures corticis Chinæ drachmæ. Quin imo plurimos ex sola hujus radice Gentianæ Indicæ masticatione, & saliva deglutita, tanquam incantamento restitutos fuisse, Excell. D. Schendo, Russorum Exercituum medicus, perhibet.

Rad. Gentianæ nigræ, Cervariæ nigræ, Athamanthæ cervariæ, Linn. *Persil des montagnes.* Radix crassa, prælonga, extus fusca, intus alba, resinosa, odoris grati & fortis, saporis acris aromatici. Passim in montibus Europæ crescit. A quibusdam adversus febres intermittentes, Podagram &c. commendatur. Veterinariorum usibus etiam inservit.

Graminis, Graminis arvensis, loliacei, radice repente, Graminis canini, Tritici radice repente, foliis viridibus, Linn. Racine de Chien - dent, Graßwurzel, Queckentwurzel, Hundsgraß. Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus; censentur etiam diureticæ & anthelminticæ.

Helenæ S. Cyperus Hernand. Racine de la Ste. Helène, St. Helenen - Wurzel. Nodosa est, crassitudine pollicari, foris nigra, intus alba, saporis aromatici, Galangæ instar. Plantam tradunt ramos per terram diffundere, & folia ampla viridia habere. A Botanicis pro specie Cyperi habetur. Ex radicum nodis perforatis faciunt Sphæras, recitandis ad numerum precibus idoneas, quibus de collo suspensis, tam Hispani, quam Indi, multas tribuunt virtutes. Indi radices recentes lapidibus conterunt, totique corpori sibi balneaturis inducunt, persuasi, cutim constringere & membra roborare. Interne pulveris radice; ex vino haustus, ad ventriculi dolores & urinae difficultatem commendatur. Hæc Monardes.

Hellebori albi & nigri. Videantur Rad. Ellebori.

Hermodyli, Colchici alba radice, C. B. J. B. Racine d'Hermodylles, d'Hermès, Hermodyl, oder fremde Zeitlosen - Wurzel. Sunt radices oblongæ rotundæ, latæ, & quasi compressæ, cordis figuram referentes, foris albicantes, intus prorsus albæ, saporis dulcescentis & acris, odoris nullius. Nonnulli Botanicorum putant esse Radices Colchici, radice alba ficcata, C. Bauh. Ex Syria, Smyrna & Aleppo advehuntur. Eligantur albæ & solidæ. Leniter laxant; decoctis adduntur antarthriticis, antivenereis, ac a Wedelio inter leniora & mitiora purgantia recensentur; specificè laudantur ad guttam serenam in collyriis.

Hirundinariæ, Asclepiadis, multis floribus albicantibus, Vinctoxici, Asclepiadis caule erecto simplici herbaceo, foliis cordato lanceolatis, racemis conglomeratis alternis, Linn. Racine de Domppe venin, ou d'Asclepias, Schwalbentwurzel. Amant montosa. Vires habentur alexipharmacæ, incidentes, resolventes, & urinam pellentes; Hydropicis præcipue commendantur. Sunt tamen, qui propter affinitatem & similitudinem, quam planta cum Apocynis habet, non sine suspitione admittere volunt. Certum est, recentes radices vomitum provocare. Dosis in decocto uncia semis, in pulvere scrupulus unus vel etiam duo.

Rad. Hyoscyami, Jusquiami, Fabæ suillæ vel porcinae, Hyoscyami albi majoris, Hyoscyami foliis petiolatis, floribus sessilibus, Linn. *Racine de Jusquiamé blanche, d'Hannebane, Bilsentkraut-Wurzel, Toller oder Schlaffkraut-Wurzel*. Distinguuntur albus & niger, ratione florum & feminis: albus præfertur nigro, qui virulentior creditur. Distinguitur ab albo foliis amplexicaulibus. *Raro in usum veniunt; interdum ad somnum conciliandum in pediluviis adhibentur.*

Hypecacuanhæ, Ipecacuanhæ, Hyppoacannæ, dysentericæ radices, Loniceræ caule procumbente repente foliis obverse ovatis acutis scabris, Linn. *Racine d'Ipecacuanha, Indianische Ruhr-Spey-Wurzel*. Tres apud autores recensentur species, nigra, alba & flava. Ex his prima, scilicet nigra, apud nos in usum vocatur; alba, a Portugallis *blanca* vocata, rarior est, & flava, quæ tamen optima censetur, rarissima. Secundum alios: alia Hypecacuanha Guianensium est, *Barhavia diandra*; alia Insularum Caribæarum, *Asclepias Curassavica*; alia Virginianorum, *Spiræa trifoliata*. Ex America, & præsertim ex Brasilia advehitur. Planta in Horto Cliff. vocatur *Ouragoga*, a Pluckenetio, *Periclimenium parvum Brasilianum, alexipharmacum, a Rajo, Herba Paris Brasiliæ polycoccus*. Eligantur a fibris mundatæ, asperæ, multis annulis notatæ, tenaces, compactæ, pulposæ & resinosæ, quæ crassiori cortice sunt cinctæ. *Ipecacuanha lene & securum præbet emeticum, quod etiam infantibus dari potest, non raro per inferiora quoque purgat. Præscribitur ut plurimum in substantia, adultis, a scrupulo uno ad drachmam semis, infantibus, pro ratione ætatis, a granis duobus vel tribus ad decem, addito stimulo salino. A minimis dosibus infra granum dimidium descendantibus, quovis bihorio vel trihorio repetitis multa sibi promittunt recentiores in uteri hæmorrhagiis. Celebratur etiam alexipharmacum. Non magna ejus quantitas insimul in pulverem teri debet, sed tempore usus tantum recenter teratur; ær enim, qui minimas particulas subit, vim emeticam aufert.*

Jalappæ, Gialappæ, Chelapæ, Mechoacannæ nigrae, Gelapii, Rhabarbari nigri, Jalappa officinarum fructu rugoso Tournefortii, & Convolvulus Americanus, Jalappium dictus, Convolvulus Jalappa, Linn. *Racine de Jalap, Jalappen-Wurzel*. B. Barhave, *Mirabilem Peruvianam*, pro Jalappa habet, ea tamen distinctione, quod sub Nro. 5. Jalappam fructu rugoso officinarum ponit. *Ind. pl. T. 1. Gleditschius* saltem mirabilis longifloram pro vera Jalappa agnoscit. Radices sunt crassæ, oblongæ, rariarum instar, & orbiculatim incisæ nobis adferuntur. Patriam agnoscunt *Americam*, ubi in insula *Madera* largus & spontaneus earum est proventus. Eligendæ sunt nigricantes, resinosæ, ponderosæ, quæ candelæ admotæ mox accendantur. *Ufus & virtutes radices hujus sunt purgantes, omnibus notæ, anodynæ vero & somniferæ incertæ. Dosis resinosæ in substantia scrupulus unus ad drachmam dimidium.*

Ikan. Radices sunt mole parvæ, oblongæ, teretes tenuem in caudam expositæ; intus resinosæ, flavæ instar curcumæ, quam & aliis dotibus æmulantur, sapore tamen magis aromatico excellunt. Crescunt in Chinenfi provincia Suchuan. *Virtutes adscribuntur sanguinem purificantes, emmenagogæ, stomachicæ, carminativæ & sudoriferæ. Dosis scrupuli duo ad drachmam unam ex vino vel cerevisia.*

Rad. Imperatoriæ, vide Rad. Ostrutii.

Ipecacuanhæ, vide Rad. Hypecacuanhæ.

Iridis Florentinæ, Iridis albæ Florentinæ C. B. Iridis corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro, Linn. *Racine d'Iris de Florence*, *Florentinische Beil- oder Violett-Wurzel*. Ex Italia, Rhodo insula, Cypro & Dalmatia advehuntur. Eligantur radices albæ, longiores, crassæ, odore Violas martias æmulantes. *Tam ad odoramenta, quam in Medicina, multus earum est usus. Resolvunt, alvum & urinam movent, & præsertim hoc scopo infantibus, bono cum effectu, præscribuntur. Dosis grana tria ad scrupulum unum. Pulvis adspargitur ossibus denudatis, & ad cariem præservandam, vel præsentem auferendam, laudatur.*

Iridis nostratis, Iridis vulgaris Germanicæ, five filvestris C. B. *Racine d'Iris bleue, ou de Glayeul, gemeine Beilwurzel, blaue Schwertel- blaue Lilienwurzel*. Linnæus hanc radicem pro varietate præcedentis habet. Nonnunquam sponte proveniunt, coluntur etiam in hortis. Radix colligenda auctumnali tempore. *Commendatur hydropicis & œdematosis; alvum laxat & serum educit. Datur uncia dimidia in sero lactis decocta.*

Lapathi acuti, folio acuto, C. B. Oxylapathi J. B. Rumicis filvestris, Rumicis floribus hermaphroditis, valvulis crenatis grano incumbente, Linn. *Racine de Patience sauvage, de Parelle, Grind- wurzel, wilder Ampfer, Mangelwurzel, Lendenwurzel*. Ubique occurrunt. *Adstringunt & vulnerariæ censentur; ad scabiem & cutaneos morbos externe commendantur.*

Levistici, Lybistici, Ligustici, Laserpitii Germanici, Ligustici foliis multiplicibus, foliolis superne incis, Linn. *Racine de Leveche ou Liræche, Liebstöckel, Badkraut, Saukraut-Wurzel*. Coluntur in hortis. Verno tempore effodiendæ sunt. *Vires habent alexipharmacas, carminativas, uterinas & diureticas.*

Liliorum alborum, Liliorum candidorum, Liliorum foliolis sparsis, corollis campanulatis intus glabris, Linn. *Racine des Lis blancs, weisse Lilienwurzel*. Sunt radices bulbosæ, ex pluribus squamis carnosis constantes. Coluntur in hortis; auctumnali tempore colligendæ. *Ufus internus est rarus; in clysteribus & cataplasmatibus emollientibus frequens.*

Liquiritiæ, Glycyrrhizæ, Glycyrrhizæ leguminibus glabris, Linn. *Racine de Réglisse, Süßholz, Süßholzwurzel*. Præfertur Liquiritia, quæ in Germania & præcipue circa Bambergam colitur, Hispanicæ & Italicæ, quæ raro satis recens, & situ non corrupta, advehitur. Diu in aqua cocta amarescit; hinc decoctis in fine addi debet, remoto cortice exteriori. *Acrimoniam humorum demulcet, dolores nephriticos mitigat, atque expectorationem promovet. Datur in pulvere & in decoctis. Sed adhibenda cautio est, ne paulum ulterius, quam oportet, coctione continuata amarescat.*

Lopez. Radix, cujus variæ crassitiæ frustra in Europam ex Goa mittuntur, nec odora nec sapida; Cortex tenuiter amarescit. Gaubius denuo in usum traxit.

xit, & eam sive in decocto, sive sub forma pulveris ad drachmam semis aliquoties de die datam in vario alvi fluxus genere, diarrhœa maxime colliquativa egregie conducere confirmavit.

Rad. Malvæ, Malvæ vulgaris, flore minore, folio rotundo, Malvæ caule procumbente, foliis cordato orbicularibus obsoleto-quinquelobis, Linn. *Racine de Mauve*, *Pappelmurzel*. Cum radicibus *Altheæ* conveniunt; raro tamen in usum vocantur, nisi ad dentes affrictione extergendos.

Mandragoræ, Mandragoræ fructu rotundo, vel Maris, *Racine de Mandragore*, *Alraunwurzel*. Nascuntur in calidis regionibus, Italia & Hispania; coluntur apud nos nonnunquam in hortis. Usus in Medicina est rarus, quia ob vim stupefacientem inter infida medicamenta locari merentur. In pediluviiis, contra dolorem capitis & ad somnum conciliandum, nonnunquam adhibentur.

Mechoacannæ albæ, Bryonniæ Mechoacannæ albæ C. B. *Racine de Méchoacan*, *weisse Jalappa*, *weisse Rhabarbara*. Pertinet ad convolvulorum classem, & *Rajo* pariter ac *Linnæo*, *Convolvulus Americanus*, *Mechoacanna* dictus, audit. Ex America advehitur, & in regione Mexicana, quæ vocatur *Mechoacanna*, a qua nomen habet, provenit. Saporis & odoris fere omnis expers est. Eligenda ponderosa, alba, insipida, quæ non radicibus *Mandragoræ* vel *Bryoniæ* adulterata vel permixta, nec cariosa sit. Ad infantes laxandos commode adhibetur, quia insipida est. Dosis grana quinque, ad drachmam semis.

Sunt, qui varia funesta symptomata usum *Mechoacannæ* secuta, observasse, scribunt; quæ vero symptomata nunquam a *Mechoacanna* vera, sed a *Mandragoræ* radicibus, quæ faciem externam *Mechoacannæ* habent, & a falsariis his substitui solent, excitantur.

Mechoacannæ nigræ. Vide *Rad. Jalappæ*.

Metalistæ, *Matalistæ*, *Racine de Metalliste*, *Mechoacannæ* species esse videtur. A mercatoribus Batavis ex India Orientali ad nos advehitur. Cujus plantæ sit radix, nondum satis constat. Leniter alvum ciet, & serum educit. Dosis drachma una.

Mei, *Mei Athamantici*, *Anethi ursini*, *Fœniculi ursini*, *Athamantæ*, *Athamantæ* foliolis capillaribus feminibus glabris striatis, Linn. *Racine de Meum*, *Bärwurzel*, *Mutterwurzel*, *Bärenfenchel*, *Herzwurzel*. Sunt radices oblongæ, digiti vel pollicis crassitie, foris fuscæ, intus albicantes. Nascuntur in montosis Galliæ, Italiæ & Germaniæ, imprimis in silva Hercynia proveniunt. Eligantur recentes, non cariosæ. Vires sunt alexipharmacæ, carminativæ & *Theriacam* ingrediuntur.

Moringa. Est radix arboris *Lentisci* foliis, fructu magno anguloso, in quo semina *Ervi Joh. Bauhin.* a *Christophoro Acosta Libr. Aromat.* describitur: Frutex *Lentisci* magnitudine, cui folia persimilia, paucis prædita ramis. Multis scatet nodis, adeoque fragilis est, ut facillime cum ipse frutex tum rami confringantur. Fructum fert pedalem, octangulis insignitum, semina rotunda, Ervo similia. Radices pastinaceas hortenses luteas referre, nisi quod annulis pluribus numero, calamistratæ celebris instar *Ginseng* conspiciantur. Odoris sunt aromatici, & substantia videntur resinosa, *Zingiberis* instar, adversus omnis generis venenatorum animalium

malium morsus, & puncturas insectorum tam interne quam externe adhibetur. In cholericâ passione singularis efficaciam est, atque anthelmintica celebratur; præcipue ad Elephantiasin commendatur. Radice hac Hystrices perditæ delectari ajunt, & ab illa vim bezoardicam lapidis illius celebris Piedra del Porco originem habere. Abunde provenit in Indiæ Orientalis provinciis, præsertim vero apud Malabaros.

Rad. Morsus diaboli, Succisæ hirsutæ C. B. Præmorsæ; Jaceæ nigræ, Scabiosæ corollulis quadrifidis, caule simplici ramis approximatis, foliis lanceato-ovatis, Linn. Racine de Succise, Teufels-Abbis-Wurzel. Indigena planta, provenit in prætis. Radix colligenda primo vere. *Alexipharmaca & vulneraria habetur.*

Mungos, Ophiorhizæ, Linn. Racine de Mungos, Indianische Gistwurz. Radix est plantæ, Malaicæ *Hampaddu Tanah*, i. e. *fel terræ dictæ*, a sapore amarissimo omnium fere partium, præsertim radice, quæ intensam bilis amaritiem exhibet. Lusitanis *Mungo*, Batavis *Muncus* appellata, a Mustela quadam seu Viverra, quæ radicem monstrasse, & usum ejus pro alexipharmaco prima mortalibus prodidisse creditur. Est mustelæ huic is genius, ut serpentem naturali odio prosequatur; tradunt igitur, si contingat, morderi Muncum, pro alexipharmaco hanc radicem quærere, & ejus esu illico restitutum, certamen redintegrare. Indi, præcipue, qui *Sumatram* & *Javam* incolunt, radicem pro explorato habent antidoto, sive venenum extrinsecus vulnere illatum, sive intrinsecus assumptum fuerit. Maximam autem celebritatem radice hujus enatam esse ab eximia illa virtute, quam adversus exitiale illud & vix alio remedio vincibile Macassarense toxicum præstat, *Kämpferus*, qui nobis descriptionem dedit, perhibet. Patriam agnoscit *Javam*, *Ceylanam* & *Sumatram* insulas. Crescit, altitudine pedali & longiori, faciem eminus conspecta exhibet Centaurii minoris. Radix illi una est & simplex, spithamam longa, digiti crassitie, crebro vagoque deflexu intorta; cortice firmiter adnata fungosa, rufa, rugosa, substantia lignosa, dura, fibrarum exorte & fragili, coloris albidus, saporis amarissimi, instar Gentianæ, sed subtilioris & haud æque ingrati. Caule assurgit recto, tenui, æquali, ramulis raris, alterne adversis, quos folia ornant pari ordine disposita, rariora, angusta, longitudinis uncialis, figuræ lanceatæ; stylis singulis, ex furculorum axillis in duorum vel trium digitorum transversorum longitudinem exsurgentibus, tenuibus, deciduis, insistent flosculi circiter quinquaginta, parvi, in plures fasciculos digesti, & in umbellam tantillam, quam ungue obumbres, conglobati, pulchre rubentes; qui per microscopium cognoscuntur nudi, tubulati, extremitate in quinas & senas lacinias divisi. Arescente flosculo, ex umbilico ejus semen minutissimo pediculo protruditur, in aliis geminum, vel ex duobus seminibus ad bases concretum, fastigiis divaricatis, in aliis simplex & unum, inæqualis rotunditatis, & ex quadantenus compresso utrinque turbinatum, osseum, seminis Coriandri magnitudine, cute vestitum carnosâ adnata, per siccitatem rugosa, coloris promiscue vel nigricantis, vel ex viridi pallentis.

Dosis est drachma integra, vel etiam dimidia, cum haustu aquæ. Externe radicem sputo vel aqua in pultis formam tritam vulneribus venenatis imponere solent. Non solum autem contra venena, sed & in febribus putridis & malignis, & adversus morsum canis rapidi infallibilem habere virtutem, perhibet, quem laudavimus, Kämpferus.

Ninzin, Nindsin, Dsin, Gin-fem, Gensing, Ginseng, Nissi, Sium Nissi, Linn. Racine de Ninzin, ou Gin-seng, Indianische, Japa-

Indianische Kraftwurz. Vocatur planta a *Kämpfero*, *Sisarum montanum Corvense*, radice non tuberosa. Sunt radices oblongæ, vix digiti minimi crassitie, ut plurimum bifidæ, albicantes, nonnunquam flavescentes, saporis subdulcis & amaricantis simul, suavis, aromatici. Nascuntur in Japonia, China & regno Siam. Colliguntur ineunte hyeme, &, ad usum ut fiant idoneæ, ita præparantur: recens effossæ triduum mæcerantur in aqua dulci frigida, vel Oryzæ, mæceratæ in ahenò operculato suspenduntur in vapore super igne; tum exsiccatæ ab ima parte, usque ad mediam, duram, rufam, resinofam ac quasi pellucidam acquirunt faciem. Eligendæ bifidæ, flavescentes, & quæ quasi diaphanæ apparent. Virtutes harum radicum a Japonensibus & Sinensibus prædicantur variae, ex quibus præcipuæ sunt, quod robovent, pinguesfaciant, renibus conducant, analeptica & aphrodisiaca sint. Earum usu Sincæ homines veluti immortalitatem consequi perperam sibi persuadent. Kircheri China monument. illustr. p. 178. (Utuntur veluti Thea in India. Dantur ex infuso aquæ ferventis, vel etiam in pulvere, a scrupulo uno ad duos. Magno in pretio etiam in India sunt, & unica uncia olim quinquaginta florenis Hollandicis & ultra vendita est, quæ nunc decem modo constat. Sub nomine Ninzin alia quandoque venditur radix, quæ in Asiæ parte boreali & America septentrionali provenit. Hæc est radix *Panacis foliis ternis quinatis*. Gronov. Flor. Virg. Colore magis fusco, amaritiei majori & odore fortiori a præcedenti distinguitur. Cæterum iisdem laudibus evehitur.

Rad. Nymphææ albæ majoris, C. B. Nenupharis, Nenufaris, Nymphææ foliis integerrimis cordatis, calyce tetraphyllo, corolla multiplici, Linn. Racine de Nenufar, weisse Seeblumen-Wasser-Lilientwurz. Nascuntur in stagnantibus aquis & fluminibus pigro cursu labentibus. Adstringentis sunt virtutis, a nonnullis ad fluorem album commendantur.

Olsnitii, Apii lacteo succo turgentis, Apii silvestris, Thysselinii Plinii, Mei palustris Silesiaci, Selini sylvestris, Linn. Racine d'Olsnitium, Elsenich, Delniß. Radices sunt digiti minimi crassitie, candidæ, saporis amari, acris. Calefaciunt, incidunt & resolvunt; asthmaticis & ictericis conveniunt; alexipharmacæ sunt virtutis, urinam & menses movent.

Ononidis, Restæ bovis, Remoræ aratri, Ononidis floribus subsessilibus solitariis, lateralibus, caule spinoso, Linn. Racine d'Arrête Boeuf, de Bugrane, de Bugrade, Hauhechel-Stallkraut-Ochsenbrech-Wurzel. Vocatur etiam *Urinaria*, ob effectum. Adnumerantur radicibus quinque aperiens minoribus. Ubique ad vias occurrunt. Primo vere colligendæ sunt. Vim habent diureticam, abstergentem & attenuantem. Specificè ad sarcocelen a Tournefortio, ad drachmæ unius pondus pro dosi exhibitæ, commendantur.

Ostrutii, Imperatoriæ, Magistrantiæ, Astrantiæ, Imperatoria Ostrutium, Linn. Racine d'Imperatoire, ou d'Otruche, Meisterwurz, Rauserswurz. Intelligitur Imperatoria major C. B. Proveniunt in locis montosis, nostris Alpibus, etiam in Styria. Sunt nervinæ, alexipharmacæ, carminativæ & diureticæ. Præferuntur a C. Hoffmanno, Angelicæ & Zedoariæ, præsertim in colicis doloribus; ad quartanam, hydropem & febres diuturnas, non habere sibi parem, & divinum esse remedium, perhibet. Ad urinam pellendam, infusum theiforme, & in clystere, ad partum facilitandum, laudantur. Veterinariis quam maxime in usum venit.

Rad. Oxylapathi. Vide Rad. Lapathi acuti.

Palmae Christi, Orchidis palmatae, Satyrii Basilici, *Racine de Palme de Christ, Kreuzblumen-Wurzel*. Nascitur in humidis pratis. Cum Satyrio vel Orchide rotunda conveniunt; alii ad febrem quartanam & maniam commendant.

Pareiræ bravæ, Ambutua, Butua, Cissampelos foliis peltatis cordatis emarginatis, Linn. *Racine de Pareira brave, Amerikanische Griefswurzel*. A Brasilianis hæc planta *Caapeba*, a Lusitanis *Pareira brava*, quod vitem sylvestrem notat, vocatur. Planta in America, & præsertim in Brasilia nascens, juvenula existit farmentosa & tortuosa, arbores vicinas scandit, vel super terram repit, annosa vero crassitie rudentes navium adæquat. Radices juniores & minores foris coloris e cinereo sunt nigricantis; annosiores & majores, quæ sæpius ad crassitiem brachii perveniunt, extrinsecus plane nigricant, intrinsecus vero colorem habent ex fusco luteum, & saporem dulcamarum. Eligendæ sunt radices crassiores, non cariosæ. *Vim habent demulcentem & diureticam; hinc in doloribus spasticis, renum, pulmonum & articularum affectibus, nec non Hydrope & Ictero bonam præstant opem. Exhibentur tam in forma pulveris, quam in decoctis; sunt etiam, qui spiritu vini essentiam extrahunt. Incolæ Brasilicæ unciam unam hujus radices, cum salis armoniaci drachma, in mensura aquæ coquunt, & de hoc decocto singulis quatuor horis ægro haustum præbent. Dosis in substantia a scrupulo ad drachmam semis, in infuso drachmæ duæ.*

Pastinacæ, Pastinacæ sativæ, Linn. *Panaïs, Pestnagel*. Radices fusiformes, albæ rugis transversalibus rugosæ, carne laxiori, sapore dulci non-nihil aromatico perfusæ. Crescit passim per Europam. *Viribus ad Daucum accedit.*

Pefaulina. Ex provincia Chinenſi Junnan adferri tradunt, & propter colorem lacteum, quem recens habet radix, a Malayis *Lac tigrinum* appellari. Substantia est spongiosa, Agarici instar, cortice obducitur nigro. In medio lignosa substantia prædita est. Nunquam ante tertium ætatis annum effodiunt. Ex viribus & denominatione judicare licet, plantam hanc non sicut aliæ lactescentes, succum vehere acrem, sed potius dulcem uti Tragopogon, Scorzonera &c. *Sicca in pollinem trita albedine farinam tritici æmuletur; atque singulari gaudet virtute confortante: hanc ob causam hædics, tabe consumptis & hæmoptoicis commendari solet. Acrimoniam sanguinis & humorum temperat, & tam junioribus quam senibus proficua æstimatur. Præcipue vero gravidis, quod deliquia & nauseam abolet, datur. Confert etiam nephriticis, & illis, qui catarrhis ex acri materia cum febricula vexantur. Exhibetur in decocto, & quotidie quantum V. vel VI. vascula porcellana, theæ sorbillationi inservientia, capiunt, sumere suadent.*

Pentaphylli, Quinquefolii majoris repentis C. B. Potentillæ foliis digitatis, caule repente pedunculis unifloris, Linn. *Racine de Quinte-feuille, de Pempedula, Fünffingerkraut-Wurzel*. Proveniunt in locis arenosis. Colligantur verno tempore. *Alexipharmacæ, vulnerariæ & adstringentis sunt virtutis. A Tabernæmontano radicibus Chinæ æquiparantur; Theriacam ingrediuntur.*

Petasitidis majoris, vulgaris rubentis, rotundiori folio, Tussilaginis scapo imbricato thyrsifero, flosculis omnibus hermaphroditis, Linn.

Linn. *Racine de Pétafite, de grand Pas d'Ane, Pestilenz-Wurzel, Schweiß-Wurzel, neue Kraft-Wurzel.* Crescunt in locis humidis, pratis uliginosis & irriguis. Colligantur primo vere. Flores Petasitidis & Farfaræ ante folia proveniunt; hinc Farfara *filius ante patrem* apud nonnullos audit. *Vis attribuitur alexipharmaca, cardiaca & anthelmintica; externe ad bubones & maligna ulcera laudantur.*

Rad. Petroselini vulgaris, Apii hortensis, Apii foliis caulinis linearibus, Linn. *Racine de Persil, Petersilien-Wurzel.* Seruntur in hortis. In Sardinia sponte crescunt. *Sunt diuretica, & radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.* Tabernæmontanus Petroselini usum gravidis, puerperis & lactantibus prohibet, ne infantes epilepsia, vel motibus convulsivis corripiantur.

Peucedani, Fœniculi porcini, Pinastellæ, Peucedani foliis quintuplicato - tripartitis lineari - subulatis integerrimis, Linn. *Racine de Queue de Pourceau, Haarstrang - Sau - Fenchel - Schwefelwurzel.* Spontè proveniunt in nostris Alpibus. *Resolvunt & attenuant; carminativa, alexipharmaca & diuretica celebrantur.* Etiam externe decoctum, ad ulcera inveterata sordida curanda commendatur.

Phu Pontici, Valerianæ hortensis, Phu folio Olufatri Dioscorid. C. B. Phu magni, veri, Valerianæ floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, Linn. *Racine de grande Valeriane, grosser Baldrian, Garten-Baldrian.* Sunt radices oblongæ, rugosæ, superficie geniculatæ, digitum crassæ, multis fibris dotatæ, foris cinerei, intus albicantis coloris, saporis acris, odoris aromatici. Effodiendæ verno tempore. Coluntur in hortis, nonnunquam in silvis occurrunt. *Habentur alexiterica, & ad Theriaca compositionem requiruntur.*

Pimpinellæ sanguisorbæ, Sanguisorbæ spicis ovatis, Linn. *Racine de Pimprenelle, Pimpernell-Wurzel, Blutkraut - Rölbleintraut - Wurzel.* Inveniuntur in incultis, & circa limites agrorum aridiorum; amant aprica & petrosa. *Virtutem habent adstringentem & vulnerariam; a Palmario contra Hydrophobiam laudantur: Equis, teste Tabernæmontano, anthelminticum præbent.*

Pimpinellæ albæ, umbelliferæ, hircinæ, Saxifragæ, Tragoselini, Pimpinellæ foliolis subrotundis, Linn. *Racine de Pimprenelle blanche, de Boucage, de Bouquetine, Bibernell, Steinpeterlein, Pfefferwurzel.* Nascuntur in locis arenosis & incultis. Effodiendæ vel verno vel autumnali tempore. Saporis sunt acris, & odorem quasi hircinum spirant. *Virtute gaudent alexipharmaca, lithontriptica, uterina, vulneraria & anticatarrhali.*

Pimpinellæ nigræ, Tragoselini minoris, *Racine de Pimprenelle noire, schwarze Bibernelle, Blau-Wurzel.* Pro varietate præcedentis habetur; gustui se minus acrem offert; recens succum fundit cœruleum, qui color cum spiritu vini per alembicum ascendit.

Plantaginis latifoliæ, Plantaginis majoris, Plantaginis foliis ovatis glabris, Linn. *Racine de Plantain, breite Begerich-Wurzel.*

Ubique occurrunt. Colligendæ autumnali tempore. *Decoctum commendatur in febribus intermittentibus; vulnerariis potionibus & gargarismis adduntur.*

Rad. Pœoniæ, Rosæ benedictæ, regiæ, Pœoniæ officinalis, Linn. Racine de Pivoine, Pœonien-Wurzel, Pfingstrosen-Sichtrosen-Wurzel. Præfertur illa species, quæ mas dicitur, folio splendido, nigricante. Coluntur in hortis, & primo vere effodi debent. Sunt anodynæ, antispasmodicæ, & inprimis antepilepticæ censentur, atque plerisque pulveribus antepilepticis adduntur. *Dosis a granis decem ad triginta, in decocto a drachmis duabus ad unciam semis.*

Polygalæ, Polygalæ amaræ, Linn. Kreuzblume. Radices fibrosæ, graciles, ex capite crassiusculo sensim filiformes, colore extus pallide luteo, intus albissimo, exsiccatae admodum duræ sunt, nullum odorem, saporem habent levissimum. *In phthisi commendatur hodie vel sub forma pulveris ad drachmam dimidiam bis de die, vel in decocto.*

Polygonati majoris, latifolii, vulgaris, Sigilli Salomonis, Geniculatæ, Genicellæ, Convallariæ foliis alternis, pedunculis axillaribus unifloris, L. Racine de sceau de Salomon, Weiß-Wurz, Schminfwurzel. In silvis & umbrosis locis proveniunt. Verno tempore effodiendæ sunt. *Ad sugillationes in forma cataplasmati applicatæ pro specifico habentur, atque cosmetico usui inserviunt.*

Polypodii vulgaris, Filiculæ dulcis, Racine de Polypode, Engelsfuß, Baumfarn, Eichfarn, Kropfwurz, Corallentwurz. In silvis ad radices caudicesque arborum Fagi, Quercus & Coryli nasci solent. Eligendæ sunt quercinæ, vel quæ ad caudices Quercuum reperiuntur. Coloris intus viridescantis, saporis dulcis. *Aperiunt, incidunt, ad pectoris & renum vitia, febre quartana laborantibus, & melancholicis, ex decocto, commendantur; in podagra & arthritide efficacissimæ habentur. Veteres etiam melanagogis adscribebant. Usus est in infusis; longa coctione amara reddunt decocta. Dosis est uncia semis ad integram purgandi & drachma una referandi scopo.*

Pseudacori. Vide Rad. Acori vulgaris.

Pulsatillæ cœruleæ, Herbæ venti, Pulsatillæ foliis decompositis pinnatis, flore nutante: limbo erecto, Linn. Racine de Coquelourde, Rûchen-Schell-Osterblumen-Wurzel. Sunt crassæ, longæ, Cardopatii modo exesæ, saporis subdulcis, acris. *Vi pollent alexipharmaca, & contra pestilentiae contagia, virulentorum animalium ictus, cum vino potæ commendantur. Aliis earum usus internus est suspectus.*

Pyrethri officinalis, Salivalis, Dentariæ, Anthemis Pyrethrum, Linn. Racine Salivaire, ou de Pyrethre, Bertram-Zahnwurz, Speichelwurz, St. Johanniswurz. Sunt Pyrethri, flore Bellidis, radices, ex calidioribus regionibus allatæ. *Incidunt & attenuant; raro interne adhibentur. Piperis instar acres sunt; ad linguæ Paralyzin, & ad dentium dolores masticatæ præcipue commendantur. Ettmüllerus singularem virtutem, externe cum pinguetudine coturnicis, membro, generationi dicato, adhibitis adscribit stimulantem. Raro in officinis*

ficinis nostris vera Pyrethri radix invenitur. Plerumque pro ea *Radix Ptarmicæ*, quæ viribus multo est inferior, substituitur.

Rad. Quinquefolii. Vid. **Rad. Pentaphylli.**

Rapæ, Rave, Navet, Navau, Rübe. Radices alias rotundæ, alias cylindroideæ, varii tam coloris, quam magnitudinis, odoris proprii, saporis in junioribus amari, in adultis dulcissimi. *Brassica rapa* L. *Planta Anglica & Belgica.* Plures ejus varietates in hortis coluntur. *Resolvendi sine intus dantur ex jure coctæ. Extus gelu constrictæ Perniones sanant.*

Raphani, Radis, Rettich. Radices figura, magnitudine, colore, saporis acumine multum variantes, odore proprio, sapore acri perfusæ. *Raphanus sativus.* L. In China sponte nasci dicuntur, apud nos plurimæ ejus varietates coluntur. *Resolvendi, urinam ducendi, scorbutum sanandi gratia succus expressus exhibetur.*

Raphani rusticani, Raphani rustici, Raphani marini, Armoraciæ, Cochleariæ folio cubitali, Tournefort. *Cochleariæ foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis, Linn. Racine de grand Raifort, Meer-Rettich.* Coluntur in hortis, & plantis antiscorbuticis adnumerantur. *Calculosis, hydropicis, scorbuticis, arthriticis, verminosis & mensum vitiis laborantibus, commendari solent. Comestæ spiritum alliaceo odore contuminant, rasura epispastico scopo cuti imponitur.*

Rhabarbari Monachorum, Lapathi latifolii hortensis, Rumicis sativi, Rumicis Alpini, Linn. Racine de Rhubarbe des Moines, Münch-Rhabarbara. Coluntur in hortis. *Multum cum Rhabarbaro vero conveniunt, magis vero adstringunt.*

Rhabarbari veri, Rhabarbari lanuginosi, sive Lapathi Chinensis longifolii, Racine de Rhubarbe, edle Rhubarbara, wahre Rhubarbara. *Lapathum præstantissimum, Rhabarbarum officinale Munting.* Ob florem monopetalum, campaniformem, multifidum, proprium genus constituit *Bærhave Ind. pl. part. II. p. 84.* A *Tournefortio* ad plantas flore monopetalo, campaniformi, multifido, refertur. *Linncæus Rhabarbarum Sinense, folio crispo, flagellis rarioribus & minoribus Ammanni* pro vero habet *Rhabarbaro* & in sua materia medica *Rheum foliis subvillosis* adpellat. Sed *Gleditschius* hanc ad viliores species amandat, & in suo *Verzeichnuß der gewöhnlichsten Arzneypflanzen*, p. 305. genuinam *Rhabarbari* speciem fusius, sed non satis botanice, describit. Patriam agnoscit Chinam, unde per reliquas Asiæ regiones ad nos pervenit. Eligendum est *Rhabarbarum*, quod rarum existit, & minorem stipticitatem habet, quod inter mandendum glutinosum est, cum levi adstrictione, & crocææ tincturæ; varii coloris, dilute ex carneo colore rubens. Frustra nodosa minora præferuntur majoribus, quæ sæpius intus putrescunt & nigrescunt. Hodie etiam radices in taleolos dissectæ advehuntur, quæ reliquis præferri merentur. *Rhabarbarum Moscoviticum* præstantissimum est. Aliud enim, nisi ad id negotium constituto delegato, Jæchtæ habitante, delectum & comprobatum, per totam Russiam vendere non licet. Ex hoc delectu non exsulent frustra lactei coloris, saporis subdulcis, sed virtute non inferiora. Sit mediocriter ponderosum & non cariosum. *Vires vere habet polychrestas, quas recensere nimis longum esset.* Tilingius integrum

L

scripsit

scripsit tractatum, sub titulo Rhabarbarologiae. Unicum monemus: Rhabarbarum assumptum urinam tingere flavo colore, quod juvenes practici, ne in urinarum examine hallucinentur, notent.

Rad. Rhapontici officinalis, *Lapathi Alpini folio subrotundo* J. C. *Lapathi hortensis rotundifolii* C. B. *Rumicis floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis unica granifera, foliis cordatis*, Linn. *Racine de Patience grande, de Rhapontic vulgaire, gemeine Rhapontic*. Sunt unius vel duorum pollicum crassitie, extus flavæ, intus sicut Rhabarbarum verum variegatæ, saporis amaricantis adstringentis. Reperiuntur nonnunquam crassæ proxime ad formam & magnitudinem Rhabarbari veri accedentes; distinguuntur vero odore, qui non ita gravis, sapore magis adstringente & glutinoso, atque, quod masticatæ, salivam colore non ita intenso flavo, sicut Rhabarbarum, inficiant. Coluntur in hortis, & sponte in Styriæ & Austriæ alpibus proveniunt. *Alvum, ad drachmam unam usque vel duas exhibitæ, solvunt. Commendantur vulneratis, ictericis & ab alto lapsis.*

Rhapontici veri, Rhei foliis glabris, Linn. *Racine de Rhapontic veritable, wahrhafte, gerechte Rhapontic*. Sunt oblongæ, pollicis crassitie, coloris foris fusci, intus crocei, substantiæ raræ & laxæ, saporis amaricantis subadstringentis, parum glutinosi, odoris haud ingrati. Planta inter *Lapatha* a nonnullis ponitur; *Tournefortius* vero, ob florem monopetalum, campaniformem, multifidum, proprium inde genus constituit: hinc inde, eandem cum Rhabarbaro vero plantam esse, multi, quibus etiam *Linnaeus* annuit, autumant, & non nisi loco natali & radicibus minoribus distinctam produnt. Raro in officinis reperiuntur, & loco Rhapontici veri, plerumque radices *Centaurei majoris*, quod *Rha capitatum*, sive *Rhaponticum Helenii folio* appellant, prostant. *Optime igitur, si Rhaponticum verum præscribitur, Rhabarbarum verum orientale substituitur, cum quo etiam ratione virium convenit.*

Rhodiae, Rosariae, Rhodiolæ roseæ, Linn. *Racine de Rhodus, Racine sentant les Roses, Rosentwurz*. Planta sub nomine *Anacampteros*, radice rosam spirante, majoris, a *Tournefort*. describitur. A *Bærhavio*, *Thelephium*, radice rosam spirante majus, foliis cæsis, minus serratis, vocatur. Nascuntur in alpibus. *Vim habent subadstringentem, & tam interne sumtæ, quam externe, fronti cum aceto applicatæ, ad Cephalalgiam laudantur.*

Rubiæ tinctorum, fativæ majoris, Erythrodani Raji, Rubiæ foliis senis, Linn. *Racine de Garance, Färber-Röthe-Wurzel*. Coluntur copiose fere per totam Germaniam & Galliam. *Vulnerariae sunt & radicibus quinque aperiensibus minoribus adsociantur. Propter traumaticas vires a Turcis per excellentiam Baya, i. e. Balsamum, vocantur. Usus maximus in arte tinctoria. Decoctum animalibus junioribus propinatum ossa infecit rubedine.*

Rusci, vide **Rad. Brusci**.

Salab. Sunt radices *Orchidis Persicæ* unifoliæ bulbosæ, substantia quasi cornea, saporis glutinosi. *Linnaeus* plantam adpellat: *Orchidem bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso*. *Sinenses & Persæ* magni pendunt has radices & illis vim adscribunt aphrodisiacam, atque fere easdem virtutes, quas Japonenses de sua *Ginseng* prædicant. *Drachma una hujus radicis in pulverem*

verem trita, atque aquæ fontanæ unciis octo macerata, leni calore, fere tota in gelatinam vel mucilaginem solvitur, quæ acrimoniam biliosam in intestinis hærentem mitigat & dolores demulcet; hinc inde non solum dysentericis, sed etiam ad colicos dolores & convulsiones infantum commendantur. B. *Geofroy* docuit etiam nostratis orchidis radices ad modum radicum *Salab* præparare, atque ablatō cortice, in aqua fontana frigida, per aliquot horas macerare, postea parum coqui, & filo, mediante acu trajecto, appensas in aëre calido ficare jubet: sic quasi corneam & semi diaphanam acquirunt faciem, atque in pulverem tritæ & aqua fervida dilutæ, pariter, sicut persicæ, in mucilaginem abeunt. *Pro una dosi sufficiunt grana XXIV.*

Rad. Saniculæ, Saniculæ officinarum, vulgaris, Diapensia, Saniculæ foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus, Linn. Racine de Sanicle, Sanickelwurzel, Bruchkrautwurz. Indigena est planta, & in silvis nascitur. *Folia & radices leniter adstringunt, & decoctis adduntur vulnerariis; commendantur etiam herniosis.*

Sanley. Sunt radices *Acori veri palustris*. Crescunt in regno Chinesi circa urbem *Canton* in provincia *Suchuan*, ubi recentes in tenues taleolos scissæ, siccantur, in plumbeis receptaculis, uti herba *Thee*, ne virium jacturam faciant, aut ab aëre marino corrumpantur, asservantur. *Apud Chineses magno habentur pretio, ob plurimas, quibus pollent, virtutes medicas. Præcipue laudatur vis earum in febribus malignis & morbis contagiosis. Dari solet in pulvere a granis XX. ad XL. bis vel ter de die cum vehiculo idoneo. Serviunt etiam hæ radices usui externo ad morsus animalium venenatorum, atque pulvis vino subactus, parti affectæ adplicatur. Plura Acta Physico-Medica Vol. IV. habent.*

Saponariæ majoris lævis, C. B. Lychnidis Saponariæ dictæ, Saponariæ calycibus monophyllis cylindræis, foliis ovato-lanceolatis, Linn. Racine de Saponnaire, ou de Savonniere, Seiffenkrautwurz. Juxta rivulos & fossarum margines crescunt. Radices primo vere effodiendæ. *Vires sunt sudoriferæ, attenuantes, aperientes & diuretice, ac in morbis serosis, pectoris, lue venerea & mensibus ciendis commendari merentur. Stahlius radices Saponariæ, Sarsaparillæ radicibus longe præferendas esse, autumat.*

Sarsaparillæ, Salsaparillæ, Zarzaparillæ, Smilacis caule angulato aculeato, foliis dilatato-cordatis inermibus, Linn. Racine de Sarcepareille, de Salsepareille, Sarsaparill. Sunt *Smilacis viticulis asperis Peruvianæ, folio hederaceo lævi. Smilax caule angulato aculeato, foliis ovatis, acutis, inermibus; vel Smilax viticulis asperis Virginiana, folio hederaceo lævi. Zarza nobilissima. Hort. Lugd. Royen.* Ex multis Americæ provinciis, Peru, Mexico, Virginia & Brasilia advehuntur. Eligendæ sunt radices recentes, coloris foris obscurioris, intus albicantis, quæ non facile franguntur, nec cariosæ sunt; præferuntur, quæ calami scriptorii crassitiem habent. *Temperatissima est radix, & in morbis lymphæ bonam præstat opem, longam vero exposcit coctionem, vel macerationem. Virtutem antisyphiliticam etiam recentiora experimenta confirmant.*

Satyrii, Cynosorchidis latifoliæ C. B. Orchidis bulbis indivisis, nectarii labio integerrimo lanceolato, cornu longissimo, petalis patentibus, Linn. Racine de Satyrion, Stengelwurz, Anabenkrautwurz.

Radices *Orchidis* & *Satyrii* hodie confunduntur, atque sæpius una pro altera sumitur. A veteribus vero distinguebantur, ita ut speciem, quæ radicem bulbosam, eamque geminam obtinerent, *Orchides*, quæ vero tantum unicam, *Satyria*, appellarentur. Differunt etiam ab illa specie, quæ *Palma Christi* vocatur, & radices multifidas habet. Nascuntur in pratis humidis, colliguntur ineunte vere. *Radices Satyrii*, virtute multum cum illa *Perfica radice*, *Salab dicta*, convenire, Degnerus in *Dissertatione* de Dysenteria contagiosa biliosa, perhibet; quæ & celeberr. & illustr. Hallerus confirmat. Muntingius ad spasmos & convulsiones nervorum, fluorem album, & hæmorrhagias uteri commendat. Vulgo pro aphrodisiacis habentur, & ad Electuarium Diasatyrium expetuntur.

Rad. Saxifragiæ albæ, Saxifragiæ rotundifoliæ C. B. radice tuberosa, Saxifragæ foliis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulosa, Linn. Racine de Saxifrage, weisse Steinbrechwurzel. Proveniunt in pratis & collibus humidis. Ordinario in officinis sub nomine seminum Saxifragiæ veniunt, magnitudine semen Coriandri æquantes. Resolvunt, & humores viscidos attenuant; hinc ad pectoris, renum & vesicæ vitia commendantur.

Scillæ, Squillæ, Scillæ rubræ, sive Pancratii veri, Scillæ radice tunicata, Linn. Racine de Scille, Oignon marin, Meerzwiebel, Mauszwiebel. Sunt species *Ornithogali maritimi*, radice rubra *Tournef.* magnitudinis variæ, aliquando duorum pugnorum & ultra, e plurimis squamis, lamellatim, ceparum instar, sibi incumbentibus compactæ, inferius multis fibris donatæ, extus rufæ, quæ ordinarii sunt usus, albæ rarioris. Utræque saporis amari & acris, odoris nullius. Nascuntur in locis maritimis arenosis Lusitaniæ, Hispaniæ, Siciliæ. Flores, hyacintho stellari similes, in spica crescentes, antequam folia apparent, emergunt. Crudæ raro, præparatæ vero sæpius in usum vocantur. Vide *Scilla præparata, Parte II. Pharm. Wirt.* *Scilla alba* mitior habetur rubra. Dari squillam esculentam nonnulli adstruunt.

Scorzoneræ, Latifoliæ, Sinuatæ, Serpentariæ, Scorzoneræ caule subnudo unifloro, Linn. Racine de Scorzonere, Scorzonera wurzel, Schlangenwurzel. Scorzonera a voce Catalonica *Escorzo*, *Vipera*, cuius morsui & assumpta, & externe applicata, mederi creditur. Coluntur in hortis. Tam alimentum, quam medicamentum, blandum, diaphoreticum & alexipharmacum præbent.

Scrophulariæ, nodosæ foetidæ, vulgaris & majoris, Ficariæ, Ferrariæ, Castrangulæ, Scrophulariæ foliis cordatis, caule obtusangulo, racemo terminali, Linn. Racine de Scrophulaire, Brauntwurzel, Sanfrautwurzel, Feigwarzwurzel. Nascuntur in locis humidis, circa rivulos & fossas. Verno tempore colligi debent. *Vulnerariæ sunt & incisivæ, sed odoris & saporis ingrati, amari.*

Seneka, Senegar, Senegan, Polygalæ caule simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis erectis alternis integerrimis, racemo terminali erecto, Linn. Racine Seneka, Senefa, Senegar, Virginische oder Pensylvanische Klapper-Schlangenwurzel. Est radix perennis semi spithamam vel etiam spithamam longa, variæ pro ætate crassitie, ut plurimum digitum

gitum circiter minimum crassa, varie contorta, in plures ramos divaricata, fibris stipata lateralibus, & margine veluti membranaceo extuberante, secundum longitudinem decurrente, foris sublutea, intus alba, sapore acri amaricante, non-nihil aromatico prædita. Adfertur ad nos ex Virginia, Carolina, Marylandia, Pensylvania & hujus provincia Senega. *Remedium apud Virginicæ incolas est ad morsus viperæ caudisonæ, pleuritidem, peripneumoniam, aliasque febres phlogisticas. In officinis olim non usitata fuit Polygala; exemplo vero Virginienſium, Parisienſes Medici nostram exhibuere, eventu felicissimo & eodem, licet vi debiliori gaudeat. Vomitus & catharsis quandoque hoc remedio benigne cientur, idque satis feliciter. At si æger admodum debilitatus fuerit, nec vomitum facile pertulerit, emesin sistunt absorbentia quævis testacea.*

Paratur Essentia ex radicibus Senega uncis tribus; Valerianæ sylvestris uncia una semis, Vini Canariensis libris duabus. Dosis tria cochlearia statim post venæ sectionem, quæ dosis singulis sex horis repetenda.

Rad. Serpentariæ Virginianæ, Viperinæ, Colubrinæ, Contrayervæ Virginianæ, Aristolochiæ caulibus infirmis angulosis flexuosis, foliis cordato-oblongis planis, floribus recurvis solitariis, Linn. Racine Serpentinaire, Racine Vipérine de Virginie, Virginische Schlange-Wurzel. Planta ad aristolochiarum classem refertur, atque *Serpentaria* sive *Pistolochia flore atro purpureo, in terræ superficiem procumbente, foliis cordiformibus a Clayton in flora Virginica vocatur. Apud Gronovium, Aristolochia, caulibus infirmis, angulosis, flexuosis, foliis cordato-oblongis, planis, floribus recurvis, solitariis, audit. Plerumque tota planta, in fasciculos ligata, ad nos pervenit. Radices sunt tenues, fibrosæ, saporis aromatici, odoris camphorati, vel ad Valerianæ accedentis, gravioris tamen. Vires alexipharmacæ, balsamicæ, anticatarrhales, carminativæ, diureticæ & uterinæ, celebrantur.*

Sigilli Salomonis, vide Rad. Polygonati.

Spicæ Celticæ, Nardi Celticæ, Alpinae, Valerianæ Celticæ, Tournefort. Valerianæ floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis, Linn. Racine de Nard Celtique, Celtischer Nardus, Magdalenen-Kraut, Magdalenen-Blumen. In officinis quidem ad flores referuntur; accuratius vero examinatæ, sunt radices cum foliis, quæ in Alpibus Tyrolensibus, Styriacis & Ligusticis crescunt. Eligendæ sunt odoris aromatici, jucundi, radiculis numerosis cohærentes, haud fragiles & plenæ. *Alexipharmacæ, uterinæ & diureticæ sunt. Ad Theriacæ confectiorem adhibentur. Valerianæ officinarum viribus æquiparari imo præferri meretur.*

Spicæ Indicæ, Nardi Indicæ, Graminis Cyperoidis aromatici Indici, Laguri paniculæ racemis supra decompositis proliferis, Linn. Racine de Spica Nard, de Nard des Indes, Indianische Spicanard. Radices sunt longæ, fungosæ, digiti crassitie & longitudine, ex nervosis quasi filamentis convolutæ & congestæ, colore ex fusco rufescente, saporis amari aromatici. Ex India Orientali ad nos advehuntur. Eligendæ recentes, leves, coma longa præditæ, Cyperum redolentes. *Uſus præcipuus est ad Theriacæ confectiorem, ad menses ciendos, vermes necandos; carminativæ, stomachicæ & nephriticæ etiam habentur.*

Rad. Squamariæ, vide Rad. Dentariæ.

Succifæ, vide Rad. Morsus Diaboli.

Taraxaci, Dentis Leonis, Leontodontos calyce inferne reflexo, Linn. *Racine de Pisse en Lit, Pissenlit, ou de Dent de Lion, Psaffenröhrlein, Löwenzahn, Löwenfrautwurz.* Ubique occurrunt. Colligendæ primo vere. Cum Cichorii radicibus conveniunt, sanguinem purificant, vulnerariæ, aperitivæ & diureticæ sunt.

Tormentillæ, Heptaphylli, Tormentillæ silvestris, Tormentillæ caule erecto, Linn. *Racine de Tormentille, Tormentill-Rothwurz, Blut- und Ruhrwurz.* Proveniunt in arenosis locis. Adstringunt, vulnerariæ & alexitericæ sunt. Decoctum, roseum quasi odorem spirat, & ad tonum ventriculi & intestinorum deprædicatur. Quia vero fortius adstringit, non saturatum, sed dilutum exhiberi debet. Etiam in gargarismatibus & collutionibus, ad dolores & dentium vacillationem, usus est.

Tragoponis, Tragopogon pratense, Linn. *Barbe de Bouc, Bocksbart.* Radix fusiformis, sub cuticula flava albam & dulcem carnem includit. Vulgaris per Europam planta. Scopo aperiendi a quibusdam exhibetur.

Trifolii fibrini, aquatici, antiscorbutici, Menyanthis foliis ternatis, Linn. *Racine de Trefle de Castor, Biberflee-Wasser- und Scharbockflee-Wurzel.* Rarioris sunt usus. In locis paludinosi proveniunt. Eadem vires, quas foliis, adscribunt; efficaciora vero folia habentur. Lapponicæ incolis, exsiccata, tam pro pabulo pecorum, quam, urgente annonæ scævitia, cum farina mixta, panificio inserviunt; panis vero inde paratus admodum amarus & detestabilis est, monente Linn. Flor. Lapon.

Turbith, Turpethi, Convolvuli foliis cordatis angulatis, caule membrano quadrangulâri, Linn. *Racine de Turbit, Turbit-Wurzel.* Advehuntur ex Insula Ceylon & Malaharia, ubi in locis opacis, humidis, ad fossarum margines, aliisque locis silvestribus proveniunt. Eligendæ sunt resinosæ, albicantes, non cariosæ. Tormina excitare solent, nec temere gravidis exhibendæ sunt; hydropicis optime & mirifice conveniunt. Dosis scrupulus unus, ad duos, vel drachmam unam.

Tussilaginis, vide Rad. Farfaræ.

Valerianæ palustris, vel silvestris montanæ, quæ etiam pratensis vocatur, *Racine de Valeriane, Fleiner Baldrian, Raxenwurz, Augenwurz.* Indigenæ sunt, posterior priori præfertur. Colliguntur verno tempore. Viribus sunt alexipharmacæ, emmenagogæ, uterinæ, anthelminticæ, antarthriticæ & diureticæ, ac specificæ ad ophthalmiam & epilepsiam commendantur.

Victorialis longæ, Victorialis maris, Allii Alpini, Allii montani latifolii maculati, Allii caule planifolio umbellifero, umbella globosa, filamentis simplicibus corolla longioribus, Linn. *Racine de Victorialis longue, lange Siegwurz, Allermanns-Harnisch-Wurzel, Schlangen-Knoblauchwurz.* Proveniunt in alpibus Tyrolensibus. Raro

in medicina inserviunt; mulierculæ contra veneficia & magicas incantationes in usum vocare solent.

Rad. Victoralis rotundæ foeminæ, Gladioli foliis ensiformibus, floribus uno versu dispositis, purpureo-rubentibus C. B. Gladioli foliis ensiformibus, floribus distantibus, Linn. Racine de Victoralis ronde, runde Siegmur, Siegmurweiblein, Aker-Schwertel. Apud nos coluntur in hortis; in regionibus calidis sponte inter segetes occurrunt. Utriusque Victoralis radices corticem fibrosum, lamellatum & quasi reticulatum habent, odorem alliaceum & nonnihil quoque saporem. *Rarissimi in medicina sunt usus; externe ad emolliendos tumores adhibetur.*

Vincetoxici, vide Rad. Hirundinariæ.

Ulmariæ, vide Rad. Barbæ caprinæ.

Urticæ, Urticæ majoris urentis, vulgaris, Urticæ dioicæ, foliis oblongo-cordatis, Linn. Racine d'Ortie, Nesselmur, Brennesselmur. *Vim habet diureticam & sanguinem depurantem; specificè ad mictum cruentum commendantur.*

Zedoariæ, vide Aromata.

Zinziberis, vide Aromata.

CAPUT II.

DE HERBIS ET FOLIIS.

Herba Abrotani maris angustifolii, Artemisiæ foliis ramosissimis setaceis, caule erecto fruticoso, Linn. Auronne ou Garderobbe le mâle, Stabmur, Gartheyl, Gertmur, Gertkraut. Colitur in hortis. In Europa australi & oriente sponte crescit. Colligenda Augusto. *Cum Absinthio Pontico, cujus est succedaneum, convenit, & habetur balsamica, uterina, antictérica, anticachectica, anthelmintica, & contra morsus animalium venenatorum laudatur. Externe decoctum alopeciam, tineam & achores tollit.*

Absinthii alpini, Artemisia rupestris, Linn. le Genippi. Folia sericea angusta pinnata, tenuiter divisa, grato aromate instructa. Helvetiæ, Sibiriae, Oelandiæ civis. *Laudatur contra febres intermittentes, ad menses pellendos & vulnera consolidanda.*

Absinthii Pontici, Romani, nobilis, tenuifolii, incani, hortensis, Artemisiæ foliis compositis multifidis: subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo, Linn. Absinthe Romain, Absince Pontique, petit Absinthe, Welscher, Römischer Wermuth. Colitur in hortis; sponte provenit in Ponto & in Palatinatu, mitius est Absinthio vulgari. *Vis stomachica, anticachectica, anthelmintica notoria est, & specifica diuretica ab Hermanno adscribitur.*

Herba Absinthii vulgaris, Artemisiæ foliis compositis, multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo, Linn. Absinthe, Absince, Aluine, gemeiner Wermuth. Colitur in hortis, & nonnunquam sponte provenit. *Viribus cum antecedente convenit; adscribitur etiam vis anodyna. Externe succus vel decoctum ad ulcera inveterata, putrida & scabiem, suffitus vero auribus exceptus ad otalgiam commendatur, Assidue potatum calculosis prodest. In fuscum cum aqua frigida paratum pallide fuscescit, cum calida fuliginosum colorem induit, cum spiritu vini ordinario lutescit, & cum spiritu vini rectificato pulcre viridescit.*

Acetosæ, Oxalidis, Acetosæ pratensis vulgaris, Rumex acetosa, Linn. Ozeille, ou Oseille, Aceteuse, Sauerampfer. *Rarius decoctis, sæpius jusculis medicatis adhibetur, bilem temperat & antiscorbutica est. Acetosa nostra hortensis rotundifolia, Rumex scutatus L. iisdem gaudet viribus.*

Acetofellæ, Allelujæ, Trifolii acetosi, Oxytriphilli, Oxalidis scapo unifloro foliis ternatis, radice squamoso-articulata, Linn. Oseille sauvage, Alleluja, Sauertlee, Buchampfer, Herzklee. Provenit in silvis, circa radices fagorum. Colligitur Majo. *Saporem acidum gratum præbet. E succo plantæ paratur Syrupus & Sal. essentielle.*

Acmellæ, Attmellæ, Admellæ, Acemellæ, Achmellæ, Verbenæ foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolatis serratis, pedunculis unifloris dichotomiæ caulis, Linn. Acmelle, Indianisch Harnkraut. Sunt folia *Bidentis, urticæ folio, Ceylanicæ, vel Chrysanthemi Zeylanici flore luteo, Lamii folio.* Nascuntur in Ceylon & Ternate Insulis. Annuæ est planta, quæ etiam sub dio in nostris hortis coli potest. *Virtus adscribitur huic plantæ lithontriptica, diaphoretica, anodyna & humores viscidos attenuans; specificè etiam ad fluxum album commendatur. Bibitur ceu apozema; datur etiam in substantia. Infusum nunquam absque Liquiritia, Syrupo de Althæa, vel simili quopiam, quod acrimoniam foliorum temperat, propinari debet. Pretiosa est medicina, cum unciam unam pro quatuor imperialibus divendant Batavi; propterea commode nostram Bidentem, Lamii vel Urticæ folio, quæ fere easdem vires habet, huic pretiosæ substitui posse, cum clarissimo Nebelio censemus.*

Aconiti, Napelli, Aconiti foliorum laciniis linearibus, superne latioribus linea exaratis, Linn. Cappe de Moine, Napel, Aconyt, Eisen-Hütlein. Sponte crescit in Helvetia, Bavaria, Gallia. Apud nos in hortis ornamenti gratia colitur. Planta hæc semper pro venenata, & quidem jure, habita, procul ab officinis pharmaceuticis abesse juebatur. Introduxit eam Celeberrimus *Stærkius*. Postquam extractum ejus Saccharo palliatum in minutissima dosi deprehendit, non solum innocuum, sed etiam in tumoribus scirrhis, tophis nodisque emolliendis, in atrocissimis articulorum partiumque induratarum doloribus sopiendis & ulceribus cacoethicis & rebellibus depurandis & firma cicatrice consolidandis proficuum. Nunc a granis sex ad decem exhibetur. Imo sunt, qui dosin ad drachmam semis auxerunt.

Adhatodæ. Folia majora ex ovatis acute terminata, superne viridia, inferne albida, validis nervis percursa, saporis proprii amaro-contigui, odore plane

ne destituta. *Justia Adhatoda* Linn. Ceylonæ civis, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. *Utero purgando dicata a nonnullis dicitur.*

Herba Adianti, Adianti albi, Rutæ murariæ, Paronychiæ, Matth. Asplenii frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis, Linn. Adiante blanche, Sauvevie, Mauer-Nauten, Stein-Nauten. E scissuris & juncturis vetustorum murorum, in locis umbrosis provenit. *Vim habet diureticam, ad rachitidem & enterocelas puerorum, specificè commendatur.*

Adianti aurei, Polytrichi aurei, Musci capillacei majoris, Tournefort. Polytrichi capsula parallelipipedeæ, Linn. Percemouffe, Golden Wiederthon. In silvis provenit, & ad muscos pertinet. *Raro in medicina in usum vocatur. Humores attenuare dicitur. Refertur inter antimagicas herbas.*

Adianti nigri, foliis Coriandri, Linn. Capilli Veneris, Capillaire, Cheveux de Venus, Frauen-Haar, Venus-Haar. In Languedocia, circa Montem Pessulanum, multus ejus est proventus. *Incidit & attenuat, pulmonica & diuretica est. Paratur ex hac plantula syrupus ille celebris Syrop capillaire.*

Agrimoniæ, Lappulæ hepaticæ, Eupatorii veterum, Hepatorii, Agrimoniæ foliis pinnatis, fructibus hispidis, Linn. Aigremoine, Odermenig, Leberfletten, Steinvurz. Circa agrorum & viarum margines provenit. Majo & Junio colligenda. *Vulneraria est, atque hepaticis & lienosis dicata, ad urinæ incontinentiam & renum ulcera commendatur.*

Alceæ, Alceæ vulgaris, Malvæ caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis, Linn. Alcée, ou Mauve sauvage, Sigmarß-Simeons-Kraut, Fellsiß. Differt a Malva foliis divisis & profundius incis; provenit in incultis. *Viribus cum Malva convenit; laudatur imprimis ad nodos & tumores scirrhusos mammarum, de cancro ipso suspectos, in cataplasmate.*

Alchimillæ majoris, Pedis Leonis, Leontopodii, Alchimillæ foliis lobatis, Linn. Pied de Lion, Sinnau, Löwenfuß, Frauenmantel, grosser Sanicul. Crescit in pascuis & pratis humidis. *Vulneraria est & adstringit.*

Alliariæ, Alliastri, Erysimi foliis cordatis. Linn. Alliaire, Herbe des Aux, Lurchal, Knoblauchkraut, Lâuchelkraut. In dumetis & juxta sepes provenit. Mense Majo colligenda. *Folia recentia contrita Allium redolent & viribus cum Scordio conveniunt. Ad gangrænam, & ulcera cancrofa à Bærhavio commendatur.*

Alnus, Aunée, Erlen. Folia sunt rotunda, crenata, inferne albida, insipida. *Betulæ Alnus, Linn. Folia incisa & mammis calide imposita ad lac distrendiem laudantur.*

Alsines mediæ, Morsus gallinæ, Alsines foliis Triflaginis, Alsines petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis, Linn. Morgeline, Hünerschergen, Bogelkraut. Ubique provenit, & etiam hyeme viret. *Externe*

ad ulcera & scabiem adhibetur; interne sumta refrigerat & atrophia laborantibus commendatur.

Herba Althææ, Bismalvæ, Ibisci, Guimauve, Eybischkraut, Heylkrout. Colitur in hortis. Adnumeratur herbis quinque emollientibus.

Anagallidis maris, flore phœniceo, Anagallidis foliis indivisis, caule procumbente, Linn. *Morgeline, Mauron, Anagallis le mâle, Gauchheil, Collmarkraut, Vogelkraut, Hünerdarm.* Crescit in vinetis & hortis. Adscribitur ei vis singularis antimelancholica, antepileptica & antimaniaca. Antiquatam contra morsum canis rabidi virtutem impressa, publica autoritate divulgata, restituere videntur.

Anethi hortensis, Anethi fructu compresso, Linn. *Anet, Dillkraut, Dill, Garten-Dill.* Seritur in hortis. Raro herba sicca, nisi forsan in clysteribus & pediluviis, in usum vocatur.

Anserinæ, Argentinae, Argentariae, Potentillæ, Potentillæ foliis pinnatis, caule repente, Linn. *Argentine, Genserich, Gänßkraut, Silberkraut.* Juxta sepes & vias occurrit. Colligitur mense Junio. Refrigerat, adstringit & vulneraria est.

Antirrhini, majoris folio longiori, C. B. Antirrhini corollis acaudatis, calycibus flores superantibus, Linn. *Muffle de Lion, de Veau, Kalbsnase, Löwenmaul, Sterckkraut, Dorant.* Colitur in hortis. Virtute gaudet diuretica, & herbis antimagicis adnumeratur.

Apalachines, Paraguay, *Thée de la Mer du Sud.* Angl. *Cassio-berry-busch, Cassina* Floridanorum. Species est *Alaterni*, & sub nomine *Apalachine* ante aliquot lustra in Gallia celebris fuit. Ab aliis frutex *Alaternoides lauri serrato folio* appellatur. Non solum in America, sed & in Africa reperitur. Apud Americanos magni æstimatur, & eorum fere unicum solatium est. Hinc quotannis, sicut apud nos, ad fontes salutares, ita apud illos, certo anni tempore, ad ripas maris, ubi frutex copiose provenit, magnus est confluxus. Infundunt folia recentia aqua fervente & in circulo accumbentes vas hoc infuso repletum unus alteri porrigunt. Hoc plerumque per tres dies insequentes continuare solent, atque interim quilibet quantitatem horum foliorum secum domi transportandam colligit. Vires hujus infusi sunt emeticæ, & absque omni molestia ventriculum purgat.

Ex effectu indoles plantæ, quæ ad Thymelæam refertur, cognoscitur. Ipsi etiam Americani plantam olim fuisse venenatam, sed ex benedictione S. Bartholomæi salutarem nunc habere effectum, sibi persuadent. Præcipue Metallicolis & Peruani regni circa celebres illas fodinas montis Potofi incolis salubris est medicina. Folia hæc & eorum infusum intense sunt amara. Apud Hispanos audiunt *Terba de Palos* & *Terba de Camini*. Præferri solent illa, *Terba de Camini*, quæ & ab Anglis *Paraguay* vocantur: frutex vero, qui *Terba de Palos* profert, *Cassio-berry-busch* insignitur.

Aparines, Gallium Aparine, Linn. *Grateron, Klee-Kraut.* Ubi-vis in Europa crescit. Succus ejus expressus, interne sumptus, in morbis cutaneis laudatur.

Herba Aristolochiæ, Piftolochiæ dictæ C. B. Aristolochiæ polyrhizæ J. B. Aristolochiæ foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis, Linn. *Aristolochie menue, Sarrafine, Ratelou, Ofter = Luceyfraut.* Nonnunquam in vinetis occurrit; colitur etiam in hortis. *Vulneraria habetur, & plerumque a veterinariis, præsertim ad equorum ulcera, adhibetur.*

Arnica, Ptarmicæ montanæ, Doronici, Plantaginis folio, Plantain des Montagnes, Fallfraut, Luciansfraut. Vide Radices Arnica. *Pulvis foliorum pituitam e naribus trahit.*

Artemisiæ vulgaris, caule & flore purpurascens, Artemisia rubra, Armoise ou Artemise rouge, rother Bensfuß, rother Buck. Est varietas sequentis.

Artemisiæ albæ vulgaris, caule ex viridi albicante, Artemisiæ foliis pinnatifidis planis laciniatis floribus erectis, Linn. Armoise blanche, weisser Bensfuß, weisser Buck. Sponte proveniunt. Alba & rubra virtutibus conveniunt, & inter plantas seu herbas vulnerarias & uterinas numerantur. Ex *Artemisia Chinensi* paratur illa lanugo, quæ Moxa dicitur, & in curatione podagræ per usionem, apud orientales gentes, celebre est remedium.

Asari, Nardi silvestris, rusticæ, Cabaret, Oreille d'homme, Haselwurzfraut. Nascitur in dumetis & circa caudices Corylorum, perpetuo viret. Colligenda Majo & Junio. Vim habent folia radices; mitiora tamen sunt, & in parva dosi diureticum & emmenagogum præbent insigne: raro tamen, ob nauseam & vomitus, quos excitare solent, in usum vocantur, nisi in pulveribus errhinis & pediluviiis. Fortiori coctione vim emeticam & purgantem deponunt.

Asplenii, vide Herba Ceterach.

Aurantiorum folia arboris Citrus Aurantium Linn. dicta. Sunt ovato oblonga, obtuse ferrata, albida, petiolo cordiformi subhastata, sapore aromatico amaricante, odore fragrante. *Exsiccata sub forma pulveris vel in infuso contra Epilepsiam dantur.*

Auriculæ muris, vide Herba Pilosellæ.

Balsamita, Costus hortensis, Tanacetum Balsamita, Linn. Coq, Frauenmünz. Folia ovata obtusa, obtuse ferrata, albida. Proprium ad mentham accedentem odorem spirant; saporem amaricantem, evidenter aromaticum emittunt. Europæ calidæ civis, nostri climatis patiens. A vi stomachica & emenagoga laudatur.

Basilici, Ocymi vulgatiore, medii, magni, Ocymi foliis ovatis glabris, Linn. Basilic, Basilgen, Basilienfraut. Colitur in hortis. Ceilonæ & Indiis indigenum. *Cephalica & uterina est planta. Ad cibos condendos adhibetur.*

Beccabungæ, Anagallidis aquaticæ, folio subrotundo C. B. Veronicæ aquaticæ, Veronicæ racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente, Linn. Becabunge, Bachbungen, Wasserbungen. In fossis, palustribus & rivulis provenit. Colligenda primo vere. *Siccata raro in usum*

usum venit; recens antiscorbuticis adnumeranda est. *Scirrhis viscerum resolvendis, ipsique podagræ, longum hujus plantæ usum, opposuit Bærhavius. Succus ad integros scyphos, vel solus, vel cum sero lactis mixtus, exhiberi potest.*

Herba Belladonnæ, Solani lethalis Dod. Atropæ caule herbaceo foliis ovatis integris, Linn. Belladonne, Belledame, Tollbeeren, Wald-Nacht-Schatten. Provenit passim in Germania, colitur etiam in hortis. Planta est venenatissima. *Folia recentia externe imposita, & eorum infusum parca dosi interne sumtum ulceribus cancris mederi perhibentur. Pulverem foliorum nunc a grano uno ad quinque eodem scopo & contra hydrophobiam adhibent.*

Bellidis minoris, pratensis, Bellidis scapo nudo unifloro, Linn. Pâquerette, petite Marguerite, Maßliebenfraut, Margarethentraut, Gänßblumenfraut. Ubique luxuriat. *Vulneraria & pectoralis est, refrigerat, abstergit & roborat.*

Betæ, Beta vulgaris cicla, alba rubra, lutea, Linn. Poirée, Bête, Fotte, Mangold. Colitur in hortis. *Uusus maxime est culinaris; in officinis a nonnullis adscribitur herbis quinque emollientibus. Folia imponuntur cuti, cui epidermis fuit ablata.*

Betonicæ, Veronicæ vulgaris purpureæ, Betonice corollarum lacinia labii inferioris intermedia emarginata, Linn. Betoine, Betonien, braune Betonien, Zehrfraut. Crescit in pratis & montibus herbidis. Colligenda mense Junio. *Polychresta est herba, atque ad multos præcipue nervorum morbos commendabilis. Folia integra, naribus intrusa, & per aliquot horæ quadrantes detenta, singulare quidpiam præstare in Epiphora, seu Ophthalmia serosa, Aët. Phys. Med. Vol. IV. testantur. Vim narcoticam observationes nonnullorum adstruunt.*

Boni Henrici, Lapathi unctuosus, Tota-bonæ, Chenopodii folio triangulari, Tournefort. Chenopodii foliis triangulari - sagittatis, Linn. Toute bonne, Bon Henri, guter Heinrich, stolzer Heinrich, Smerbel. Ubique in locis incultis, ad sepès & parietes hortorum reperitur. *Pollet insigni virtute in vulneribus recentibus sanandis, & ulceribus antiquis expurgandis, ad hæmorrhoidum dolores, cum butyro frixa, specificum habetur.*

Borriginis, Borrage, Bourrache, Borragefraut, Borretsch. Colitur in hortis. *Antimelancholica, cordialis & alexipharmaca habetur; herba sicca vero raro in usum venit.*

Botryos, Botryos Mexicanæ, Ambrosioidis, Chenopodii, Atriplicis odoratæ Americanæ, Ambrosioidis Mexicanæ, Tournefort. Chenopodii foliis oblongis dentato-sinuatis, racemis nudis multifidis, Linn. Piment, Patte d'Oye, Traubenfraut, Mottenfraut, Lungenfraut. Colitur hæc planta in hortis; & ante paucos annos, sub titulo *Theæ Romanæ* sive *Silesiacæ*, celebris fuit. Planta tota odorata est, non insuaviter graveolens, saporis subacris, resinosi, aromatici, amari. Vires promittit & habet. *Ad pectoris affectus, præsertim ad tussim serinam, ad menses ciendos, & sætum mortuum ejiciendum commendatur; usus est in infusis & decoctis. Recens siccata & in usum vocata vim habet inebriantem. Intra vestes reposita ad tineas abigendas laudat Rajus. Datur etiam Botrys Europæa, calidioris Europæ indigena.*

Herba Brancæ ursinæ Italicæ, Acanthi mollis Virgilii, Bauh. Acanthi foliis sinuatis inermibus, Linn. *Acanthe, Branche ou Branque ursine, Barentflauen.* Provenit in Italia & Sicilia. *A nonnullis refertur ad herbas quinque emollientes.*

Brancæ ursinæ Germanicæ, Spondylii, Heraclei foliolis pinnatifidis, Linn. *Branche ou Branque ursine, Barentflauen, Barentaken.* Provenit in pratis humidioribus. *Spiritus vini colore eleganti viridi inficit, qui color durabilior est, quam ullius herbæ. Vires non satis examinatæ: male præcedenti substituitur.*

Buglossæ, Buglossi angustifolii, Linguae bovis, *Buglossé, Ochsenzungen.* Colitur in hortis; etiam passim sponte provenit. *Cordialis & antime-lancholica celebratur; sicca tamen raro in usum vocatur.*

Bursæ pastoris, Herbæ cancri, Sanguinariæ, Bursæ pastoris majoris, folio sinuato, Thlaspi filiculis verticaliter cordatis, Linn. *Ta-bouret, Bourse à Berger, Täscheßkraut, Hirtentäschlein, Seckelkraut.* Occurrit in locis incultis. *Refrigerat, adstringit & in fluxionibus sanguinis pro specifico habetur, tam interne, quam externe adhibita.*

Calaminthæ montanæ, flore magno, C. B. Melissæ floribus ex axillis superioribus, pedunculo communi confertis, Linn. *Calamenté, wohlriechende Bergmünz.* Ex regionibus calidioribus advehitur; colitur etiam in hortis. *Alexiteria, nervina, uterina & diuretica habetur, & ad Theriacam requiritur.*

Calaminthæ vulgaris, Calaminthæ agrestis, Calaminthæ Pulegii odore, seu Nepetæ, Melissæ pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus caule decumbente, Linn. *Herbe aux Chats, Kornmünz, Feldmünz, wilder Woley.* In arenosis & locis apricis provenit. Colligitur Augusto mense. *Diuretica & uterina est.*

Capilli Veneris, vide Herba Adianti nigri.

Caprifolii, Lonicera periclymenon, L. *Cheurefeuille, Hahnens-fießlein, Geißblatt, Jerichorosen.* Ubivis nascitur. *Folia a vi roborante & abstergente laudantur. Flores & stipites a nonnullis sanguinem depurandi & urinam ciendi causa sub forma infusi exhibentur.*

Cardiacæ, Marrubii Cardiacæ dicti, Brancæ seu Patæ lupinæ, Lycopis, Leonuri foliis caulinis lanceolatis trilobis, Linn. *Agripau-me, wild Mutterkraut, Herzgespankraut, Herzgesperrkraut.* Provenit in locis asperis & incultis, juxta sepes & vinetorum muros. Colligenda mense Junio. *Urinam & menstrua movet, vermes enecat, in pectoris pituitosis morbis convenit, atque ad infarctum & inflationem hypochondriorum infantibus commendatur. Vulgo sub forma unguenti applicatur.*

Cardui benedicti, Cardui sancti, Cnici sylvestris, Centaurea Carduus benedictus, Linn. *Chardon benit, Cardobenedictenkraut, geseg-neter*

neter Distel, Spinnen-Distel. Colitur in hortis. *Polychresta est & vere benedicta, atque præsertim morbis ex ventriculo oriundis medetur. Succus subemeticus, unciae unius, duarum dosi febribus intermittentibus, viscerum obstructionibus, ictero utilis, externe ad ulcera cancrofa, putrida, imo gallica, commendatur.*

Herba Cardui Mariæ, Lactei, Spinæ albæ, Cardui squamis calycinis, margine apiceque spinosis, Linn. Chardon de nôtre Dame, Webedistel, Mariendistel. Colitur in hortis. *Pleuritidi & hepatis morbis opponi solet.*

Cardui tomentosi, Onopordum acanthum, Linn. Chardon sauvage. *Succi inde expressi externus usus, multum ad ulcera etiam cancroidea sananda laudatur.*

Cassinæ, vide Herba Apalachines.

Centaurii minoris, Febrifugæ, Fellis terræ, Gentianæ corollis infundibuliformibus quinquefidis, foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, Linn. Petit Centaurée, flem Tausendguldenkraut, Sieberkraut, Erdgallen. In silvis & pascuis nascitur. *Omnibus morbis a bile ortis dicata est, ut vix præscribatur vinum medicatum, cui non addatur Centaurium. Contra furfures & crustosam capitis scabiem, vix præstantius ullum decoctum reperiri, quam Centaurii ex pisorum brodio, Rajus perhibet. Pediculos enecare idem asserit. Etiam ad reliquas cutis affectiones, varos, alphas &c. conducit secundum Matthiolum. Decoctum per clysterem infusum, mirificum auxilium ad ischiaticum malum esse, humores educere, & dolores sedare, Fernelius auctor est.*

Centumnodiæ, Centinodii minoris, Polygoni, Sanguinaræ, Renouée, Centinode, Weatritt, Weggras, Tausendknoten, Blutkraut. Ubique ad vias occurrit. *Refrigerat & adstringit; hinc in sanguinis & alvi fluxionibus commendatur.*

Cerefolii, Chærefolii, Chærophylli sativi, Scandicis feminibus nitidis ovato-subulatis, Linn. Cerfeuil, Körfelkraut. Colitur in hortis. *Colligenda vere. Diuretica, pectoralis, emmenagoga & lithontriptica censetur. Ad dolores puerperarum posthumos summopere laudatur. Diurno usu Cancrum sanandi spem alunt nonnulli ex veterum promissis.*

Ceterach, Scolopendrii veri, Asplenii, Asplenii frondibus pinnatifidis laciniis alternis adnatis, Linn. Ceterac, Milfkraut, Milzfarn. Ex Helvetia, ubi in montibus asperrimis atque rupibus ad umbram sitis provenit, adfertur. *Spleneticis, calculosis & ictericis commendatur, atque herbis quinque capillaribus adnumeratur.*

Chamædryos, Chamædryos repentis minoris, Querculæ minoris, Teucrii foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis, floribus laxè verticillatis, Linn. Germandrée, petit Chêne, Gamanderlein, flem Bathengel, edel Gamanderlein. Provenit in montosis, & colligitur per æstatem. *Arthriticis, hydropicis & scorbuticis præprimis commendatur. Bibitur infusum ejus loco Theæ.*

Chamæpityos, luteæ vulgaris, folio trifido, Ivæ artheticae, Ajugæ, Teucrii foliis linearibus trifidis integerrimis, Linn. Ivette, Erd-

Erdkieffer, Feld = Cypress, Schlagfräutlein, Je länger je lieber. Odorem spirat terebinthinaceum. *Balsamica est planta, nervina & anodyna; apoplecticis & epilepticis, vertiginosis atque pareticis commendabilis.*

Herba Chelidonii majoris, Chelidonii vulgaris, Chelidoine grande éclairé, groß Schöllkraut, Schwalbenkraut. Provenit in locis incultis circa sepes & muros. Succum in se habet acrem crocei coloris. *Ictericis commendatur, & in obstructionibus hepatis laudatur; externe egregium est vulnerarium, detergit & mundificat ulcera. Tota planta hydropicorum plantis pedum subditur.*

Cichorii hortensis, Chicorée, Wegwartenkraut, Sonnenwendkraut. Colitur in hortis. *Vires sunt eadem ac radicum; rari tamen usus.*

Cicutæ, Cicutæ majoris, Conii seminibus striatis, Ciguë, Schierling. Non in omnibus officinis eadem herba sub nomine Cicutæ deprehenditur. Sunt, pro quibus *Cicuta aquatica Gesneri*, colligitur; aliæ *Ethusa cynapium* vendunt, aliæ *Phellandrium aquaticum* recipiunt. Invenies etiam ubi ex *Cherophyllo tenuilo* Extractum cicutæ paratur. Ipse Linnæus pro conficiendo *Emplastro de cicuta* feligit *Cicutam aquaticam*, a quibus omnibus probe distinguimus nostram. Nostram enim facimus & officinis nostris commendamus eam, quæ Stoerkianis experimentis materiam dedit, circa sepes & in dumetis occurrit, & caule suo maculoso ac odore viroso etiam indoctis non-Botanicis facile innotescit. *Utilem esse perhibent hanc Cicutam malis scirrhis, scrophulosis, quæ vel resolvit, vel ad benignam suppurationem redigit; cancro limites ponere, etiam acrem cancrum emendare, & ichorem in bonum pus convertere, Cataractas incipientes solvere, vel earum progressus impedire, fomentando dolores podagricos, imo topicos dispellere, rheumatismum & arthritidem curare.*

Clematidis, Flammulæ Jovis, Clematis recta. Linn. Liene. Folia aliquot pinnarum paribus pinnatæ, pinnæ majusculæ petiolatæ, ovato-oblongæ inter mastigandum acrimonia quadam, sed modice linguam afficiunt. Exsiccatæ omnem fere acrimoniam exuunt. *Folia recentia cuti imposita rubefacientis imo vesicantis effectus adunt. Infusum foliorum dilutissimum sanguinem depurandi scopo propinatur. Pulvis ulceribus sordidis & carni fungosæ inspergitur.*

Cochleariæ folio subrotundo, Cochleariæ foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis sinuatis, Linn. Herbe aux Cuillers, Löffelkraut. Colitur in hortis, & colligitur verno tempore. *Aperitiva, diuretica & antiscorbutica est. Præfertur recens sicca.*

Consolidæ majoris, Symphyti majoris, Grande Consoude, Wallwurmkraut. Sponte provenit in locis humidis & circa fossas pratorum. *Decoctis additur vulnerariis.*

Consolidæ mediæ, Bugulæ, Ajugæ tetragono-piramidalis, Linn. Bugle, Consoude moyenne, gulden Günsel, gulden Wundkraut. Nascitur in pratis & pascuis humidis. *Vulneraria censetur, subadstringit & refrigerat.*

Consolidæ Saracenicæ, Solidaginis, Virgæ aureæ angustifoliæ minus ferratæ, Solidaginis caule erecto, racemis alternis erectis, Linn. Verge d'or, heydnisch Wundkraut. Sponte provenit in silvis. *Vulneraria*

est celeberrima & lithontriptica. Gargarisma ex decocto, faucium & columellæ morbis medetur, putredinem gingivarum & vacillationem dentium curat. Cosaci infusum contra incontinentiam urinæ bibunt.

Herba Conyzæ cœruleæ: Asteris conyzoidis: Senecionis cœrulei, Erigeri vulgaris, Erigeri pedunculis alternis unifloris, Linn. *Conise, blau Dürrewurz, Berus: oder Beschreykraut.* Provenit in locis siccis apricis. *Siccat, digerit, discutit, & antimagica habetur.*

Conyzæ pulicariæ, mediæ, Asteris conyzoidis luteo flore, anti-dysentericæ Hoffmanni, Conyzæ foliis lanceolatis, acutis, caule annuo corymbofo, Linn. *Conise jaune, gelbe Mume, Rubrkraut.* In humidis locis nascitur. *Ad dysenteriam & icterum commendari solet. Suffitu venenatas bestias fugare, & culices abigere, atque pulices necare, Dioscorides auctor est.*

Coronopi, Cochlearia Coronopus, Linn. *Corne de cerf, Arähenfuß.* Folia nervo-lata crenata, pennati fida, pinnis cuneiformibus, progrediendo majoribus, jam integris jam incis, gustu acriuscula. Europæ haud infrequens planta. *Vires diureticæ adscribuntur.*

Crassulæ, Crassulæ majoris, Fabariæ, Telephii vulgaris, Illecebræ majoris, Sedi foliis planiusculis patentibus ferratis, corymbo-terminali nudo, Linn. *Orpin, fette Henne, Knabentkraut, Bruchkraut, Wundkraut.* Provenit in arenosis. *Refrigerat, adstringit & vulneraria creditur.*

Crithmi, Crithmum maritimum, Linn. Ad maris littora crescit. *Ad excitandam esuriem sub forma acetarii comeditur, etiam propter vires aperientes celebratur.*

Cupressi, Chamæcyparissi, Santolinæ, Abrotani foeminæ, Santolinæ foliis quadrifariam dentatis, pedunculis unifloris, Linn. *Garderobbe, Garten-Cypressen, Stabwurz, Weiblein.* Colitur in hortis. *Anthelmintica & diuretica est, atque cum Absinthio Pontico convenit. Garderobbe a Gallis vocatur, quia vestes contra tineas defendit.*

Cuscutæ majoris, Cassuthæ, Cuscutæ nudæ repentis filiformis, Linn. *Cuscute, Goutte de Lin, Flachsseiden, Flachsdotter, Nilkraut.* Planta est parasitica. Inter linum & urticas nascitur. Si *Thymo* innascitur, *Epithymum* vocatur. *Splenetica & hepatica est; aperit & abstergit.*

Cymbalariae, Antirrhinum Cymbalaria, Linn. *Linnaire de montagne, Gymbelkraut.* Vulgatissima per Europam temperatam planta. *In aperiendo ejus vis hinc inde laudatur, tam cum jusculis recens coquitur, quam succus ejus expressus exhibetur.*

Daturæ. Vide Herba Stramonii.

Dictamni Cretici veri, Origanum foliis tomentosis, spicis nutantibus, Linn. *Dictam, Dictame ou Dictamne de Crete, Cretischer Diptam.* Ex Creta advehitur. Folia sunt eligenda tomentosa, recentia, odorata. *Alexipharmaca & uterina est; Theriacam & Diascordium ingreditur. Vulnerarium etiam celebratur, & ad partum difficilem, fetum mortuum & secundinas expellendas, ad grana*

grana decem, in forma pulveris exhibitus, multum laudatur. Etiam in infuso, Theæ instar, apud incolas Candicæ, ad febres tertianas, cachexiam, & sudorem prolicientum, celebris est.

Herba Digitalis purpureæ, folio aspero C. B. Digitalis calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiori integro, Linn. *Digitale*, *Fingerhut*. Raro quidem in officinis reperitur; commendatur vero a Parkinsonio, in decocto cum radicibus *Polypodii*, tanquam remedium ad epilepsiam sive morbum caducum, efficax. Vomitus excitat, & alvum purgat magna cum vehementia.

Dracunculi, Artemisia Dracunculus, Linn. *Estragon*, *Dragun*, *Kayser-Salat*. Folia hujus plantæ odoratui sunt pergrata, gustui, aromatica, leniter linguam pungentia. Asiam septentrionalem incolit, apud nos copiose in hortis colitur. Tam in palati gratiam, quam ad juvandam digestionem emhammatibus & acetariis adjicitur. Multo in usu est acetum cum his foliis infusum.

Ebuli, Sambuci humilis, arvensis, *Yeble*, ou *Hieble*, *Attichkraut*. Provenit in agris & campis. Serum educit, & eo fine hydropicis confert.

Endiviæ majoris, latifoliæ, Intybi hortensis, Cichorii caule simplici, foliis integris crenatis, Linn. *Endive*, *Andivien*, *Endivien*. Colitur in hortis. Refrigerat & hepati dicata est.

Epaticæ, vide Herba Hepaticæ.

Epithymi, Epithymi Cretici, Cassuthæ minoris, Cuscutæ Thymi, *Epithyme*, *Cretische Thym-Sende*. Ex Creta insula advehitur; nascitur etiam in Italia. Epithymum species est Cuscutæ, & planta parasitica. Epithymum vocatur, quia *Thymo*, sicut Cuscuta, urticis & lino adhæret. Purgat melancholicos sic dictos humores, urinam & menses ciet.

Equiseti, arvensis longioribus setis, Equiseti scapo fructificante nudo, caule sterili, ramis compositis, Linn. *Prêle*, *Queue de Cheval*, *Raßenwedel*, *Schaftheu*. Laudatur decoctum, vel infusum ejus in exulceratione renum & vesicæ, atque hæmorrhagiis sistendis.

Ericæ, Ericæ vulgaris humilis J. B. Ericæ antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis, Linn. *Bruyere*, *Sende*, *Sendekraut*. Planta omnibus notissima, copiose circa martiam silvam occurrit. Colligitur planta florescens. Specificè ad nephritidem & calculum vesicæ, infusum vel decoctum a Matthiolo laudatur: aqua destillata ad Ophthalmiam, infusus & balnea ex decocto arthriticis & paralyticis commendantur.

Erysimi, Verbenæ foeminæ, Irionis, Erysimi siliquis cauli appressis, Linn. *Velar*, *Tortelle*, *wilder Weg-Senf*. Juxta vias occurrit. Odor nullus, sed sapor est acer fervidus, ut cutim recens impositum inurat. Attenuat & resolvit, atque in morbis a visciditate humorum ortis, convenit, & ad Syrupum de Erysimio Lobelii requiritur.

Eupatorii cannabini Avicennæ, Trifolii cervini, Origani aquatici, Eupatorii foliis digitatis, Linn. *Eupatoire bâtarde*, *Wasserdosten*, *Runi-*

Runigunden-Kraut, Hirsch-Klee. Provenit circa rivulos & fluviorum ripas. *Vulneraria* & *antiscorbutica* habetur, & præsertim externus ejus usus est. *Turfi fossiores putrida ulcera pedesque tumentes*, hoc & nullo alio remedio sanare, beat. Boerhavius auctor est. *Radices hydropicis & ictericis*, in infuso commendantur, vehementer purgant, & serum educunt.

Herba Euphrasie flore albo, Eupragie, Herbæ ophthalmicæ, Euphrasie foliis ovatis acute dentatis, Linn. Eufraise, Euphraise, Augentrost. Provenit in pratis, & sub initium autumni colligenda est. *Ictericis commendatur, & ad memoriam confortandam, nec non Ophthalmiam laudatur.*

Farfaræ, Tussilaginis, Ungulæ caballinæ, Pas d'Ane, Tussilage, Huflattich, Rosshub, Brandlattich. Provenit in locis humidis. *Tota planta pectus juvare fertur; folia etiam externe ulceribus imponuntur.*

Foeniculi, Marathri, Herbe de Fenouil, Fenchelkraut. Colitur in hortis. *Herba vires habet semine debiliores, atque raro, frequentius radix & semen in usum vocantur.*

Folia Indi, Malabathri, Tamalapatri, Canellæ silvestris Malabaricæ, Laurus Cassia, Linn. Feuille Indienne, Indianisch Blatt. Folia sunt oblonga, acuminata, densa & glabra, a pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus, odore grato, sapore aromatico. Veterum *Malabathrum* plane incognitum est; nostrum folia sunt arboris *Canellæ Malabaricæ* in H. M. *Katou-Karva* nominatæ. Eligenda sunt recentia, viridiuscula, odorata. *Ad Mithridatii & Theriacæ confectiorem requiruntur; alexitericæ, balsamicæ & uterinæ sunt virtutis, & urinam potenter movent.*

Fragariæ, Trifolii fragiferi, Herbe de fraiser, Erdbeerkraut. In silvis largus ejus est proventus. *Vulneraria est, leniter adstringit, & hepar imprimis juvare fertur.*

Fumariæ, Fumi terræ, Fumariæ pericarpiis monospermis, Linn. Fumeterre, Taubenkropf, Erdrauch, Kräghenyl. Sponte provenit inter olera & in vinetis. Colligenda planta floescens, mense Junio & Julio. Multum salis habet essentialis, & B. Bærhæve crystallos, nitri similes, in succo inspissato observavit. *Insigniter amara, splenetica & hepatica est, serum purificat. In morbis chronicis atque cutaneis commendatur.*

Galegæ, Rutæ caprarie, Galega, Geißrauten. Colitur in hortis. *Alexipharmaca & sudorifera est.*

Galeopsidis. vid. *Lamium album.*

Gallii, Gallii lutei, Gallii foliis octogonis linearibus, ramis floriferis brevibus, Linn. Caillelait, Megerkraut, Waldstroh, Bettstroh. Provenit copiose circa vias, margines agrorum, & in collibus apricis. *Acidum in se continet, unde lac coagulat; ceterum vulneraria & detergens est.*

Gallitrichi, Hormini Sclarea dicti, sativi sive hortensis, Salviæ foliis rugosis oblongo-cordatis serratis: floralibus calyce longioribus, Linn. Ormin, Scharlachkraut. Colitur in hortis. *Raro in usum venit.*

Siccat

Siccat & abstergit, atque vulnerariis adscribitur. Sunt, qui vina hormino & floribus sambuci mangonizant, ut illis saporem & odorem moschatellinum concilient, quæ vero vina citius inebriant, atque enormes capitis dolores excitare solent.

Herba Geranii Robertiani, Gratiæ Dei, Herba Ruperti, Geranii pedunculis bifloris, foliis quinque trive partitis: Lobis pinnatifidis, Linn. Bec de Grue, Herbe Robert, Storchenschnabel, Ruprechtskraut, Gottesgnad, Rothlauffenkraut. Obvia est Geranii hæc species in ruderibus & muris vinetorum. Colligenda mense Majo. *Vulnerarium præstantissimum est; externe applicatum lac in mammis discutit, & inflammationi medetur. Succus expressus cum melle ad oeam laudatur.*

Gnaphalii montani, Elichrysi montani, flore rotundiore, Tournef. Hispidulæ, Rivini. Gnaphalii caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, sarmentis procumbentibus, Linn. Pied de chat, Feldkorn, Muhrkraut, Haasenspötlein. Nascitur in montosis apricis locis. *Ufus est in decoctis & gargarismis; vulneraria est & subadstringit. Commendatur ad tussim ferinam puerorum.*

Gratiolæ Limnesii, Digitalis minimæ, Centauroidis C. B. Gratiolæ floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis, Linn. Gratiole, Herbe à pauvre homme, Gottesgnadenkraut, Wild-Murin. Provenit in locis uliginosis & pratis humidis. Ad Tanaim fluvium copiose crescit. *Commendari solet hydropicis & cachecticis, febre quartana, & mensium obstructione laborantibus. Potenter per superiora, pariter atque inferiora, purgat; emmenagoga & anthelmintica est. Datur in substantia a granis quindecim ad drachmam semis, in infuso aut decocto a drachma una ad duas exhibere licet: sed cum grano salis propinanda, quia facile hypercatharsin excitat. Præstat infusum, lacte vel sero ejus dulci, quam vino paratum. A Tournefortio Speciebus pro clysteribus emollientibus additur.*

Hederæ arboreæ, Hederæ communis majoris, Hederæ foliis ovatis lobatisque, Linn. Lierre, Eppheu, Baumwinde, Mauer-Eppheu-Blätter. In silvis reperitur, & passim muros antiquos scandens occurrit. *Sunt, qui internum usum foliorum hederæ arboreæ dissuadent, & mentis turbationem inde secutam observatum esse tradunt; in Act. Physic. Medic. Vol. V. vero pro specifico ad Atrophiam infantum laudantur, si dentur pulveris forma mane ad duas vel tres cultri cuspides, per tempus, ex jussulo vel cum infuso foliorum. Externe decoctum præbet mundificans, vulnerarium, & folia fonticulis superimposita affluxum concitant majorem.*

Hederæ terrestris, Chamæclema, Boerhav. Calaminthæ humilioris, rotundiori folio, Tournef. Glechomatis foliis reniformibus crenatis, Linn. Lierre terrestre, Terrette, Gundelreben, Sundermann. Ubique circa sepes & parietes hortorum occurrit. Colligenda Majo & Junio. *Pectori dicata est, & quasi polychrestum & balsamicum est remedium, in sputo & metu cruento. Succus naribus attractus cephalalgiam etiam vehementissimam & inveteratam, non lenire tantum, sed penitus auferre, Rajus refert. Cerevisiæ fermentationem impedit, eamque peculiari vi limpidam atque claram reddit.*

Hepaticæ fontanæ, Lichenis petræi latifolii, Marchantiæ calyce communi decemfido, Linn. Hepatique d'eau, Stein-Leberkraut,

Brunnen-Leberfraut. In puteis & circa fontes, ubi radii solares raro vel nunquam perveniunt, crescit. *Siccat, adstringit & abstergit.*

Herba Hepaticæ nobilis, Epaticæ, Trifolii aurei, Trifolii hepatici C. B. Hepaticæ, Linn. Hepatique noble, Leberfraut, Guldentlee. In silvis & dumetis occurrit. *Vulneraria est & subadstringit. Laudatur ad Gonorrhœam inveteratam, mictum & sputum cruentum.*

Hepaticæ stellatæ. Vide Herba Matrisylvæ.

Herniariæ, Millegranæ, Empetri, Herniariæ calycibus bractea nudis, Linn. Turquette, Herniole, Harnfraut, Bruchfraut. Crescit in locis aridis arenosis. *Subsalsa acris & styptica est. Commendatur in renum & vesicæ affectibus, ad urinam ciendam; prodest herniosis in pulvere exhibita.*

Hispidulæ. Vide Herba Gnaphalii montani.

Hormini. Vide Herba Gallitrichi.

Hyoscyami, Jusquiami, Fabæ fuillæ, Hyoscyami foliis amplexicaulibus, Linn. Jusquame, Hanebane, Bilsentfraut, Schlaftraut. Circa sepes & muros hortorum occurrit. *Raro in usum vocatur. Vires sunt anodynæ & emollientes. Cataplasma cum lacte & croco, ad urinæ suppressionem, lac abigendum, & perniones laudant. Internus usus merito suspectus. Noviter tamen Stœrck cum extracto, ex herba recenti facto, in affectibus spasmodicis, convulsivis & melancholico-maniacis experimenta, felici partim cum successu, facere cœpit; grana tria, sex, duodecim & ultra per diem, partitis dosibus, suadendo.*

Hyperici, Perforatæ caule rotundo, Hyperici floribus trigynis, caule ancipiti, foliis punctatis obtusis, Linn. Mille-pertuis, St. Johannisfraut. Provenit circa vias, in dumetis. *Colligenda cum floribus mense Junio. Vulnerarium, diureticum & anthelminticum est egregium; adnumeratur antimagicis.*

Hyssopi, Hyssopi officinarum, spicatæ flore cœruleo, Hyssopi spicis secundis, Linn. Hysope, Isop, Ispen, Hyssop. Colitur in hortis. *Est balsamica, incisiva, & multis morbis medetur. In specie ictericis, hydropicis & calculosis prodest; externe ad oculorum sugillationes commendatur.*

Jaceæ tricoloris, Trinitatis, Violæ tricoloris hortensis, Violæ caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis dentatis, Linn. Pensée, Dreyfaltigkeitkraut, Freysamkraut. Nonnunquam sponte occurrit, nascitur etiam in hortis. *Demulcet & refrigerat, inflammationibus internis opem fert; epilepticis, infantibus præcipue, succus vel syrupus inde paratus conferre creditur. In crusta lactea infantum pulvis herbæ cum successu datur.*

Ivæ Arthetice vid. Herba Chamæpytis.

Junci odorati vid. Herba Schoenanthi.

Juniperi, Juniperi foliis sessilibus patentibus, Linn. Summitates Juniperi, Sommitées de Genevrier, Wachholder-Lympf, Wachholder-Sprossen. *Juniperus tota est balsamica, antiscorbutica, alexipharmaca & diuretica.*
Herba

Herba Lactucæ virosæ, sylvestris, Lactucæ scariolæ & Lactucæ virosæ, Linn. Plantæ odor virosus. Sapor acris, amarus. Ubique per Europam crescit. Succus lacteus, quem fundit, exsiccatus, opio simillimus habetur. Succus expressus probe clarificatus ad aliquot drachmas per diem partita dosi datus efficacissimum est in Hydroke medicamentum.

Lamii, alba linea notati, Lamii C. B. Lamii Plinii, mortui Columænæ, Galeopsidis maculatæ J. B. Milzadellæ vulgo, Lamii foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, Linn. *Archangelique, Melisse de Montagnes.* Apud nos ubique provenit. Prædicatur a C. Hoffmanno ad scirrhum lienis.

Lappæ majoris, Bardanæ, Personatæ, Bardane grande, grosse Klettenblätter. Raro in usum veniunt, & externe ad cutis vitia in decoctis adhibentur.

Lavendulæ angustifoliæ, foeminæ, Lavandulæ foliis lanceolatis integris, spicis nudis, Linn. *Lavande, Savendel.*

Lavendulæ latifoliæ, maris vulgaris, Pseudonardi, quæ vulgo Spica, Aspic, Spick. Coluntur in hortis. Hanc a præcedenti specie non differre, Linnæus asserit. Viribus conveniunt; raro herbæ, frequentius flores in usum vocantur. Nervinæ & uterinæ sunt.

Lauri, sive folia Lauri, Lauri foliis lanceolatis venosis perennantibus floribus quatrifidis dioicis, Linn. *Feuilles de Laurier, Lorbeerblätter.* Magis in usum vocantur culinarium, quam pharmaceuticum. Possunt in infusis, scopo diuretico & carminativo, dari.

Lauro-Cerasi sive Folia Lauro-Cerasi J. B. Cerasi folio laurino, Feuilles de Laurier-Cerise, Kirsch-Lorbeerblätter, vulgo Mandelblätter. Arbor colitur in hortis. Folia, in lacte cocta, saporem ei conciliant Amygdalarum, & spiritum vini super illis abstractum, suavi sapore, Persicorum nucleorum instar, imprægnant. Secundum Linnæum folia hæc feris tantum, sed aliis observantibus etiam hominibus, lethalia sunt; imo aquam inde abstractam deleteriam esse affirmant. Lac est antidotum. Unde lacti incocta nemini nocuerunt. Aquam destillatam ad guttas 60. aliquoties de die datam potentissimum viscidum resolvendi remedium esse; foliorum infusum in obstructionibus hepatis; eademque cum farina in cataplasma redacta in tumoribus scirrhosis egregios effectus edere recentius observatum est.

Lichenis arborei, videatur Herba Pulmonariæ arboreæ.

Lichenis Islandici, Purgier-Moos. Ex foliis efformatur subrectis, coriaccis, flexibilibus versus basin latioribus; extus albis, intus fuscis; laciniatis, laciniis latiusculis, denuo laciniatis, ciliatis, exiguis lacunis adspersis; inodori, amaricantibus. Passim Europæ Saxi accrescit. Cum aqua gelatinam rubicundam efformat. In pulverem redactum & lacte coctum in alimentum cedit. Aqua cum eo decocta lenissime alvum ducit & pulmentum cum lacte inde paratum Phtisicis conducit.

Lichenis terrestris cinerei, Raj. Musco - fungus terrestris, latifolius, cinereus, hepaticæ facie, Oxon. Lichen foliis planis, subrotundis,

tundis, lobatis, obtusis, calice plano ovali, lacinula propria adnato. Niveus. Linnæi Fl. Lapp. Celeberrimus Hallerus in opere splendidiss. *Enum. Plant. Helvet.* in agris & pascuis macilentis provenire, terræque valide adhærere scribit. *Pulvis cum pipere mixtus, ad morsus canis rabiosi laudatur, vid. Pulv. Antilyssus.*

Herba Ligustri vulgaris, Ligustri Germanici, C. B. Phillyreæ, Dod. Ligustri, Linn. *Troesne, Hartrigel, Reinweide, Mundholz.* Sunt folia fruticis in Germaniæ sylvis ubique obvii. *Virtutem habent adstringentem. Usus eorum olim erat frequens in gargarismatibus.*

Linariæ vulgaris flore luteo, Oxyridis, Antirrhini foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis, Linn. *Linaire, Leintraut, Harntraut, Stalltraut.* *Diuretica est, & unguentum, ex illa paratum, hæmorrhoidum dolores sedat. Flores muscas necant.*

Lini cathartici, Lini caule dichotomo, foliis ovatis lanceolatis, Lini pratensis, foliis exiguis C. B. Lini foliis oppositis ovato-lanceolatis, petalis acutis, Linn. *Lin cathartique, Purgier-Flachs, flem Leintraut.* Floret in pascuis montosis mense Julio & Augusto. *Ob vim, quam habet catharticam, ita vocatur; humores serosos satis valide, absque molestia, educit. Sumuntur caulis, folia & capitula exsiccata, atque in pulverem redacta, cum Cremore Tartari, vel in vino infusa. Dosis in substantia drachma dimidia, ad scrupulos duos; in infuso uncia dimidia siccæ plantæ.*

Lunariæ racemosæ minoris, Rutæ lunariæ, Osmundæ scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria, Linn. *Lunaire, Mondrauten, Mondstrauf.* In montibus ac collibus herbidis, circa silvam martiam, provenit. *Adstringentis saporis est, refrigerat & siccatur, atque inter vulnerarias plantas, & quæ ad superstitionem adhibentur, locum habet.*

Lupuli salictarii. Vide Flores Lupuli.

Lyfimachiæ luteæ, Lyfimachiæ luteæ majoris vulgaris, Lyfimachiæ paniculatæ, racemis terminalibus, Linn. *Lyfimachie, Corneille, Perce-bosse, Weiderich, gelber Weiderich.* In silvis, locis humidis, & ad rivos occurrit. *Vulneraria est; raro autem in usum venit medicum.*

Lyfimachiæ purpureæ, floribus spicatis, foliis conjugatis. Salicariæ. Lythrum, Linn. *Lyfimachie rouge, rother Weiderich.* *A laxitate ortas dysenterias & diarrhæas, etiam annosas, expurgatis primum sordibus, curare, nova tentamina comprobarunt, dum drachma una vel scrupuli quatuor pulveris hujus plantæ, mane ac sero dantur.*

Majoranæ, Majoranæ æstivæ, Amaraci, Sampfuchi, Origani foliis ovatis obtusis, spicis confertis compactis, pubescentibus, Linn. *Marjolaine, Majoran, Maferan.* Colitur in hortis. *Balsamica, cephalica, uterina & errhina est planta, nec non aromatica, & in usum venit culinarium.*

Herba

Herba Malvæ vulgaris, pumilæ, silvestris folio rotundo, flore minori, *Mauve*, *Pappeln*, *Käspappeln*, *Hasenpappeln*. Crescit circa sepes & inculta. *Adscribitur herbis emollientibus. Veteres illam in usum culinarium vocabant.*

Mari veri Syriaci. Teucris foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis spicatum digestis, Linn. *Marum*, *Amberkraut*, *Mastichkraut*. *Thymbra* est species, & a Tournefort. *Thymbra Hispanica*, *Majoranæ* folio, vocatur. Colitur in hortis. *Balsamica* est, & inter medicamenta cephalica, ptarmica, diuretica & carminativa excellit. In vitris probe obturatis servari debet.

Marrubii albi, Præsti, Marrubii denticulis calycinis setaceis uncinatis, Linn. *Marrube blanc*, *weisser Andorn*. Colitur in hortis; nunquam etiam circa rudera sponte nascitur. Colligenda mense Junio. *Calefacit & siccant; uteri & pectoris affectibus dicata est, atque nephriticis commendatur. Ptyalismum mercurialem juvare, Linnæus innuit.*

Marrubii nigri, Ballote dicti, nigri fœtidi, Ballotæ foliis cordatis indivisis ferratis, Linn. *Marrube noir*, *puant*, *schwarzer Andorn*. Sponte circa sepes hortorum nascitur. *Commendatur ad hypochondriacos & hystericos affectus.*

Matricariæ, Artemisiæ tenuifoliæ, Parthenii minoris, Matricariæ foliis compositis planis: foliolis ovato-incisis, pedunculis ramosis, Linn. *Matricaire*, *Espargoutte*, *Mutterkraut*, *Mettrich*. Colitur in hortis. Folia & flores simul colliguntur. *Ad uteri morbos frigidos, flatulentiam & renum calculum commendatur: tam interne, scilicet in infusis, quam clysteribus adhibetur. Imponitur mammis ad lac discutiendum.*

Matrifilvæ, Hepaticæ stellatæ, Aparine latifolia humilior montana Raj. Asperula, foliis octonis lanceolatis, floribus fasciculatis pedunculatis, Linn. *Muguet de bois*, *Waldmeister*, *Sternleberkraut*, *Herzfreund*. Est *Aparine latifolia humilior montana Tournefort*. Nascitur in silvis. Colligenda mense Majo. *Vulneraria est & hepati dicata.*

Meliloti, Meliloti vulgaris, Trifolii odorati, Trifolii floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto, Linn. *Melilot*, *Steinflee*, *Honigflee*. Ad agrorum margines & inter segetes crescit. Colligenda cum floribus, qui vel albi vel lutei. *Emollit & dolores mitigat. Ad emplastrum ejus nominis requiritur.*

Meliloti cœruleæ, odoratæ, Loti hortensis odoræ, Trifolii spicis oblongis, leguminibus feminudis mucronatis caule erecto, Linn. *Melilot bleu*, *Siebengezeit*, *zäher blauer Steinflee*. Colitur in hortis. *Alexipharmaca, anodyna, diuretica & vulneraria est. Ab Helvetis caseis viridibus, quos Schaabzieger vocant, admiscetur. Flores cœrulei cum herba Rutæ hortensis in butyro cocti, unguentum exhibent ophthalmicum, laude dignum.*

Melissæ hortensis, Citratæ, Citronellæ, Melissæ floribus ex axillis inferioribus subsellibus, Linn. *Melisse*, *Melissen*, *Mutterkraut*, *Citro-*

Citronen-Melissen, Bienenkraut. Colitur in hortis. *Vires habet stomachicas, carminativas, nervinas atque uterinas.*

Herba Melissæ Turcicæ, Peregrinæ folio oblongo, Citraginis Turcicæ, Dracocephali floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaribus, Linn. Melisse Turque, Türkische, fremde Melissen. Colitur in hortis. *Viribus cum antecedente convenit.*

Melissophylli Fuchsii, Lamii montani Melissæ folio, Melissæ humilis latifoliæ, maximo flore, Tournefort. Melittis, Linn. Melisse sauvage, Wald-Melissen. Proveniunt in silvis montosis. Colligenda mense Junio & Julio. *Laudatur tanquam incomparabile remedium ad renum & vesicæ affectus, & in retentione urinae, quæ non a calculo oritur, feliciter adhibetur.*

Menthæ crispæ, fativæ, rotundifoliæ crispæ, spicatæ, cruciatæ, Menthæ floribus spicatis, foliis cordato-dentatis, undulatis sessilibus, Linn. Menthe crépue, Beaume, Krausemünz, Kreuzmünz. Colitur in hortis. Colligenda mense Junio & Julio. *Balsamica, stomachica, uterina & carminativa est. Lac in mammis coagulatum superimpositam resolvere perhibent.*

Menthæ Piperitidis Folia ovato-oblonga, acuta, viridia, ferrata; odore & sapore piperi supparia. Anglis est indigena planta. Abhinc aliquot annos copiose apud nos colitur. Oleum destillatum sapore ferventissimo non sine sensu frigoris linguam ferit. *Reliquas Menthæ species efficacia vincit.*

Mercurialis, annuæ, glabræ, vulgaris, Mercurialis caule brachiato, foliis glabris, Linn. Mercuriale, Bengelkraut, Hundsfohl. Provenit coliturque in hortis & vineis. *Emollit, alvum movet, & herbis quinque emollientibus adscribitur. Cavendum est, ne Mercurialis caule simplicissimo, foliis scabris, quippe quæ subvenenata est, in usum vocetur. Quamvis & nostram Linnæus pro suspecta habeat.*

Millefolii albi, Achilleæ vulgaris, Achilleæ foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acute laciniatis, Linn. Millefeuille, Garbenkraut, Schafgarben, Tausendblatt. Ad viarum & agrorum margines occurrit; floret per æstatem, & colligenda est florescens. *In fluxibus sanguinis compescendis, præcipue affectibus hæmorrhoidalibus convenit, & summo jure adtonica referri potest. Adscribitur etiam vis alexipharmaca, vulneraria & lithontriptica. Infusum theiforme haud ingratum, etiam phthisicis commendabile. Millefolium in destillatione exhibet oleum cæruleum, sicut Chamomilla.*

Millegranæ vide Herba Herniariæ.

Morsus Diaboli, Succisæ, Succise, Abbiß, Teufels-Abbiß. Crescit in pratis. *Cum scabiosa convenit, & vulneraria est; raro autem in usum venit, frequentius radix.*

Morsus gallinæ, vide Herba Alsines.

Myrti, folia Myrti, Boeticæ silvestris & fativæ, communis Italicæ, Myrti floribus solitariis, calyce fructus diphylo, Linn. Myrte, Myrthen

Myrthenblätter. Myrthus colitur in hortis apud nos; sponte provenit in regionibus calidioribus. *Folia adstringunt, & præprimis maslicata, vel decoctum inde paratum, gingivis relaxatis scorbuticorum medentur.*

Herba Myrti Brabanticæ, Myricæ Gale, Linn. Piment Royal, Post, Porst. Folia ovato-oblonga inferne contracta, integerrima sapore adstringente. Europæ frigidæ & Canadæ indigena. *A nonnullis Theæ Chinesi surrogabatur. Admiscetur subinde unguentis contra scabiem.*

Napelli, vide Herba Aconiti.

Nasturtii aquatici, supini, Cardamines, Sisymbrii, Sisymbrii aquatici, Sisymbrii foliis pinnatis, foliolis subcordatis, Linn. Cresson d'eau, Brunnen-Kresse, weisser Kresse. Provenit in aquosis; colligitur verno tempore. *Incidit, aperit & resolvit; recens in jussculis medicatis, succusque expressus specificè in scorbuto commendantur. Dosis est uncia semis.*

Nasturtii Indici, Tropæolum majus. Linn. Capucine, Kapuzinerlein. Annua est planta Americæ australis indigena. Copiose in hortis nostris colitur. *Gemmæ aceto condiuntur & cum carne comeduntur, capparide omnino gratiores. Flores ad acetaria recipiuntur. Ad sanguinem purificandum commendantur.*

Nepetæ, Menthæ cattariæ, Nepetæ floribus interrupte spicatis pedunculatis, Linn. Herbe aux Chats, Katzen-Münz. Sponte circa margines agrorum, & in incultis provenit. *Commendatur ictericis, asthmaticis, nephriticis, tussientibus, in infuso.*

Nicotianæ majoris, Peti, Tabaci, Hyosciami Peruviani, Nicotianæ foliis lanceolatis, Linn. Tabac, Taback. Nomen ab *Johanne Nicotio*, Regis Galliæ ad Lusitaniam Regem oratore, qui semen Nicotianæ vulgaris, a Belga quodam, ex Florida allatum, primus in Galliam misit. Colitur in agris & hortis. *Vires habet abstergentes, incidentes, resolventes, anodynas, vulnerarias, vomitorias & sternutatorias; clysteribus additur in affectionibus soporosis. In usum medicum vocari debent folia probe siccata, lutei coloris, non Tabacum jam præparatum & contortum.*

Nummulariæ, Centummorbiæ, Lyfimachiæ foliis subrotundis, floribus solitariis caule repente, Linn. Nummulaire, Pfennigkraut, Egelfkraut, Schlangenkraut. Provenit in locis humidis & herbosis, mense Majo colligenda. *Antiscorbutica, vulneraria & antiphthisica est.*

Ocymi, vide Herba Basilici.

Ophioglossi, Echioglossi, Linguae serpentariæ, Ophioglossi fronde ovata, Linn. Langue de serpent, Natterzünglein. Provenit in pratis & pascuis humidis, montosis. *Egregium est vulnerarium, tam interne exhibitum, quam externe applicitum. A Rajo ad ramices, vel in forma pulveris, vel in decocto exhibitum, laudatur. Oleum, per infusionem paratum, ad vulnera recentia, & ulcera inveterata, nec non ad ramices, valdopere commendatur; præsertim, si Terebinthina addatur. Parckinson.*

Herba Origani Cretici, Origani foliis ovatis acutis glabris: venis scabris, spicis tetragonis, Linn. *Origan de Crete*, *Cretische Dosten*, *Cretischer Wohlgemuth*, *Spanischer Hopfen*. Ex Creta insula advehitur. Eligi debent spicae recentes odoratae. *Aperit, resolvit, urinam & menstrua movet.*

Origani vulgaris, silvestris, Cunilae bubulae Plinii, Origani foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis, Linn. *Origan*, *ge meiner Wohlgemuth*, *Dosten*, *Frauendosten*. Nascitur in dumetis, & amat locos apricos. *Abstergit & aperit, ad pulmonum, hepatis & uteri affectus commendatur; lac augere etiam perhibent. Sacculus, origano repletus, atque cerevisiae probe lupulatae calefactae immersus, ad urinam movendam pectini bono cum effectu imponitur.*

Paridis, Paris quadrifolia, Linn. *Raisin de Renard*, *Wolfsbeer*, *Einbeer*. Folia ovato-acuta, obscure viridia, inodora, fatua, nauseosa. Crescit in omni Europa. *Plantae nonnullis suspectae folia siccata non modo non nocuisse, sed ad scrupulum unum pueris convulsionibus laborantibus data, saluberrimos effectus edidisse gravissimi Auctores testantur.*

Parietariae majoris, vulgaris, Helxines, Parietariae foliis lanceolatis ovatis, Linn. *Parietaire*, *Tag und Nachtkraut*, *St. Peterskraut*, *Nachtkraut*, *Glasskraut*. Colitur apud nos in hortis. *Abstergit, refrigerat, & ad herbas quinque emollientes refertur. Succus expressus, vel infusum saturatum, nephriticis & haemoptoicis commendari meretur.*

Parthenii, vide *Herba Matricariae*.

Pentaphylli lutei, **Quinquefolii**, *Quinte-feuille*, *Fünffingerkraut*. Provenit in locis arenosis campestribus. *Vulnerariis & adstringentibus herbis adnumeratur.*

Perfoliatae, **Perfoliatae vulgaris**, annuae arvensis, Bupleuri involucri universali nullo, foliis perfoliatis, Linn. *Perce-Feuille*, *Durchwachs*. Colitur in hortis, & nonnunquam sponte inter segetes provenit. *Adstringit & roborat; decoctis vulnerariis additur, & herniosis commendatur.*

Perforatae, vide *Herba Hyperici*.

Petroselinii vulgaris, hortensis, *Persil*, *Peterlein*, *Petersilienkraut*. Seritur in hortis. *Aperit & urinam movet; raro in medicum, frequentius in culinarium usum vocatur.*

Phytolaccae, **Phytolacca decandra**, Linn. In Virginia, Italia, Helvetia sponte crescit, nostrae hyemis patientissima. *Fuerunt, qui ejus contra cancrum efficaciam laudarunt.*

Pilosellae montanae hispidae, vide *Herba Gnaphalii montani*, sive *Hispidulae Rivini*.

Pilosellae majoris, repentis hirsutae, Auriculae muris, **Pilosellae luteae**, Hieracii foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro, Linn. *Piloselle*, *Oreille de souris*, *Mausohrlein*, *gelbe Mausohrlein*. Crescit in montosis, aridis & arenosis. *Pectoralibus & vulnerariis plantis*

plantis adscribitur. Decoctum ulceribus sinuosis inveteratis injicitur, atque ad collutiones, in oris, faucium & columellæ vitiis, laudabilem præstat opem.

Herba Pimpinellæ sanguisorbæ, Pimprenelle sanguisorbe, welscher Biebernell, Stölbleinskraut, Blutkraut. Nascitur in pratis humidis. *Virtute pollet adstringente, diuretica & vulneraria.*

Pimpinellæ, Saxifragæ majoris, Bimpinellæ, Pimprenelle saxifrage, Biebernell, Bockspeterlein, Steinpeterlein. Provenit in locis incultis, campestribus. *Aperit, abstergit, urinam movet & vulneraria censetur.*

Plantaginis angustifoliæ, Quinquenerviæ minoris, Plantaginis foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato, Linn. Plantain long, spiziger Wegerich, Hunde-Nippe. *Cum sequente convenit. Succus laudatur ad febres intermittentes.*

Plantaginis majoris, latifoliæ, Arnoglossi, Septinerviæ, Plantain majeur, breiter Wegerich. Ubique juxta vias crescit. *Refrigerat, siccatur & adstringit; adhibetur in decoctis vulnerariis & gargarismis.*

Polii Cretici, montani, angustifolii, Teucris foliis lanceolato-linearibus integerrimis subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis, Linn. Polium de Crete, Cretischer Berg-Polen. Nascitur in Creta insula. *Eligenda recens & odorata. Ad Theriacæ compositionem requiritur; urinam & menses movet.*

Polii montani lutei, maritimi erecti Monspeliaci, Teucris corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis, Linn. Polium de montagne, Berg-Polen, mit gelber Blüthe. Ex Gallia advehitur, ubi in Provincia, Delphinatu & Languedocia frequenter nascitur. *Cum præcedenti ratione virium convenit, & ejus est succedaneum. Sylvius adscribit vim antepilepticam; alii maniacis & noctambulis commendant.*

Polygalæ C. B. Ambarvalis, Dod. Polygalæ floribus cristatis racemosis caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis, Linn. Polygale, Kreuz-Blumen. Plantæ hujus, quæ in pratis ficcioribus, & ad margines eorum occurrit, qua huc usque in officinis nostris nondum usi sumus, hic mentionem facimus, propter characterem & eximias virtutes resolventes, quas cum *Polygala Virginiana* communes habet. Vide *Radix Seneka*.

Polygoni. Vide *Herba Centumnodiæ*.

Polytrichi aurei. Vide *Herba Adianti aurei*.

Populi, Populi nigræ, Peuplier, Pappelbaum. Prostant oculi sive gemmæ ante foliorum evolutionem colligendæ; hoc tempore succo foetæ viscido, digitis adhærente, suaveolente amaro. *Hodie maxime ad parandum, inde denominatum, unguentum colliguntur.*

Potentillæ. Vide *Herba Anserinæ*.

Prasii. Vide *Herba Marrubii albi*.

Herba Prunellæ, Consolidæ minoris, Brunellæ vulgaris, Brunellæ bracteis cordatis, Linn. Prunelle ou Brunelle, Prunellenkraut, Gotts-heyhl, St. Anthonikraut. Crescit in montosis & herbosis locis. *Refrigerat & leniter adstringit; celebratur vulneraria & antiscorbutica; adhibetur recens in jussulis, & sicca in decoctis in gargarismis ad faucium inflammationem.*

Ptarmicæ vulgaris, folio ferrato, flore albo, Dracunculi ferrato folio pratensis, Pyrethri germanici, Achilleæ foliis integris minutissime ferratis, Linn. Ptarmica, wilder Bertram, Beruskraut, weisser spiziger Rheinfarn. Indigena est; in pratis humidis & fossis crescit. *Naribus indita sternutationem movet; sunt, qui acetariis addunt recentem herbam, ad eorum frigiditatem corrigendam.*

Pulegii hortensis, Pulegii cervini, angustifolii, Menthæ floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, Linn. Puliot, Poley. Colitur in hortis. Sponte etiam crescit in Europa temperata. Colligenda mense Junio & Julio. *Aperit, attenuat & ad plantas nervinas refertur; ad tussim ferinam & raucedinem pertinacem, aliosque pectoris & uteri morbos specificè commendatur; præcipue menses imo sætum pellere creditur.*

Pulmonariæ arboreæ, Musci arborei pulmonarii, vocatur etiam Lichen arboreus, Lichen foliaceus repens laciniatus obtusus glabrus, supra lacunofus, subtus tomentosus, Linn. Pulmonaire de chêne, Lungenkraut, gemein Lungenkraut. In silvis occurrit, & plerumque quercubus aliisve arboribus adnascitur. *Siccat & adstringit; vulgo ad pulmonum affectiones adhibetur. In Ephem. Nat. Cur. Ann. III. Observ. 290. ad icterum, omnium Medicorum solertiam eludentem, efficax remedium, celebratur.*

Pulmonariæ maculosæ latifoliæ, Symphyti maculosi, Echii folio, Pulmonariæ foliis radicalibus ovato-cordatis, Linn. Pulmonaire, Flecken-Lungenkraut. Colitur in hortis; occurrit etiam in silvis, foliis angustioribus. Colligenda Aprili mense. *Usus est in affectibus pulmonum, ulceribus, phthisi & exspuitione sanguinis.*

Pulsatillæ, Anemone pratensis, Linn. Coquelourde, Ruchenschelle. Folia petiolata, pinnis linearibus & acutis bipennata, subtus hirsuta, odore levi, sapore primum levi, dein multum acri; passim per Europam obvia. *Aquam destillatam valde acrem fundit. Succus inspissatus ad extracti consistentiam ad scrupulum semis exhibetur. Variis oculorum morbis medelam attulisse illustris Stærkius observavit.*

Pyrolæ rotundifoliæ, Limonii Cordi, Pyrolæ staminibus ascendentibus, pistillis declinatis, Linn. Pyrole, Wintergrün, Holz-oder Wald-Mangold. Provenit in montosis silvis. *Refrigerans, adstringens, consolidans & vulneraria est.*

Quercus, Folia Quercus, Quercus foliis annuis oblongis superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis, Linn. Feuilles de chêne, Eichenlaub. Quercus ubique occurrit. Colligantur folia tenella. *Adstringunt, & in gargarismis atque decoctis externe adhibentur, etiam interne post nimiam sanguinis jacturam prædicantur.*

Herba Rorellæ, Roris folis, folio subrotundo, Droseræ scapis radicatis, foliis orbiculatis, Linn. *Ros solis, ou Herbe de la Goutte, Sonnentheu.* In humidis & palustribus inter muscos provenit. Colligenda Junio mense. *Abstergit & incidit. Acrimonia quædam dotata est hæc planta, ob quam nonnulli ejus usum disuadent. Maxime ovibus noxia a Rajo censetur, quia pulmones eorum adurit, & tussim lethalem excitat. Recentem cuti impositam vesicas subsequi observatum est.*

Rorismarini, Libanotidis, Rosmarini lati & angustifolii, Romarin, Rosmarin. Colitur in hortis. *Tota planta est balsamica, nervina, cephalica & uterina; interne & externe in usum vocatur. Herba recens, axungia anguillæ infusa, & ad solem digesta, pro remedio habetur ad gravem auditum.*

Rosmarini sylvestris, Ledum palustre, Linn. Romarin de Bohème, Pest-Wanzen-Mottenkraut. Europæ septentrionalis planta indigena & officinalis. *Laudatur ejus infusum aquosum ad pessimæ scabiei species, nec non ad tussim ferinam sanandam. Hæc planta cum Myrto Brabantica, quæ in nonnullis Pharmacopoliis loco Rosmarini sylvestris venditur, non est confundenda. Multum hæc Plantæ etiam habitu externo a se invicem differunt. Prior enim folia habet Rosmarini officinalis foliis simillima, at lana rubiginosa obducta; posterior vero ovato oblonga, ferrata, glabra.*

Rubi vulgaris, Rubi fructu nigro, Rubi foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis, Linn. Feuilles de Ronce, Brombeer-Laub. Crescit in silvis & dumetis. *Adstringit & in gargarismis adhibetur.*

Rutæ hortensis, vulgaris, latifoliæ, fativæ, Rutæ foliis decompositis, Linn. Ruë, Gartenrauten, Weinrauten. Colitur in hortis, & colligitur, dum floret. *Alexipharmaca, cephalica, nervina, uterina & diuretica est. Succus ut anthelminticum & antepilepticum celebratur. Herba, mammis imposita, lac discutit. Olim erat magnæ contra fascinum & venena laudis.*

Rutæ caprariæ, vide Herba Galegæ.

Rutæ murariæ, vide Herba Adianti albi.

Sabinæ, Savinæ vulgaris, Tamarisci folio, Juniperi foliis inferne adnatis: oppositionibus concatenatis, Linn. Sabine, Sevenbaum, Sadebaum, Mägdebaum. Colitur in hortis. *Calefacit, incidit, discutit, urinam movet; ob vim, menses ciendi, suspectis mulierculis nunquam dari debet; externe decoctum ad gangrænam & ulcera mali moris commendabile est. Porris veneris, ossibus cariosis & fungis duræ matris pulvis inspergitur.*

Salicis, folia Salicis vulgaris albæ, Feuilles de saule, Weidenblätter, Gelbenblätter. Ubique occurrunt. *Refrigerant, siccant, & adstringunt; usus est externus & in gargarismis.*

Salviæ hortensis, majoris & minoris, Salviæ foliis lanceolato-ovatis crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis, Linn. Sauge, Salben. Colitur in hortis, & florescente planta colligi debet. Vocatur a Paulino: *Herba sacra. Est nervina, balsamica, uterina & tam externæ, quam interne in usum vocatur.*

tur. Vinum salviatum a Sebizio commendatur mulieribus, quæ ob frigiditatem uteri infæcundæ sunt. Camphoram largitur.

Herba Salviæ filvestris, Scorodonæ, Salviæ agrestis C. B. Teucris foliis cordatis ferratis petiolatis, spicis laxis secundis, Linn. Sauge sauvage, wilde Salbey. In pratis & dumetis provenit. *Inter vulnerarias plantas eminet, menses & urinam ciet.*

Sampfuchi, vide Herba Majoranæ.

Saniculæ, Saniculæ quinquefoliæ, Diapensiæ, Sanicle, Sanickel, Bruchkraut. Nascitur in silvis & montosis. *Refrigerat & adstringit; vulneraria est, & fere omnia decocta vulneraria ingreditur.*

Santolinæ, vide Herba Cupressi seu Abrotani foeminæ.

Saponariæ, majoris, lævis, Lychnidis Saponariæ dictæ, Saponaire, Seiffenkraut. In arenosis, juxta rivulos & torrentes, nascitur; colligenda mense Junio, dum floret. *Attenuat, aperit & sudorem movet; externus usus in scabie & cutis vitiis commendatur.*

Saturejæ fativæ, hortensis, Cunilæ fativæ, Saturejæ pedunculis bifloris, Linn. Sariette, Saturey, Garten-Jsop, Bohnenkraut. Nascitur in hortis, & mense Augusto colligenda. *Stomachica, carminativa, diuretica & uterina est. Etiam in usum cedit culinarium.*

Saxifragiæ albæ, vulgaris, rotundifoliæ, radice granulosa, Saxifrage, weisser Steinbrech, Steinbrechkraut. Provenit in pratis & pascuis arenosis humidioribus. Colligenda cum floribus sub finem Aprilis, vel initium Maji. *Usus est in sabulo & calculo renum pellendo.*

Scabiosæ, vulgaris majoris, pratensis, foliis laciniatis, Scabiosæ corollulis quadrifidis, corollis radiatis, Linn. Scabieuse, Scabiosen, Apostemkraut. Crescit in pascuis & ad margines agrorum. Colligitur mense Junio & Julio. *Alexipharmaca, traumatica & pulmonica est, atque a Bærhavio summopere ad pectoris morbos commendatur.*

Scariolæ, vide Herba Endiviæ.

Sclareæ, vide Herba Gallitrichi sive Hormini.

Schœnanti, Junci odorati aromatici, Gramen Orientale aromaticum, panicula ampla, Schœnant, Junc Oriental odorant, Cameelheu, Cameelstroh. Est gramen dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevioribus tomentoso-candicantibus, ex eodem pediculo binis, *Pluckentii. Andropogon paniculæ spicis conjugatis ovatis. Linn.* Affertur ex Arabia. Eligendum spica non orbatum, & quod est saporis acris, amaricantis & suavis, odoris fragrantis. *Calefacit, subadstringit & discutit, urinam & menses ciet, capiti & ventriculo gratum est; purgantibus tanquam corrigens addi solet, & ad Theriacæ compositionem requiritur.*

Scolopendrii veri, vide Herba Ceterach.

Herba Scolopendrii vulgaris, majoris, Lonchitidis, Linguae cervinae, Phyllitidis, Asplenii, frondibus ensiformibus integris, basi cordato-inflexis, petiolis hirsutis, Linn. *Langue de Cerf, Hirschzungen.* Colitur apud nos in hortis; sponte provenit in rupibus Tirolis & Helvetiae. *Pertinet ad herbas quinque capillares, & easdem habet virtutes. Pulvis herbae exsiccatae ad palpitacionem cordis, suffocationem uteri, & motus convulsivos specificè a Rajo commendatur. Vulneraria & antiscorbutica est planta.*

Scordii Cretici, Scordium de Crete, Cretischer Lachen-Knoblauch. Ex Creta insula advehitur. Eligenda recens, foliacea, odorata, redolens Allium, saporis amaricantis.

Scordii nostratis, Chamædryos aquaticæ, allium redolentis, palustris, Teucris foliis ovato-lanceolatis sessilibus, floribus subbiatis, Linn. *Germandrée d'eau, Scordium, Lachen-Wasser-Knoblauch, Wasser-Bathenig.* Nascitur in palustribus. Colligenda mense Junio & Julio. *Alexipharmacum, sudoriferum, pectorale & anthelminticum medicamentum est, & præcedenti Cretico substitui solet in Theriacæ compositione.*

Scrophulariæ aquaticæ, vulgaris, nodosæ foetidæ C. B. Scrophulaire, Scordium, Braunwurz, Feigwarzenkraut. Floret Junio, & in palustribus, & fluviorum ripis provenit. Colliguntur folia, florescente planta, atque in umbra per decem vel duodecim dies siccantur, & tandem per aliquot horas foli exponuntur. *Virtute gaudent vulneraria, tam externe, quam interne in usum vocata. Ad odorem & nauseosum saporem Sennæ corrigendum commendantur, & Yquetayæ Brasiliensi substituuntur. Vide infra: Folia Sennæ.*

Scrophulariæ minoris, Chelidonii minoris, Ranunculi verni, rotundifolii minoris, Raj. *Petite Chelidoine, Scharbockskraut, klein Schöllkraut.* Nascitur in humidis. Colligenda Majo. *Ad plantas antiscorbuticas refertur, & cum reliquis antiscorbuticis plantis recens, siccata vero, utpote virtute fere orbata, raro in usum venit.*

Sedi, Vermicularis flore flavo, Sedi, foliis subovatis adnato sessilibus gibbis erectiusculis alternis, racemo triplici, Linn. *Tripe Madame, Mauer-Pfeffer, Rachen-Träublein, klein Hauswurz.* Ex parietibus & muris vinearum & rudera nascitur. *Saporem acrem fervidum præbet, & pro specifico antiscorbutico habetur. Succus expressus ad unum aut alterum cochlear sumptus vomitus & secessus alvinos excitat. Herba contusa & extus applicata, Clavos pedum consumere, Cancro & ulceribus fungosis medelam attulisse perhibetur.*

Senecionis, Erigeri vulgaris, Senecionis corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis, Linn. *Senecion, Kreuzwurz, Grindwurz-Kraut,* nostris *Goldkraut.* In hortis, arvis & inter olera occurrit, atque omni anni tempore floret. Colligenda est ante florum pappescentiam. *Maxime efficax est, atque scorbuticis, arthriticis, ictericis, vulgo etiam ad convulsiones & tormina infantum succus expressus commendatur.*

Sennæ, Folia Sennæ Alexandrinæ, Cassiæ foliolis tripennibus quadripennibus subovatis, Linn. *Sené, Feuilles de Sené, Sennetblätter.*

In Syria, Persia, Arabia & Ægypto colitur Senna. Optima censentur folia acuta, quæ ex Alexandria advehuntur, coloris sunt pallido - vel flavo - viridescens, saporis subacris, amaricantis, nauseosi, recentia & a stipitibus liberata. Tripolitana majora sunt & obtusa, Italica sunt latiora & obtusiora, saporis magis subdulcis & glutinosi, utraque villioris pretii & virtutis. *In classem purgantium usitatissimorum pertinent. Flatulentiam excitare solent; hanc ob causam Zinziberis, Galangæ & Cinnamomi additione corrigi debent. Nauseoso vero sapore, per additionem portionis æqualis foliorum Scrophulariæ aquaticæ, orbantur, sicut experimentum fecit Dn. Marchantius. Eph. Acad. Reg. Paris. 1701. Dosis in substantia drachma una; in infuso ad quatuor, usque sex, ascendere licet; per longam coctionem virtute privantur laxativa; præstat igitur, aqua infundere bulliente, & infusum post digestionem exhibere.* Huc etiam pertinent

Sennæ Folliculi, Follicules ou Ecoffes de Sené, Sennetbälglein. Sunt capsulæ sive siliquæ feminales Sennæ fulcatæ, recurvæ, semilunares, compressæ, continentes femina nigricantia. *Nonnulli eos foliis præferre volunt; sed experientia docet, magis flatulentos esse, quam folia.*

Herba Serpilli vulgaris, minoris, Serpilli silvestris repentis, Thymi floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis, Linn. Serpolet, Quendel, Feld-Poley, Künlein. Crescit in ficcioribus, montosis & sabulosis. Colligenda, dum floret, Junio vel Julio. *Cephalica, stomachica, diuretica & uterina est plantâ, atque tam externe, quam interne, in usum vocari potest. Urinam & sudorem movet; usus in infuso, Theæ instar, est. Externe ad cucuphas, pediluvia, gargarismata & fomentationem adhibetur.*

Sideritidis, hirsutæ, procumbentis, Sideritidis foliis lanceolatis subdentatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus, Linn. Cräpau dine, Gliedkraut, Wundkraut, Feld-Andorn, Berus-oder Beschreykraut. In agris ficcioribus, sabulosis apricis provenit. *Vulneraria & arthritica est; subadstringit & urinam movet. Balnea ex aqua, in qua Sideritis coctâ, mulieres ad infantum atrophiam, ab incantatione putatitia ortam, commendare solent; unde nomen Berus-oder Beschreykraut.*

Solani, Solatri nigri, Solani caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis, Linn. Moreke, Nachtschatten oder Saukraut. Circa sepēs & inter olera nascitur. Colligitur, dum floret. *Refrigerat & anodyna est. Nunquam interne, raro externe in usum vocatur.*

Soldanellæ, Brassicæ marinæ, Convolvuli marini rotundifolii, Convolvuli foliis reniformibus, Linn. Chou marin, Meerföhl, Meerwinde, Meerglöcklein. Per terram suas spargit viticulas, ex quibus folia prodeunt subrotunda, retusis alis prædita, latiora, quam longa, *Chelidonii minoris similia, crassiuscula, liquore lacteo manantia, pediculis longis innixa; flos magnus, purpureus, quadrantalis fere, campanulatus. Crescit in maritinis Galliæ, Angliæ & Italiæ. Planta est in totum ventriculo inimica, acris; vehementissime alvum ciet. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carnis jusculo; Valide serum educit; hinc Altomarus, Medicus ille celebris, usum Soldanellæ disuadet, atque potius noxam inferre, quam auxilium hydropicis præstare perhibet, Raj. in Hist. Plantar. Dari solet in pulvere drachma una, in infuso vel decocto uncia semis.*

Herba

Herba Spigeliæ, Spigeliæ Marilandicæ, Linn. Americæ septentrionalis propria planta. *Contra vermes præcipue ab Anglis, maximopere commendatur. Adultis duæ pro dosi drachmæ bis de die dantur. Iusto majori quantitate data Soporosos edidisse effectus compertum est.*

Squianti, vide Herba Schoenanti.

Stramonii, Solani Maniaci Diosc. Solani foetidi, pomo spinoso oblongo, flore albo, C. B. Daturæ fructu spinoso erecto, calyce pentagono, Linn. Pomme épineuse, Stechappfel. Crescit in incultis. *Planta hæc semper pro venenata habita, solo odore inebriare & mentem turbare credita est. Ill. Stærkius, capto in se ipso experimento, non adeo deleteriam invenit, & postea diversis institutis tentaminibus, eos, quos inducere perhibebatur morbos, maniam scilicet & epilepsiam, extracto inde parato, curasse sibi persuasit.*

Tamarisci, germanicæ, silvestris, fruticosæ, Tamaricis floribus decandris, Linn. Tamaris, Tamarisfenkraut, Porst. Juxta Rhenum & Danubium fluvios provenit copiose; nascitur etiam in Gallia Narbonensi. *Adstringit & refrigerat; raro tamen in usum venit, frequentius vero cortices.*

Tanaceti vulgaris, lutei, Athanasicæ, Tanaceti foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis ferratis, Linn. Tanesie, Rheinfarn, Burmfarn. Crescit circa fossas, & agrorum margines, aliaque sabulosa loca. Colligenda mense Junio & Julio. *Anthelmintica, nephritica, vulneraria & uterina est. Externe ad scabiem & lentigines decoctum commendatur.*

Taraxaci, Dentis Leonis, Dent de Lion, ou Pissenlit, Löwenzahn, Pfaffenröhrlein. In hortis & pascuis crescit. *Censetur alexipharmaca, pectoralis & hepatica. Folia tenella primo vere acetariis inserviunt & pro olere coquuntur,*

Theæ, The Sinenfium, Tsiæ Japonenfium, Thee Indorum, Thé, Thee. Colitur in regno Japonico & China. Planta est Evonymo adfinis, nuncifera, flore roseo. Frutex ultra orgyæ altitudinem raro exurgens, vestitur foliis carnosissimis brevissimis, furculos perenni, nisi decerpantur, vigore inordinate singulatim occupantibus, foliis *cerasi fructu acido* similibus. Flores sunt Rosæ silvestris facie, remisse fragrantés, albi, hexapetali, cum numerosis staminibus. Fructus monococcus, bicoccus & ut plurimum tricoccus, concretus ex globulosis capitulis, Pruni silvestris magnitudine, nucula fere globosa foetis. Florum & fructuum nullus est usus. Decerpuntur prima collectione folia nobilissima, tenella & nondum explicata, quæ rara & etiam in patria valde cara sunt, atque *Thea cæsarea*, nec non *flos Theæ* appellari solent. Secunda collectione folia integra explicata, cum semi-explicatis decerpuntur, atque secundum bonitatem ac magnitudinem in classes seliguntur. Messiem claudit tertia collectio, folia rigidiora perfecta largiens. Post collectionem folia Thee præparantur, atque recens decerpta super lamina ferrea torrentur, tosta & adhuc ferventia volis manuum volvuntur, donec crispa evadant. Duæ species Theæ maxime familiares nobis notæ sunt, prior *Thee Bohe, Thee Bou, Thee rubrum, rother Thee*, posterior *Thee viride*, ad quam etiam *Thee imperiale* refertur, appellatur. Dubium adhuc est, utrum ex eadem, an vero ex specie diversis fruticibus decerpantur *Thee Bou* & *Thee viride*. Omnes Theæ species magis vel minus adstringunt; viridem rubra tamen sapore adstringente plerumque antecellit. Grata fere omnibus est medicina infusa sunt

sum Theæ & vere polychresta; multum tamen aquæ calenti adscribendum esse persuasum sumus. Optima Thea censetur, cujus folia parva tenella, atque in apicibus alba, incana vel lanuginosa sunt, quæ leviter adstringunt, & odoris atque saporis grati deprehenduntur. Thea viridis aquam, in qua infusa est, viridiusculo colore, & odore violaceo, vel fœni recentis instar, imprægnare debet.

Herba Thlaspi, Thlaspi arvense, Linn. Moutarde sauvage, Baurensenf. Vulgaris per Europam planta. Tota planta efficax contra curculiones & cimices habetur.

Thuyæ, Arboris vitæ, Thuya occidentalis, Linn. Canadæ & Sibiriae indigena in nostris hortis non infrequens hospes. Decocto foliorum adscribitur resolvendi vis, eadem in unguenti formam redacta contra rheumatismos laudantur.

Thymi Cretici, Thymi albi capitati veri, Saturejæ floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis, Linn. Thym de Crete, Cretischer Thymian. Provenit in Creta insula, & aliis regionibus calidioribus. Eligenda odorata aromatica, capitulis integris.

Thymi vulgaris, folio tenuiore cineritio, rigidi, Thymi erecti, foliis ovatis, margine reflexis, floribus verticillato-spicatis, Linn. Thym vulgaire, a feuille menue, Thymian. Colitur in hortis. Colligenda mense Junio. Carminativas, anticatarrhales & nervinas habet vires. Non solum in usum cedit medicum, sed & culinarium. Est succedaneum prioris sive Cretici, utpote qui vulgari præstantior est, si modo debitas bonitatis notas habet.

Tormentillæ, Septifolii, Tormentille, Tormentill, Blutwurz-Kraut, Siebenfinger-Kraut. Raro in usum, nisi in decoctis vulnerariis, venit.

Trichomanis. Vide Herba Adianti aurei.

Trifolii fibrini, aquatici, palustris, Menyanthes foliis ternatis, Linn. Limonium Cord. Acopa Dioscorid. Boerh. H. L. Menyanthes palustre triphyllum Raj. Treffle de Castor, Menyanthe, Bieberflee, Bitterflee, Wasserflee, Scharbocksflee. Nascitur in aquis stagnantibus & paludosis. Colligenda mense Majo vel Junio. Aperit, incidit & roborat. Excellens est antiscorbuticum, antarthriticum, antasthmaticum, antihypochondriacum & antifebrile. Externe etiam, scopo mundificandi, ad ulcera tibie succus, vel decoctum herbæ conducit. Rajus ad ovium tabem commendat.

Trifolii pratensis, purpurei, vulgaris, majoris, Trifolii spicis subvillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis, Linn. Treffle des prés, Wiesenflee. Ubique provenit in pratis herbidis. Colligenda, dum floret. Vulneraria censetur, & albo fluori conferre, ob vim balsamicam & subadstringentem, creditur.

Tussilaginis, vide Herba Farfaræ.

Verbasci, flore luteo; maris latifolii lutei, Bauh. Pin. Thapsi barbati, Verbasci foliis utrinque tomentosis decurrentibus, Linn. Bouillon blanc, Molene, Bonhomme, Wullkraut, Himmelbrand, Rönigs-

nigſferzen. Juxta agrorum margines, aggeres & ſcrobis nascitur. Folia colligenda ſunt Junio menſe. *Prodeſt interne ſumtum, in morbis pectoris, tuſſi, ſputo cruento, & torminibus ventris.* A veterinariis Anglis, in affectibus pulmonum vaccarum & jumentorum, adhibetur, atque Pulmonaria vaccarum appellatur. Raj. Hiſt. Plant. *Externe adhibutum emollit, diſcutit & dolores mitigat, atque in lacte coctum ad hæmorrhoidum dolores, tenesnum & ani procidentiam commendatur.*

Herba Verbenæ vulgaris, maris, flore cœruleo, Verbenæ ſpicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, Linn. Verveine, Eiſenfraut, Taubenfraut, Eiſenhart. Nascitur juxta ſepes & muros, aliosve locos incultos. Colligenda menſibus æſtivis. *Adſtringit, refrigerat, vulneraria & anodyna eſt.*

Veronicæ majoris, vulgaris ſerpentis, Veronicæ ſpicis pedunculatis lateralibus, caule procumbente, Linn. Veronique, Ehrenpreiſſ, Heyl aller Schäden, Wundfraut. Nascitur in paſcuſ ac ſilvis recens cæſis, ſiccioribus. Colligenda menſe Majo & Junio. *Inter vulnerarias plantas eminet; diuretica, ſudoriſera, pectoralis & roborans eſt. Succum ad uncias duas de die potum, Podagræ mederi Boerhavius aſſerit.*

Vincæ per vincæ, Clematitidis Daphnoidis, Vincæ foliis ovatis, Linn. Pervenche, Wintergrün, Singrün, Ingrün. Provenit in ſilvis. Colligenda Majo & Junio. *Ob vim, quam habet, leniter adſtringentem, vulnerariis adſcribitur, atque in fluxionibus ſanguinis commendatur.*

Violaræ, Violæ acaulis, ſtolonibus teretibus reptantibus pedunculis radicatis, Linn. Violette, Biolenfraut, Beylfraut, Merzen Biolenfraut. Juxta ſepes, in dumetis & hortis provenit. *Ad herbas quinque emollientes reſertur.*

Vitis, Folia Vitis, Feuilles de Vignes, Weinlaub, Weintrauben Blätter. Colligenda ſunt menſe Auguſto. *Adſtringunt & refrigerant, atque in gargarismis adhiberi ſolent.*

Virgæ aureæ. Vide Herba consolidæ Saracenicæ.

Viscago, Cucubalus Otitis, Linn. Sponte provenit in collibus apricis Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ & Angliæ. *Infuſum herbæ vinoſum cum theriaca pro certiffimo venditatur in hydrophobia remedio.*

Urticæ urentis, vulgaris, racemiferæ, Ortie commune, Brenneſſeln. Ad ſepes & rudera creſcit. *Diuretica eſt, ad miſtum cruentum ſpecificè & hæmorrhagias omnis generis commendatur. Cicuta & Hyoſcyamo adverſatur.*

Urticæ mortuæ, inertis, Galeopſidis, Lamii flore albo, Lamii foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, Linn. Ortie blanche ou morte, weiſſe, todte Neſſel. Ad ſepes hortorum occurrit. Colligitur, dum floret, menſe Aprili & Majo. *Commendatur ſpecificè ad fluorem album & ſcrophulas.*

Uvæ urſi, Arbuti caulibus procumbentibus, foliis integerrimis, Linn. Arbouſier, Bouſſerole, Bärentraube, Wolfsbeere, Sandbeere. In montibus, collibus & ericetis Sueviæ, Norwegiæ, Ruſſiæ, Auſtriæ, Styriæ, Carniolæ,

Carniolæ, Helvetiæ, Italiæ, Hispaniæ, Gallo-Provinciæ &c. crescit. *Folia* hujus plantæ nostris demum temporibus officinis illata, in suppressione urinæ & doloribus renum atque vesicæ, a calculo & coacervata materia sabulosa ortis, tanquam insigne atque specificum remedium commendantur. Qua virtute autem miracula sua præstet, in ambiguo est. Si qualitates requiris manifestas, præter adstringentem, quam gustus detegit, invenies nullam. Forsitan hæc sufficit. Dosis est a scupulo semis ad drachmam semis.

Herba Vulvariæ, Chenopodium vulvaria, Linn. Arroche puante, kleine Mistmelten. Foetidissimum habet urinæ putrescentis odorem, saporem salsum. Passim per Europam crescit. *Hystericarum umbilico* imponitur. Annon odor & sapor majoris virtutis index?

Uvulariæ, Hypoglossi, Bislinguæ, Bonifaciæ, Lauri Alexandri-næ, Rusci latifolii fructu folio innascente, Tournefort. Rusci foliis subtus floriferis subfoliolo, Linn. Uvulaire, Zäpfleinfraut, Zungenfraut, Kehlblatt. Colitur in hortis; sponte provenit in Gallia & Italia in montosis. *Traumatica* est, adstringit, & decoctum in affectibus uvulæ, ex nimia humiditate & laxitate ortis, pro gargarismatibus adhibetur.

Xanthii, Lappæ minoris, Xanthium strumarium, Linn. Grappelles, petit Gluteron, Bettlerläuse, Spizfletten. Occurrit per omnem Europam. *Succum* ad sanguinem depurandum & contra scrophulos commendant.

CAPUT III.

DE FLORIBUS.

Flores Acaciæ Germanicæ, Pruni silvestris, Pruni spinosæ foliolis lanceolatis, Linn. Fleurs de prunier sauvage, Schlehenblüth. In sepibus occurrit Acacia. Floret mense Aprili. Flores colligendi sereno cœlo. *Laxant alvum, sed nonnunquam tormina excitant; serum & sabulum renum educunt; inter anthelmintica & antepileptica numerantur.*

Anethi hortensis, Fleurs d'Anet, Dillenblumen, Dillenblüth. Sunt in umbellam congesti. Colligantur Julio. *Anodynus & carminativus* sunt; usus est in enematibus.

Anthos, Rosmarini, Libanotidis, Fleurs de Romarin, Rosmarinblüthe. Colliguntur Majo & Junio. Vix apud nos sufficienti habentur quantitate; hinc afferuntur ex calidioribus regionibus. Eligendi odorati, recentes. *Cephalici, nervini & uterini* sunt.

Aquilegiæ, Fleurs d'Ancolie, Akeley, Akeley, Glockenblumen. Nascitur Aquilegia in hortis; nonnunquam sponte occurrit in silvis. Flores reperiuntur diversi coloris; eligendi cœrulei. *Antiscorbutici* sunt, urinam & menses cient, vulnerariis adnumerantur; in gargarismis etiam adhibentur.

Arnica. Vide *Herba & Radices*, cum quibus conveniunt, mitius tamen agunt.

Flores

res Aurantiorum, Citri petiolis alatis, Linn. Naphæ, Fleurs d'Orange, Pomeranzenblüth. Coluntur in hortis. Sicci raro, recentes ad aquam destillandam expetuntur. *Sunt alexipharmaci & cordiales.*

Balauftiorum, Balauftiæ, Mali punicæ silvestris, flore pleno majori, Punicæ, Linn. Fleurs Balauftes, Granatenblüthe Coluntur in hortis, & ex regionibus calidioribus advehuntur. *Valde adstringunt & refrigerant; ad uulvæ laxitatem in gargarismis conducunt. Ex petalis rubris, abjectis calycibus, pulverem rubrum sternutatorium parare solent.*

Basilici, Ocymi, Fleurs de Basilic, Basilgenblumen. In officinis prostant summitates herbæ cum floribus. *Virtutibus balsamicis, nervinis & uterinis conveniunt cum herba.*

Bellidis minoris, silvestris, Fleurs de petite Marguerite, de Paquerette, Gänseblumen, Angerblumen. Florent primo vere in pratis & aggeribus. *Cum herba conveniunt. Refrigerant, & pectori, renibus, hepaticis sunt amici.*

Bellidis hortensis, Bellidis rubræ, Fleurs de Marguerite rouge, rothe Maslieben, Margarethen-Blumen. *Virtutes eadem ac prioris, & præcipue ad Tincturam requiruntur.*

Betonicæ, Bethonicæ purpureæ, Fleurs de Betoine, Bethonienblüth. Junio & Julio colliguntur; plerumque spicæ florescentes tantum, non flores excerpti, in usum trahuntur. *Cæterum cum herba conveniunt, & ad conservam expetuntur.*

Borraginis, Buglossi veri latifolii, Fleurs de Bourrache, Borragenblumen. Mense Julio & Augusto colliguntur. *Adscribitur illis vis cordialis & antimelancholica, atque floribus quatuor cordialibus adnumerantur.*

Buglossi angustifolii, Fleurs de Buglosse, Schsenzungenblüthe. Junio & Julio florent. *Cum Borraginis floribus conveniunt, & pariter ad flores quatuor cordiales pertinent. Infusum ut antepilepticum a nonnullis commendatur.*

Calcatrippæ, Consolidæ regalis, Delphinii, Delphinii caule subdiviso, nectariis monophyllis, Linn. Fleurs de pied d'alouette, Ritter-Spornblumen, Lerchenflaunenblumen. Sponte inter segetes proveniunt; coluntur etiam in hortis. *Silvestres cœrulei in usum vocantur. Ophthalmici, diuretici, & vulnerarii sunt. Nonnullis tamen usus internus, ob vicinitatem, quam cum Aconito Calcatrippa habet, suspectus est. In Ophthalmia flores in sacculis, vel decoctum eorum externe applicantur.*

Calendulæ, Calthæ fativæ, Verrucariæ, Calendulæ feminibus radii cymbiformibus echinatis, disci bicornibus, Linn. Fleurs de Soucy, Ringelblumen, Goldblumen. Coluntur in hortis. Per totam ætatem florent. *Censentur cardiaci, uterini & alexipharmaci; suffitum a parturientibus, vagina exceptum, partum promoveri ajunt.*

Cardamines, Cardamine pratensis, Linn. Cresson des prés, Wiesenfresse Communis per Europam planta. *Hi flores laudantur contra morbos convulsivos ad drachmam unam aliquoties de die dati.*

Flores Carthami, Cnici fativi, Carthami foliis ovatis integris serratis aculeatis, Linn. *Fleurs de Carthame, ou de Safran bâtard, wil Safran, Saslohr.* Coluntur in hortis & agris. Florent Julio & Augusto. *Alvum emolliunt; & ictericis commendantur. Usus præcipuus est ad tingendum.*

Centaurii minoris. Vide Herbæ.

Chamomillæ seu Chamæmeli Romani, Leucanthemi odorati, multiplici flore, Matricariæ receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis, margine æqualibus, Linn. *Fleurs Camomille Romaine, Römische Chamillen, edle Chamillen.* Coluntur apud nos in hortis. *Sunt carminativi, stomachici, anodynæ & diuretici. Infusio theiforme ad dolores post partum commendabile est.*

Chamomillæ, seu Chamæmeli vulgaris, silvestris, Matricariæ receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, feminibus coronatis marginatis, squamis calycinis, margine obsoletis, Linn. *Fleurs Camomille des Champs, Chamillen, gemeine Chamillen.* In segetibus mense Junio & Julio luxuriant; singulis annis colligendi. *Gaudent virtute tonica carminativa, anodyna & antesebrili. Externe in sacculis discutiendi & in cataplasmatibus resolvendi gratia adhibetur.*

Cheiri, Keyri, Levcoji lutei, Cheiranthi foliis lanceolatis acutis glabris, Linn. *Fleurs de Giroflée jaune, gelbe Viole.* Primo vere florent; coluntur in hortis. *Ad icterum & uteri vitia commendantur.*

Cichorii, *Fleurs de Chicorée, Wegwartenblumen.* In campestribus & circa vias publicas proveniunt. *Hepati dicati sunt, & conserva ex floribus, non ex herba, parari debet.*

Consolidæ regalis. Vide Flores Calcatrippæ.

Cyani cœrulei, Baptifeculæ, Centaureæ calycibus ferratis, foliis linearibus: infimis dentatis, superioribus integerrimis, Linn. *Fleur de Bluet, blaue Kornblumen.* Florent inter segetes Junio. Colligendi sicca & serena tempestate, & celeriter inter chartam, fornacis calore, ne palleant siccandi. *Diuretici sunt; externe aqua destillata & flores ipsi in sacculis ad ophthalmiam commendantur.*

Farfaræ, Tussilaginis, *Fleurs de Tussilage, Huflattich, Rosshutblumen.* Primo vere ante herbam proveniunt, & hanc ob causam planta *Filius ante patrem* vocatur. *Pectorales sunt; in decoctis exhibentur, & eorundem syrupi atque conserva in officinis prostant.*

Galeopsidis. Vide Urticæ.

Genistæ, Cytiso-genistæ, flore luteo, Genistæ scopariæ angulosa, Genistæ foliis lanceolatis, ramis teretibus striatis, Linn. *Fleur de Genet, Ginster-Pfriementkraut-Blumen, Rünschotten.* Copiose proveniunt in arenosis, montosis, incultis. Mensibus Majo & Junio colliguntur. *Vires spleneticæ, nephriticæ, antiscorbuticæ & diuretici illis tribuuntur. In substantia vomitus excitant, in decoctis alvum laxant.*

Flores

Flores Granatorum. Vide Flores Balauftiorum.

Hepaticæ nobilis, *Fleurs d'Hepatique noble*, Edel-Leberfraut-Blütthe. In filvis proveniunt & primo vere colliguntur. Sicut flores Cyani colligi & ficari debent. Conveniunt cum herba, & ad conservam requiruntur.

Hyperici, Perforatæ, *Fleurs de Millepertuis*, Johannis-Blumen, Harthheu-Blumen. Junio & Julio colliguntur. Vulnerarii & anthelmintici sunt. Odorem contriti spirant terebinthinaceum, spiritum vini & oleum colore carmesino-rubro inficiunt.

Jasmini, Jasmini officinalis, Linn. Sunt flores arbusculi in India orientali sponte crescentis, copiose in hortis Europæis colitur. Flores recentes fragrantium effectus edunt. Oleum destillatum dare recusant. Oleum Behen cum iis infusum olei Jasmini nomine in officinis prostat, ad usus cosmeticos, ob gratum, quem large spargit, odorem, aptatum.

Lavendulæ fœminæ, angustifoliæ, *Fleurs de Lavande*, Lavendels-Blumen. Coluntur in hortis. Vigent mense Junio & Julio. Cephalicæ & nervinæ sunt, atque pro odoramentis & cucuphis expetuntur.

Liliorum alborum, Liliorum foliolis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris, Linn. *Fleurs de Lis blancs*, weisse Lilienblätter. Coluntur in hortis. Flores colligi possunt Julio & Augusto. Anodynæ sunt; digerunt, humectant & maturant, cuticulam curant; sicci vero raro in usum veniunt. Antheras sive apices luteos liliorum, menstrua & sætum pellere, nonnulli perhibent.

Liliorum convallium, Convallariæ scapo nudo, Linn. *Fleurs de Muguet*, Mayenblumen. Florent Majo in filvis. Cephalici sunt, & contra morbos frigidos capitis adhibentur. In substantia assumpti alvum movent; præstat igitur scopo confortandi aquam adhibere ex illis destillatam. Errhinam etiam habent virtutem, & pulveribus sternutatoriis adduntur. Baccas in pulverem redactas Epilepticis salubrites datas prætendunt.

Linariæ. Vide Herba.

Lupuli salictarii, Humuli, Linn. *Fleurs de Houblon*, Hopfen. Sunt folliculi squamosi, vel capsulæ foliaceæ, strobilorum instar, molles, quæ semina continent parva, & potius fructus, quam flores appellari deberent. Lupulus sponte provenit; copiose vero etiam colitur. Planta est scandens. Præcipuus usus Lupuli est ad cerevisias condiendas; in medicina vero medicamentum anodinum, discutiens, resolvens, calculum, urinam & menstrua pellens, præbet; externe contusionibus & tumoribus auxiliatur.

Malvæ arboreæ, hortensis, hyemalis, Alceæ foliis sinuato-angulatis, Linn. *Fleurs de Mauve de jardin*, Rose tremiere, grosse Pappel, Herbst-Rosen, Winter-Rosen. Coluntur in hortis. Flores colliguntur mensibus Augusto, Septembri & Octobri. Eligendi, qui colore sunt fusco-purpurei. Emolliunt, & ob visciditatem præbent anodinum in faucium inflammatione. Usus est in gargarismis.

Flores Meliloti, *Fleurs de Melilot*, *Steinflee-Blumen*. *Infusum florum Meliloti*, ad partum facilitandum; dolores post partum, & nephritidem commendatur. *Ufus eorum etiam in clysteribus est.*

Nymphææ albæ, *Nymphææ foliis integerrimis cordatis*, calyce tetraphyllo, corolla multiplici, Linn. *Fleurs de Nymphée blanche*, de *Nenuphar blanc*, *weiße Seeblumen*. Nascuntur in stagnis; florent mense Julio. *Refrigerant*, *humectant*, & ad maniam & satyriasm commendantur.

Origani, sunt summitates. Vide *Herbæ*.

Papaveris erratici, *Rhœadis silvestris*, *Papaveris caule multifloro folioso hispido*, foliis pinnatifidis, capsulis lævibus, Linn. *Fleurs de Coquelicot*, ou de *Pavot rouge*, *Kornrosen*, *Klapperrosen*, *Schnallenblumen*. Proveniunt inter fegetes. Colliguntur mense Junio & Julio. Aquam, diutius immerfi, reddunt mucilaginosam. *Anodynæ sunt*, & præcipue in catarrhis acribus, *salsis* & *pleuritide* conducunt, atque ob mucilaginem leniunt & mulcent.

Perficorum, *Mali Perficæ*, *Amygdali foliorum ferraturis omnibus acutis*, Linn. *Fleurs de pêcher*, *Pfersich-Blüth*. Florent mense Aprili; coluntur in hortis & vineis. *Alvum laxant*, *serum educunt*, & *vermes necant*. *Parantur inde syrupus* & *conserva*.

Pœoniæ, *Fleurs de Pivoine*, *Gichtrosen*. Coluntur in hortis. Colliguntur mense Majo. *Conveniunt virtutibus cum radicibus*, & *antepileptici* creduntur. *Raro flores*, sæpius *syrupus ex illis paratus adhibentur*.

Primulæ veris, flore odorato, *Paralyseos*, *Verbasculi pratensis odorati*, C. B. *Primulæ foliis denticulatis rugosis*, limbo-corollarum concavo, Linn. *Fleurs de Primevere*, *Schlüsselblumen*, *Himmelschlüssel*, *St. Petersschlüssel*. Ubique in pratis verno tempore proveniunt. *Censentur nervini*, *antepileptici*, *anodynæ* & *pectorales*.

Rosarum albarum, *Rosæ albæ vulgaris majoris*, *Fleurs de Roses blanches*, *weiße Rosen*. Coluntur in hortis, & mense Junio florent. *Ad oculorum inflammationes* & *fluorem album mulierum* commendari solent.

Rosarum pallidarum, *Fleurs de Roses pâles*, *bleiche Rosen*, *Ulmer Rosen*. Etiam in hortis coluntur, & eodem tempore florent. *Alvum laxant*, *biliosis* & *hydropicis* prosunt.

Rosarum rubrarum, *vulgarium*, *Fleurs de Roses rouges*, *Zucker-Rosen*, *rotte Rosen*. Colliguntur eodem tempore, quo præcedentes. *Omnes Rosarum species vim quandam habent subadstringentem*; hæc vero paulo magis, quam præcedentes. *Sunt simul roborantes*, *analepticæ* & *cordiales*. *Floribus adnumerantur quatuor cordialibus*. *Ufus est varius*, tam *internus*, quam *externus*.

Rosarum finarum, *intense rubrarum*, flore simplici sericeo, *Fleurs de Roses de Provins*, *Knopf-Rosen*, *feine Rosen*, *Efig-Rosen*, *Sammet-Rosen*. Coluntur in hortis. Colliguntur, dum nondum sunt apertæ, atque abscissis unguibus albis celeriter siccantur. *Vi adstringente*, omnibus reliquis
Rosarum

Rosarum speciebus, præcellunt, in reliquis conveniunt. Requiruntur præcipue ad Tincturam & Acetum. Linnæus omnes Rosas officinales sub una eademque specie, Rosæ caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis, comprehendit.

Flores Salviæ hortensis, *Fleurs de Sauge*, *Salbey-Blütthe*. Colliguntur per æstatem, & imprimis mense Julio. Virtutibus balsamicis & nervinis cum herba conveniunt.

Sambuci, Sambuci caule arboreo ramoso, floribus umbellatis, Linn. *Fleurs de Sureau*, *Hollunderblütthe*. Ubique occurrit Sambucus arbor, & circa rudera, muros & sepes nascitur. Floret mense Junio. Flores discutunt, emolliunt, resolvunt, lac augment, dolores mitigant, sudorem movent; infusum Theæ loco, senibus præsertim, ad cruentum sputum & tussē pertinacem, commendatur.

Saxifragiæ, vide Herbæ.

Scabiosæ, *Fleurs de Scabieuse*, *Scabiosen-Blumen*, *Apostemkraut-Blütthe*. Cum Herba conveniunt, & imprimis ad conservam expetuntur.

Spicæ Celticæ &

Spicæ Indicæ, vide Radices.

Spicæ hortensis, Lavendulæ latifoliæ, Psevdonardi, *Fleurs de Spic*, ou de Nard commun, *Spick*. Coluntur in hortis; in Hispania & Gallia Narbonensi sponte proveniunt. Colliguntur mense Junio & Julio. Adscribitur vis cephalica, nervina atque uterina, & tam externe, quam interne in usum vocantur.

Stœchadis Arabicæ, Stœchadis purpureæ, C. B. Lavendulæ foliis lanceolato-linearibus, spica comosa, Linn. *Fleurs de Stœchas Arabique*, *Stœchas-Blumen*, *welscher Lavendel*. Advehitur ex Gallia, Italia & aliis calidioribus regionibus. Eligendæ Spicæ integræ, odoratæ, recentes. Nervina, pulmonica, diuretica, uterina & carminativa gaudent virtute.

Stœchadis citrinæ, Germanicæ, Amaranthi lutei, Elichrysi, Gnaphalii foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo terminali composito, Linn. *Fleurs de Stœchas citrin*, de Passevelours, *Immortelles jaunes*, *Rheinblumen*, *Winterblumen*, *Schaben-Motten-Kraut*. Sunt species Elichrysi; proveniunt in locis sabulosis siccis; frequenter occurrunt circa Rhenum. Florent Junio & Julio. In affectibus pectoris, lienis & renum conducunt, vermes enecant. Fumus, a floribus carbonibus injectis, excitatus, ad arthriticos dolores commendatur.

Tanacetum, *Fleurs de Tanesie*, *Rheinfarn*, *Wurmkraut-Blumen*. Colligendi mense Junio & Julio. Anthelmintici sunt, & cum herba conveniunt.

Tiliæ, Lin. Tiliæ fœminæ, folio majori, C. B. *Fleurs de Tillau*, de Tilleul, ou de Tillot, *Lindenblütth*. Passim sponte & plantata provenit Tilia. Floret mense Julio. Flores roborant, discutunt, anodynī & cephalici sunt; ad epilepsiam, apoplexiam & vertiginem commendantur. Speciebus pro potu Ordinario additi gratum conciliant colorem rubellum.

Flores Tunicae hortensis, rubri, Dianthi floribus subsolitariis, corollis crenatis, squamis calycinis subovatis brevissimis, Linn. *Fleurs d'Oeuillets rouges, Nägelblumen, Garten-Nägelein, Grasblumen.* Coluntur in hortis. Florent mense Julio & Augusto. *Cephalici & cordiales censentur.*

Tussilaginis, vide Flores Farfaræ.

Verbasci, Thapsi barbati, *Fleurs de Bouillon blanc, Wullenblumen.* Proveniunt in locis arenosis, juxta agrorum margines. Colliguntur mensibus Julio & Augusto. *Sunt anodynæ & emollientes, atque ad hæmorrhoidum dolores & tenesmum, ab hypercatharsi ortos, in lacte dulci cocti & sacculis applicati, conveniunt. Infusum florum Verbasci ad phthisin laudatur, & Italis familiare esse, Ill. Hallerus perhibet.*

Violarum, purpurearum odoratarum, *Fleurs de Violettes de Mars, blaue Viole, wohlriechende Veilgen, Merzen-Viole.* Juxta muros sepes & in hortis proveniunt. Florent mense Martio & Aprili. *Refrigerant, humectant, emolliunt & laxant; vis etiam adscribitur cordialis, & hanc ob causam floribus quatuor cordialibus adnumerantur. Siccati in vitris loco calido asservandi, ne accessu aëris pallefiant.*

Urticæ mortuæ, Galeopsidis, Lamii albi, *Fleurs d'Ortie morte, ou de Lamium, taube Nesselblumen.* Ad hortorum sepes occurrunt, Martio Aprili & Majo florent. *Specificæ ad album fluorem commendantur.*

CAPUT IV.

DE SEMINIBUS.

Semen Abelmosch, Ketmiæ Ægyptiacæ, semine moschato, Tournefort. Alceæ Ægyptiacæ villosæ, Bamiae moschatae, Ketmiæ Americanæ hirsutæ, flore flavo, Raj. Hibisci foliis peltato-cordatis septem angularibus ferratis hispidis, Linn. *Graines de Musc, Bisamsaamen.* Grana sunt reniformia, pusilla, albicantia, odorem moschi & ambræ spirantia. Tam ex Oriente, quam ex Americæ regionibus calidioribus advehuntur; in hortis etiam nonnunquam coluntur. Eligenda probe odorata & recentia. *Aphrodisiaca censentur, & ad odoramenta & alia odore moschato imbuenda, inserviunt.*

Acetosæ, Oxalidis pratensis, *Semence d'Oseille, Sauerampfer-Saamen.* Est nigrum, parvum, triangulare, puniceæ coloris, splendentis, saporis adstringentis. *Pro alexipharmaco habetur, & hoc fine nonnullis compositionibus additur.*

Agni casti, Viticis officinalis, Vitex Agnus castus, Linn. *Semence d'Agnus castus, Reuschbaum, Reuschlamm-Saamen, Schaasfüllen-Saamen.* Arbuscula sponte in Italia & Sicilia nascitur. Semina sunt grana rotunda, pipere minora, colore cinereo, saporis subadstringentis, acris. *In calidioribus subjectis habere vim antaphrodisiacam; in frigidioribus vero venerem excitare, non satis compertum, id vero certum est, vim habere narcoticam, & esse medicamentum valde calidum, quare usus ejus caute instituendus.*

Semen

Semen Alkekengi, Halicacabi, Physalidis caule simplici, radice annua, foliis integerrimis geminatis, floribus solitariis, Linn. Bayes de Coqueret, Judenfirſchen-Saamen. Proveniunt Alkekengi in vineis & filvis. Semina & fructus maturescunt menſibus Octobri & Novembri. *Adnumerantur antinephriticis.* Vid. Fructus.

Altheæ, Ibiſci, Semence de Guimauve, Eybiſchfraut-Saamen. Sunt ſemina parva, ſemicircularia vel reniformia. Mucilaginem, in aqua macerata, exhibent. *Emolliunt, leniunt, & nephriticis commendantur.*

Ammeos, Ammi veri Cretici, odore Origani, Siſonis foliolis ſubcapillaribus, Semence d'Amni, Cretiſcher Ammy-Saamen. Ad umbelliferas & annuas refertur plantas. Semen parvum, ſtriatum, e ruſo ſpadiceum, ſaporis aromatici, acris eſt. Ex Alexandria Ægypti advehitur. Eligendum recens, maturum, ſaporis acris. *Alexipharmacum, diureticum & carminativum eſt; Theriacam ingreditur; & ſeminibus quatuor calidis minoribus adnumeratur. Commendatur a Matthiolo ad fluorem album, & ſterilitatem mulierum.*

Amomi, Semence d'Amome, wohlriechender Saamen, oder Frucht aus Indien, Amömlin. Inter Auctores liſ eſt, quid verum ſit Amomum; hodie plerumque pro Amomo baccæ rotundæ ex fuſco nigricantes, pipere paulo majores, *Myrti arboreæ aromaticæ, foliis laurinis, acuminatis, ſive Myrti foliis alternis Linnæi,* venduntur, quæ etiam *Caryophylli rotundi,* vel *Piper odoratum Jamaicenſe & Pimenta* vocantur. Colliguntur immaturæ, & ſaporis ſunt aromatici, ex Caryophyllorum, Nucis moſchatæ & Cinnamomi ſapore & odore quaſi compoſiti. Angli iis ad condiendos cibos utuntur, & ex *Jamaica* inſula, ubi arbor in montofiſ ſilvis creſcit, ſub nomine *All-Spice*, quia odorem & ſaporem omnium aromatum, ſcilicet *Cinnamomi, Caryophylloſum & Nucis* referunt, advehunt. *Rajus* ex *Sloani Historia Jamaicae* arborem ſub nomine *Caryophylli aromaticæ Americanae, lauri acuminatis foliis* ſequenti modo deſcribit: „Arboris hujus truncus, femoris humani craſſitudinem æquat, ad triginta pedum altitudinem recta aſſurgit, cortice glaberrimo incano tectus, quaqua verſus ramos emittit. Virgularum extrema folia diverſæ ſunt magnitudinis, ampliffima, quatuor vel quinque uncias longa, duas vel tres lata, glabra, tenuia, nitentia, ſaturato virore imbuta, pediculis uncialibus inſidentia, attritu odorata, & laurinis per omnia ſimilia.„ Surculorum extrema, ſeu ſummitates in multos, unciam longos, pediculos faceſſunt, totidem flores ſuſtinentes, quorum unusquiſque e plurimis ex albicante viridibus ſtaminibus, quatuor petalis perexiguis, deorſum reflexis, concoloribus conſtat. Floribus delapſis, ſuccedunt baccæ multæ coronatæ, ſeu umbilicatæ, per maturitatem baccis juniperinis majores, nigræ. glabræ & ſplendentes, in quibus continetur pulpa humida, ſubviridis, acris & aromatica. Baccæ hæ per veſicam deſtillatæ, oleum largiuntur ſuave, odoriferum, quod, velut *Oleum caryophyllorum & cinnamomi* fundum petit. Alii pro Amomo vero venditant ſemen quoddam anguloſum, rugoſum, aromaticum, nigrum, quod in capſulis ſeu ſiliquis ſubovatis, trigonis, in tria loculamenta diviſis, apportatur, & a nonnullis *Cardamomum majus*, ab aliis *Amomum racemoſum* vocatur, atque a *Linnaeo* in *Horto Clifſortiano*, ſub nomine *Amomi, ſcapo nudo, ſpica ovata & ſpica oblonga obtuſa,* deſcribitur. *Amomi vires ſunt cephalicæ, ſtomachicæ, incidentes & roborantes; ob virtutes alexipharmacas ad Theriacæ conſeſtionem requiritur.* Alii *Amomum* hoc, ſcapo nudo Linnæi,

Linnaei, pro *Cajeput*, *Cardamomi* specie fumunt. *Spielmanno* *Amomum* est semen exiguum, griseum striis eminendibus fulcatum, odoris levioris, saporis aromatici linguam fenendis, *Sison Amomum*, *Linn.* Crescere dicit in Anglia & Europa calida & nostras Hyemes ferre. Celebratissimum antiquitati *Amomum* hodie in integrum ignoratur.

Semen Anethi hortensis, Semence d'Anet, Dill = Saamen. Compressum, membranaceum quasi & tenue est, tribus striis notatum, coloris dilute fusci, saporis aromatici, odoris grati. *Digerit & discutit, auget lac, & somnum conciliat, flatu & urinam pellit.*

Angelicae fative, Semence d'Angelique, Angelick = Saamen. Albicans, latum & compressum est, saporem acrem & odorem Angelicae radiceis habet. *Carminativum est, diureticum & alexipharmacum.*

Anisi, Pimpinella Anisum, Linn. Semence d'Anis, Anis = Saamen. Oblonge rotundum, parvum & striatum est, coloris viridiusculi, saporis dulcis, aromatici. Ex annua planta, quae copiose in agro Bambergensi feritur colligitur. Eligantur semina magna, matura, & a stipitibus & quisquiliis libera. In Egypto & Syria sponte provenit, in Hispania collectum reliquis magnitudine cedit, aromate praestat. *Carminativum, pnevmonicum & stomachicum est. Ad quatuor semina calida majora refertur.*

Anisi Indici, stellati, Philippinarum insularum, Badianae, Semence d'Anis de la Chine, ou Anis étoilé, Indianischer Anis, Stern-Anis. Externa forma, capsula feminali stellam repraesentat, dum ex sex vel septem radiis constat, ex eodem centro ortis, qui hiantes grana tot proferunt, quot sunt radii. Coloris est ex fulvo fusci, saporis ex Foeniculi & Anisi mixti dulcis. Non raro integræ stellæ ad nos veniunt. Cujus plantæ fructus sit, nondum constat; creditur esse planta, quae *Evonymo* affinis Philippinarum insularum. *Anisum spirans, nucas in capsulis stellatim congestis proferens, vocatur.* Ex India orientali advehitur, & in Moscoviam ex Tartaria transportatur, unde forsitan *Foeniculum* & *Anisum Sibirienfe* nominatur. Eligendæ capsulae vel radii majores, multo oleo dotati, saporis subdulcis. *Convenit virtute cum semine Anisi vulgaris, penetrantius, gratius & praestantius tamen est.*

Apii fativi, Semence d'Ache, Garten = Eppich, Selery = Saamen. Parvum, striatum, Petroselini semine minus est. *Ad calculum & uteri vitia commendatur. Adnumeratur seminibus quatuor calidis minoribus.*

Aquilegiae, Semence d'Ancolie ou d'Ancholie, Ackeley = Glockenblumen = Saamen. Nigrum, parvum, splendens est. *Tribuitur illi vis alexipharmaca & antiscorbutica. Commendatur ictericis, vel in substantia, vel in emulsione, quæ emulsio etiam in peripneumonia, variolis, morbillis, aliisque febribus exanthematicis, nec non erysipellate, bono cum effectu datur.*

Asparagi fativi, Semence d'Asperge, Spargel = Saamen. Plerumque baccæ rubrae, in quibus semina, seu acini nigri duri includuntur, loco seminum prostant. *Vis adscribitur diuretica; raro vero in usum venit.*

Atriplicis hortensis, albæ fativæ, Atriplicis caule erecto herbaceo, foliis triangularibus, Linn. Semence d'Arroche, Melten = Saamen. Albi-

Albicans, orbiculatum, compressum est. *Vim habet emeticam & purgantem, atque ad drachmas duas cum aqua calida propinari solet; ictericis imprimis commendatur.*

Semen Aurantiorum, Semence d'Orange, Pommeranzen-Kern, Pommeranzen-Saamen. *Virtute gaudet alexipharmaca, diaphoretica & anthelmintica. In emulsionibus datur.*

Bardanae, seu Lappae majoris, Semence de Bardane, Aletten-Saamen. Oblongum, fuscum, nigris striis interstinctum est, saporis amaricantis. *Habetur insigne diaphoreticum & diureticum. Datur in substantia, vel in emulsione ad drachmam unam & ultra.*

Basilici, Ocymi vulgatiore, Semence de Basilic, Basilgen-Basiliens-Saamen. Parvum, nigricans, & saporis mucilaginosi est. *Ad Uteri affectus commendatur. In aqua maceratum dat mucilaginem, quae ad aphtas & fissuras labiorum & mammillarum utiliter adhibetur.*

Berberum, Acini fructus berberum, Berberis pedunculis racemosis, Linn. Semence d'Epine vinette, Erbselen-Saamen, Saurachbeer-Saamen. Sunt acini, sive arilli oblongi ex fructu, coloris pallidi, saporis adstringentis. Frutex, in qua fructus Berberis nascitur, sponte provenit in dumetis silvosis, & incultis locis; alitur etiam quandoque in hortis. Floret Aprili & Majo, & circa finem Septembris fructus perficit. *Semen adstringit, sed raro in usum vocatur.*

Bombacis, Gossypii frutescentis, semine albo, annui, Gossypii foliis quinquelobis, Linn. Semence de Coton, Baumwollen-Saamen. Est coloris ex nigro cinerei, Pisorum majorum magnitudinis; nucleum condit album, oleosum, dulcem. Gossypium sive Bombax colitur in Cypro, Maltha, Sicilia, & aliis insulis Archipelagi. *Semen vim habet demulcentem, & recens, non rancidum, nephriticis & hecticis prodest.*

Brassicæ rubrae, Brassicæ radicæ caulescente cylindracea carnosæ, Linn. Semence de Chou rouge, rother Köhl-Saamen. Rotundum, Sinapi magnitudinis, coloris ex rufo fusci, saporis oleosi, subacris est. Colitur brassica in hortis & agris, & demum altero post sationem anno semina perficit. *Commendantur ad gonorrhœam, vermes necandos & colicam.*

Buniadis. Vide Semen Napi.

Cannabis fativæ, Cannabis foliis digitatis, Linn. Semence de Chanvre, Hanf-Saamen. Parvum, rotundum, cineracei coloris, saporis dulcis, oleosi est. *Intus sumitur ventriculum & caput gravat; commendatur a nonnullis in tussi, & ad icterum. Dosis est in substantia; scrupulus unus, ad drachmam unam; præstat in emulsionibus exhibere, externe ad capitis dolores quoque utilibus, nec non ad maculas a variolarum suppuratione contractas delendas.*

Cardui benedicti, Semence de Cardon benit, Cordobenedictens-Saamen. Oblongum, teres, striatum est, & scopulam quasi refert, saporis amari. *Vires sunt alexipharmacæ, antipleuriticæ; in variolis & morbillis etiam adhiberi solet. Additur emulsionibus.*

Semen Cardui Mariæ, albis maculis notati, vulgaris, *Semence de Char-don Marie*, *Mariendistel*, *Behdistel* - *Saamen*. Oblongum, aliquantum compressum, fuscum est, saporis amaricantis. *Non solum ob signaturam, sed revera antipleuriticum est, atque emulsio exinde parata ad internas inflammationes quas-cunque conducit.*

Carthami, flore croceo, **Cnici**, *Semence de Saffran bâtard*, *wilder Saffan* - *Saamen*. Album, oblongum, angulare est, & sub cortice duriorè album, dulcem nucleum condit. Copiose in Alsatia & in agro Argentoratenfi colitur Carthamus. Semina sunt eligenda matura, magna, nucleum oblongum, album, pulposum, ponderosum includentia. *Egregium & leve est catharticum; hydragogum, atque tussientibus, hydropicis, & febre quartana laborantibus, convenit. Optime in emulsionibus exhibetur, & a drachmis duabus ad sex dari potest.*

Carvi, **Cari**, Linn. **Cumini pratensis**, *Semence de Carvi*, *Rüm-mich*, *Wiesen-Rümmel*. Planta sponte provenit in pratis; floret Majo, & sequente mense semina maturantur. *Semina carminativa, stomachica & diuretica sunt, atque ad quatuor calida majora referuntur.*

Cataputiæ majoris, **Ricini vulgaris**, **Ricini foliis peltatis ferratis**, **petiolis glanduliferis**, Linn. *Semence de Ricin*, *de Chassetaupe*, *Pur-gier-Rörner*, *Treib-Rörner*. Ovalis figuræ atque quodammodo compressæ est, Fabæ minoris magnitudinis, coloris albicantis & cineracei, ex nigro variegati; sub putamine tenui nucleum condit album, saporis acris. Colitur in hortis, ubi eodem, quo feritur, anno floret; in Ægypto vero sponte nascitur & perennat. *Hydragogum & purgans satis vehemens est; Emulsio ex granis decem vel duodecim, i. e. seminibus duobus vel tribus, parata, vehementer serum educit, & hydropicis, non vero emaciatis & biliosis, convenit. Oleum ex semine expressum externe ad membra paralitica commendatur, atque ad drachmas duas & ultra interne potest dari ad serum educendum. Ricini majoris semina in multis officinis prostant, cum hisce nostris non confundenda, quia ex alia planta Jathropha, nempe, foliis cordatis angulatis desumuntur. Utraque tamen ob exurentem acrimoniam & vim inflammantem, admodum suspecta esse debent.*

Cataputiæ minoris, **Tithymali latifolii**, **Lathyridis majoris**, **Euphorbiæ inermis**, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali quadrifida tetrphylla reliquis dichotomis, Linn. *Semence d'Epurge*, *Spring-Rörner*, *Treib-Rörner*. Seritur in hortis, & quotannis se sponte propagat. Semina sunt grana rotunda, Pisi magnitudinè; nucleus albus a corticosa substantia includitur. *Vehementer sursum & deorsum purgat, sed vix aliis, nisi hydropicis exhiberi debet, cum ob nimiam acrimoniam facile inflammationem intestinorum excitare possit. Caveant etiam pharmacopolæ hæc grana indiscrimina-tim divendere, præsertim suspectis mulierculis nunquam dari debent. Dosis hydropi-cis grana quinque ad septem. In succo expresso & inspissato, cum mercurio & sa-turmo misto, specificum quæerunt nonnulli contra cancerum.*

Chærefolii, *Semence de Cerfeuil*, *Rörbelfraut* - *Saamen*. Longum, nigrum, acuminatum, saporis acris, aromatici est. Seritur in hortis; planta est annua. *Seminum vires cum herba conveniunt.*

Semen Cicerum rubrorum, fativorum, flore ex purpureo rubefcente, Ciceris foliolis ferratis, Linn. Semence des pois chiches rouges, Rischen, Richer-Erbsen, Ziesern. Seruntur Cicera verno tempore. *Decoctum commendatur puerperis ad lochiorum fluxum promovendum; nonnulli venerem excitare credunt.*

Cichorii hortensis, fativi, Semence de Chicorée, Wegwarten-Saamen. *In emulsionibus, ad hepatis inflammationem commendatur.*

Cinæ, Cynæ, Zinæ, Zedoariæ, Sanctum, Santonicum, contra vermes, Semence contre le vers, Wurm-Saamen, Zittwer-Saamen. Ex Persia & Ægypto advehitur. De planta, ex qua hoc semen colligitur, nihil certi constat. Volunt esse Absinthii speciem, quæ *Absinthium Santonicum, Judaicum & Alexandrinum* C. B. vocatur. Alii ex seminibus, terræ mandatis, plantam Tanacetii similem provenisse, perhibent. Eligantur semina ex viridi flavescentia, non pulvere & quisquiliis mixta, odoris Zedoariæ, saporis acris, amari. *Vermibus adversatur, & stomachicum ac emmenagogum præbet.*

Citri, Mali Citrei, Semence de Citron, Citronen-Saamen. Ex fructu maturo colligendum. *Calefacit, attenuat, & lumbricos necat; ob magnam amaritiam ingratum est: additur tamen nonnunquam emulsionibus in febribus maligis.*

Citrulli, Anguriæ, folio Colocynthidis secto, semine nigro, Cucurbitæ foliis multipartitis, Linn. Semence de Citrouille, Angurien-Wasser-Melonen-Saamen. Eligatur recens, non rancidum. *Vim habet refrigerantem & demulcentem. Seminibus quatuor frigidis majoribus adnumeratur.*

Coccognidii, Laureolæ folio deciduo, flore purpureo, Chamæleæ, Mezerei, Daphnes floribus sessilibus infra folia ellipticolanceolata, Linn. Semence de Lauréole, Kellerhals, Seidenbast-Saamen, Purgier-Rörner. Rotundum, pipere paulo majus, fuscum & urentis saporis est. Frutex est Laureola, quæ Martio in silvis & editioribus locis flores; semina circa autumnum perficit. *Vehementer, ob vim causticam purgat, ut, non nisi robustissimis concedi debeat; hydropicis tria integra grana ab empiricis dantur. Religiosi medici illius usum merito interdiciunt.*

Cochleariæ, rotundifoliæ hortensis, Semence de Cochlearia, Löffel-Fraut-Saamen. Parvum, seminis Papaveris instar, est, ex rufo fuscum, rotundum, saporis acris, amaricantis. Seritur in hortis. *Antiscorbuticum est, & cum herbâ convenit.*

Colocynthidis, Cucumeris foliis multifidis, pomis globosis glabris, Linn. Semence de Coloquinte, Coloquinten-Saamen. Albicans, oblongum & compressum est. Medulla alba, quam sub cortice duriusculo continet, non adeo amara deprehenditur, sicut fructus. *Raro, vel nunquam in usum venit. Videatur Fructus.*

Coriandri vulgaris, fativi, majoris, Coriandri fructibus globosis, Linn. Semence de Coriandre, Coriander-Saamen. Seritur in hortis & arvis. Planta est umbellifera & annua. Semen rotundum, saporis aromatici.

Stomachicum, carminativum & antifebrile est. Veteres quibus etiam Linnæus adstipulatur, Coriandrum pro venenato habuerunt, ideo aceto præpararunt. De virulentia vero experimenta defunt.

Semen Cucumeris fativi, Cucumeris foliorum angulis rotundatis, Linn. Semence de Concombre, Gurcken = Cucumern = Saamen. Albicans, oblongum, planum, & saporis oleosi - dulcis est. Seritur in hortis. Fructus in usum culinarium cedit. *Semen inter quatuor majora frigida numeratur; refrigerat & demulcet, modo sit recens, non rancidum.*

Cucurbitæ, Cucurbitæ feminibus - obsolete - bicornibus, Linn. Semence de Courges, Kürbisen = Kern. Plures dantur Cucurbitarum varietates; hinc etiam semen, quod in officinis prostat, variæ est formæ & magnitudinis, semper tamen planum & album, atque margine cinctum. Colitur in hortis, agris & vinetis; Autumno semen maturescit. *Ob vim refrigerantem feminibus quatuor majoribus frigidis adscribitur. Usus horum seminum est in emulsionibus, quæ nunquam sine saccharo, ne lentore & mucilagine ventriculum molestant, propinari debent; addito vero saccharo hoc incommodum præveniri potest.*

Cydoniorum, Semence de Coins, Quitten = Kern, Quitten = Saamen. Fulvo colore, & magnitudine pomorum femina imitatur. Arbores in hortis & vinetis coluntur. *Mucilago e feminibus extracta refrigerat, & tam acrimoniam, quam æstum temperat; in alvi fluxu, ardore & excoriatione linguæ ac faucium cæteris mucilaginosi ob gratiorem saporem præfertur. Drachma una seminum sex uncias aquæ in mucilaginem inspiscat.*

Cymini, Cumini, Linn. Cumini semine longiore, hortensis, Romani, Fœniculi Orientalis, Cuminum dicti, Tournefortii, Semence de Cumin, Römischer Kümmel, langer Kümmel. Oblongum & striatum, ex flavo spadiceum est. E regionibus calidis, præcipue ex Melita insula, ubi copiose feritur, advehitur. *Ingrati est odoris & saporis; carminativum tamen, dissolvens & diureticum insigne. Seminibus quatuor majoribus calidis accensetur.*

Cynosbati, Rosarum silvestrium, Semence d'Eglantier, Hägen = Hüften = Hagenbutten = Saamen. A lanugine, quæ pruritus & molestiam in ano parit, probe liberari debent. *Laudantur ob lithontripticam virtutem ad calculum præcavendum.*

Dauci Cretici, Candiani, Myrrhidis annuæ, semine striato, villoso incanæ, Athamanthæ foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, feminibus oblongis hirsutis, Linn. Semence de Daucus de Crête, Möhren = Kümmel, Cretischer Bogelnest = Saamen. Daucus habet folia Fœniculi tenuissima, femina oblonga, incana, superiore parte acutiora; saporis est acris, aromatici, grati. In Creta sponte provenit; colitur etiam in hortis. *Alexipharmacum, diureticum, carminativum & uterinam virtutem habet. Ad Theriacæ & Mitridatii confectiorem requiritur.*

Dauci vulgaris Germanici, Pastinacæ silvestris, Dauci Seminibus hispidis, Linn. Semence de Panais, ou de Carotte sauvage, Bogelnest = wilder Möhren = Saamen. Floret mense Junio, in fegetibus, pascuis & pratis

pratis. In medio umbellæ floris purpureus plerumque reperitur flosculus, qui instar Coccionellæ purpureo colore inficit, & ad Epilepsiam commendatur. Dicitur a vulgo: *das Vögelein im Nest*, f. *Avicula in nido*. Semen cum præcedente, tam forma, quam sapore, convenit, paulo tamen minus est, & saporis non adeo aromatici. Carminativa & diuretica gaudet virtute, & ad semina minora calida refertur.

Semen Ebuli, Sambuci agrestis arilli vel acilli, Semence d'Yeble, Attich-Saamen. *Hydragogis* adscribuntur, & urinam simul movent. Dantur ex vino, vel in substantia, vel infuso. Oleum ex semine expressum per superiora & inferiora, a drachma una ad unam semis assumptum, purgat, & contra philtia laudatur.

Endiviæ albæ, fativæ, Scariolæ, Intybi fativæ, Cichorii latifolii, Tournefort. Semence d'Endive, Endivien, Winter-Endivien-Saamen. Parvum, oblongum, albo, & etiam alia species nigro cortice tectum, reperitur. Colitur planta in hortis, & in usum culinarium cedit. Seminibus quatuor minoribus frigidis adscribitur. Refrigerat, ictericis & hepaticis prodest; usus est in emulsionibus.

Erucae, Sinapi hortensis, Sinapi albi, Brassicæ foliis lyratis, caule hirsuto, filiquis glabris, Linn. Semence de Roquette, weisser Senf. Rotundum, parvum, flavescens, & saporis acris est. Colitur in agris & hortis; floret Majo & Junio; Augusto & Septembri semina perficit. Antiscorbutica & diuretica vi pollet; externe ad sinapismos etiam expetitur. Condimentum illud, quod Mustardam vocant, ex Erucae & Sinapios semine cum musto parari solet.

Fabarum, vulgarium, albarum, viciæ caule erecto, petiolis cirrho destitutis, Linn. Fèves des Marais, Sau-Bohnen. Sunt semina plantæ annuæ, papilionaceo flore; feruntur in hortis & agris. Flores recentes odorem spargunt suavissimum, siccati plane sunt inertes. Magis in culinarium, quam medicum usum veniunt. Farina est cosmeticum & abstersorium, atque ad cataplasmata emollientia & discutientia inservit.

Fagopyri, Tritici fagini, Polygoni caule erectiusculo inermi ramofo, foliis cordato-fagittatis, seminibus lævibus, Linn. Blé noir, Sarrafin, Buchweizen, Heydenforn, Heidelforn. Grana sunt triquetra, oblonga, nigra, quæ sub cortice nigro farinaceam continent substantiam albissimam. Seritur in agris. Panis, pulmenta & juscula ex Fagopyro cocta, cibum præbent haud ingratum, & inprimis commendari solent in vulneribus & erosione ventriculi atque intestinorum, cataplasma ad inflammationem testium & mammarum laudatur.

Foeniculi Cretici, dulcis, Romani, majore semine, Semence de Fenouil doux, Römischer, süßer Fenchel-Saamen. Colitur in hortis, & ex Italia advehitur. Ex cinereo spadiceum, oblongum, striatum, saporis dulcis, grati est. Eligatur recens, multo oleo dotatum, & a stipitibus liberum. Commendatur ad lac augendum, calculum & flatum pellendos. Datur in trageis & infusis.

Foeniculi vulgaris, Germanici, Semence de Fenouil commun, Fenchel-Saamen. Colitur in hortis, & altero, post sationem, anno floret &

& semina perficit. Semen gaudet virtute carminativa, diuretica, lac auget, & pectori amicum est. Egregium etiam præbet ophthalmicum, & inter semina quatuor majora calida numeratur.

Semen Fœni græci, Fœnugræci, Trigonellæ leguminibus sessilibus strictis erectiusculis acuminatis, Linn. Semence de Fenugrec, Boeckhorn-Saamen. Granula sunt dura, parva, flava, angulosa, quæ in longis, acuminatis filiquis, conformibus, crescunt. Saporis & odoris ingrati mucilaginosi. Seritur in agris, floret Junio; annua est planta, & ad papilionaceas refertur. Usus seminis est externus in cataplasmatibus. Virtute pollet anodyna, emolliente & discutiente. Equis etiam est medicamentum confortans.

Fraxini, Lingua avis, Fraxini floribus nudis, Linn. Semence de Frêne, Eschbaum-Saamen, Vogelzungen. Fraxinus arbor in silvis provenit. Semen ex longis, planis & ad modum linguæ acuminatis laminis, seu foliolis constat, in quibus ex flavo fuscum semen latet, subacri & amaro sapore præditum, quod excorticatum in usum vocatur. Adscribitur illi vis diuretica, lithontriptica, antipleuritica, antihydrica & aphrodisiaca.

Genistæ angulosæ, Scopariæ, Semence de Genêt, Genisten-Pfriemen, Rünschotten-Saamen. Est seminis Lini magnitudine, lutei coloris, aliquantum planum, cordiforme, saporis amaricantis. Provenit in incultis, floret mense Majo & Junio. Seminis drachma una in pulvere ex aqua exhibitâ alvum & urinam movet, & hydropicis confert; in majori dosi vomitus excitare solet.

Hordei, Hordei flosculis lateralibus masculis muticis, angularibus imbricatis, Linn. Semence d'Orge, Gerste. Seritur in agris; est vel hybernium vel vernum; prius ante hyemem, posterius verno tempore feritur. Virtute demulcente, anodyna, nutriente & refrigerante conveniunt; plerumque in usum vocatur excorticatum sive perlatum. Usus est in decoctis, ptisanis, & externe in cataplasmatibus. Malta, Dreche, Malz. Est Hordeum aqua madefactum & ad germinandum in acervos congestum & deinceps solerter exsiccatum. In aqua bulliente maceratum dat potum scorbuticis & fere omnibus sanguinis acrimonia laborantibus saluberrimum.

Hyosciami albi, Semence de Jusquiame, weisser Bilsen-Saamen. Pallidi coloris, parvum, planum, reniforme, & oleosi saporis est; mense Septembri ad maturitatem pervenit. Stupescientem vim habet, & merito inter infida medicamenta ponitur, a nonnullis tamen specificè in hæmoptysi commendatur. Ingreditur Pilulas de Cynoglossio & Philonium Persicum. Nonnunquam etiam in parva dosi exhibitum funestos edidit effectus, deliria, maniam, sopores, convulsiones lethales; imo etiam externe fumo suscepto, & fomentationibus, deliria movisse, exempla prostant. Dosis in substantia grana octo ad scrupulum semis usque. Hyosciami antidota sunt sinapi, allium, cepæ, & vomitoria.

Hyperici, Semence de Millepertuis, Johanneskraut-Saamen. Parvum, oblongum, cylindricum, coloris ex rufo fusci, saporis amari, resinosi est. Vulnerarium diureticum, antinephriticum & anthelminticum egregium habetur. Datur a drachma dimidia ad integram.

Semen Lacryma Job, Coix, Lacryma Job, Linn. Semen nitidum inverſe turbinatum; ſub cortice durior cineraſcente includit nucleum membrana teſtum, rotundum, ruſeſcentem, inſipidum, inodorum. Eſt ſemen plantæ Indicæ apud nos non perennantis. *A quibusdam ob virtutem diureticam commendatur.*

Lactucæ fativæ, non capitatæ, Semence de Laitue, Lattich-Saamen. Colitur in hortis. *Semina cum tota planta refrigerant, bilofis conveniunt, & ſeminibus quatuor minoribus frigidis adnumerantur.*

Lapathi acuti, Semence de Patience, Mengel- oder Grindwurz-Saamen. Fufcum & triangulare, Acetofæ ſimile eſt. *Virtute pollet adſtringente & alexipharmaca. Volkamero teſte, ſemen ex lapatho folio acuto rubente, miraculi loco, ſopit alvi fluxum dolentem, ſcrupuli unius, vel drachmæ ſemis doſi contuſum, & in vino ſumtum.*

Lappæ majoris. Vide Bardanæ.

Leviſtici, Liguſtici, Semence de Leveche, Liebfüßel-Saamen. Oblongum, planum & ſtriatum ac membranaceum eſt, coloris pallidi, odoris fragrantis, ſaporis aromatici. Colitur in hortis. *Alexipharmacum, diureticum, carminativum & hyſtericum cenſetur.*

Lini fativi, Lini foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capſulis mucronatis, Linn. Semence de Lin, Leinſaamen, Flachſſaamen. Seritur in agris. Oblongum, planum, læve, ſplendens, fufcum & ſaporis oleoſi eſt. *Vires habet anodynas, emollientes & maturantes. Decoſtum vel mucilago tuſſientibus, phthiſicis & pleuriticis commendatur; imo mucilagine huius ſeminis ſola, per aliquot ſeptimanas loco jentaculi aſſumta, colica ſpasmotica, ex plumbi fumo contracta, quam metalluſores Hütten-Raze vocant, laborantem, me reſtituiſſe, memini; externe in cataplaſmate dolores mitigat, emollit, diſcutit, & fœtum mortuum pellere creditur.*

Lupinorum fativorum, flore albo, Lupini calycibus alternis, appendiculis lateralibus nullis, Linn. Semence de Lupin, Feigbohnen, Wolfbohnen. Fabæ adæquat magnitudinem; colore eſt album, figura rotunda, compreſſum & in medio quaſi concavum. Colitur in hortis; ſemina ſeruntur vere; planta floret Junio, Julio & Auguſto; ſemina maturitatem Septembri conſequuntur. *Interne raro vel nunquam in uſum vocantur; externe ad conſcienda cataplaſmata diſcutientia inſerviunt. Cosmeticum etiam præbent, ob vim abſtergentem.*

Lycopodii, Plicariæ, Muſci clavati, ſquamofi, vulgaris, repentis, Lycopodii foliis ſparſis filamentofiſ, ſpicis teretibus pedunculatis geminis, Linn. Semence de Lycopodium, Beerlappen-Gürtelfraut-Truttenfußſaamen. Provenit in ericetis ſilvæ Martiæ. Pulvis flaveſcens, qui in clavis reperitur, ab aliis pro ſemine, aliis pro polline antherarum habetur. *Commendatur tanquam panacea fere ad omnes infantum morbos. Eſt diureticum, roborans, anodynum, antihecticum, antiepilecticum & traumaticum. Doſis grana ſex, ſcrupulus ſemis ad ſcrupulos duos in adultioribus. Externe valet ad intertrigines, cum Tutia, vel pauſillo Ceruſſæ mixtum. Flammiſ injectum tanquam pyrius pulvis fulgurat; hinc inde a nonnullis Sulphur vegetabile appellatur. Deſtillatum principia ceræ edere dicitur.*

Semen Malvæ, folio sinuato rotundo, *Semence de Mauve*, **Pappeln-Ros** = **Pappeln-Saamen**. Est fuscum, semilunare, in parvas placentulas caseoli instar congestum, mucilaginosi saporis. Malva provenit in sepibus, floret Majo, & semina perficit Junio & Julio. *In aqua decoctum, vel in pulvere exhibitum, vim habet demulcentem, antinephriticam.*

Melonum, Cucumeris foliorum angulis rectis, Linn. *Semence de Melon*, **Melonen-Kern** oder **Saamen**. Vix a semine Cucumeris distinguitur; crassius tamen est. Colitur in hortis; Julio & Augusto maturescit. *Refrigerat, demulcet, nephriticis commendatur, & inter semina quatuor majora frigida numeratur. Sit recens, ponderosum, non rancidum.*

Milii folis, Lithospermi majoris Cretici, Lithospermi seminibus levibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis, Linn. *Semence de Gremil*, *d'Herbe auxperles*, **Meerhirse**, **Steinsaamen**, **Perlenhirse**. Rotundum, glabrum, splendidum, album, semine Cannabis paulo minus est. Provenit in segetibus. *Diureticum & lithontripticum est, partum promovet, & ad febrem quotidianam, ante paroxysmum ad drachmam integram assumptum, laudatur.*

Napi sativi, Buniadis, Brassicæ radice caulescente fusiformi, Linn. *Semence de Navet*, **Stechrüben-Saamen**. Parvum, rotundum, ex rubro nigrum, saporis acris, amaricantis est. Seritur in agris; altero post sationem anno floret & semina perficit. *Alexipharmacæ, abstergentis & attenuantis virtutis est. Datur in emulsionibus.*

Nasturtii hortensis, Lepidii foliis oblongis multifidis incisissimis, Linn. *Semence de Cresson*, **Kressig-Garten-Kressen-Saamen**. Parvum, oblongum, ex flavo fuscum, saporis acris est. Seritur in hortis primo vere, & Junio vel Julio semina maturantur. *Commendantur herniosis & scorbuticis; urinam cient.*

Nigellæ, Melanthii, Cumini nigri, Nigellæ petalis subtricuspidatis, foliis subpilosis, Linn. *Semence de Nielle*, **schwarzer Küm-mich**, **schwarzer Coriander**. Extus nigrum, angulosum & rugosum, intus album est, saporis acris. Colitur in hortis; floret Julio & Augusto. Semina odorem quendam gratum aromaticum spirant. *Incidunt, aperiunt, & urinam movent; ad hydrophobiam & animalium rabidorum morsus, lac augendum, & febres quartanas commendantur, & inter errhina decantata sunt. Multis vero internus usus suspectus est, ob characterem, quem planta habet.*

Orobi, Ervi veri, Ciceris pistillorum germinibus undulato-plicatis, Linn. *Semence d'Orobe*, **Erbsensaamen**. Grana sunt spadicea, & aliquantum rotunda, saporis farinacei, amaricantis. Seruntur in hortis, ad plantas flore papilionaceo referuntur. *Semina in decocto ad nephritidem, & in cataplasmatibus ad emolliendos & maturandos abcessus laudantur.*

Oryzæ, Oryzæ sativæ, Linn. **Ris**, **Reiß**. Asiæ & Americæ indigenea. In America, Italia, Hispania copiose colitur. Annua est planta, apud nos Se-minum maturandorum causa in vaporario servanda. Hispanica rubet, Carolinensis albedine, magnitudine & pelluciditate Europæam vincit. *Vulgatissimus orien-*

orientis cibus, nostris quoque mensis copiose apponitur. *Demulcendi ergo ægrotis datur, contra alvi fluxus efficax celebratur.*

men Papaveris albi, hortensis, sativi, Papaveris caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisus caulinis, Linn. *Semence de Pavot blanc, weisser Mag-Mohusaamen, Delmagensaamen.* Album, valde minutum, saporis subdulcis, oleosi, est. Colitur in hortis, floret Junio, Julio & Augusto; eligatur recens, maturum, ponderosum. *Virtutis est anodynæ, lenitivæ & demulcentis. Datur in emulsionibus.*

Papaveris nigri, hortensis, semine nigro, *Semence de Pavot noir, schwarzer Mag-Saamen.* Cum præcedente convenit magnitudine & virtute.

Perfoliatæ, *Semence de Percefeuille, Durchwachs-Saamen.* Ex nigro fuscum, oblongum, in uno latere convexum, in altero aliquanto planum, & quasi crenatum, saporis subamari, acriusculi. *Adstringit, & herniosis tam interne, quam externe commendatur.*

Petroselini Macedonici, Apii saxatilis, petræi, Bubonis foliis rhombeis ferratis glabris, umbellis paucis, Linn. *Semence de Persil Macedonien, Stein-Eppich, Stein-Peterlein, Macedonischer Petersilien-Saamen.* Petroselini vulgaris semine paulo longius & tenuius, striatum & villosum, obscure viride, acris, aromatici saporis, odoris fragrantis est. Colitur in hortis. *Cum semine Apii convenit; alexipharmacam, diureticam & carminativam habet virtutem, & ad Theriacæ compositionem requiritur.*

Petroselini vulgaris, *Semence de Persil, Petersilien-Saamen.* Est oblongum, striatum, parvum, saporis aromatici, subacris. Seritur in hortis. *Alexipharmacum & diureticum est.*

Phellandrii, Phellandrii aquatici, Linn. *ligüe des Marrais, Wasser-schierling.* Semen ovali oblongum striatum ex viridi purpurascens, odoris aromatici, saporis acriusculi. *Ad sananda ulcera externa & interna & ad febres intermittentes commendatur.*

Plantaginis, *Semence de Plantain, Wegerich-Saamen.* Minutissimum est, longiusculum, fulvum, saporis mucilaginosi. *Adstringit & refrigerat; ad calculum, hernias, sanguinis & alvi fluxiones commendatur. Refertur a nonnullis ad semina quatuor minora frigida.*

Pœoniæ folio nigrante maris, *Semence de Pivoine, Sicht-Rosen-Saamen.* In cortice nigro, splendente rotundum, pisi magnitudinis album nucleum, ingrati saporis, continet. *Habetur antepilepticum & anodynum. Nunquam vomitus excitasse, & alvum movisse, B. Boerhave auctor est.*

Portulacæ hortensis, latifoliæ, sativæ, Portulacæ foliis cuneiformibus sessilibus, Linn. *Semence de Pourpier, Wurzel-Wurzelkraut-Saamen.* Valde exiguum, nigrum, & saporis oleosi est. Seritur in hortis, & autumnò semina perficit. *Semen refrigerat, & seminibus quatuor frigidis minoribus adscribitur.*

Semen Psylli, Pulicariæ, Plantaginis caule ramoso, foliis dentatis spicis nudis, Linn. Semence de l'herbe aux puces, Psyllienkraut, Flöb kraut: Saamen. Pulciforme, fusci coloris, saporis mucilaginosi, & parum acris est. Colitur in hortis; in calidioribus regionibus sponte luxuriat. *Virtus gaudet refrigerante, demulcente & laxante; biliosis convenit; mucilago extracta a faucium & linguæ siccitatem, nec non anginam confert.*

Raparum sativarum, Brassicæ radice caulescente orbiculari de pressa carnosa, Linn. Semence de Rave, Rüben: Saamen, weisse Rüben: Saamen. Est Raphani semine minus, fuscum, rotundum, saporis oleosi, acris. *Cum semine Napi convenit, & in emulsionibus ad variolas & morbillos expellendos datur.*

Raphani, Raphani filiquis teretibus torosis bilocularibus, Linn. Semence de Raifort, Rettig: Saamen. Rotundum, rufi coloris, saporis acris est. Colitur in hortis; radices cedunt in victum. *Semina incidunt, & urinam movent.*

Rufci, Semence de Houx-frelon, Mausdorn: Saamen. Bacca est rotunda, ex fusco rubra, quæ semen continet nigrum, saporis subdulcis. *Diuretica & abstergente gaudet virtute, & cum radice convenit; raro, vel nunquam nisi ad Electuarium benedictum laxativum in usum vocatur.*

Rutæ hortensis, Semence de Ruë, Rauten: Saamen. Nigrum est parvum, figuræ semilunaris, saporis acris, amari. Perennat & colitur Rutæ in hortis; floret per æstatem, & semina matura profert autumnus. *Commendatur ad singultum a flatibus ortum, lumbricos enecandos, gonorrhæam, urinam & menstrua pellenda.*

Sabadilli, Semence de Sabadillum, Mexicanischer Laus: Saamen. Figura & colore nigrescente Muscerdam refert, & in capsulis oblongis, gibbosis quasi corniculatis, trilocularibus adfertur. Saporis est fervidi, amari, ingratum sicut *Staphidis agricæ*, odoris nullius. Masticatum salivam ciet, atque acrimoniæ caustica fauces afficit, & nauseam excitat. E Mexico, Americæ regno advehitur, & quantum ex capsula feminali & effectu conjicere licet, *Veratri* vel *Aconiti* est species. *Miræ contra pediculos est efficacior, quos vix adplicitum, magis præsentaneo effectu, quam Mercurius vel semen Staphidis agricæ, perimit. Semen cum capsula feminali in pulverem teritur, & vel solus pulvis, vel axungia suilla exceptus, adplicatur. Milites, religiosi & nautæ, futuras vestium hoc semine fricare solent, atque se contra hos, alias insensissimos hostes, reddunt securos. Pulvis huius seminis saccharo commixtus, vel quibusvis eduliis inspersus, mures & glires necat. Contra affectus nephriticos & tæniam ad drachmam usque datam fuisse perhibent.*

Sambuci, Semence de Sureau, Hollunder: Saamen. Sunt arilli, sive acini ex baccis Sambuci. Oleum inde expressum alvum laxat, & serum educit ad drachmas duas sumptum, specificè contra philtia commendatur.

Santonicum, vide Semen Cinæ.

Saxifragiæ albæ, vide Radices ejusdem.

Scariolæ, vide Semen Endiviæ.

Semen Sefami, Digitalis Orientalis, Sefamum dictum, Tournefort. Sefami foliis ovato-oblongis integris, Linn. *Semence de Sefame, ou Jugeoline, Leindotter, Flachsdotter: Saamen.* Ex Ægypto, Sicilia & Italia advehitur. Eligenda femina albicantia, oleosa, dulcia. *Emolliunt, resolvunt & digerunt. Ægyptiis in cibum cedunt.* Passim pro femine Sefami semen *Myagri sativi* vendunt.

Sefeli Cretici, Tordylii minoris, Tordylii involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis lanceolatis, Linn. Semence de Sefeli de Candie, Sefel = Saamen, Cretischer Berg-Kümmel. Oblongum, striatum & depressum, coloris obsoleto viridis, ad fuscum inclinantis, saporis acris, aromatici, est. Sponte provenit in Candia, in incultis Apuliæ, & aliis calidis regionibus. *Diuretica, carminativa, & uterina pollet virtute.*

Sefeli Massiliensis, Sileris montani, Laserpitii foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis, Linn. Semence de Sefeli de montagne, Sefel = Saamen, Berg-Kümmel. In Gallia Narbonensi & Provincia, in viis & locis incultis provenit; floret Augusto & Septembri. Semina colliguntur Novembri. Depressum & oblongum est semen. Eligendum viridiuscule pallidum, saporis acris, aromatici, succi plenum. *Carminativum est, alexipharmacum, diureticum & emmenagogum. Ad Theriacam assumitur.*

Sinapi, Rapi folio, femine rufo, Sinapeos filiquis glabris tetragonis, Linn. Semence de Moutarde, rother Senf = Saamen. Perfekte rotundum & saporis acris est. Seritur in agris; floret Majo & Junio; semina mense Augusto & Septembri perficit. *Frequens ejus est usus ad mustardam parandam. Incidit, attenuat, diuresin promovet. Contra vertiginem & in prophylaxin apoplexiæ pituitosæ datur interne; externe ad sinapismos adhibetur.*

Sophiæ Chirurgorum, Nasturtii silvestris tenuissime divisi, Sisymbrii annui, Absinthii minoris folio, Tournefort. Sisymbrii petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis, Linn. Semence de Sisymbrium, Sophienkraut = Well = Saamen, Habicht = Saamen. Minutissimum, oblongum, rufum, & saporis acris est. Provenit in locis incultis, circa vias & in arenosis. Floret per æstatem, & semina simul matura perficit. *Vulneraria & mundificante, anthelmintica & diuretica pollet virtute.*

Staphidis agriæ, Herbæ pedicularis, Delphinii Platani folio, Tournefort. Delphinii nectaris diphyllis, foliis palmatis, laciniis integerrimis, Linn. Semence de Staphis - d'Herbe aux Poux - aigre, Staphis = Körner, Lause = Körner. Est triangulare, asperum, nigro-gryseum, saporis acris, nauseosi, & ingrati odoris. Nascitur in calidis regionibus, Hispania, Italia, Gallia, nonnunquam in hortis colitur. *Ad purgantia acria, drastica, pertinet; tam per superiora, quam inferiora evacuat; raro igitur interne adhibetur. Usus est decocti, in ore detenti, ad dolores dentium; frequentius autem, ad pediculos necandos, in pulvere & unguento adhibetur.*

**Sumach, Rhois Ulmi folio, Rhois coriariæ, culinariæ, obso-
niorum, Rhois foliis pinnatis ferratis, subtus villosis, Linn. Semence**

de *Sumach*, *Gerberbaum*, *Järberbaum* = *Saamen*. Colitur in hortis; sponte etiam provenit in calidioribus regionibus, præcipue in Hispania. Sunt baccæ orbiculatæ, villosæ, parvæ, rubentes, quæ nucleum seu semen orbiculatum includunt. *Adstringunt, & in fluxionibus alvi & sanguinis conferunt.*

Semen Tanaceti, *Semence de Tanesie*, *Rheinfarn* = *Saamen*. Saporis aromatici, amari est, & cum *Semine Cinæ* convenit. *Egregium præbet carminativum & anthelminticum; laudatur etiam uterinum & emmenagogum.*

Thlaspios arvensis, *Thlaspios filiculis orbiculatis*, foliis oblongis dentatis glabris, Linn. *Semence de Thlaspi*, *Bauren* = *Senf*, *Besensfraut* = *Saamen*. Oblonge rotundum, parvum, fuscum, saporis viscosi, acris est. Provenit in locis incultis, apricis & saxosis; floret Majo & Junio. *Urinam potenter movet, & ad aperiendos abscessus internos commendatur.*

Violarum, *purpurearum*, *martiarum*, *Semence de Violettes*, *blauer Biolen* = *Saamen*. Albicans, rotundum, splendidum, & saporis oleosi, sub-acris est. *Violæ* florent Martio & Aprili, & semina mense Junio ad maturitatem perveniunt. *Virtute pollent diuretica, leniter laxativa. In emulsionibus dantur.*

Viticis, vide *Sem. Agni casti*.

Urticæ Romanæ, *piluliferæ*, *Hispanicæ*, *femine lini*, *Urticæ foliis oppositis*, *amentis fructiferis globosis*, *androgynæ*, Linn. *Semence d'Ortie Romaine*, *Römischer Nessel* = *Saamen*. Fuscum splendens, *Lini femine* minus, saporis parum acris est. Colitur in hortis apud nos; in regionibus calidis sponte provenit. *Commendatur ad affectus pulmonum, asthma, tussim ferinam & pleuritidem, nephriticis prodest, & in pulvere, vel, quod præstat, in emulsionibus propinatur.*

Urticæ urentis, *vulgaris*, *racemiferæ*, *Semence d'Ortie*, *Brenn-Nessel* = *Saamen*. *Diureticum est, & subadstringit. A nonnullis ut anthelminticum laudatur.*

Zedoariæ, vide *Semen Cinæ*.

CAPUT V.

DE FRUCTIBUS, BACCIS ET NUCLEIS.

A *acaciæ germanicæ*, *nostratis*, *Pruna agrestia*, *Prunelles sauvages*, *gedörrte Schlehen*. Autumno maturæ colliguntur & exsiccantur. *Refrigerant & adstringunt; in gargarismis ad uvulæ relaxationem, & gingivas relaxatas profunt. Præcipuus recentium usus est ad succum inde exprimendum, qui succo Acaciæ Ægyptiacæ substitui potest.*

Alkekengi, seu *Halicacabi baccæ*, *Solani vesicarii*, *Coquerets*, *Juden-Rirschen*. In vineis & silvis umbrosis proveniunt; florent Junio & Julio, & autumno fructus, in vesica inclusi maturitatem adipiscuntur. Ex calyce amarissimo baccas exemturus caveat, ne istius vel levissimo attactu amaritie inficiantur. *Refrigerant, urinam movent, & calculosis profunt.*

Amyg-

Amygdalæ amaræ, Amandes ameres, bittere Mandeln. Arbor primo vere floret, & ab Amygdalo dulces fructus proferente, non differt. Linn. *Amygdalus foliis petiolatis, serraturis infimis glandulosis.* Colitur in hortis, sed raro occurrit; inter alias amygdalos dulces in tractu Rheni & regionibus calidioribus frequentior. Ut plurimum ad oleum exprimendum in usum vocantur. Vulpibus, Psittacis & aliis animalibus carnivoris lethales sunt.

Amygdalæ dulces, Amandes douces, süsse Mandeln. Amygdalus sativa colitur in hortis & vineis; copiose provenit in Provincia, Languedocia & aliis calidis regionibus. Eligantur majores, quas *Ambrosinas* vocant, non rancidæ, nec verminosæ. Ad emulsiones & oleum consiciendum præcipuus earum est usus.

Anacardium, est arboris Malabaricæ, Oepatæ & Linnæo Aviceniæ dictæ, fructus, Anacardes, Elephanten - Laub. Orientale figuræ cordis compressi, occidentale vero reniforme est, & *Acajon* vocatur; nigricat utrumque, sub involucro duplici nucleum solidum albicantem, saporis subdulcis, condit; inter hoc involucrum succus rubicundus oleosus, saporis acris & exurentis reperitur. Nucleos ventriculum roborare, venerem stimulare, & memoriam confortare, perhibent; succus oleosus ad scirrhus resolvendos, & clavos pedum extirpandos, commendatur. Raro in usum venit medicum; ipsa etiam Confectio Anacardina obsoleta est.

Aurantiorum, sunt Poma magnitudine admodum inter se diversa. Pulpam includunt, five flavicantem five rubram, grate olentem, alia dulcem, alia amaram, vinosam. Pulpa Aurantiorum dulcium refrigerat, scorbuticis & febre decumbentibus egregie conducit; Amarorum quibusdam cibus adjicitur. Aurantia immatura Essentiæ cum vino Hispanico vel spiritu vini parandæ inserviunt.

Been, Balanus myrepfica, Glans ungentaria, Ben, Ben. Fructus est *Guilandinæ inermis, foliis triplicato pinnatis: foliolis infimis ternatis, Linnæi*, arboris in Syria & Arabia nascentis, & ab incolis ad montem Sinai *Pharagon* dictæ, avellanæ magnitudinis, triangularis, in putamine corticoso, cinereo nucleum pinguem condens. Olei acris amari plenæ sunt *Balani*, quod, cum non facile rancescat, & odoris plane expers sit, variorum florum suavi odore facile inficitur, & fraudulentis mercatores olea destillata hoc oleo inquinare solent. Fructus raro apud nostros pharmacopolas reperitur, & rarioris est usus. Vomitus movet & violenter purgat; ad cutis vitia nonnunquam adhibetur.

Berberes exsiccatæ, Oxyacanthæ fructus, Berberis pedunculis ramosis, Linn. Berberis seché, gedörte Saurach-Beerlein, Erbselen, Weinnägelein. Baccæ sunt oblongæ, in racemos congestæ, per maturitatem rubræ, acido grato sapore præditæ. Frutex sponte in dumetis & silvestribus locis provenit; floret Aprili, & maturos fructus mense Septembri offert. Baccæ refrigerant, bilem refrenant, & æstum sanguinis temperant; siccatae in decoctis adhibentur.

Cacao, Cacavahe, Avellanæ Mexicanæ, Cacao, Caccou, oder Choccolade-Frucht. Arbor a Barbaris *Cacahuse*, aliis *Cacao Cacavifera*, Botanicis vero recentioribus *Theobroma foliis integerrimis* vocatur. Flos surgit ex calice pentaphyllo rosaceus, pistillum tubi cujusdam multiscissi laciniis cinctum mutatur in fructum cucumeriformem, quinquangularem, striatum, seminibus seu nucleis, in quinque ut plurimum acervulos oblongos collectis, foetum, qui amygdalarum formam habent, & fistiles sunt. Nascitur in locis uliginosis, pinguibus, riguis Americæ calidioris. *Theobroma* dicta est arbor, cum fructus basin sternat potionis saluberrimæ, maxime nutrien-

trientis, *Chocolate* Mexicanis, Europæis quondam solis Magnatibus propriæ, (*ἔσθηται τῶν θεῶν*, vos Deos feci, dixit Deus de imperantibus,) licet nunc vilioris factæ. Non solum vero ad *Chocolatæ* confectiōem requiruntur fructus, sed & oleum ex illis exprimitur dulce, grati saporis, copiosum, quod sevi instar frigesceus coagulatur, & sub nomine: Butyri Cacao venit, de quo inter Olea expressa v. Pharm. Wirt. P. II.

Capita Papaveris, Codia, *Têtes de Pavot*, *Mohnhäupter*, *Mohnköpfe*. Capsulæ sunt feminales Papaveris sativi, globosæ, ut plurimum nucis juglandis, non raro mali mediocris magnitudine, coronatæ quasi, & operculis stellatis testæ, semen nunc nigricans, nunc album continentes. Asservantur cum & sine feminibus. Vires sunt eadem, quæ seminum magis tamen narcotica. Ad *Diacodii* confectiōem & pediluvia eorum est usus.

Caricæ, Ficus passæ, *Figues seches*, *dürre Feigen*. Sunt fructus Ficus arboris sativæ, *Ficus foliis palmatis*, Linnæo dictæ. Variæ & multæ earum numerantur species; optima censetur *Ficus sativa*, fructu parvo, serotino, albido, intus roseo, mellifluo, cute lacera *Tournefortii*. Hæ, in minutis e spartio paratis corbibus, ex *Marsilia* afferuntur, & *Marsilianische Korb-Feigen* vocantur. Eligantur pingues, non verminosæ. Vocabulum *Ficus* in officina denotat recentes fructus; *Carica* vero Ficum exsiccatam vel passam significat. Demulcent humores acres, & in raucedine, nephritide, ardore urinæ, & tussi sicca commendantur. Decoctum in variolis laudatur; externe emolliunt, maturant & leniunt.

Carpobalsamum, *Carpobalsame*, *Balsam = Körner*, *die Frucht vom Balsam = Baum*. Sunt grana, seu baccæ oblongæ, pediculo donatæ brevi, cortice rugoso, fusco, quatuor costis distincto, odoris & saporis aromatici, grati. Planta, in qua nascuntur, est *Balsami Syriaci Arbuscula*; secundum Linnæum *Amyris, foliis bijugis*. Crescit hæc ad Ligustri vel Cytisi altitudinem, cortice est vestita subrubro, ramuli longi, recti, graciles, paucis foliis inordinatim referti, sunt ejusdem coloris. Folia Rutæ similia, perpetuo virentia, alata, impari numero vel terna, quina aut septena, deprehenduntur. Flores parvi, albi, Acaciæ proximi, terni singulis alis vel extremitatibus ramulorum, quasi in umbellæ forma insident, summe odorati. Patriam agnoscit Arabiam felicem, & in pluribus locis etiam arenosis & sterilibus, prope *Meccham* & *Medinam*, nec non circa villam quandam *Bedruniam* ab Arabibus vocatam, ubi mons prægrandis arenosus, innumeris Balsami arbusculis refertus, sponte nascitur; parum vero vel nihil ex his silvestribus fruticibus Balsami producit, femina tamen vel fructus ferunt copiosos. Incolæ igitur, ut Balsamo fecundas reddant arbusculas, in Balsameta & pingue solum transferunt, atque diligenter colunt. Non solum autem in Arabia felici, sed etiam in Ægypto Balsami arbusculæ, in hortis ad hunc finem constructis, aluntur. Carpobalsamum est eligendum grave, oleo vel balsamo foetum, saporis cum Opobalsamo convenientis. Raro in usum venit medicum; ad Theriacæ vero compositionem requiritur. Stomachicum, nervinum, vulnerarium atque diureticum est.

Cassia fistula, Siliqua purgatrix, *Casse en Bâton*, *Cassien-Röhrlein*. Siliqua est longa, rotunda, nigricans, includens sub putamine corticoso, in loculamentis, femina depressa, fulva, & pulpam dulcem nigricantem. Optima censetur Alexandrina, sive Orientalis. Advehitur etiam ex America, quæ longe crassiores & breviores siliquas, pulpam vero saporis amariuscule, & virtute purgativa præstantiorem habet. Arbor, quæ Cassiam fert, Linnæo dicitur: *Cassia foliolis quinque pinnis, ovatis acuminatis glabris petiolatis*. Siliquæ eligi debent recentes, graviores & medulla plenæ.

plenæ. De virtute hujus medullæ videatur Pulpa Cassiæ, in Parte II. Pharmac. Wirtemberg.

Cerasa acida, exsiccata, Cerises aigres seches, saure Kirschen, Weinkirschen, Weichseln. Sunt fructus Cerasi sativæ, fructu acido, ferotino, succo sanguineo. Colitur arbor in hortis; fructus perficitur Junio & Julio. Ex recentibus succus exprimitur pro confectiōe Syrupi; e siccatis parantur decocta pulchre rubentia, biliosis ad æstum sanguinis & sitim sedandam utilia.

Cerasa dulcia, Waldfirschen. Sunt fructus globosi arboris speciosæ sylvarum nostrarum incolæ, coloris vel nigri vel rubri. Fructus cum officulis contriti ante fermentationem destillationi subjecti dant aquam destillatam sapore & odore gratam, post fermentationem largiuntur spiritum gratissimum sub nomine Kirschenwasser Eau de Cerisse notissimum.

Ceraforum Nuclei, Noyaux des Cerises, Kirschen-Kerne. Ex omnibus Ceraforum speciebus colliguntur. In emulsionibus adhibentur. Sunt anodynæ & diuretici.

Coccognidium. Vide Semina.

Cocculi Indi, Cocculæ Orientales, vel de Levante, Coques de Levant, Röckel-Körner, Fisch-Körner. Ex Oriente afferuntur. Arbor a Rajo, Solanum Indicum arboreescens, cocculos Indos ferens, & in Horto Malabarico, Natfiatam vocatur, & foliis cordiformibus, floribus monopetalis quinque partitis, candidis, fructibus racematim congestis, describitur. Linnæo Menispermum foliis cordatis retusis mucronatis audit. Fructus est baccarum Lauri magnitudine; rotundior tamen, fusco & rugoso cortice tectus. Perniciosi sunt, atque nunquam in medicina adhiberi intus solent. Pediculos enecant, & ad capiendos pisces inserviunt.

Coffée, Caffee, Caffea, Coffea, Linn. Caffé, Coffe, Caffé-Bohnen. Est fructus, sive nucleus arboris Bon vel Pan, quæ a nonnullis Jasminum Arabicum, Lauri folio, vocatur. Folia habet Lauri, majora, semper virentia, pinnata; calix floris est quinquefidus, flos infundibuliformis, bacca subrotunda, cerasi magnitudinis, ex carne molli, dulci, viscosa, & nucleo bifido constat. Sponte provenit arbor in Oriente, præsertim in Arabia & Persia; in Americam translata, magna in quantitate colitur, neque infrequenter in hortis botanicis reperitur. Baccæ vel cerasa nunquam in usum veniunt medicum, quamvis viscosa sua substantia acrimoniam demulcere valeant; semina vero bina, sibi invicem parte plana cohærentia, & folliculo membranaceo tecta eo frequentius. Variæ nobis afferuntur Coffée species, quæ ratione bonitatis differunt; ex omnibus optima habetur, quæ ex Oriente affertur, atque Caffée de Levante appellatur, quæ cæteris est minor, & coloris pallidi; hanc sequitur alia viridiusculi coloris; infimæ notæ est, cujus semina sunt majora, ex albo flavescentia. Ustulata, & in pulverem redacta, cum aqua coquuntur, & decoctum, addito Saccharo, fervens scorbillatur. Ad roborandum ventriculum, juvandam coctionem, & spiritus excitandos, laudatur; virtute antihypnotica etiam celebratur. Convenit magis phlegmaticis, & illis, qui frigidioris sunt temperamenti, quam biliosis & macilentis.

Colocynthis, fructu rotundo minor, Coloquinte, Coloquinten. Adscribitur plantis pomiferis, & a cæteris cucurbitaceis folio, in profundas lacinias dissecto & fructu amaro, differt. Fructus, Pomi mediocris magnitudinis, cortice cingitur duro, flavo, quo vero, antequam ad nos venit, orbat; in substantia alba, levi, fungosa, semina albicantia, plana includit. In Syria & cæteris orientalibus

regionibus provenit. Eligatur a cortice exteriori mundata, alba, levis. *Vehementissimam vim habet purgantem, ut suspectis mulierculis nunquam dari debeat. In substantia nunquam, sed in vino infusa & in petia ligata, atque in compositione Trochiscorum Alhandel, qui inde parantur, medico inservit usui. Optimum, vires drásticas Colocynthis corrigens, habetur Nux Moschata vel Macis.*

**Corna, arboris, Corni hortensis, Corni arboreæ, umbellis involu-
crum æquantibus Linnæi, fructus exsiccati, Cornouilles, Cornel-Kirschen,
Rubr-Kirschen, Dürlißen.** Floret arbor, quæ in hortis colitur, mense Martio,
fructus vero maturos mense Julio perficit. *Refrigerant & siccant, & in fluxionibus alvi,
atque ad sitim restinguendam commendantur. In decoctis adhibetur fructus exsiccatus; ex
recentibus Roob Cornorum paratur.*

Cubebæ, vide Aromata.

Cupressi Nuces, Noix de Cypres, Cupressen-Nüsse. Sunt coni arboris
*Cupressi, foliis imbricatis erectis Linnæo, quæ in Creta insula copiose provenit, atque
apud nos frequenter in hortis colitur, & perpetua fronde viret. Nuces sive coni
adstringunt; in diarrhæa, mictione involuntaria, & ubi adstrictione opus est, vel in pulvere,
vel infuso ac decocto tam interne, quam externe adhibentur.*

Cydonia exsiccata, Coins secs, gedörrte Quitten. Sunt fructus arboris
*Cydoniæ, Pyri foliis integerrimis Linnæi. Colitur in hortis & vineis; floret Aprili &
Majo; fructus Octobri maturat. Adstringunt & roborant, sitim & æstum temperant.
Vulneribus, telis vel aliis instrumentis bellicis intoxicatis, inflatis, bono cum effectu impo-
nitur cataplasma, ex carne cydoniorum cocta, quod & de Succo Cydoniorum Forestus
affirmat.*

Cynosbata, Cynorrhodons, ou Gratte-cu, Hüften, Hagenbutten. Sunt
fructus *Rosarum sylvestrium, exemptis seminibus & lanugine absterfa, siccati. Ad-
scribitur eis vis diuretica, aperitiva; laudantur ad sodam sive ardorem ventriculi in pulvere
exhibiti, & a nonnullis in decoctis pro potu adhibentur.*

Dactyli, Dactes, Dattes, Datteln. Sunt fructus *Palmæ majoris, vulgaris,
dactyliferæ, Phœnicis frondibus pinnatis, foliolis alternis ensiformibus basi complicatis,
petiolis compressis, dorso rotundatis, Linnæi. Vocantur etiam Palmulæ & Caristæ. Fi-
gura sunt oblongi, rotundi, Glandium majorum magnitudine & forma; includunt
sub dulci carne nucleum durum, oblongum, per longitudinem fulcatum. Nascuntur
in Syria, & Ægypto, aliisve calidis orientalibus provinciis. Eligendi sunt magni,
fulvi, parum rugosi, molles, carnosi, saporis mellei, vinosi. Vires habent demul-
centes; hinc in catarrhis, tussi & faucium asperitate, calculo, nephritide & dysuria utiles
sunt.*

Ebuli Baccæ exsiccatae, Altich-Beer. Vide Semen Ebuli.

**Faba S. Ignatii, Faba febrifuga, Nux Vomica legitima Serapionis
Camelli, Fève de S. Ignace, St. Ignatius Bohnen.** Sunt semina oblonga,
*Avellanæ nuci cum putamine æqualia, nonnunquam paulo majora, nodosa, durissi-
ma, corneæ quasi substantiæ, saporis intense amari, coloris glauci. Nascitur in
planta cucurbitifera, Malabathri folio scandente, Catolongay & Contara Philippinis
Orientalibus dicta, in uno fructu viginti & plures hujusmodi fabæ reconduntur, molli
flaventeque pulpa ab invicem distinctæ. Facile fiunt cariosæ, quæ rejiciendæ.*

Vene-

venenis resistere, febres quartanas curare, urinam & menses provocare, creditur. Nimis argam dosin vertiginem & vomitus, sudores frigidos, & animi deliquia excitasse, Rajus & H. Pl. auctor est. Dosis in substantia grana sex, adultiori etiam grana decem dari possunt. Vino infusa amaritie illud, Centaurii minoris instar, inficit.

Gallæ, Noix de Galle, Galläpfel. Plerumque inter fructus ponuntur; sunt vero excrescentiæ morbosæ a puncturis insecti cujusdam, ovula deponentis, ortæ. In robore, quercus specie, nascuntur. Præferuntur cæteris illæ, quæ ex Aleppo & mirna advehuntur, atque nigræ, nodosæ, aculeatæ, ponderosæ & minores sunt; avellescentes vero magnæ & leves improbantur. *Virtutis sunt adstringentis, & pro febrisrefugo habentur. Decoctum ad examinandas aquas minerales inservit, & cum Vitriolo Martis exhibet atramentum.*

Glandes quercinæ, Glands, Eicheln. Fructus arboris notissimæ, quercus vulgaris. Diversæ sunt quercus species, quæ tamen omnes virtute conveniunt, Glandes vero vel magnitudine, vel sapore distinguuntur. *Esculus dulces habet glandes; Ilex & ceteræ amaras. Virtute pollent adstringente, & in alvi fluxionibus atque urinx incontinentia commendari solent. Tostæ, cum aqua decoctæ contra atrophiam præputie infantum laudantur.*

Grana Kermes, Grana Tinctorum, Kermes, ou Graines d'Ecarlate, Scharlach-Beer, Carmesin-Beer. Eandem originem, quam Gallæ, habent, & in foliis *Ilicis coccigeræ aculeatæ*, e puncturis & depositione ovulorum insecti cujusdam nascuntur. Ex Monspeliensi agro ad nos veniunt. Eligenda sunt grana rubundo-fusca integra. *Ex his granis Succus vel potius Syrupus Chermes & Confectio alkermes parantur. Modicè adstringunt, & cardiaca creduntur.*

Grana Paradisi, vide inter Aromata.

Grana Tiglia, Pignons d'Inde, ou Graines de Tilli, Purgier-Körner. Sunt *Ricini Indici* arborescentis, *Pavana* incolis & *Croton foliis ovatis glabris acuminatis serratis*, caule arboreo, *Linnaeo* dicti, fructus oblongi, ovales, *Ricini* vulgaris magnitudine, coloris cinerei, putamine tecti, quod condit nucleum saporis acris. Seriatur & colitur in Malabaria hæc arbor, & magni ab incolis æstimatur. Truncus supeditat *Lignum Moluccense*. *Vehementer purgant, hinc personis suspectis nunquam, & iis summa cum circumspeditione dari debent; serum potenter educunt, in hydrope nonnunquam laudabilem præstiterunt effectum, & contra tæniam a nonnullis commendantur. Obcedentem acredinem, fauces, palatum, & nonnunquam anum inflammant. Corriguntur succo liquiritiæ, aromatibus vel viscosis. Dosis granum unicum fructus, vel grana sex ponderis medicinalis.*

Granatorum poma, vide Cortices.

Hederæ Baccæ, Bayes de Lierre, Eppheu-Beer. Sunt fructus *Hederæ* arboreæ corymbosæ, seu fructibus in corymbos digestis. *Purgant per superiora & inferiora; laudantur ad febres intermittentes, & philtora. Dosis drachma dimidia ad integram, ex aceto vel vino.*

Hippocastanum vulgare, Castaneæ equinæ, folio multifido, Æsculi floribus heptandris, Linn. Marons d'Inde, Roß-Cästen, wilde bittere Castanien. Arbor olim in Germania rara, nunc frequenter occurrit. *Nucleus in pulverem redactus præbet errhinum, & serum copiosum e naribus educit, atque hemicranicos dolores nonnunquam mitigasse compertum est. Cæterum equis anhelosis & tussientibus, cum abulo exhibitus, opem fert.*

Jujubæ, Jujubes, rothe Brustbeer. Sunt fructus arboris *Ziziphi*, sive *Jujubæ majoris*, magnitudine olivari, coloris rubri, saporis dulcis, mucilaginosi, continentes ossiculum unicum. In Italia, Hispania & Botanophilorum hortis colitur. A *Linnaeo*: *Rhamnus*, floribus digynis, aculeis geminatis rectis, foliis ovato-oblongis, vocatur. Eligantur recentes, succulentæ, non putridæ ac cariosæ. *Demulcent & humectant; exhibentur in decoctis; maxime pectoralibus.*

Juniperi Baccæ, Juniperi foliis sessilibus patentibus, Linn. Bayes de Genevre, Wachholder-Beer. Sunt fructus Juniperi vulgaris, ubique in silvosis, montosis, & ericetis obviæ, flores a fructu sunt remoti. Colligantur baccæ maturæ, magnæ, nigræ, resinosæ. *Incidunt, resolvunt, urinam cient, carminativa & alexipharmacæ sunt.*

Lauri Baccæ, Bayes de Laurier, Lorbeer. Arboris *Lauri latifoliae* fructus rotundus, nigricans, sub putamine tenui nucleum geminum includens, saporis amari, aromatici. Arbor habet flores pentapetalos, fructum per maturitatem siccum monococcum. Sponte gignitur in Italiæ sepibus & filvis; colitur apud nos in hortis. *Menses & urinam cient; in affectionibus colicis, & ventriculi frigidis conducunt. In colicis lochiali raro tutæ. Dosis in pulvere scrupulus semis.*

Mespili Fructus exsiccati, Mespili foliis lanceolatis integerrimis subtomentosis, calycibus acuminatis, Linn. Nefles seches, gedörrte Mespeln. Fructus arboris ejusdem nominis, folio laurino non ferrato. Colitur in hortis; flore Majo & autumnio fructus absolvit. *Refrigerant & adstringunt; arilli laudantur ad cataplasmum.*

Momordicæ, Momordica Balsamina, Linn. Pomme de Merouilles, Balsam-Äpfel. Pomum in medio ventricosum utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, pluribus tuberculis notatum, multis feminibus turgens, insipidum inodorum. Indiæ indigena annua planta, apud nos in hortis colitur. *Oleum unguinosum cum his fructibus infusum ad usus vulnerarios & præcipue ad ambusta quondam commendabatur.*

Myrobalani Belliricæ, rotundæ, Myrobalans Bellirics, Bellirische Myrobalanen. Gallarum majorum magnitudinem, figuram rotundam, nonnunquam angulosam obtinent.

Myrobalani Chebulæ, Myrobalans Chebules, grosse schwarzbraune Myrobalanen. Omnium sunt maximæ, oblongæ, rugosæ. Ex arbore Myrobalanifera, Perfici folio, colliguntur.

Myrobalani citrinæ, Myrobalans citrines, gelbe Myrobalanen. Sunt arboris, Sorbi folio, Myrobalaniferæ fructus oblongi, rotundi, pentagoni, rugosi. Chebulis Myrobalanis minores.

Myrobalani Emblicæ, Myrobalans emblics, Aschfarbe Myrobalanen. Fructus arboris, foliis minutim incisis, rotundi, nigri, sessiles, sexangulares. *Linnaeus* arborem, quæ hunc fructum fert, vocat: *Phyllanthum foliis pinnatis floriferis pedunculatis, caule arboreo, fructu baccato.*

Myrobalani Indæ, Myrobalans Indiens noirs, Indianische schwarze Myrobalanen. Arboris Myrobalaniferæ, Salicis folio, fructus oblongi, superficie octangula.

angulari, rugosi, solidi & duri, intus & extus coloris nigri. Myrobalaniferæ arbores nondum satis innotuerunt; ad Pruniferas referuntur, & in multis Indiæ Orientalis regionibus reperiuntur. Eligendæ sunt carnosiores & ponderosiores. *Adscribebant veteres Myrobalanis citrinis bilem flavam, Indis bilem atram, Chebulis, Belliricis & Emblicis pituitam & bilem educendi facultatem.*

Myrti Baccæ, Bayes de Myrte, Myrten-Beer. Sunt fructus *Myrti communis Italicæ*, oblongi, nigri, umbilicati, triloculares, multis feminibus reniformibus foeti, saporis acerbi, adstringentis. Advehuntur ex Italia & Gallia. Refrigerant & adstringunt; tam interne, quam externe adhibentur; raro tamen in usum veniunt, & plerumque Baccæ Myrtilli, seu *Vitis Idææ* illis substituuntur.

Myrtilli exsiccati, Baccæ Vaccinii foliis ovatis ferratis deciduis, caule angulato, Linn. Bayes de Myrtille, d'Airelle, Heidelbeer. Planta in ericetis nascitur; floret Majo, flos urceolum refert, & mense Julio & Augusto fructus maturantur. Frigidi sunt & subadstringunt, febrium calorem mitigant, & in decoctis, quæ pulchro colore inficiunt, adhibentur.

Nuces Vomicæ, Noix vomiques, Krähen-Augen. Semina sunt *Solani arborci Indici maximi*, foliis *Oenoplicæ* majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, seminibus orbicularibus, compressis, maximis, in Horto Malabarico *Caniram* appellatæ. *Linnæo* vocatur: *Strychnos* foliis ovatis, caule inermi. Ex Malabaria advehuntur; sunt orbiculatæ, cornea duritie, colore cinereo. Veteres pro alexipharmaco *Nuces Vomicas* habuerunt; merito vero inter infida a recentioribus ponuntur medicamenta: quamvis non desint, qui de ejus usu interno satis largo in dysenteria multum promittant. Narcoticæ & virulentæ; canibus, felibus, corvis, aliisve brutis carnivoris præsentissimum sunt venenum.

Nuclei Pineæ, Pignedli, Pignons, Pinien-Müßlein, Zirbel-Müßlein. Arbor *Pinus sativa*, *Pinus* foliis geminis: primordialibus solitariis ciliatis *Linnæi*, quæ hos fructus fert, copiose in Italia crescit. Nuclei sunt oblongi, candidi, inclusi offi- culis crassis & duris, in squamato cono dispositis. Eligantur recentes, non rancidæ. Demulcent, resolvunt & pinguesfaciunt; phthysicis, tussi sicca & stranguria laborantibus, profunt.

Oxycoccus, Vaccinium oxycoccus, Linn. Canneberge, Moosbeeren, Kesselbeeren. Baccæ rubræ, globosæ umbilicatæ, gustu, siquidem glacie adustæ fuerint, acidulæ, Europæ temperatæ & frigidæ planta, in hortis coli ægre patitur. Fructus refrigerandi causa ægrotantibus præbentur, scorbuto adversari creduntur. Succus baccarum æquis partibus cum melle mixtus in Suecia officinalis est, & febricitantibus laudatur.

Paridis Baccæ, Bayes des raisins de Renard, Wolfs-Beer, Einbeer. Solani quadrifolii, bacciferi, sive *Paridis herbæ* sunt fructus. Flos in singula planta est unicus, perfectus, tetrapetalus, quem sequitur fructus solitarius. Floret mense Majo & Julio, & Augusto maturescit; provenit in silvis & umbrosis. Alexipharmacæ creduntur, & maniacis convenire.

Passulæ majores, Uvæ passæ majores, Raisins de Damas, ou gros raisins, grosse Rosinen, Zibeben. Sunt *Vitis viniferæ* fructus, & ex Italia & Hispania ad nos veniunt; præferuntur tamen, quæ ex Syria advehuntur. Eligantur majores, pingues & recentes. Temperatæ sunt, alvum laxant, acrimoniam temperant, ventriculo, pectori & hepati grata.

Passulæ minores, Passulæ Corinthiacæ, Raisins de Corinthe, Kleine Rosinen, Weinbeerlein, Corinthen. Vitis Corinthiacæ, sive Apyrenæ, fructus. Ex insulis Ægei maris advehuntur. Ad æstum sitinque febrilem temperandam, & alvum laxandam in usum vocantur; plurimus usus est in decoctis.

Perficorum Nuclei, Noyaux des pêches, Pfersich-Kern. Colliguntur ex fructibus maturis arboris Mali Perficæ. Commendantur ad præcavendum & pellendum calculum & sabulum. Anacollemata & emulsiones frontales ex his nucleis parata ad cephalalgiam & agrypniam laudantur.

Pichurim Faba. Nucleus ovato-oblongus, utrinque obtusus, superne convexus, inferne concavus, sub epidermide nigricante medullam ferruginei coloris includit, grate aromaticum spirat odorem suavique sapore linguam afficit. Suspicio est a quadam Lauri Specie in Paraguay crescente decerpi. Olei expressi $\frac{1}{3}$ circiter fundere fertur. Ab aliquot retro lustris in Suecia ejus exorsus est usus. Multum deinceps laudata est in sistendo alvi fluxu. Datur ad drachmam semis.

Pistaciæ, Nuces pistaciæ, Pistaches, Pistacien, Syrische Pimpernußlein. Fructus arboris Pistaciæ peregrinæ, fructu racemoso, vel Terebinthi Indicæ, Pistaciæ foliis impari pinnatis, foliolis retrorsum subfalcatis, Linn. In Persia, Syria copiose hæc arbores proveniunt; nonnunquam etiam in Hispania & Italia coluntur. Fructus seu nuces angulosæ, oblongæ, Avellanæ magnitudinis, includunt sub putamine tenui, rufo, nucleum virescentem, oleosum, pellicula obductum rufescente, saporis subdulcis, grati. Eligantur recentes, ponderosæ, non rancidæ. Roborant, pinguescunt, semen augent, & stomacho gratæ sunt.

Pruna Damascena, Pruna magna atro-coerulea, dulcia, Pruneaux doux, Zwetschen, Quetschen. Fructus pruni omnibus notus. In officinis ad pulpam conficiendam, & pro decocto florum & fructuum requiruntur. Refrigerant, humectant & alvum laxant.

Ribes nigrum, Grossularia nigra, Chassis, schwarze Johannis-Beeren. Baccæ nigræ globosæ, umbilicatæ, succo purpureo turgentes, polypyrenæ, cimices redolentes, ex dulci acidali saporis. Passim per omnem Europam occurrit. Hæc baccæ contra renum vitia & cum Spiritu vini digestæ contra colicos dolores valere dicuntur.

Rubi Idæi, Framboise, Himbeere. Baccæ rubræ subinde etiam flavescentes, villo obsessæ ad basin concavæ, proprium suavissimum odorem, saporem habent vinosum dulcem. Copiosus ejus proventus est per totam Europam. Ad analepticum, nec non refrigerandi & putredinem arcendi finem succus in syrupum, rotulas, gelatum conversus exhibetur. Aqua inde destillata, gratum odorem spirat.

Sambuci Baccæ exsiccatae, Grana Actes, Bayes de Sureau, Hollunder-Beeren. Fructus arboris notissimæ. Sunt alexipharmacæ, sudoriferæ, diureticæ, atque ad diarrhæam commendantur.

Sebestenæ, Sebesten, Myxæ, Sebestes, schwarze Brust-Beerlein, Sebesten. Fructus est arboris in Syria & Ægypto nascentis, quæ Linnaeo Cordia, foliis subovatis, serrato-dentatis, vocatur, calici insidens, acetabuli instar, concavo, pruno fere similis, minor tamen, nigricans, & sub pulpa carnosâ, dulci, mucilaginosâ, nucleum includens. Eligantur recentes & carnosæ, situ non infectæ, quales tamen raro ad nos perveniunt; hinc eleganter officinæ his carere queunt, atque Jujubæ,

bæ, quæ recentes haberi possunt, illis substitui, cum quibus etiam viribus conveniunt. *Demulcent & in catarrhis acribus, urinæ ardore & biliosis febribus, in decoctis in usum veniunt.*

Siliqua dulcis, Ceratia, Xylocaracta, Caroba, Carouge, Johannis-Goed-Brod, Bockshörnlein. Fructus est arboris in regionibus calidioribus, Sicilia, Neapoli & Syria frequentis, flore apetalò, plurimis staminibus constante, ex divisis calicis nascentibus; meditullium occupat pistillum, quod abit in fructum, seu siliquam planam, compressam, carnosam; folia sunt pinnata, lata, decidua. *Linnaeo vocatur: Ceratonia. Eligendæ sunt Siliquæ carnosæ, recentes. Demulcendi & acrimoniam mitigandi habent virtutem; in decoctis pectoralibus & ordinariis, pro infantum potu, adhibentur.*

Sorbi Torminalis Baccæ, Cratægi foliis cordatis septangulis, Lobis infimis divaricatis, Linn. Sorbes sechéés, Speyerling, Arlas-Beer, Elster-Beer. Sunt fructus *Sorbi Torminalis*, sive *Cratægi folio laciniato, subtus incano, floribus & fructibus in umbellam congestis.* Floret Majo, & fructum auctumno perficit. Nascitur in montosis, & ad silvam Martiam in dumetis nonnunquam occurrit. *Refrigerant & adstringunt fructus, atque ad calculum laudantur.*

Spinæ Cervinæ Baccæ, Rhamni cathartici seu solutivi, Spinæ infectoriæ, Rhamni spicis terminalibus, floribus quadrifidis, Linn. Bayes de Noirprun, Bourgepine, Crenz-Beer, Wegdorn-Beer. Fructus sunt fruticis, flore monopetalò, infundibuliformi, foliis mali minoribus, in margine denticulatis. Succus baccarum recentium, addito alumine, virescit; amaricantis & nauseosi est saporis. Occurrit in sepibus & silvis; floret Majo, & fructus Octobri maturescit. *Ex succo Baccarum maturarum recentium paratur Syrupus domesticus, & color viridis, qui Saftgrün appellatur. Baccæ exsiccatae in pulverem trita, a drachma una, vel ad drachmas duas, in decocto exhibitæ, alvum movent, & imprimis Cachecticis & Arthriticis commendantur.*

Tamarindi, Tamarinds, Tamarinden, saure Datteln. Sunt pulpa fructuum e fusco nigricans, acidi saporis, filamentis lignosis pertexta, in qua latent ossicula dura quadrata, rubicunda, splendentia. Arbor *Siliquæ Arabicæ, Tamarindus dictæ, florem habet rosaceum, ex plurimis petalis, in orbem dispositis, constantem, e cujus calice multifido surgit pistillum, quod deinde in siliquam compressam, aliam condentem, femine foetam plano, ut plurimum anguloso, abit; intervallum autem, quod inter duas siliquas occurrit, pulpa turget nigra & acida, quæ Tamarindos constituit.* Provenit in Arabia felici arbor. Fructus ad nos non integri, sed pulpa saltem, adferuntur. Eligatur recens, nigra, rufescens, tenera, multis villis intertexta, pinguis & acida. *Refrigerant Tamarindi, humorum & imprimis bilis fervorem temperant, & blande educunt, sitimque sedant. Usus est in decoctis.*

Tribuli aquatici, Castaneæ aquaticæ palustres, cornutæ, Tribules aquatiques, Wasser-Nüsse, Stech-Nüsse. Est fructus *Tribuloidis vulgaris, aquæ innascentis, Tournefortii; Trapæ petiolis foliorum natantium ventricosi, Linnei.* Planta est flore rosaceo, ex cujus calice pistillum surgit, quod deinde cum calice abit in fructum subrotundum, aculeatum, unicapsum, femine, Castaneæ simili, foetum; folia sunt angulosa. Nascitur in aquosis. Floret Mense Majo, & circa auctumnum fructus perficit. *Utuntur plebei hac nuce in pleuritide.*

Vainiglia, Vaniliæ, Vanillæ, Bainillæ, Vanilles, Vanilien. Siliquæ sunt compressæ, semipedem fere longæ, calami scriptorii majoris crassitie, coloris atro-fusci, saporis aromatici, odoris grati, quæ pulpam, seu medullam, cum minutissimis acinis, pinguem continent. *Vaynilla* ab Hispanis, a vaginarum similitudine, vocantur. Fructus sunt *Volubilis filiquosæ Mexicanæ, foliis Plantaginis, & floribus nigricantibus*, quæ *Epidendrum foliis ovato oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spirabilibus*. Linn. *Angurek Kæmpf. & Tlixochitl* Americanis dicitur. Ex America & imprimis nova Hispania advehuntur. Eligendæ sunt filiquæ pingues, recentes, aromatici saporis & odoris, dum recentes, gratissimi. *Creduntur virtutis roborantis & diureticæ; calefaciunt, flatu discutiunt, & concoctionem adjuvant.* *Vainillarum tinctura, spiritu vini extracta, ad melancholiam & phrenesin, remedium singulare & specificum habetur, quo multos, post methodos usitatas, incassum tentatas, sanatos esse, Raj. H. Pl. perhibet.* *Præparatur ex seminibus, cum sacchari albissimi tripla vel sextupla portione tritis; apud Hispanos celebris ille pulvis Vâcaka dictus, quo ad Chocolatæ fragrantiam, in ipso haustu ex tempore exaltandam, utuntur.*

Uva Quercina, Eichtraube. Est excrescentia quædam, ad radices quercuum, ab insecti cujusdam puncturis, quod ovula deponit, orta, & quasi Galla subterranea, in forma uvæ, conglomerata. *Vehementer adstringit, & in omnibus cum Galla convenit.* *Laudatur a nonnullis in dysenteria, sed, ob vim vehementer adstringentem, caute adhiberi debet.*

CAPUT VI.

DE AROMATIBUS.

Anthophylli, Meres de Girofle, Mutter-Nägelein. Sunt arboris Caryophylliferæ fructus maturi, Caryophyllis crassiores & tumidiores, odoris & saporis pene ejusdem. Arbor colitur præcipue in insula *Moluccensium Ternata*, solo omnium aridissimo & siticuloso, ut vix ficcior terra ulla inveniatur, atque a *Rumphio* in *Herbario Amboinenfi* sequenti modo describitur: „Arbor Anthophyllos & Caryophyllos gerens Lauro quodammodo similis est. Trunco simplici anguloso, versus inferiora ut plurimum diviso, gaudet; Cortex est glaber, tenuis, coloris ex cinereo lutei; Folia laurinis longiora & angustiora, bina semper opposito situ conspicua, ita, ut cum sequenti pari cruciatim ponantur, in ambitu integerrima, superius obscure viridia; splendentia, inferius flava. Mense Majo tenera folia propullulant, & simul floris & fructus rudimenta evolvuntur. Quarto deinde subsequente mense completam Caryophyllorum dant speciem. Fructus rudimentum sensim læte viridem deponit colorem, atque pallide flavum induit, qui demum in sanguineum transit. Flore evoluto fructus nondum maturi aromaticam, quam exoptamus, vim habent, tamen ad propagationem apti non sunt. Ad maturitatem accedentes, amplum acquirunt ventrem, quatuor anguli antea in capitulo immaturi fructus conspicui, sese contrahunt, & color iterum in viridem mutatur. Tum demum nucleum durum continent, & Caryophylli matres, sive Anthophylli dicuntur. Caryophylli fructus tres dantur species: Prima parum rubet; altera, minor præcedente, sanguinei est coloris: tertia, quæ foemina dicitur, alba est; parum rubens, omnes vero aromaticæ indolis. Caryophylli olim in Moluccis insulis tantum inveniiebantur; nunc vero in Amboina majori cura, quam in naturali ipforum patria, coluntur. Arbusculæ juniores, arborum silvestrium umbra obteguntur, adultiores vero factæ requirunt, ut

ut arbores assitæ extirpentur. Minime vero credendum est, ac si arbores propinquæ calida Caryophyllorum natura, destruerentur. Ex fructibus maturis sive Anthophyllis arbor sponte se propagat, & arbusculæ inde natæ transplantantur. Anthophylli ipsi ne quidem per octo dies in ædibus vegeti possunt conservari, statim enim exsiccantur, & nunquam germinant., Nihilominus industria Gallorum hanc arborem in insulas Africæ Gallicas transplantavit. Illam etiam in Nova Guinea sponte crescentem invenerunt recentiores. Cæterum, quoad characterem, arbor Caryophyllus pertinet ad plantas flore rosaceo, quatuor petalis, in orbem positis, calici infidentibus. Filamenta sunt plurima, perianthium ovale, & semen unicum. *Anthophylli viribus cum caryophyllis aromaticis conveniunt, & imprimis ad hystericos affectus laudantur.*

Cardamomum maximum, vide Grana Paradisi.

Cardamomum minus, officinale, C. B. Petit Cardamome, Kleine Cardamomen, Cardamemelen. Variæ species sunt Cardamomi, & vel in capsulis, sive siliquis feminalibus, brevibus, triangularibus, vel digitum fere longis, triquetris, pallidis, vel granis angulosis, fuscis advehuntur, & nobis, sub nomine Cardamomi minoris, venduntur. Planta, in qua nascuntur hæc grana, a *Rajo* ad graminifolias floriferas, flores & racemos fructuum in caule peculiari, non folioso, ex radice orto, ferentes, refertur. A *Linnaeo* vocatur: *Amomum scapo bracteis alternis laticaulis caule brevioris*. Flores habet tetrapetalos, dissimiles, albos, luteo colore distinctos, odoris aromatici, suavissimi, ovario infidentes; fructus est trilocularis, polyspermus. Præfertur Cardamomum minus, thecis minoribus inclusum, recens, oleosum, saporis suavis, aromatici, odoris grati. Tam in orientalis, quam occidentalis Indiæ regionibus, præcipue in Malabar provenit; Cardamomum majus vero in siliquis longioribus ut plurimum ex Java advehitur. *Utrumque calefacit, attenuat, flatum discutit, coctionem juvat, & urinam ciet.*

Caryophylli Aromatici, Cloux de Girofle, Girofles, Nelken, Gewürz Nägelein. Sunt fructus immaturi, vel potius germina cum calicibus florum arboris Caryophylliferæ, *Ts-hinka* dictæ. Capitellum seu sphaerula, quæ Caryophyllo infidet, est rudimentum floris ex quatuor petalis constantis, quæ complicata firmissime Caryophyllis adhærent, quando manu decerpuntur, vel arundinibus decutiuntur, colliguntur & cratibus impositi atque latis foliis Ari tecti, per aliquot dies fumo macerantur, & deinde in sole exsiccantur. Si vero Caryophylli diutius suis furculis adhærent, petala expanduntur, coloris cœrulei, lineolis albis notata, stamina autem purpurei sunt coloris, & paucas post septimanas in Anthophyllos abeunt. Eligendi sunt oleosi, saporis fervidi, & odoris suavis. Plura reperiuntur sub titulo *Anthophyllorum*. *Ufus Caryophyllorum tam in medicina, quam in culinæ, frequentissimus est: Cardiaci, cephalici & stomachici sunt; calefaciunt & discutunt. Ad febres intermittentes, cortici Peruviano additi, laudantur.*

Caryophylli rotundi, vide Semen Amomi.

Cassia Caryophyllata, Canella Cubana, Jonst. Ecorce de Girofle, Nelken-Rinden, Nelken-Zimmet. Est cortex tenuis, ex rufo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, sapore & odore caryophyllaceo. Arbor est Myrti species, & a Botanicis *Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis*, sive *Caryophyllus aromatica Americana, Lauri acuminatis foliis*, a *Linnaeo* *Myrtus foliis obverse ovatis*, vocatur; Americanis vero *Canninga* dicitur. In Cuba insula, montosis Jamaicæ silvis, & aliis Indiæ occi-

occidentalis regionibus provenit. Eligatur cortex recens, odoratus, & saporis acris, caryophyllacei. *Virtute cum Caryophyllis convenit, inferioris autem efficaciae & pretii.*

Cassia lignea, Xylo - cassia, Cassé, Mutter - Zimmet, Cassien - Minden. Est cortex arboris *Canelliferæ, Malabaricæ*, cujus folium *Malabathrum* officinarum. Character arboris cum Cinnamomi Zeilanica arbore fere idem est; Linnæana descriptio, qua *Laurus* est foliis lanceolatis trinerviis, nervis supra basin unitis, vix eam a Cinnamomi arbore distinguit, unde saltem loco natali differre nonnullis visa est. Cortex lignosior, odore & sapore plerumque debiliore, & magis mucilaginoso, a vero Cinnamomo differt. Hinc a *Breyn. Prodr. II. Arbor canellifera Indica, cortice acerrimo, viscido, seu mucilaginoso, quæ cassia lignea, officinarum vocatur.* Cortices variarum Lauri specierum ad Cinnamomum accedentes Cassiæ lignæ substitui videntur. *Virtutes sunt Cinnamomi, sed longe debiliores, & ob mucilaginem, quam condit, non adeo durantes. Quo magis ad Cinnamomum accedit, eo melior habetur.*

Cassiæ flores, Grains du Canellier. Prostant ab aliquot retro decenniis germina fusca colore caryophyllorum aromaticorum profundiore tincta, pedunculo concolori, oblongo, sensim crassiori, gracili, striato insidentia rotunda, calyce sexfido, laciniis striatis ad germen adeo reflexis, ut non nisi ejus apex brevissimus stylo infermissiore. Dicuntur improprie flores.

Cinnamomum, Canella Zeylanica, Canelle fine, Zimmet, Canell. Est cortex tenuis, ab exteriori pellicula alba purgatus, cannulatus, coloris ex flavo rubescentis, saporis acris, subdulcis, grati, odoris fragrantissimi. Arbor, ex qua colligitur, ab Illustr. *Linneo, Laurus foliis oblongo - ovatis, trinervis, basi nervos unientibus, in Mat. Med. vocatur.* Nascitur in *Ceylon*, vel *Zeylan*, insula Indiæ orientalis, & ad arbores fructu caliculato refertur, foliis oblongis, trinerviis, nitidis, planis, ex adverso binis, flosculis monopetalis, in sex lacinias divisus. Fructus glandi quærnæ similis, a calice excipitur. Eligendum est Cinnamomum longum, saporis acris, & odoris fragrantis. Eadem arbor in *Martinica* crescens exhibet Cortices a *Zeiloni* pore acriore, odore, paulo minus fragrante, quibus nomen Cinnamomi Indici, brevis & *Gallici* dederunt. *Calefacit, siccatur, roboratur, menstrua movet, partum accelerat, & in omnibus affectionibus frigidis locum invenit; præstantissimum est cordiale.*

Costus corticosus, Canella alba, Canelle blanche, weisser Zimmet. In oblongos tubulos convolutus, ab exteriori cortice purgatus, tam foris, quam intus, albicans, Cassia lignea crassior, ad nos venit. Saporis est aromatici, acris, odoris grati. Est arboris bacciferæ, laurifoliæ, aromaticæ, fructu viridi caliculato, ramosifident. Nascitur in insula *Jamaica* & aliis Americæ regionibus. Plurimi distinguunt hanc corticem a Cortice *Winterano*, nonnulli vero pro uno eodemque habent, inter quos: *Linneus, Cranzius, Gleditschius &c.* *Calefacit & siccatur, incidit, scorbuto medetur, & vomitus sistit, ventriculum roborando.*

Crocus, Safran, Safran. Est pistillum ovarii in tres lacinias fissum, non ipse flos, neque stamina floris. Planta est radice bulbosa, foliis angustis, gramineis, linea in medio alba, secundum longitudinem decurrente; Flores nudi, erecti, ab ipsa stamina tria: Capsula seminalis subrotunda, trilobularis: semina plura, rotunda. Floret autumnali tempore, & colitur in regionibus temperatis, in *Gallia, Anglia, Germania.*

ania, & præcipue in agro Viennensi. Optimus est *Austriacus* & *Anglicus*, & præ-
 rtim ille, quem provinciæ *Essex* & *Cambridge* producant. Notæ bonitatis sunt fila-
 menta, neque nimis pingua, neque nimis marcida, coloris purpurei, ad aureum
 inclinantis, sapor amariuscule, acris, odor fragrans & parum acris, & si exigua
 quantitate magnam aquæ quantitatem tingit. *Vires sunt anodynæ, cordiales, pneumo-
 cæ, uterinæ. Dosis grana tria, ad duodecim.*

Cubebæ, Cubebes, Cubeben, Schwindel-Körner. Sunt grana rugosa,
 nigro petiolo prædita, piperis magnitudine, coloris cinerei, intus quodammodo
 alba, & parvum nucleum continentia, odoris fragrantis, saporis acris, aromatici,
 abamari. Cujus plantæ sint fructus, nondum certe constat. Creduntur esse fruticis
 convolvulacei Javanensis, *Carane* dicti. Ex Java insula advehuntur. Eligantur ma-
 jores, recentes, ponderosæ & oleosæ. *Calefaciunt, incidunt, discutiunt, nervos robo-
 rant, flatu pellunt, & specificam vim contra vertiginem habere creduntur, ad apophleg-
 matismos utiliter adhibentur, atque aphrodisiacis adnumerantur.*

**Galanga major, Maranta Galangæ, Linn. Grand Galanga, grosser
 Balgant.** Est radix tuberosa, pollicis crassitie, nodosa, geniculata quasi, fusca,
 intus rufescens, saporis acris, amaricantis, odoris aromatici. Venditur pro radice
 plantæ Indicæ, *Barehabe* dictæ, quæ cum Cannacoro, vel Canna Indica convenire,
Celeb. Bærhavio in *Hort. Lugd.* traditur. *Linnaeo* vocatur: *Kæmpferia foliis ovatis
 sessilibus*, & Galanga minor a majori specie non differre creditur. Advehitur ex Ma-
 labaria & Java. Eligantur radices recentes, non cariosæ, & non adeo lignosæ.

Galanga minor, Petit Galanga, fleiner Balgant. In omnibus cum præ-
 cedente convenit, nisi quod minor & paulo acrior sit. Sponte in China, ubi *Lagon-
 i* vocatur, nascitur. De charactere plantæ nihil certi constat; plurimi ad graminis-
 folias referunt. Eligendæ sunt radices minores, ponderosæ, non fibrosæ, odoratæ,
 non cariosæ. *Præfertur Galanga minor majori, ac in cruditate ventriculi & vertigine
 valde laudatur. Specificum etiam est emmenagogum. Vim habet incidentem, roborantem
 & attenuantem, atque virginibus, ob retentionem menses pallescentibus, utiliter ex-
 hibetur.*

**Grana Paradisi, Cardamomum maximum, Melaguettes, Graines de
 Paradis, Grand Cardamome, Paradies-Körner.** Sunt grana triquetra,
 parva, foris spadiceæ coloris, intus albi, saporis acris, fervidi, sicut Piper. Planta,
 ex qua colliguntur hæc grana, nondum satis cognita est. *Rajus* tamen in *Hist. Plant.*
 mentionem facit *Cardamomi Surinamensis*, cujus descriptio cum Granis Paradisi con-
 venit. Et *Linnaeus* vocat *Amomum caule ramoso*. Radix est crassa, oblonga, tubero-
 sa, saporis aromatici expers, caulis & folia Zingiberis silvestris. Flores non in sum-
 mitate caulis, sed scapo peculiari, e radice seorsim prodeunte, in parva spica dispo-
 siti. Fructus pruni majoris magnitudine & forma, in tres partes dehiscunt, quorum
 cortex cæruleus, carnosus, plane aromaticus includit semina, grana Paradisi tam
 facie, quam sapore ad amissimam referentia, sextupla serie, secundum fructus longitu-
 dinem, eleganter disposita. Singulis seminum interstitiis interjacens substantia alba
 fungosa, qualis in fructu Cardamomi cernitur. Ex Oriente magna ejus quantitas ad-
 vehitur. *Calefaciunt & incidunt, atque cum Pipere magis conveniunt, quam Cardamo-
 mis; hinc abusive Cardamomo majori substituuntur.*

Macis, Macis ou Fleurs de Muscade, Muscaten-Blüthe. Non est flos,
 sed involucrum, sub putamine, Nuci moschatæ, instar reticuli, circumducitur, colo-
 ris,

ris ex aureo rufescentis. Eligenda recens, integra, magna, colore saturato, rubescente, odore suavi, sapore subacri; pinguis & oleosa. *Stomachica, uterina & carminativa est.*

Nuces moschatae, Myristicae, Nucistae, *Muscades, Muscaten = Musse* Arbor, in qua crescit, ab Indis *Pala, Pongopala*, & a *Linnaeo: Myristica* vocatur. Provenit in insula Banda. Tradunt, piri habere magnitudinem, corticem griseum, lignum porosum, folia nervosa; florem pentapetalum, qui cum basi fructus cohæret. Ipse fructus est solitarius, pediculo brevissimo, & a reliquis hujus generis, triplici integumento, & nucleo inprimis, exterius rugoso, pulpa interiore, venis flavo-rubentibus variegata, aromatico differt. Noces moschatae sunt vel majores, vel minores, rotundae vel oblongae; praeferuntur rotundae: oblongas silvestres esse putant, rotundas domesticas. Eligendae ponderosae & pingues, quae acu candefacta punctae oleum emittant. *Calefaciunt, subadstringunt; stomachicae, cephalicae, uterinae & anodinae sunt.*

Piper album, rotundum, Poivre blanc, weisser Pfeffer. Sunt grana albidula, rotunda, non rugosa; a nonnullis pro fructu ejusdem plantae, in qua *Piper nigrum* crescit, habetur, & artificio quodam decorticari traditur. Eliguntur scilicet grana *Piperis nigri* majora, & aqua marina maceratis cortex exterior niger detrahatur. *Jonstonius* & alii, peculiarem, quae *Piper album* profert, esse plantam, perhibent, eamque non nisi in Malabaribus & Malacca, provenire. *Viribus cum pipere nigro convenit, attamen non adeo est acre.*

Piper Jamaicum, vel Jamaicense, vide Semen Amomi.

Piper nigrum, rotundum, Malabaribus Molagocodi, Piper foliis ovatis septinervis glabris, petiolis simplicissimis, Linn. Poivre noir, schwarzer Pfeffer, Pfeffer = Körner. Est fructus plantae scandentis, foliis nervosis, subrotundis, acuminatis, flosculis monopetalis, tripartitis, racematim digestis, fructu rotundo, monopyreno, racemoso. Colitur in Malabaribus, Java & multis Indiae orientalis regionibus. Eligenda grana majora, pulvere & aliis quisquilliis non mixta. *Piperis usus multus & frequens est in culinis, rarius in Medicina; sunt, qui grana integra piperis deglutita pulveri praeferunt, & ad febrem quartanam maxime suadent. Vires habet calefacientes, incidentes & resolventes. Suibus est noxium & quasi venenum.*

Piper Hispanicum, Poivre d'Espagne, Spanischer Pfeffer. Est fructus seu siliqua *Capfici*, five *Piperis Indici, Capfici annui Linnaei*. Planta florem habet monopetalum, stellatum, multifidum; pistillum ex calice surgens abit in fructum mollem, membranaceum, in duo loculamenta divisum, seminibus compressis foetum. Variæ sunt species *Capfici*; ex his tamen plerumque in usum veniunt siliquis propendentibus, & erectis longioribus. Frequenter in hortis colitur, floret Augusto, & fructus siliquosos, coloris rubri vel lutei, autumnus perficit. *Ferventissimi est saporis, & vix unquam in Medicina adhibetur. Vires habet piperis incidentes & attenuantes. Apud Indos & etiam nonnullos Europæos familiare est, siliquas nondum perfecte maturas in aceto & saccharo coquere, atque iis condimenti loco uti. Acetum his siliquis conditum citius acescit, diutius durat, & a vappa præservatur, quod etiam tinctoribus, qui colorem nigrum, pro tingendis linteis, Capfico condiunt & conservant, notum est.*

Piper longum, Macro-Piper, Poivre long, langer Pfeffer. Est fructus oblongus, teres, cinerei coloris, figuræ julorum *Coryli*, e numerosis, vermiculato plexu dispositis granis minutim compactus. Planta, quæ *Linnaeo* vocatur: *Piper foliis cordatis petiolatis sessilibusque*, est sarmentosa, foliis latis, subrotundis, nervosis, acu-

acuminatis, flosculis monopetalis, quinquepartitis, fructus, uti diximus, longus, teres, aggregatus, saporis fervidi & amaricantis est. Colitur in Malabaria, Java, & aliis regionibus Indiæ, indeque nobis advehitur. *Potentius est pipere nigro; summenum igitur, ubi in compositionibus piperis mentio fit. Incidit, attenuat, resolvit, digestionem promovet. Ad Theriacæ, Mithridatii & Diascordii compositiones requiritur.*

Zedoaria, Zedoire, Zittwertwurzel. Radix est tuberosa, nodosa, cinerea, saporis acris, amaricantis, odoris ad Camphoram accedentis, fragrantis. Apud Auctores Zedoariæ longæ & rotundæ fit mentio, quas tamen non inter se differre, nisi quod ejusdem radices partes sint diversæ, aliis videtur. Notæ plantæ sunt folia longa, nervosa, flores pentapetali, in singulari scapo. *Linnaeus* eam vocat: *Kampferiam, foliis lanceolatis petiolatis.* Ex India Orientali, China & Zeylon ad nos transfertur. Eligenda ponderosa, non cariota, & quæ odoris est fragrantis. *Alexipharmaca est, alleviat, siccatur, in colicis doloribus prodest, menses movet, & vermes enecat. Dosis est granis quinque ad decem.*

Zingiber album, Inschi, vel Inschikua Hort. Malab. Gingembre blanc, Ingwer, weisser Ingwer. Radices sunt ramosæ, nodosæ, compressæ, pallidæ, saporis fervidi, odoris aromatici, a cortice exteriori aliquantum liberatæ.

Zingiber, Gingiber, Zinziber vulgare, Gingembre, gemeiner Ingwer. Ejusdem plantæ radices sunt, infusione cum aqua fervida ita paratæ. Facile enim vel vermibus arroditur Zinziber, vel, dum adhuc recens est, inter siccandum germinat; hoc ut impediunt cultores, recentes & a fibris mundatas radices aqua ferventi infundunt, & postea solis vel fornacis calore exsiccant. Quo fit, ut faciem quasi corneam interior earum substantia induat. Zinziber vero album, detracta cortice ex parte, sine immersione, siccatur, atque majori indiget cura & labore. A plerisque ad Iridum classem refertur Zinziber, & Iris latifolia tuberosa, flore albo, quæ Zinziber est, vocatur. Notæ Zinziberis sunt: radix tuberosa, folia Cannacori, folios in scapo singulari, pentapetalus, difformis, quasi bilabiatus, insidens ovario trigono triloculari. Plantam *Linnaeus* vocat: *Amomum scapo radicato, spica ovata.* Copiose provenit & colitur Zinziber tam in orientalis quam occidentalis Indiæ regionibus. Eligatur minus fibrosum, ponderosum, non cariosum. *Incidendi, attenuandi & roborandi vim habet; commendatur hydropicis, serosis, cachecticis; additur quoque purgantibus, & inprimis foliis sennæ, ad corrigendam eorum flatulentiam & vehementiam.*

CAPUT VII.

DE CORTICIBUS.

Cortex Acaciæ Germanicæ radicum, Ecorce de prunier sauvage, Schlehdornwurzel-Rinde. Colliguntur autumnali tempore. Adstringunt & refrigerant; in gargarismatibus, ad uvulæ, & in balneis, ad uteri & ani laxitatem adhibentur. In Act. Ph. Med. Vol. V. etiam ad febres intermittentes decoctum eorum laudatur.

Aurantiorum, Arantiorum, Pomorum Aurantiorum, Ecorce d'Orange, Pomeranzen-Schaaßen. Sunt cortices fructuum *Mali Aurantice*, quæ adnumeratur arboribus pomiferis, fructu corticoso molliori. Notæ speciales sunt, arbor fruticosa, foliis semper virentibus, glabris, acuminatis, odoratis,

ratis, floribus pentapetalis, albis, odoratis, semina utrimque acuminata, in carne succulenta. Provenit in regionibus calidioribus, Lusitania, Hispania & Italia; colitur & in hortis apud nos. Cortices eligendi sunt amari, recentes, non situ corrupti. Qui ex insula *Curaçao* advehuntur cortices Aurantiorum, Europæis multo sunt præstantiores. *Vires habent tonicas, carminativas & antiscorbuticas. Liberati ab interna fungosa albida substantia ingrati saporis, suppeditant, quod in officinis vocant Flavedinem Corticum Aurantiorum.*

Cortex Cabbage, Cortex arboris Jamaicensis, Geofrææ inermis, Linn.

Sub hoc nomine Angli asservant cortices aliquot pollices plus minus longos, convolutos, non crassos, colore extus cinamomeo, intus cinereo tinctos, interdum extus epidermide ex nigro cinerea instructos, inodoros, levissime linguam adstringentes. *Maxime contra vermes laudantur. Datur ejus decoctum ad uncias duas. Extractum ad grana tria, pulvis ad drachmam semis. Dosis excedens nauseam & vomitum excitat.*

Capparidis vide Radix.

Cascarillæ, Chacarillæ, Clutiæ, foliis cordato-lanceolatis, Linn. Hort. Cliffort. Chacarille, Chagrillen-Minde. Sunt grisei extus, ferruginei intus coloris, saporis acris & amari, fragrantis, maxime, si accendantur, odoris quasi moschati. Magna huc usque inter Materiæ Medicæ scriptores lis fuit, qualis Planta sit, quæ Chacarillam profert? Tandem *Marcus Catesby*, Anglus, in Historia naturali Carolinæ; Floridæ & insularum Bahamæ, tradit: esse illam *Ricinoidem, Elæagni folio*, copiose in plurimis Bahamæ insulis crescentem; raro altitudine decem pedes attingere, vixque crassitie pedem superare; folia esse oblonga, angusta, acuminata, pallide viridia. In extremis ramificationibus, e calicibus, surgere flosculos exiguos, hexapetalos, albicantes, flavis apicibus; hoc excipere baccas ex albo viridescentes, distinctas in tres loculos, magnitudine pisi, quæ tria semina nigra continent, in singulis loculis unum. Collectio corticis fit, resecto circa radicem cortice, ut nutritionis defectu, reliqua pars a trunco & ramis soluta, decidat. Crescit non solum in Florida & Bahamæ insulis, sed & in Peru, & magna quantitate ad nos vehitur. Eligendi cortices odorati & resinosi quasi. *Vires sunt blande sedativæ, balsamicæ, tonicæ, diapnoicæ & discutientes.*

Chinæ Chinæ, Kinkinæ, Peruvianus, Antifebrilis, Antiquartius, Febrifugus, Quinquina, Chine Chine, China China, Sieber-Minde. Cortex est crassitie mediocris, scaber, parum canescens, aliquando musco obductus, intus lævis, coloris e fusco rufescentis, saporis adstringentis, parum aromatici, amari. Arbor corticem hunc nobilem elargiens, Americæ civis est, atque maxime in Peruanis montibus, Cajanuma dictis, duobus milliaria ab urbe Loxa distantibus, provenit, a *Linneo Cinchona* vocatur. Ramum cum floribus, fructibus & seminibus delineatum *Histor. Academ. Parisiens. Anni MDCCXXXIX.* cum ulteriori descriptione & historia arboris exhibet. Quina apud veteres Peruanos corticem significare, atque more illorum, propter eximias virtutes per excellentiam *Quina Quina, Cortex corticum* vocari, de la *Condamine*, qui historiam suppeditavit, autumat. *Chinæ Chinæ* nomen a *Comitissa de Chin Chon, Pro-Regis Peruani conjuge*, quæ ejus usu a febre pertinaci liberata fuit, accepisse fertur. Ipsa Comitissa remedium, in se expertum, omnibus, quibus opus fuit, gratis distribuit, atque tum demum, scil. circa annum *MDCXXXIX.* sub

sub nomine *Pulveris Comitissæ* innotescere cœpit. Et cum paulo post, R. P. S. J. copiam corticis a laudata Comitissa illis traditam, etiam gratis distribuerent, nomen *Pulveris Jesuitarum* accepisse, perhibent. Eligendus cortex non nimis crassus, ex junioribus arboribus detractus, qui etiam odoris est suavis, aromatici, sapore amarus, & sine molestia adstringens. *Vis antifebrilis, tonica, roborans &c. omnibus nota; non solum in febribus intermittentibus prudenter adhibitus raro fallit, sed & contra gangrænam a causa interna, & ad inhibendos sphaceli progressus egregiam præstat opem. Dosis, intuitu ætatis & circumstantiarum, varia. Raro tamen ultra drachmam in substantia, & drachmas duas in decocto Caffæe tostæ, vel vino infusum exhibetur. Abhinc aliquot annos prostat Cortex quem Kinkinam rubram appellant & a colore sic denominant. Hujus virtutem supra modum extollunt & Cortici Peruviano antiquo præferunt. De Arbore, quæ hunc Corticem largitur, nondum satis constat.*

Cortex Citri, Ecorce des Citrons, Citronen-Schalen. Sunt cortices fructus Citræ, sive Medicæ mali. Arborea ab Aurantiis non nisi foliis, quæ in Citrea absque appendice, distinguuntur. Copiose crescunt in Italia, Hispania & Lusitania. Fructus magna in copia ex comitatu Nicensi & ditone Genuensi nobis advehuntur. Ex diversis Citri speciebus in usum veniunt fructus & cortices Citrei vulgaris. Eligantur recens siccati citrini, non virides, fusci ac situ corrupti. *Calefaciunt, atque alexipharmaca, cardiaca & carminativa gaudent virtute. Flavedo Corticum Citri eandem habet rationem, quam Corticum Aurantium.*

Codagapala, Cropal, Profluvii Cortex, Canessi-Rinde. In tubulis aliquot lineas crassis convolutis adducitur. Niger, superficie nigra, lichene tecta, saporis amari & austeri esse dicitur. Nerium antidyfenterium, Linn. Humilis arbor in Malabaria & Zeilonia crescens hunc corticem largitur. *A Britannis potissimum ad sistendam diarrhœam laudatur. A lichene purgatus & in pulverem redactus ad drachmam semis laudatur aliquoties de die.*

Culilavvan, Culilavan, Caryophylloides, Culilavan, bittere Zimmet-Rinde. Est cortex arboris Amboinensis, quæ Cassiæ ligneæ, sive Cannelæ silvestris arbori valde similis, extus albicans & subcinereus, ubique minutis verrucis obsitus, intus ex rufo flavescens, qui in parte infima, vel trunco, detractus est, digiti crassitiem habet, versus superiora tenuior est, ille, qui calami scriptorii crassitiem non habet, abjicitur; superior & tenuior pro optimo habetur, saporis debet esse acris, aromatici, ad Caryophyllorum aromaticorum proxime accedentis. *Apud Indos externus ejus est usus in torminibus, colica & cephalalgia, ex causa frigida; nimirum corpora sua hoc cortice, antea cum Massoy cortice in massam coacto, inungunt. Ob oleum copiosum carminativus, roborans & stomachicus est.*

Ebuli. Vide Radix.

Efulæ. Vide Radix.

Frangulæ, Alni nigræ bacciferæ, Rhamni, inermis floribus monogynis hermaphroditis, Linn. Ecorce de Frangula, Bourgene, Faulbaum, Hundsbaum, Zapfenholz-Rinde. Nascitur in silvis, locisque humidis; floret Majo; folia sunt decidua. Cortices eliguntur arboris mediani, vel, qui præstant, radicem, flavescens, amaricantes. *Vehementer purgant, tam*

per superiora, quam inferiora. Propinantur a drachma una ad drachmas tres in infuso. Externe Unguentis ad Scabiem dicatur.

Cortex Fraxini, Ecorce de Frêne, Eschbaum = Eschen = Alschbaum = Rinde.

In usum vocantur *Fraxini excelsioris, vulgatoris*, Cortices, qui sunt ex cinereo pallescentes, ad viriditatem inclinantes, saporis acris, amari, adstringentis. Arbor crescit in silvis montosis; floret Aprili & Majo; semen autumnino maturefcit. *Cortex adstringentis est virtutis, & ob acrimoniam & amaritiam, simul attenuat. Laudatur in cachexia, hydrope & febribus intermittentibus.*

Granatorum, Cortices Mali Punici, Malicorium, Ecorce de Grenades, Granaten = Schalen. Arbor pertinet ad illas, quibus flos summo fructui insidet, & ob id umbilicatus appellatur. Folia sunt decidua, flos roseus perfectus, pentapetalus, fructui insidet, qui in plura loculamenta divisus, acinis succi plenis, membranis tenuissimis distinctis, impletus est. In Italia, Gallia, Hispania provenit, & apud nos in hortis colitur. Cortices, qui etiam *Malicorium* vocantur, sunt coriacei, duri, rugosi, saporis amaricantis, adstringentis. *Raro interne in usum vocantur; ad gargarismata, balnea & fotus adstringentes eorum frequentior est usus.*

Guajaci, foliis pinnatis, foliolis quatuor obtusis, Linn. Ecorce de Guajac, ou de Bois saint, Franzosenholz = Rinde. Sunt ligni Guajaci cortices tenues, duriusculi, lignosi, e cinereo rufescentes, maculati, intus pallidi, lamellatim congesti, saporis acris, amaricantis. *Nobiliiores & potentiores ligno habentur. Præcipuus usus est in decoctis lignorum ad luem veneream & sanguinem mundificandum.*

Hippocastani, Castaneæ equinæ, folio multifido, J. B. Ecorce de Maronier d'Inde, wilde Castanienbaum = Rinde. Arbor, alias in Germania hospes, nunc frequenter occurrit, & ad ambulacra copiose plantatur. *Cortices ante aliquot annos in usum venire ceperunt medicum, & pro succedaneo Chinæ Chinæ habentur, eodemque modo & dosi exhiberi solent.*

Jujabæ, cortex Peruvianus. Cujus radicis vel arboris sit, nobis non constat. Afferri ex America, cordi confortando inservire, sapore gratissimo ac mire balsamico se commendare, suavitate enim Vaniglias superare, hinc ad Chocoladæ confectionem illis præferendum esse, *Seba in Thesaurο naturali* tradit. Alii saporem amygdalinum, suave amaricantem, huic cortici adscribunt.

Mandragoræ. Vide Radix.

Maffoy. Cortex tenuis est, fere planus coloris cinnamomei obscurioris, epidermide grisea striata tectus, saporem habens dulcem, grato aromate cinnamomum referente. *Ex India olim advectus roborantibus adnumerabatur.*

Mezerei, Bois gentil, Bois de Garou, St. Bois, Seidelbast. Est cortex fruticis grana Coccognidii exhibentis. *Validissimum est drasticum, nonnisi cum maxima circumspectione intus dandum. Quamvis sint, qui decoctum ejus ad dimidiam libram quotidie epotam, contra nodos & tophos venereos a salivatione reliquos laudent. Extus adhibetur, ut fonticuli vices expleant.*

Cortex

Cortex Mori radice, Ecorce de Meurier, Maulbeerbaum = Rinde. Colitur in vinetis & hortis; cortex e radice detrahitur. *Abstergit & calefacit, alvum laxat, & pro specifico habetur ad lumbricos latos enecandos.*

Quercus, Ecorce de Chêne, Eichbaum = Rinde. Provenit in silvis & fere ubique. Cortex eligitur a junioribus, non ab annosis detractus. *Virtutis est adstringentis; non tam interne, quam externe, in gargarismis, balneis & fotibus adstringentibus in usum venit.*

Salicis. Cortex ramorum juniorum, colore viridis & splendens, odore gratus, sapore balsamicus, amaricans. *Eadem cum cortice Peruviano in abigendis febribus intermittentibus vires exercere non pauci sibi persuadent.*

Sambuci medianus, Ecorce moyen de Sureau, Hollunder = Rinde. Florem & fructum in umbella dispositum habet, & ubique occurrit; floret Majo, & fructum circa autumnum perficit. Cortex, de quo hic sermo, tempore vero detrahitur; debet esse medius, qui scilicet externum cineritii coloris sequitur, viridis. *Remedium est insigne antihydopicum, serum educit, ictericis convenit, & menstrua movet. Infunditur uncia dimidia, vel habita ratione subjecti, uncia integra recentis in vino, & exhibetur pro una dosi. Imponitur etiam erysipelati.*

Sassafras, Ecorce de Sassafras, Sassafras = Fenchelholz = Rinde. Sunt leves, ferruginei coloris, odoris & saporis intensioris ligno. *Eadem vires, quas lignum, habent; ob oleum vero, quod copiosus in cortice residet, minori dosi præscribi solent. Ligni vires non, nisi coctione aliqua, corticum vero infusione aqua fervida facile extrahuntur; hinc infusionibus theæformibus anticatarrhalibus, aliisve, commode addi possunt. Plura vide sub lignis.*

Simaruba, Simarouba. Est cortex fibrosus pallidi coloris, saporis amari, haud ingrati, parum adstringentis; ex America primum MDCCXIII. in Europam translatus est. Patriam agnoscit non solum Cayennam, sed in aliis etiam insulis ad ventum provenit. De caractere arboris non satis certi sumus. Vocatur *Burseria gummiifera. Jacquin. Hist. Stirp. Amer. Betula Americana, seminibus lithospermi frumentaceo æmulis. Plucke. Almag. Terebinthus major, betulæ cortice fructu triangulari. Sloan Hist. Jamaic. Pro Quassia Dioica habet Pharmacop. Suec. quamvis Aublet Monaciam esse observaverit.* Arborem ferunt esse satis magnam, folia longa acuta, pallide virefcentia. Cortex ex radice colligitur, & tilia instar longis fibrillis intertextus est. Lignum, quod leve & fibrosum, ob amaritiem se ab omnium insectorum injuria defendit. *Cortex hic gummi-resinosarum partium est, quod ex lacteo colore, quo aquam, in qua coquitur, inficit, cognoscitur. Vi tamen quadam irritante ventriculum & intestina præditus est. Vomitus enim nonnunquam, præsertim, quando decoctum nimis saturatum est, & copiosiores dejectiones, nec non sudores valde incommodos excitare solet. Correctis vero dosibus, experientia magistra, egregium præbet in dysenteria remedium. Coquantur drachmæ duæ hujus corticis in aquæ fontanæ libris duabus; ad dimidiæ partis exhalationem. Quantitas hæc tres doses, singulis tribus horis sumendas, constituit.*

Tamarisci fruticosæ, foliis crassioribus, Germanicæ, Ecorce de Tamaris, Tamarisken = Rinde. Juxta ripas Rheni & Danubii crescit frutex. Præfertur cortex radici detractus. *Ad icterum, fluorem album, scabiem, melan-*

melancholiam, & specificè ad affectus lienis laudatur. Usus est in decoctis & vinis medicatis.

**Cortex Thuris, Thymiamatis, Thuris Judæorum dicti, Narcaphtum, Sty-
rax Thymiamata, Tigname, Narcaphte, Weihrauch-Rinde, Juden-
Weihrauch.** Fragmenta sunt corticis, coloris ferruginei, saporis acris, aro-
matici & amari, odoris suavis, ad Styracis & Balsami Peruviani accedentis.
Præferuntur cortices pingues, odorati, crassiores. Ex India Orientali ad nos
advehuntur; cujus vero arboris vel plantæ pars sint, adhuc incognitum est.
Putant, esse cortices arboris Storacis, ex qua liquida Storax exprimitur, atque
incola est Asiæ minoris. *B. Fridericus Hofmannus, mediante Spiritu vini, essen-
tiam & resinam extraxit, quarum priorem, propter vim anodynam, ad tusses ferinas
& convulsivas, posteriorem ad suffimenta, commendat. Suffimentis, odoris gratia,
adduntur, & ad prolapsum uteri ex suffitu prosunt.*

**Ulmi, Ulmi campestris, Linn. Orme sauvage, gemeine breitblat-
terichte Uline, weisse Rusten.** Europæ frequens arbor. Cortex medius,
flavescens, adstringens, Aprili mense detrahendus. *Decoctum hujus corticis sa-
turatum interne adhibitum medicina prædicatur efficax contra varios morbos cutaneos,
scabiem rebellem, ipsamque lepram.*

**Winteranus, nonnullis Canella alba, Winteriana Canella, Linn.
Ecorce de Winter, Winters Americanische Gewürz-Rinde.** Sunt crassi,
cannulati, foris cinereo integumento fungoso, inæquali, fisso, & multis rimis
hiante, obducti, intus solidi, densi, pallidi, saporis acris, aromatici, odoris
fragrantissimi. Ex arbore laurifolia Magellanica, seu potius Periclymeno odora-
to Magellanico colligitur, cujus notæ sunt folia laurina, flores pentapetali, albi,
odorati, racematim congesti; baccæ subvirides, multis seminibus angulosis, aci-
nis uvarum similibus refertæ. In Jamaica, Barbados & Magellanica abunde in
campestribus, & ad viarum margines nascitur, atque ita vocatur a Præfecto clas-
fico, Wintero, qui ipsum corticem primus ex Magellanica attulit. *Cum Canella
alba convenit; potentior tamen creditur. Calefacit, siccatur, vomitum sistit, flatu dis-
cutit, & specificum in scorbuto frigido habetur.*

CAPUT VIII.

DE LIGNIS ET VISCIS.

Lignum Aloës, Agallochum, Xyloaloës, Bois d'Aloës, Paradies-Holz.
Fragmenta sunt lignosa & resinosa arboris cujusdam, nondum satis cognitæ, in
Siamensi, Cambodiæ & Sinensi regnis, crescentis, atque Siamensibus *Kissinà*,
Latinis *arbor Aquilæ & Aloës*, dictæ. Lignum non, nisi per vetustatem arboris,
odorem acquirit fragrantem, qui odor in succo resinoso residet. & marcente &
putrescente arbore, interiores quasdam ligni partes occupat, & circa nodos co-
piosius condensatur. Hæc resinosa fragmenta singulari nomine, *Calambà*, vel
Calambac, reliquæ vero ipsius arboris nomine appellantur *Kissinà*. Raro vel nun-
quam ad nos venit Agallochum verum; magno enim in pretio apud Indos habe-
tur, & duplo Argenti pondere venditur; quod ad nos transvehitur, spurium est,
& tradente *Rumphio*, ex arbore *Excæcante*, ita ab incolis & nautis vocata,
col-

colligitur. Est vero arbor *Excæcans Lathyridis arborescentis* species, fructus fert triquetros, baccis *Lathyridis*, quæ vulgo *Cataputia* audiunt, valde similes; succus arboris lactescit. Deformis arbor non, nisi in littoribus desertis ac solitariis crescit. Nomen *Excæcantis* accepit, quia lacteus, quo turget, succus, casu oculis immixtus, magnos excitat dolores, & nisi citissime succurratur, summa cum inflammatione & mordacitate excæcat. In hujus periculosæ arboris caudice & radicum cavernis odoratum hoc lignum reperitur. Nascitur circa Amboinam, in Insulis, & ad nos advehitur in frustis, magnitudine varia, ex quibus solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara, odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis, eligi debent. Cum sufficiente quantitate aquæ, per vesicam destillatum, exhibet oleum, coloris albicantis, camphoræ instar, quandoquidem parva quantitate, tamen fragrantissimum, quod promte in spiritu vini solvitur. Lignum Aloës calefacit, & confortativum cerebri, cordis, ac uteri creditur; vim tamen inebriantem, delicatioribus largius exhibitum habet.

Lignum Aspalathum officinale, Aspalathus, C. B. Bois d'Aspalat, Rhodiser Dorn-Holz. Fragmenta sunt ligni exotici, resinosi, cujus arbor nondum satis descripta est, ligno Aloës seu Agallocho leviora, laxiora & pallidiora. Ex India Orientali nobis advehuntur, & sæpius Aspalathum pro Agallocho, & Agallochum pro Aspalatho venditur. Easdem etiam habet vires, modo debiliores.

Buxi arborescentis, Bois de Buis, Buxbaum-Holz. Arbor sponte nascitur in Italia & Galliæ Provincia; colitur apud nos in hortis. Pertinet ad arbores bacciferas, fructu per maturitatem sicco. Flores sunt pentapetali, basin fructuum excipientes; Fructus tricuspidales, interne in tres capsulas divisi, in quarum singulis bina semina lucida, deprehenduntur; Folia parva, perpetuo virentia. Lignum est ponderosum, flavescens, durum, & easdem virtutes cum Ligno sancto vel Guajaco habet, atque Antimagicum censetur.

Colubrinum, sive Serpentarium officinale, Strychnos Colubrina, Linn. Bois Couleuvre, Schlangen-Holz. Est radix lignosa, arboris Timorensis, Solani arborescentis Indici, foliis Napecæ seu Oenopliæ minoribus, floribus parvis in umbellam dispositis, fructu rotundo, duro, feminibus orbicularibus, compressis, quæ Nuces Vomice minores, *Scheru Katuvalli-caniram* Horti Malabarici, cortice ex fusco ferrugineo, subinde maculis cinereis aut albicantibus notato, includens materiam solidam, ponderosam, acrem, amarissimam, odoris nullius. Eligendum est amarum, grave, non cariosum. Adscribitur huic ligno specifica vis adversus serpentum & venenatorum animalium morsus, vermes & febres intermittentes. Alii vi virulenta, soporosa, hoc lignum præditum esse volunt. Forsitan hæc virulentia inest ligno recenti, quam vero perdidit nostris officinis illatum annosum exsiccatum. Ex fructu, quem profert arbor, indoles ligni suspecta aliquatenus concludi posset.

Cupressinum, Cupressi officinale, Bois de Cyprés, Cupressenholz. Est arboris coniferæ, foliolis brevibus, acutis, in squamas degenerantibus, floribus amentaceis, fructu seu cono, e clavatis, lignosis tuberibus, in formam globosam coaptatis, composito, nucleis angulatis, acuminatis, parvis. Colitur apud nos in hortis; in calidis regionibus sponte provenit. Refrigerat, siccatur & adstringit; sudoriferum & diureticum est, atque in decoctis præscribitur.

Ebenum officinale, Ebene, Ebenholz. Lignum omnium ponderosissimum. Meditullium est arboris *Ebeni* C. B. quæ in India Orientali provenit, &

prunifera est. Folia sunt juglandinis paulo minora, pinnata, prassinum colorem referentia; fructus oblongus, viridis, edulis, persicæ fructus æmulus. Nomen habere dicunt a vocabulo hebraico *Eben*, quod lapidem significat; durum enim est lignum, lapidis instar. *Virtutibus cum Ligno Guajaco convenit. Usus tamen magis est mechanicus, quam medicus.*

Lignum Guajacum officinale, Guajacum magna matrice, C. B. Bois de Gayac, Bois saint, Franzosen-Holz. Est lignum solidum, densum, ponderosum & resinofum, nigricantis coloris, saporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati. Inter plures arborum Guajaci species lignum officinis dat illa, quæ folia habet subrotunda, pinnata, pari numero, sicut *Lentiscus*, læte virentia, cujus flos est roseus, pentapetalus, colore albus, pistillum stiliforme, rectum & longum; Fructus parum compressus, cordiformis, bilocularis, loculo uno plerumque vacuo, in altero continet semen, quod est nux ovata, durissima. *Plumier Nov. Gen. plant.* arborem *Guajacum*, flore cæruleo fimbriato, fructu tetragono describit. *Linnaeus* vocat: *Guajacum foliis pinnatis: foliolis quatuor obtusis.* Ex Hispaniola, Jamaica & aliis provinciis Americæ advehitur. Eligenda est matrix, sive pars interior, non pars corticosa, quæ prior est, coloris ex fusco cinerei, resinosa. *Siccat, sudorem & urinam promovet, sanguinem mundificat, & specificè ad luem veneream adhibetur.*

Juniperinum, Bois de Genevre, Wachholder-Holz. Est radix resinosa, odorata Juniperi officinalis, vulgaris, fruticosæ. *Sudoriferum atque diureticum est, & in morbis lymphæ & catarrhalibus, in decoctis, propinari potest; ad suffitus etiam adhibetur.*

Lentiscinum, Bois de Lentisque, Mastich-Holz. Est nodosum, non admodum crassum, interne album, cortice cinereo tectum, saporis & odoris resinosi. *Lentiscus* officin. *Lentiscus vulgaris* C. B. Arbor Mastichen fundens. *Pistacia foliis abrupte pinnatis, Linn.* Flos ex foliorum alis egrediens, est amentaceus in mare, in foemina calix trifidus, minimus. Fructus unicus, nucleus glaber. In Chio insula copiose nascitur; floret Martio & Aprili. Optimum censetur ponderosum & resinofum. *Siccat & adstringit; ad sanguinis & alvi fluxiones, uteri & ani procidentiam laudatur, urinam ciet, & dentes vacillantes firmat. Usus est in decoctis.*

Moluccense, Pavana, Bois des Moluques, Moluckisches Purgier-Holz. Est spongiosum, leve, pallidum, cortice tenui tectum, saporis acris nauseosi, odoris fere nullius. Colligitur ex arbore *Ricino*, fructu glabro. *Grana Tiglia* officinis dicta, foliis *Malvæ*, cortice molliore & nigricante. Pavana ab incolis appellatur. *Cadel Avenacu Hort. Malabar.* In Malabar colitur, unde ad nos advehitur. *Recens vehementer purgat, atque serum educit, nonnunquam vomitus facit, & ob acrimoniam pruritus, imo inflammationem in ano excitat. Siccum & inveteratum mitius se gerit, & sudorem movet, præcipuus sed semper suspectus usus est in morbis chronicis, febre quartana & hydrope. Hypercatharsis & ani pruritus ab hoc pharmaco excitati, cremore oryzæ vel avenæ, facile sistuntur. Ad avium capturam etiam adhiberi solet; illico enim concidunt, si de tritico vel alio frumento, cui pulvis hujus ligni immistus est, assumerint. Ex quibus patet, cautius cum hoc ligno mercandum esse. Dosis a granis quatuor ad decem pro robustissimo, ex carnis jussulo*

Lignum Nephriticum, Bois nephretique, Grief-Holz, blaues Sandel-Holz.

A colore, quo aquam inficit, etiam a nonnullis vocatur: *Sandalum caeruleum*. Fuscum, solidum, durum & grave est, saporis acris, amaricantis. Arbor, ex qua colligitur, secundum *Linnaeum*: *Guilandina inermis*, foliolis triplicato-pinnatis; foliolis infimis ternatis. Provenit in Malabaria & Zeylonia, ac fert *Nuces Been*. An eadem sit cum *Acacia arborea*, majori, spinosa, pinnis quatuor majoribus, subrotundis, siliquis varie intortis, quam describit *Sloan Hist. N. Jamaic.* non satis constat. In usum venit pars interior, sive medullium fuscum; corticosa alba abjicitur. Ad renum vitia, calculum & urinam pellendam, laudatur. Exhibetur in infuso & decocto. Curiosum est experimentum, quod cum infusione hujus ligni in aqua fontana instituitur; versicolor enim illa cernitur, prout in hoc vel illo situ spectatur.

Quassia, Quassia amara, Linn. Bois de Surinam, Quassien-Holz, Surinamisch Bitter-Holz. Est lignum arboris Surinamensis Leve, compactum, cortice cinereo tectum, flavescens, amarissimum, inodorum. Virtutibus Corticem Peruvianum æquiparare imo superare nimis festinanter aliquandiu creditum est. Sed vires stomachicas, tonicas & carminativas eo majori jure sibi vindicat. Datur ut plurimum in decocto.

Rhodium, Bois de Rhode, de Cypre, de Rosas, Rosen-Holz. Radix est lignosa, dura, contorta; nodosa, resinosa, odoris rosei, saporis subamari. Dicitur etiam: *Aspalathum colore buxi* C. B. Sunt, qui volunt, esse *Cytisi incanae*, siliquis falcatis, C. B. radicem, quæ est planta, flore papilionaceo, fructu siliquoso. *Linnaeus* dubitat: an sit radix *Genistæ foliis ternatis*? Ex insulis Canariensibus & aliunde ad nos advehitur. Eligatur resinofum, ponderosum, odoris fragrantis, rosei. Usus ejus frequentior est ad odoramenta, quam internus. In decoctis tamen nonnunquam lignorum, ad sanguinem mundificandum, præscribitur; urinam & sudorem ciet.

Sanctum officinale, quasi Guajacum propemodum sine matrice C. B. Bois saint, Pocken-Holz. Pro eodem cum Guajaco habetur; vires etiam, odor & sapor vix differunt, colore vero paullo albidius, & pondere levius est Guajaco. Arbor *Jasminum* vulgo *Americanum*, at rectius *Evonymo* affinis *Occidentalis*, alatis *Rusci* foliis, nucifera, Indis *Huaxacon* dicta, vocatur. Ex America advehitur. Eadem cum Guajaco habet vires; Guajacum tamen potentius est.

Sandalinum album, Santalum f. Sandalum album officinale, Bois de Santal blanc, weisses Sandel-Holz. Est durum, solidum, pallidum, odoris & saporis grati, subamari, aromatici. Arbor est baccifera, folia sunt pinnata, flores ex caeruleo nigricantes, fructus cerasi magnitudine per maturitatem nigri. Ex India advehitur Orientali, & quidem insula Timor; arbor ab Indis *Sercanda* vocatur. *Linnaeo* teste ignota est arbor.

Sandalinum citrinum, Santalum citrinum officinale, Bois de Santal citrin, gelber Sandel. Colore est flavius præcedenti, superat illud etiam pondere, densitate & odore fragrantiore, sapore, virtutibus & pretio. Ejusdem arboris Timorensis bacciferae, *Sercandæ* dictæ, est pars interior; Santalum album vero, quod haud raro etiam in segmentis cylindræis, in quibus nulla medullosa ac resinosa substantia cernitur, ad nos venit, pars corticosa, sive exterior.

terior. Alii putant: Santalum album lignum esse arboris junioris, citrinum vero adultioris. *Cardiaca & hepatica censentur, & in decoctis ad lymphæ vitia præscribuntur.*

Lignum Sandalinum rubrum, Santalum rubrum officinale, Bois de Santal rouge, rothes Sandel-Holz. Est arboris pars interior, ab externo cortice liberata, colore rubrum, ponderosum, fibrosum, densum, saporis adstringentis. Præter nomen cum Santalis nihil commune habet. Species est Ligni Brasiliensis tinctorii, & arboris, folio pinnato, flore papilionaceo, filiqua bivalvi, feminibus reniformibus. Forsitan ad *Cæsalpinias Linnæi* referri potest. Adfertur tam ex Orientalis, quam Occidentalis Indiæ provinciis. *Tinctores æque ac Medici hoc Santalo utuntur; siccatur & adstringit.*

Sassafras, Winanck Virginienfium, J. B. Bois de Sassafras, Sassafras, Fenchel-Holz. Radix arboris est lignosa, levis, rara, coloris pallidi, nonnunquam cinerei, saporis acris, subdulcis, odoris aromatici, Foeniculi instar. Cortice vestitur tenui, foris cinereo, intus ferrugineo. Arbor, ex qua desumitur: *Laurus, foliis integris & trilobis*, in Hort. Clifffort. *Sassafras & Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano*, ab Indis vero *Pavane* vocatur. Mediocris est magnitudinis, fructu calicibus insidente, acetabulorum instar concavis; foliis trilobis seu angulosis, semper virentibus, subtus cinerei coloris, flosculis luteis racematim congestis, e sex petalis ovatis acuminatis constantibus, staminibus novem. Fructus baccæ parvæ sunt, per maturitatem nigricantes, sicut flosculi, racematim congesti, & continent semen unicum, nucem nimirum ovatam, acuminatam, quæ includit nucleum ejusdem formæ. In Virginia & Florida largus hujus arboris est proventus, unde etiam ad nos advehitur. Eligatur odoratum, in parvis segmentis, cortice vestitis. *Laudatur ad lymphæ vitia, catarrhos, arthritidem, fluorem album, & alios hujus generis morbos. Usus est in decoctis & infusis.*

five Stipites Solani Dulcamaræ, Solani caule perenni flexuoso, foliis superioribus hastatis, Linn. Bois de Douce-amère, Steigenden Nacht-Schatten-Hinschtraut-Holz. Crescit inter sepes; floret Junio & Julio. Cortex radices & ramorum crassiorum saponacei quid continet; hinc eximia virtute pollet resolvente, aperiente & diuretica. *Laudatur in decocto ad asthma pituitosum, phthisin, ante humorum colliquationem, luem veneream, icterum, & arthritidem vagam. Dosis est uncia una ad duas.*

Suberis, Quercus foliis ovato-oblongis indivisis ferratis, cortice rimoso, Linn. Liege, Pantoffel-Holz, Kork. Est cortex arboris, quæ Quercus species, atque foliis perpetuis, non aculeatis, & cortice crasso a reliquis differt. Provenit in Hispania & Italia. *Virtute gaudet adstringiva; sæpius tamen in usus venit mechanicos, quam medicos; præcipue ad obturanda vitra inservit. Carbo ex subere constituit colorem illum nigrum, Hispanicum dictum.*

Viscus vel Viscum, Gui, Mistel. Baccis albis, planta est parasitica, fruticosa, aliis arboribus innascens. Folia ejus conjugata sunt, angusta, oblonga, semper virentia; flores in perianthio tetraphyllo, monopetali, patentes, semiquadrifidi, foemini cum masculinis in eadem planta. Bacca est ovalis, alba, unilocularis, semen unicum cordatum. Descriptio hæc omnibus Visci speciebus convenit, quæ in Medicina adhibentur: Sunt vero

Viscus Betulæ, *Gui de Bouleau*, *Birken-Mistel*.

Coryli vel Corylinus, *Gui de Coudrier*, *Hasel-Mistel*.

Quercinus, *Gui de Chêne*, *Eichel-Mistel*.

Salicis, *Gui de Saule*, *Weiden-Mistel*.

Tiliæ, *Gui de Tillau*, *Linden-Mistel*.

Vix ulla prostat pulveris epileptici descriptio, quæ non pro ingrediente Viscum agnoscat. Quernus plerumque in usum vocatur; alii Corylinum, vel Tiliaceum præferunt. *Veteribus polychrestum fuit remedium quernus, qui & in morbis lymphæ locum habet; antepilepticum & diureticum est, atque in arthritide, catarrhis, alvi & mensum nimio fluxu feliciter, in pulvere vel in decoctis, exhibetur.*

Xylobalsamum, *Balsam-Holz* Lignum sive potius ramuli, pennam circiter anserinam crassi, lignosi, tortuosi, nodosi, extus rugosi, coloris grisei sive rufescentis; Saporis, si recentes, resinosi, balsamici; odoris, si prunis ardentibus injiciuntur, grati, balsamici. Genuinum Xylobalsamum raro in officinis obvium est. Desumitur ex arbore, quæ pariter Balsamum de Mecca & Carpobalsamum præbet. Vid. Carpobalsamum.

CAPUT IX.

DE GUMMI ET RESINIS.

Ammoniacum Gummi, *Gomme Ammoniac*, *Ammoniac*. Est concretum gummosum & resinofum, e magna ferulacea planta exstillans, collectum. Ex India Orientali advehitur; in Lybia etiam, juxta Jovis Ammonis templum provenisse, & inde allatum, atque nomen accepisse; ferunt. Secundum alios ex deserto Asiæ Barca per Alexandriam ad nos perducitur. Eligendum est in granis, instar Olivani, condensatum, ab arena & aliis quisquiliis liberum, odoris gravis, ex Castoreo & Allio mixti, saporis amari, parum acris, digitis tractatum mollescens, exterius lavum, intus candidum. Mirum, quantum per depurationem de fragrantia sua perdit. *Emollit, resolvit, digerit, maturat, alvum movet, & tam interne, quam externe feliciter adhibetur.*

Animi & Animæ Gummi, *Cancamum*, *Gomme Animé*. Est resina arida, quæ in frustis variæ magnitudinis advehitur, foris albida, intus pallescens, aliquatenus transparens, friabilis, saporis terebinthinacei. Dum accenditur, tota consumitur, & hanc ob causam, gummi animæ dicitur. Odorem spargit fragrantem. Arbor in nova Hispania & Brasilia provenit, & ab incolis *Jetaiba*, a botanicis *Lebus peregrinus cartilaginosus*, *phaseolo nigro puniceo annulo cincto*, vel *Arbor siliquosa animifera Brasiliensis*, a Plumier, *Courbaril bifolia*, flore pyramidali, & a Linnæo, *Hymenæa* vocatur. *Attenuat & resolvit, nervos roborat. Usus est externus in emplastris, ad capitis & nervorum affectus.*

Arabicum Gummi officinale, *Senegal*, *Senica*, *Gomme Arabique*, *Arabischer Gummi*, *Dinten-Gummi*. Est substantia gummosa, pallida, pel-
lucida, saporis viscosi, fatui, odoris nullius. In globis, ovis columbinis majoribus,
Hh
exterius

exterius scabris, intus claris & transparentibus, nobis ex Guinea Africana advehitur. Secundum *Rajum H. Pl.* fluit ex arbore, quæ est: *Acacia Indica Farnesiana Ald.* secundum *Linnaeum*: *Mimosa spinis geminatis distinctis, foliis duplicato-pinnatis, particularibus utrinque quinis, pluribus.* Verum Gummi Arabicum, post incisionem fruticis, exstillat ex *Acacia Ægyptiaca*, foliis Scörpioidis, leguminosa, filiquis albis compressis, isthmo interceptis, flore luteo; vermiculatum est, & vix unquam ad nos fertur. Cum eo vero virtutibus convenit Gummi *Senegal*, quod minori pretio & copiosius & purius habetur; facile igitur vero ex *Acacia* carere possumus; eligatur modo vitri instar pellucidum, purum & candidum. *Temperat lymphæ acrimoniam, & leniter adstringit, nutrit, mercurium in aqua suspendit.*

Afa dulcis, Benzoë, Benzoin, Belzoinum, Benjoin, Benzoe, wohlriechender Asand. Resina est arida & indurata, ex variis frustulis, diversorum colorum, in massam coacta, saporis acris, resinosi, odoris suavis. Arbor, quæ Benzoin largitur, non solum in Sumatra & Java, pariter in Siamensi & Martabano regnis crescit, sed etiam in America & a *Bærhavio*, sub nomine arboris *Virginianæ Benzoiniferæ*, Citri vel Limonii folio, notatur. Ex uno caliculo quadrifolio oriuntur flosculi tres, ad eundem ortum, qui singuli constant uno tubo longo, superius expanso in tumidum caput, quod in octo segmenta profunde finditur, intra hæc segmenta stamina sunt brevia, testiculata, in medio tubo floris ovarium, tuba longa instructum, cuncta vero quam minima sunt. A *Linnaeo* in *Hort. Clifford. Laurus, foliis enervibus, obverse-ovatis, utrinque acutis, integris, annuis*, vocatur. Exstillat Benzoin ex arbore vulnerata; optimum censetur, quod *Amygdaloides* vocatur, & maculas candidas, Amygdalarum instar, refert, nec aliis heterogeneis inquinatum est, atque suavissimum spirat odorem. *Calefacit, incidit, attenuat, pneumaticum est, in tussi, asthmate & catarrhis utile, atque ad suffimenta adhibetur.*

Afa foetida, Laser foetidum, Syriacum, Afa foetida, stinfender Asand, Teufelsdreck. Est gummosum, & parum resinosum concretum, e grumis albescens, flavescens, nonnunquam rosei coloris. Planta, ex qua colligitur, *Hingisch* vocata, est umbellifera, Levistico affinis, foliis, instar Pœoniæ, ramosis, caule pleno, maximo, semine foliaceo, nudo, solitario, Brancæ Urfinæ vel Pastinacæ simili. *Linnaeo Ferula Afa foetida* audit. Patria ejus sola est Persia, non Media, nec Lybia &c. &c. & illa potissimum, quæ circa *Heraatum*, campestre desertum occupat, & quæ in montibus vicinis crescit, succi ferax est. Nulla ex caulibus vel sponte fluit, vel arte exprimitur, sed ex radice manat sauciata. Miræ longævitatis est hæc radix, magna, ponderosa, nuda, exterius nigra. Quadriennio minor parum lactescit, & nunquam secatur; quo autem annosior & major, eo copiosorem fundit lachrymam. Succus ex utriculis illius recens emanans candidissimus, liquidus & pinguis, Flori Lactis similis est, ad aëris vero solisve contactum lentescit, & colorem subfuscum induit. Foetor, virtutis index, ad Allii odorem accedit. Sapor acris est & valde ingratus. *Interne contra tussim convulsivam, morbos hystericos, vermes, febres inveteratas, spinam ventosam laudatur; in colicis torminibus & hydrope, præsertim tympanitide, Indis laudatum est remedium. Externe in emplastris ad nervorum, uteri & lienis affectus commendatur.*

Asphaltum, vide Marina.

Bdellium, Bdellium, Gummi Bdellium. Est lachryma arboris cujusdam non satis huc usque cognitæ & descriptæ, quæ in Guinea, Arabia, Media & India nascitur, & a nonnullis pro *Palmæ* specie habetur. Tradunt etiam in America arborem

rem Bdelliferam, foliis quernis, spinis geminis, ad ortum singulorum foliorum, exasperatam provenire. Cl. Royen ex Plucken. arborem Bdelliferam, lactescentem aculeatam, foliis quernis describit. Coloris est ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concretum, sapore & odore myrrham æmulatur. Præfertur, quod gustu est amarum, translucidum, dum frangitur, pingue & odoratum. Cum Myrrha convenit, & ad Mithridatii compositionem & nonnulla emplastra adhibetur. Ejus accensi fumus hæmorrhoidibus mederi prædicatur.

Camphora, Caphura, Camphre, Campher, Kampfer, Kapher. Est substantia, plane peculiaris, neque resinis, neque gummatibus, neque salibus per dotes suas adnumerari potest, neque satis apte vocatur oleum destillatum solidum, nivis instar candidissimum, in panes coactum, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, gravis. Camphora, quæ in nostris officinis prostat, ex Japonia advehitur, atque ex Lauro, foliis ovatis, utrinque acuminatis, trinerviis, nitidis, petiolis laxis, Linnæi, sive Arbore camphorifera, foliis laurinis, fructu parvo, globoso, calice brevissimo, colligitur. Arboris folia alternatim sunt posita, semper virentia; flores, ex foliorum sede provenientes, hexapetali, albi, fructus seu bacca atro-purpurea, pericarpio molli, saporis ex Camphora caryophyllacei, nucleo bifido, calloso, duro ac pingui, cortice integro fragili, calici concavo infidet. Extractio Camphoræ per rusticos peragitur, in provincia Saxuma & in insulis Gotho; radices & ligna arboris in festucas comminuta, cum effusa aqua, in vesica ferrea, superimposito & stramine impleto alembico magno, coquunt, & tandem Camphoram sublimatam, straminibus adhærentem, colligunt, quæ deinde ulterius purificatur, atque, tradente Künstio in Aët. Phys. Med. Vol. V. in vitro probe clauso, leni igne colliquata, figuram orbicularem nanciscitur. Camphora Borneensis, quæ optima censetur, nunquam ad nos pervenit, sed magno pretio etiam apud incolas habetur. Nativa est & absque destillatione, ex trunco arboris eruitur & colligitur. Multæ etiam dantur aliæ plantæ, quæ Camphoram largiuntur: Radices arboris Cinnamomi magnam exhibent quantitatem destillatione; Zedoaria vero parum prodit. Eligenda Camphora candicans, sine maculis, pellucida, instar glaciei, quæ deslagrando tota consumitur, & in ipsa aqua ardet. Alexipharmaca, calida & anodina est. Adhibetur tam interne, quam externe. Dosis interne a paucis granis ad scrupulum semis, in mania ad drachmam semis. Miscetur, ut plurimum cum nitro, & absorbentibus, vel sic dictis bezoardicis. B. Fr. Hofmannus, cum Balsamo de Copaiva mixtam, ad gonorrhæam, & cum Tincturis croci, succini & Cort. Aurantiorum, ad menstrua suppressa, commendat.

Cancamum quid sit, hodie plane ignoratur. Alii Laccam esse, alii Benzöen; nonnulli Animæ Gummi, pro Cancamo habent. Plurimi, ubi in veterum descriptionibus sive compositionibus occurrit, Gummi Animæ fumere suadent.

Caoutchou, Resina elastica, Gummi elasticum. Est Resina insipida inodora, fusca interdum nigra igne cum elasticitatis jactura liquabilis, accensa minus gratum odorem emittens. Tanta ejus est tenacitas & simul elasticitas, ut in triplam vel quadruplam longitudinem & latitudinem se extendi patiatur, & cessante extensione in pristinos limites subito redeat. Nec in aqua nec in spiritu vini solubilis est. In oleis soluta elasticitatem perdit. Sola vitrioli naphthora eam facile solvit, & solutæ elasticitatem conservat. Hæc solutio conficiendis tubulis variis flexibilibus, ad usus chirurgicos varios, inservit.

Caranna, Caragne. Resina tenax duraque est, quæ, dum recens, picis instar ductilis, inveterata vero fragilis & dura est; coloris ex viridi nigricantis, saporis amari,

ri, ingrati, odoris fragrantis, præsertim, dum accenditur. Ex nova Hispania, in frustis cylindraceis, quæ foliis junceis involuta sunt, advehitur. Arbori, ex qua exsudat, folia adscribuntur oleaginea, in crucis formam composita, fructus seu baccæ oblongæ, quaternæ. *Calefacit & resolvit. Usus est externus in emplastris.*

Ceraforum Gummi, Gomme des Cerises, Kirschen-Harz, Kirschen-Gummi. *In aqua totum dissolvitur, & cum Gummi Arabico vel Senegal convenit, atque defectu ejus in usum vocari potest.*

Colophonia, Colophone, Spiegel-Harz, Geigen-Harz, Colophonium. Ex urbe Colophone olim habebatur. Pix, five abiegna resina est, lento igne ad hanc consistentiam friabilem & colorem brunneum cocta. Fit etiam ex residuo Olei Terebinthinæ, vocatur quoque *Pix græca*. *Fumus ejus ad tenesimum & prolapsum ani ac uteri procidentiam commendatur; additur Emplastris; roborat & siccatur.*

Copal, Pancopal, Gomme Copal, Gummi-Copal. Resina est duriuscula, diaphana, ex albo flavescens, dum carbonibus inspergitur, odorata, a nonnullis Succinum vegetabile vocata. Volunt, esse arborem, ex qua Copal colligitur, Populo nigro haud dissimilem, & copiose in insulis Antillinis provenire. Sponte ex arboribus defluit, & non raro ab imbribus ad ripas fluminum abripitur, quod forsan, & cum primâ facies Succinum referat, ansam dedit, Succinum vegetabile appellandi. A recentioribus botanicis, *Rajo, Pluckenet & Clayton, arbor resinam copal fundens, Rhus vel Sumach Virginiana & Linnæo, Rhus foliis pinnatis, petiolo membranaceo articulato* vocatur. *Jonston* viginti species arborum, Copal proferentium, enumerat: Americani enim fere omnes resinas transparentes, nomine Copal indigitare solent. Copal substantia sua non mere resinofum est, sed gummosi quid occultat, unde difficilis est solutionis. Oleis Rorismarini, Lavendulæ, Balsamo Copaivæ, Therebinthina dissolvi dicitur, nec non Alcohole vini, siquidem eum Camphora fuerit tritum. *In Medicina rari, nisi ad suffimenta, est usus; frequentius ad vernices seu laccas expetitur, atque peculiarem deposcit encheiresin solutionis.*

Elemi, Gomme Elemi, wild Delbaum-Harz. Resina est semidiaphana, pinguis, ex flavo albicans, ad viridem colorem inclinans, in massam coacta, & foliis arundinaceis involuta, odoris vinosi suavis. Ex America, & præsertim nova Hispania & Brasilia advehitur. Arbor Elemifera folia habet pinnata, petiolis longis, pentaphyllis, semper virentia; flosculos tetrapetalos, verticillatos; Fructus purpureos, pyriformes, minores. Arbor, Gummi vel potius resinam Elemi fundens, ab Illustr. *Linnæo in Horto Cliff. Elemifera foliis ternatis, a Cl. van Royen, Frutex trifolius resinofus, floribus tetrapetalis albis, racemosis* vocatur; A *Chabræo, Lentiscus Peruviana*. Describitur & alia arbor a *Breyn. in Prodrum. 2.* atque *Elemi* arbor ex *Surinama, myrti laureæ foliis*, appellatur; cujus tamen resina, non pro vero, sed spurio Elemi habetur; idcirco *Gummi Chibou, la Gomme Chibou, in Codice Parisiensi pharmaceutico* salutatur. *Rajus in H. Pl. ex Baccio de vinis Apulis* locum adducit, ubi Elemi, ex olea arbore vetusta exsudasse, mentio fit: Quæ *Baccii* observatio forte ansam dedit, resinam Elemi vernacula nostra *wild Delbaum-Gummi* appellandi. Eligitur odoratum, purum, pingue. *Calefacit, digerit, resolvit, & in vulneribus membranosarum & nervearum partium, bono cum effectu, adhibetur. Usus est in Balsamis vulnerariis & Emplastris.*

Euphorbium, Gumme Euphorbe, Euphorbium, ein scharfes Gummi. Substantia est gummofa, in guttis five granis pallefcantibus, saporis acerrimi, urentis,

nauseosi, odoris nullius. Colligitur ex planta Euphorbii, cerei effigie, caulibus
 oribus, spinis validioribus armati, in apice frugiferis, floribus Tithymali tetra-
 oidibus, quæ in Indiæ Orientalis regionibus & Mauritania crescit, hinc inde
 in *Tithymalus Mauritanicus*, *Aphyllus angulosus*, *spinosus*, apud *Bærhavium* & apud
 æmum *Euphorbia aculeata nuda multangularis*, *aculeis gemminatis*, audit. Succus
 æ vulneratæ lactescens a sole condensatur. Eligatur albicans in granis majori-
 Vim habet exurentem, inflammatoriam, vehementer humores viscidos fundit & edu-
 vix tamen, nisi hydropicis fortioribus dari debet: corrigitur succo citri vel aliis acidis,
 vis lixivio alcalino magis obedire credatur; externe cariei ossium absumendæ inservit.

albanum Gummi, Gomme Galbanum, Galban, Mutter = Gummi.
 Succus in grumos condensatus gummosus, resinosis paucis particulis permixtus,
 is flavescens, subfusi, saporis amaricantis acris, odoris gravis. Colligitur e
 a *Syriaca Galbanifera*, *fruticosa*, foliolis pinnatifidis, pinnis linearibus, planis,
 s, semper virentibus. Radices plantæ valde succulentæ & lactescentes sunt,
 s fungosi medulla pleni; semina & flores, in umbella, ovata, tenuia, peram-
 plerumque per maturitatem nigra. A Tournefortio planta vocatur *Oreosolinum*
anum Galbaniferum; his a Rajo adduntur verba: *frutescens anisi foliis*: Tourne-
 s, quem modo allegavimus, plantam *foliis anisi similibus*, longioribus tamen &
incisis describit: addit *flores luteos*, *semina plana*, *orbicularia*, quibus se planta
 guit a *Ferula*. Linnæo dicitur: *Bubon foliis rhombeis ferratis glabris umbellis pau-*
 Tota planta lactescit, vel succo gummoso lacteo turget, qui succus vel sponte
 pens, vel ex planta vulnerata exsudans, coagulatur a solis calore in grana, quæ
 um Galbanum constituunt. Ex orientalibus regionibus, Arabia, Syria & Æthio-
 vehitur. Eligendum Galbanum in lachrymis, sive granis, coloris flavescens,
 fi. *Emollit & maturat; interne in mensibus ciendis, & aliis uterinis affectibus adhi-*
Plurimus usus est in Emplastris.

alda Gummi, Gomme Galda, coloris est subgrisei, & multum cum Elemi
 ni, tam quoad odorem, quam virtutem convenit. De arbore nil nobis constat.

ajacum, Gomme de Guayac, Franzosen = Holz = Gummi. Est substan-
 ummi - resinosa, friabilis, coloris viridescens fusi, saporis acris, odoris fere
 s; cum vero carbonibus injicitur, haud ingrati. Distinguitur a Resina, quæ,
 nte Spiritu Vini, Ligno extrahitur; hoc vero nativum est, & ex arbore, quæ
 cum Lignum suppeditat, exsudat. Eligatur illud, quod in minoribus frustis
 itur, & corticibus adhæret Guajaci. Ejus Solutioni in spiritu vini, instillatur
 s nitri, unde si color cæruleus surgit, sincerum esse concludunt. *Incidit, atte-*
resolvit, & easdem vires habet, quas Resina, atque in iisdem affectibus, scilicet ca-
libus, Lue venerea, gonorrhæa, scabie maligna, &c. &c. in forma pilulari, cum
etis appropriatis, exhiberi potest. Contra morbos arthriticos hodie in maxima est
itate.

ummi Gutta, Gutta Gamba, Gutta, Cambodia, Gutta & Gitta
u, Gummi de Goa, Gummi de Peru, Gamandræ, Gomme goutte,
mi = Gut. Est succus gummosus & parum resinosus, inspissatus, flavus, ar-
 Malabaricæ *Caddampulli* dictæ, pomiferæ, foliis conjugatis binis, floribus te-
 alis, in summis furculis, fructu Mali Aurei æmulo. Succus e fauciato trunco
 ans, flavescens colligitur, & addita aquæ pluvix sufficiente quantitate, a fæci-
 urgatur, defæcatus, lenissimo igne, ne nigrescat, inspissatur, atque, vel in
 ros efformatus, vel in bacillis, cerei instar, contortis, ad nos mittitur. Nasci-
 I i tur

tur in Malabaria. Eligendum est Gummi Gutta flavi vel aurei coloris, purum fæcibus liberum. *Acre est, & vehementer per superiora & inferiora purgat; hydro & phlegmaticis datur a granis octo ad decem; contra tæniam specificè laudatur; pictor vero plurimum inservit.*

Hederæ Gummi, Gomme de Lierre, Epheu-Gummi. Lachryma est plurimi putant, Hederæ arborescentis, quæ vel sponte, vel ex trunco vulnerato lat, saporis caustici sive acris, simul adstringentis, substantiæ aridæ, resplendens, coloris utplurimum fusci, fere nigri; oleis non est solubile. Advehitur ex dioribus regionibus. *Resolvit, attenuat, urinam & sudorem movet. Datur in formula pilulari, cum Extractis combinatum.*

Juniperi, vide Sandaracha.

Kikekunemalo Gummi, Gomme Kikekunemalo. Habetur pro specie pal, atque puritate, elegantia & perspicuitate præ ordinario Copal se commensurat. Facilius etiam solvitur; hinc pro nitida alba vernice paranda vix aliquid aptius reperitur; calore est liquabile, inflammabile & accensum odorem suavem emittit. Arbor, ex qua fluit, ignota; certum tamen, ex America advehi. *In affectibus erylanceis & arthriticis carbonibus injectum partes affectas fumigando juvare dicunt.*

Kino Gummi rubrum, adstringens Gambiense. Prostat in frustis varietatis magnitudinis splendentibus, ex rubro nigricantibus, odore vacuis, sapore foris adstringentibus, in aqua pene omnino diffluentibus. Ex regione Africæ, fluvio Gambia adjacente, aliquot abhinc lustris pervehi cœpit. *In diarrhæa chronica, fluore & nimio mensium fluxu laudatur.*

Laccæ Gummi, Gomme Lacque en graines, en baton, en oreilles, Gummi-Lac. Est substantia sui generis. Neque resina est, neque Gummi, neque Gummi-resina. Tres in officinis ejus reperiuntur species, in ramulis sive baculis, in granis, & tabulis. *Lacca in Baculis* dicitur, quia parvis arborum ramulis, superbus efformata est, adhærens, ad nos venit. Substantia sua resinosa, fusci coloris, superficie inæquali, quasi granulata, baculos circumcludit; saporis est subadstringentis, parum resinosi, odoris fere nullius, & dum accenditur, haud ingrati. *Quæ in Granis* dicitur, pellucida, rubicunda, saporis resinosi est. Hæc fusa & a fæcibus separata illam, quæ *in Tabulis* vocatur, exhibet, atque ex flavo rubet, pellucida fragmentis Vitri Antimonii similis est. Reperitur in ramulis arboris *Jujubæ Indica* dictæ, foliis majoribus, rotundis, trinerviis, subtus lanuginosis, floribus perianthatis, herbaceis. Advehitur e regnis Pegu & Martabane Indiæ Orientalis. Sponte ex arbore destillat, sed opificium est insectorum alatorum, formicis similis, quæ materiam hujus concreti resinosi, vel ex ipsa arbore, vel aliunde colligunt, & vearia ex illa construunt, atque ovula, ad novi examinis sui generis productionem in ea deponunt; ovula. alveolis inclusa, in Chrysalides, more aliorum insectorum abeunt, & hæ Chrysalides revera id ipsum sunt, quod Laccæ colorem rubrum communicat; quo major igitur harum Chrysalidum copia in dictis alveolis latet, eo præstior ad tingendum, & extrahendam Tincturam censetur. Quæ vero, a ramulis separata, in granis advehitur, Indis, qui telas & varias res colore rubro, mediante Laccâ, inficiunt, jam inservivit, & suo colore orbata est. *Lacca in granis ad vernicem in tabulis, ad sigillatoricæ Laccæ confectiorem, expetitur. In usum medicum quando adhibetur, plerumque in granis subintelligitur. Leniter adstringit, & urinam movet. Ad præparandam vero præparationem, ob supra allegatas causas, illa, quæ baculis adhæret, requiritur.*

De Gummi Laccae origine legi meretur observatio D. D. Godofredi, Act. Phys. Med. Vol. III. Append. p. 60.

Ladanum, Labdanum, Ladan, Gomme Ladanum, Ladan. Est resinosa substantia, grisea, terra permixta, in spiras, cereorum instar, contorta; saporis amari, odoris, dum accenditur, fragrantis, non omnibus grati; nec in aqua, neque in oleis solvitur. Colligitur ex Ladani vel Cisti Ladaniferæ planta, & quidem e caulium & foliorum superficie. Plantæ frequens & copiosus est proventus in Candia, Cypro & Græcia. Cistus appellatur *Ladanifera Cretica, flore purpureo, rosaceo*. E calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum subrotundum, apice dehiscentem, multicapfularem, seminibus foetum. Modus colligendi tam a *Bellonio*, quam *Tournefortio* describitur. - Incolæ habent peculiare instrumentum, quod leniter Cisto affricant; sic adhærescit Ladanum instrumento, quod deinde colligitur. Barbis hircorum & caprarum inter Cistum pascentium etiam adhæret, unde Ladanum de Barba appellatur, quod optimum esse censetur. Sit resinofum, pingue, inflammabile, odoratum. *Nervinum est; raro tamen interne datur. Usus est in emplastris anticatarrhalibus & nervinis, & ad suffitus.*

Look Gummi, Gomme Look. Colore Succinum æmulatur. Ex Japonia affertur & sicut Mastiche electa temporibus contra dolores dentium & cephalalgiam imponitur.

Mastiche, Resina Lentiscina, Mastic, Mastich, Mastix. Lentiscus, ex qua Mastiche colligitur, copiosissime in insula Chio, Ægæi maris, provenit; nascitur etiam in Ægypto, Syria, Gallia Narbonensi, & nonnunquam in hortis Botanophilorum in Germania invenitur. *Linnaeo* vocatur: *Pistacia foliis impare pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis*. Arbor est ramosa: rami sunt flexiles, cortice cinereo obducti. Folia myrtum referunt, per paria ad unam costam disposita, non in unum folium desinentem, semper viridia, tenera, odoris non ingrati, fortis, saporis adstringentis, acidiusculi. Flores ex foliorum alis nascuntur, racemorum instar dispositi, rubri, vel coloris herbacei ad purpureum accedentis. Fructus sunt baccæ rotundæ, nigræ, saporis acidi, nucleum habentes oblongum nigrum, duram continentem medullam albam, viridem. Duplex in officinis prostat Mastiche, electa sive *in granis*; altera, quæ multis scatet impuritatibus, atque cinerei est coloris, *in Sorte* vocatur; Laudatissima vero ex *Chio* advehitur. Præfertur, quæ est in granis majoribus, alba, pellucida, friabilis, quæ tamen, dum masticator, picis instar, dentibus adhæret, & ductilis est, odoris grati, aqua non dissolvitur, igne liquatur. *Usus est tam externus, quam internus; calefacit, subadstringit, roborat.*

Myrrha, Myrrhe, Myrrhen. Est substantia gummosa & parum resinosa, arida, fusca, saporis amari, acris, aromatici, odoris fragrantis, non ingrati. Arbor, ex qua colligitur, nondum clare descripta est; dicunt ab Arabibus vocari *Pola*, esse bacciferam, atque in locis desertis provenire. Ex Arabia, Ægypto & Æthiopia advehitur Myrrha. Eligenda friabilis, levis, in lachrymis quasi, ubique concolor, amara, acris, aromatica & fragrans. Myrrha *Stacte* vocatur, quæ pellucida, vel saltem egregie splendens & pura est. Hæ forsitan sola veterum est Myrrha; reliqua, quæ nobis venditur, quamvis dicatur electa, semper variis aliis corporibus & fordibus permixta est. *Calefacit, aperit, attenuat, discutit & putredini resistit.*

Olampi Gummi, Gumme Olampi, ex America advehitur transparens, durum, coloris pallidi, saporis subdulcis, parum adstringentis. Aqua non solvitur, igne non liquatur, flammæ admotum ardet suavemque odorem resinofum spirat.

Olibanum, Thus, Encens, Weyrauch. Est lachryma resinosa arboris Thuriferæ, e flavo pallescens, duriuscula, semidiaphana, in grana variæ magnitudinis concreta, saporis resinosi, amaricantis, odoris, dum accenditur, fragrantis. Stillat partim sponte e fauciata arbore; arbor vero, ex qua colligitur, nondum descripta est; alii enim Piri, alii Lentischi, alii Lauri, alii Pini & Salicis folia illi tribuunt. Certum est, illam in Arabia, & præsertim ejus provincia, Saba, provenire. *Herbolet in Biblioth. Orient.* mentionem facit. *Gummi Laban*, apud *Clusum Louan*, quod ex arbore lentisco simili, quæ in *Arabia felici*, & quidem in provincia *Saba* copiose provenit, colligitur. *Arabs al Edresi* in *geographia Arabiæ*, scribit: Olibani, *Gummi Laban*, magnus esse proventus, in provincia *Schagiar*, circa fretum *Gicum*. Probatur album, in guttis, & friabile, corticibus arboris & quisquiliis non inquinatum, nec Thure silvestri permixtum, quod est resina abietis & pini, ex acervis formicarum collectum. Quæ de Thure Männæ, testiculato & mammoso, apud veteres auctores, leguntur, de Thure electo albo intelligenda sunt; secundum enim figuram lachrymæ nomina imposuerunt veteres. *Calefacit, siccatur, roboratur, & subadstringit Olibanum; internus & externus ejus est usus, plurimus in suffimentis.*

Opopanax, Gummi Panacis, Opopanax, Panax-Gummi. Gummi sive succus lacteus concretus, e vulnerata circa radicem planta, æstivo tempore exsudans, atque sponte concrevens. Planta, quæ Botanicis *Sphondylium majus*, sive *Panax Heracleum* & *Linneo Pastinaca foliis decompositis palmatis* audit, florem habet rosaceum, umbellatum, luteum, folia lata Pastinacæ, verum magis composita sive ramosa, femina ampla, plana, bina, ovata. Gummi est quasi ex granulis, e rufo & albo favescentibus, in glebas compactum, saporis amaricantis, acris, ingrati, odoris gravis. Bonitatis signum est, si facile in aqua solvitur, lactescit & valde amarum est. In Syria, Boeotia, Macedonia, Sicilia & Gallia meridionali provenit; colitur etiam in Botanophilorum hortis. *Emollit, digerit, flatus discutit, purgat pituitam lentam; externe etiam pro Galbano in emplastris adhiberi potest.*

Pix, Poix, Resine, Pech. Est pars resinosa, ex arboribus resiniferis, præsertim e pino, abiete, larice, collecta, cocta, & ab impuritatibus liberata. In usum medicum præcipue venit, quæ sequitur.

Pix navalis, Palampissa, Poix ou Resine noire, navale, Schiff-Pech, quæ navibus picandis adhiberi solet. Est resina sive pix magis cocta & fusca. Ex septentrionalibus regionibus advehitur. *Siccatur, calefacit & discutit; usus est in Emplastris.* Plurimi sub hoc nomine intelligunt eam substantiam, quam Galli *Goudron*, Germani *Thyer*, appellant: Oleum scilicet empyrevmaticum, spissiusculum consistentia mellis, nigro rubicundum, odorem spirans balsamicum empyrevmatico junctum, sapore perfusum amaricante. Obtinetur ex lignosis partibus Pinus, & ut alii autumant Betulæ ope destillationis per descensum. *Ante triginta, & quod excurrit, annos contra Phthisin, Variolas malignas Scabiem &c. summopere commendabatur ejus infusum.*

Resina communis vulgaris, Poix ou Resine blanche, Harz, Fichten-Harz. Colligitur magna in quantitate in silva Martia, ex abietibus & pinis, atque a corticibus arboris & aliis heterogeneis, per liquationem & colationem, liberata, in parva vasa lignea effunditur, atque longe lateque divenditur. Solet etiam antequam mercaturæ amandatur vesicæ immitti, & aquæ ministerio oleum inde destillari flavam odore minus gratum & vehemens, sapore linguam petens. Oleum Templinum, *Tannen-Zapfen-Oehl*, vocant. Idem Oleum quandoque ex Pinus Sylvestris ramis tenellis
aut

at conis viridibus destillatione per aquam paratur. Vocatur *Rübel* : *Harz*. Coloris
 flavescens, solida & odorata. *Usus est in Emplastris; emollit, discutit, digerit.*
pleuritide sub forma pilulari sumpta opem præstitisse egregiam perhibent.

Sagapenum, Serapinum, Gomme Seraphique, Serapin Gummi, Sagapen.
Sachryma seu Gummi est *Ferulæ Sagapeniferæ* a botanicis nondum descriptæ, ex qua
 laciata colligitur. Nascitur in Media, Persia & aliis orientalibus regionibus. Opti-
 um censetur in granis translucidum, foris fulvi vel rufi coloris, intus dilutioris, gu-
 us acris, odoris ad Porrum accedentis. In aqua maximam partem solubilis est, igne
 non liquatur, accensum nauseosum odorem spirat. *Inter purgantia validiora habetur;*
exiliari cum vino sumtum a bestiis venenatis commorsis Raj. Hist. plant. perhibet. Com-
 mendatur *hydropicis, asthmaticis, atque tussi inveterata laborantibus. Resolvit, attenuat,*
educit lentos humores ex ventriculo & intestinis, menses & urinam ciet, embryonem ene-
re creditur.

**Sandaracha Arabum, Vernix sicca, Gummi Juniperi, Gomme de Ge-
 evre, Wachholder-Harz, Sandarach.** Resina est pellucida, Mastichis instar,
 guttis tamen majoribus & longioribus, friabilis, saporis resinosi, odoris, dum ac-
 nditur, suavis, sicut Mastiche. Igne mollescit, sed fundi recusat; in spiritu vini, sed
 quaquam in aqua solubile; in oleis pariter non dissolvitur. Ex Africa advehitur,
 i ex arboribus Juniperi majoris, bacca rufescente C. B. fauciatis exstillat & colligitur.
 drus eam quoque suppeditat; qualis tamen raro ad nos venit. *Proxime ad Masti-*
n accedit virtute. Ad suffitus etiam est usus; plurimus tamen ad vernices varias.

Sanguis Draconis, Sang de Dragon, Drachen Blut. Resinosa est sub-
 ntia, rubra, igni admota facile liquescens, & attritu colorem dilute rubrum reddens.
 poris resinosi, adstringentis. Adfertur in folliculis figuræ olivaris, e foliis arundi-
 ceis, convolutis, & *Sanguis Draconis in Granis* vocatur. Massa illa obscure rubra,
 e *Sanguis Draconis in Tabulis* audit, plerumque factitia, impura, opaca & vilioris
 tii est. Colligitur e diversis arboribus, quæ Palmis adnumerantur, inprimis ex
 specie, quæ *Palma prunifera, foliis Juccæ*, vocatur, e cujus caudice resinam ru-
 m hanc promanare perhibent. Optima Sanguinis draconis resina censetur illa,
 um producit arbor, quæ *Draco Indica, siliquosa, populi folio, Angsana vel Angsana*
vanica, Comelin. Hort. Amst. Pterocarpus (officinalis) Jacquin Hist. Stirp. Amer. Ap-
d. & Linn. Mater. Med. vocatur. Etiam ex caudice inciso arboris, quæ lignum
 phriticum producit, gummi rubrum profluere, quo, loco Sanguinis draconis utun-
 , *Rajus in Hist. plant.* perhibet. Plurimi putant, id, quod Sanguinem draconis
 camus, cinnabarim esse *Dioscoridis*. *Kæmpferus* vero aliam methodum, Sanguinem
 aconis, e fructibus strobiliformibus *Palmæ coniferæ spinosæ*, eliciendi describit. Præ-
 tur ille, qui ab aqua non dissolvitur, clarus, pellucidus, friabilis & eleganter ru-
 , atque vel in granis, vel frustulis, digiti magnitudinis, foliis arundinaceis invo-
 us, advehitur. *Virtutes sunt adstringentes & siccantes; pulverem ad casum & denti-*
os ingreditur; dentes firmat, & gingivas, scorbuto affectas, sanat.

Sarcocolla, Sarcocolle, Collechair, Fleischleim-Gummi. Sunt granula
 nmosa, parva, ex albo rufescentia, friabilia, saporis amaricantis, acris, subdul-
 , odoris nullius. E Persia ad nos transfertur. Sunt, qui plantam sive arborem
 quosam, flore papilionaceo scribunt; alii Tithymalum Persicum spinosum esse affir-
 nt: *Linnæus Penæam foliolis ovatis planis* vocat. Eligenda recens, (vetusta enim
 escit,) coloris pallidi, saporis amari, substantiæ porosæ, glutinosæ. *Calefacit,*
stringit, consolidat, glutinat, maturat, in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis,
e humano vel asinino macerata, commendatur.

Senegal Gummi, Senica, Gomme de Senegal, illud est, quod sub nomine *Gummi Arabici* in officinis prostat, atque ex *Guinea* advehitur, & a fluvio celebri *Senegal* vel *Senega* nomen habere videtur. Productum esse *Acacia*, *siliquis compressis*, plurimi autumant. Vires sunt eædem, quæ *Gummi Arabici*. *Plurimus usus in arte tinctoria & sericaria, ad lustranda sericea.*

Styrax, Storax Calamita, Resine de Storax, Storax. Massa est resinosa, pinguis, e flavo rufescens, saporis subacris, odoris suavis, fragrantis. Ex *Styrace* arbore, folio lanuginoso *Cotonei Mali*, flore monopetalo, velut infundibuliformi multifido, fructu subrotundo, carnosio, uno vel altero officulo plerumque foeto, colligitur. In calidioribus *Europæ* regionibus nonnunquam reperitur, sed non fundit resinam, sicut in orientalibus, *Syria*, *Pamphilia*, *Cilicia*. &c. Olim in calamis sive cannis advehebatur, unde nomen *Calamitæ* accepit; nunc plerumque in massa, multis quisquiliis & rasura ligni inquinata, advehitur. *Styrax* in granis vero naturalis rarissima est. Eligatur pinguis, multis granulis resinosis, albicantibus mixta, rufescens, odoris suavis constantis. *Calefacit, emollit, concoquit. Cephalica & nervina est, catarrhis & tussi medetur; ad suffitus adhibetur.*

Tacamahaca, Tacamahac, Tacamaque, Tacamahac. Resina arida, flavescens, vel rufa, in glebas compacta, saporis resinosi, aromatici; odoris suavis fragrantis est. Stillat ex arbore *Tacamahacæ*, quæ *Linnaeo Populus foliis oblongis acutis* vocatur. Folia sunt fruticis rosarum similia, dentata, & ut plurimum quinque uno pediculo adhærentia. Flores parvi, albi, racematim congesti; semen unicum triangulare. Vocatur etiam a *Batavis Sadelhaut*, id est lignum, ad ephippia conficienda idoneum. Nascitur in *Hispania Nova* copiose, & haud raro in insula *Madagascario* provenit. Duplex reperitur *Tacamahaca*, illa, quæ sponte ex arbore non vulnerata profluit, & in corticibus cucurbitarum colligitur, atque a *Gallis Tacamahacæ* *Coque* vocatur, raro ad nos venit; altera in lachrymis & glebis, variæ magnitudinis advehitur. Sit modo pura, suaveolens & fragrans. *Roborat, resolvit, maturat, emollit, dolorem ac flatum discutit. Internus usus rarus est; externe in emplastris, præsertim odontalgicis & stomachicis, adhiberi solet.*

Tragacantha, Gomme Adraganth, d'Adragan, ou d'Epine de Bouc, Tragacanth. Lachryma gummosa lucida, tenax, levis, in aqua solubilis, mucilaginosus est. Colligitur ex radice vulnerata fruticis *Tragacanthæ Linnaei, foliis pinnatis; nuda deciduis, costa media, cui pinnulae annexæ sunt, in longam, rigidam, acutam spinam præcurrente, flore papilionaceo, siliquis geminatis, in duplici alveolo, duplicem seminum serie continentibus*, quæ etiam *Astragalus aculeatus fruticosus Massiliensis* a *Pluckenet* vocatur. Provenit planta copiose in *Syria*, imprimis circa *Aleppum*, & in *Candia*. Haud raro etiam in *Gallia*, circa *Massiliam*, occurrit, ubi tamen gummi raro vel nunquam fundit. Eligenda est alba, pura, vermiculata; rufa & impura rejicitur. *Humectat acrimoniam mitigat, incrassat, atque in tussi a materia acra, dysenteria, ardore urinae, raucedine, nec non in collyriis ad ophthalmiam bono cum successu adhibetur.*

CAPUT X.

DE RESINIS LIQUIDIS ET BALSAMIS NATIVIS.

Ambra liquida, Liquid-Ambra, Ambre liquide, flüssiger Amber. Resina liquida, e flavo fusca, consistentiæ plerumque *Balsami Peruviani* nigrescens, saporis

saporis acris, aromatici, odoris suavis. Fluit vel sponte, vel ex incisa arbore Liqui-
dambar seu Styracis Virginianæ, quæ a Rajo *Platanus Virginiana*, *Aceris foliis* quin-
quepartitis, floribus tripetalis, fructibus sphærocephalis, feminibus minimis, oblon-
gis vocatur, & in Virginia, nova Hispania, & aliis Indiæ occidentalis regionibus oc-
currit. *Resolvit, emollit, maturat, & cum Balsamo Peruviano convenit.* *Ufus pluri-*
mus est externus. Nierembergius in Hist. Nat. *etiam interne in affectibus ventriculi & ute-*
ri conducere perhibet.

Balsamum Canadense, Baume de Canada, Balsam von Canada. Species
est Terebinthinæ. Fluit ex abiete Canadensi, quæ a Pluckenetio, *Abies minor, pecti-*
natis foliis, conis parvis, subrotundis, Gallis *Epinette* ou *Sapinette de Canada*, vocatur.
Cum Terebinthina Veneta convenit.

Balsamum de Copaiba, Copahu, Gopaivæ, Baume de Copaiba, de Ca-
pahu, Balsam von Copaiva. Est liquor resinofus, limpidus, pallidi coloris, sa-
poris acriusculi, amaricantis, odoris terebinthinacei, gratioris. Arbor *Copaiba*, hoc
balsamum fundens, in *Brasilia, Americæ* regione, nascitur. Folia habet subrotunda,
five ovalia, flores pentapetalos, filiquas monospermas. Balsamum non nisi ex vulnerata
arbore fluit; magna tamen in copia, ut spatium trium horarum propemodum duodecim
libræ colligi possint. Duplex reperitur, quale prius est liquor limpidus, posterius ve-
ro crassioris est consistentiæ, instar Terebinthinæ, discrimen dependet ex diverso col-
ligendi tempore: illud enim, quod statim post arboris incisionem profluit, est admo-
dum clarum, album, odoris resinosi; hoc autem, quod sequitur, magis aurei colo-
ris & consistentiæ densioris est; & ultimum hoc magna in copia ex Portugallia ad nos
venit, alterum autem tenuius magis rarum est. Eligatur pellucidum, flavescens, li-
quidum, odoris fragrantis, & quod a Tinctura Tartari, vel alia alkalina, totum sol-
vitur, atque Oleum copiosum æthereum dat destillatum. *Ufus præcipuus est in gonorr-*
hæa; dari vero etiam potest in diarrhæa & dysenteria, nisi febris contraindicet. *Dosis est*
scrupulus dimidius, ad integrum. *Externe præbet Vulnerarium egregium.*

Balsamum Indicum album, Peruvianum album, Baume blanc de Perou,
weisser Indianischer, Peruvianischer Balsam. Est liquor resinofus, coloris pal-
lidi, odoris ad Benzoës accedentis, suavis, saporis acris, amaricantis, consistentiæ
mellis liquidi. Fluit ex arbore vulnerata, quæ *Cabareiba*, five Balsamum Peruvia-
num a *Pisone* vocatur. Crescit arbor in America, & quidem Hispania nova, estque
magnitudine Mali Medicæ, foliis Amygdali majoribus, tamen rotundioribus & ma-
gis acuminatis; floribus pentapetalis, in extremis ramorum flagellis luteis, initio lo-
culorum oblongorum forma, sed, procedente tempore, quorundam veluti foliorum
ceteris latiorum. Fructus sunt filiquosi, breves, ac in singulis semen unicum conti-
netur. Rarius in Officinis, quam Nigrum, reperitur, quamvis ex eadem arbore eli-
ciatur. *Adscribuntur vires potentiores Nigri, præsertim in pectoris affectibus, diarrhæis,*
gonorrhæa & ulceribus internis commendatur. *Datur ex ovo sorbili; dosis guttæ tres,*
quinque, ad decem. *Externe etiam præbet Vulnerarium egregium.*

Balsamum Indicum, Peruvianum nigrum, Baume noir de Perou, schwar-
zer Indianischer, Peruvianischer Balsam. Substantia est resinosa, ponderosa,
fluida, coloris ex nigro rubentis, saporis acris, paululum amaricantis, odoris sua-
vis, fragrantis. Coctione extrahitur, ramos atque etiam truncos arboris modo sub
Balsami Indici albi titulo, descriptæ, assulatim & minutim concisos, in lebetem am-
plissimum injiciunt, multaque insuper affusa aqua coquunt, quantum satis esse putant,
igne sublato frigesce finunt, & conchyliis Balsamum supernatans colligunt. Lau-
datur

datur spissum, nigrum, ponderosum, odore fragrans, & quod mixtionem cum Oleis expressis respuit. *Calidum est, dissolvit, digerit, & roborat; præstantissimum est Vulnerarium, & tam interne, quam externe in usum venit; quia mixtionem cum omnibus liquoribus respuit, commode cum vitello ovi misceri atque exhiberi potest. Dosis guttæ tres ad sex.*

Balsamum Indicum siccum, Oppobalsamum siccum, Baume rouge sec, ou dur, trockener Indianischer Balsam. Resina est pellucida, coloris fulvi & rutili, saporis acris, odoris suavis Benzoës, fragrantioris tamen & gratioris, dum recens, picis instar ductile, inveteratum vero friabile. Ex balsamifera arbore, quæ præcedentia Balsama, album & nigrum, Peruviana suppeditat, colligitur: ramuli nimirum abscissi & cortex vulneratus liquorem fundunt, qui, in corticibus cucurbitinis ad solem condensatus, ad nos transportatur. *Ejusdem virtutis cum Peruviano est, & commode in pilulis datur.*

Balsamum Orientale verum, Opobalsamum, Balsamum de Mecha, Ægyptiacum, Baume de Judée, ou de Mecha, Balsam von Mecha. Resina est liquida, limpida, albicans, saporis acris, amaricantis, aromatici; odoris fragrantis, grati. Fluit & colligitur ex arbuscula vulnerata, balsamifera, sub titulo Carpobalsami descripta. Cum emanat, tenuissimum & albo colore tinctum est, mox post paucos dies, color albus in viridiusculum mutatur, & consistentiam olei balsamum acquirit; demum, post aliquot annos, in consistentiam mellis liquidi, vel Terebinthinæ Venetæ, coloris aurei, abit. Carum atque valde rarum olim fuit: nunc vero, cum vires ejus magis innotuerunt, ab incolis Arabiæ, lucri causa, copiosius ac frequentius colitur, atque facilius obtineri potest; inprimis vero sincerum per Legatos ad aulam Turcicam, quibus ceu Munus a Turcarum Magnatibus offerri solet, nonnunquam ad nos venit. Ceterum maxima pars Opobalsami, quæ nobis venditur, *Balsamo de Copaiba adulterata est; imo ipsum Balsamum de Copaiba, cum Oleo e Carpobalsamo expresso mixtum, pro verò venditur.* Notæ sinceri & veri Opobalsami habentur: quod vehementis sit odoris, & quo magis recens est, acutioris, gratissimi, quod gustu sit amaricans, adstringens, modice acre, aquæ instillatum, tametsi parva sit gutta, supra totam aquæ superficiem expandatur, eamque liquatum totum supernatet, atque in ipsa coagulatum, totum stylo excipi ac auferri possit, quodque in laneam vestem fusum eam non, sicut oleum, inficiat, quanquam ei adhæreat; ætas vero Balsami ex colore & consistentia, uti supra monuimus, æstimari debet. *Balsamum hoc toto orbe celebratum, tam interne, quam externe in usum vocatur; confert asthmaticis, calculosis & pro medicamento habetur polychresto.*

Balsamum Rackasira, Baume Rakesira. Est Resina sicca, subdiaphana, ruro brunea, inter digitos ductilis, inter mandendum tenax dentibus adhærens. Americæ productum; arbor vero ignota. Cucurbitis inclusa nobis apportatur. Calore funditur. Accensa suavem spirat odorem. *Contra gonorrhæam & ulcera viarum urinarum laudatur.*

Balsamum Tolutanum, de Tolu, Baume de Tolu, Baume de Eustaque, Balsam von Tolu. Liquor est resinofus sive Balsamum, coloris ex pallido ad aureum tendentis, consistentiæ Terebinthinæ Venetæ, glutinosæ, saporis dulcis, aromatici; odoris fragrantis, grati. Prostat quoque siccum testis cucurbitanis inclusum. Arbor balsamifera Tolutana pumilam pinum referre nonnulli perhibent; sed de ejus charactere inter botanicos nondum satis constat. Tam sponte, quam post incisionem factam, Balsamum effluit. Advehitur ex America, ubi circa urbem Tolu colligitur, sed raro non adulteratum in nostris officinis invenitur. *Cum Opobalsamo multum convenit, & vulnera recentia ita consolidare, ut nullam cicatricem relinquant, perhibetur.*

Styrax

Styrax liquida, Storax liquide, flüßiger Storax. Est resinosa substantia, fusco grisea, tenax, consistentiæ melleæ, odoris ut plurimum gravis. Magna diffensio inter auctores est: An Styrax liquida naturalis, vel factitia sit? Sunt, qui putant, ex eadem arbore, quæ Ambram liquidam largitur, provenire. Certum est: styracem liquidam, uti in Officinis prostat, vel adulteratam, vel totam esse facticiam. *Calefacit & siccatur; raro tamen in usum venit, nisi in Unguentis ad scabiem & emplastris.*

Terebinthina communis, five vulgaris, Terebinthine ordinaire, gemeiner Terpentin. Est resina liquida, melleæ consistentiæ, ex abietis & pini arboribus extracta. Colligitur in multis Germaniæ & Galliæ provinciis. Eligenda, quæ pura, alba & fluida. *Uusus est in unguentis & emplastris; laudatur imprimis in scabie leprosa, aliisque cutis defædationibus.*

Terebinthina Veneta, officinalis, Terebinthine de Venise, Benedischer Terpentin. Resina est liquida, mellis recentis consistentia, coloris flavescentis, saporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati, *Laricis, folio deciduo, brevi, Cedrorum* in modum nascentis, conis parvis. Nascitur quidem Larix in regionibus pluribus etiam Germaniæ, sed modo in calidis Terebinthinam fundit; maxima pars Terebinthinæ Venetæ ex Gallia, ubi in silva Lionensi copiose colligitur, ad nos venit, & *Terebinthine du Bois de Pilatre a Gallis vocatur. Virtute vix a vulgari differt; liquidior tamen, purior, & oleo ditior est. Tam interne, quam externe in usum vocatur; calefacit, emollit, abstergit & incarnat; usus imprimis est in gonorrhœa debellanda, urina ciente. Drachma una vitello ovi soluta & aqua diluta alvum movet, atque ad ardorem urinae, lœcera renum & vesicæ magnopere commendatur.*

Terebinthina vera, de Cypro, de Chio, Terebinthine de Chypre, wahrer Cypri-scher Terpentin. Raro, aut nunquam in nostris officinis occurrit. Vulgari est spissior, coloris candido-flavescentis, ad cœruleum vergentis, odoris grati, & saporis acris, amaricantis. Tractu temporis Terebinthina de Chio solidescit, atque formam & substantiam resinæ pellucidæ, solidæ, coloris subflavi, quæ dentibus non adhæret, induit. In Chio & Cypro ex arbore *Terebinthino, seu Pistacia foliis impari pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis, Linn.* colligitur. *Præfertur reliquis, & ad Theriacæ confectiorem requiritur; substituitur vero plerumque Veneta, seu laricea, quæ, si viribus non æqualis, tamen haud multo inferior est.*

CAPUT XI.

DE SUCCIS CONDENSATIS ET CONCRETIS.

Acaciæ Ægyptiacæ succus, Suc d'Acacia veritable d'Egypte, Egyptischer = Schotten = Dorn = Saft. Ex Acaciæ Ægyptiacæ, (quæ *Linneo* est *Mimosa spinis geminatis distinctis foliis duplicato pinnatis: particularibus utrinque quibus pluribus*), filiquis immaturis succus exprimitur, & lento igne inspissatur, qui in substantia solida, foris coloris nigricantis, intus rufescentis, saporis acerbi, austeri, adstringentis advehitur. Nascitur in Ægypto, Deserto Lybiæ & Arabia. Eligendus, qui non nimis nigricans, nec friabilis, sed tenax est, atque totus in aqua solvitur. Spiritus vini rectificatissimus nihil vel parum inde solvit. *Theriacam ingreditur; raro tamen ad nos pervenit; hanc ob causam Acaciæ Germanicæ succum substituunt. Adstringit, refrigerat & siccatur.*

Acaciæ Germanicæ succus, *Suc de Prunelles sauvages*, eingetrockneter Schlehen-Saft. *Acacia Germanica, Prunus silvestris*, sub fructibus descriptus est. Succus exprimitur e fructibus maturis, atque lento igne in vase fictili terreo inspissatur. *Refrigerat & adstringit. Succo Acaciæ Ægyptiacæ substituitur.*

Aloë caballina, *Aloë caballine*, Roß-Aloe. Est succus *Aloës Guineensis Caballinæ*, vulgari similis, *Maculatæ*, succo foetidior. Odoris est nauseosi, picei, myrrhati; ponderosa, nec a fæcibus depurata, inspissata, coloris nigricantis.

Aloë hepatica, *Aloë hepatique*, gemeine Aloe, Leberfarbige Aloe. Succus est inspissatus, vel calore solis condensatus *Aloës vulgaris* C. B. foris color fuscus, intus flavescens, hepatis instar. Exprimitur ex foliis; saporis est amarissimi ingrati, parum adstringentis, odoris fragrantis, ad Myrrham accedentis. Colligitur in *China*, & inde advehitur; nascitur etiam planta in *Barbados*, *Americæ* Insula, & ibi succus inspissatur, qui sub nomine *Aloës Barbadosis*, in cucurbitis adfertur, & Succotrina Aloë haud inferior est.

Aloë Succotrina, Socotrina, lucida, *Aloë Succotrin*, feine Aloe, aus der Insul Socotora. Succus est gummosus & resinofus *Aloës veræ minoris, Succotrinæ, angustifoliæ, serratæ, spinosæ, floribus suave-rubentibus*, fusco-nigricans, e foliis vel vi expressus, vel e planta, circa radicem incisa, sponte destillans, atque a sole postea condensatus, coloris, quando teritur, crocei, saporis amari, odoris non ingrati. In Insula Socotora magnus est proventus hujus plantæ, & succus condensatus inde adportatur. Communis hucusque fuit opinio, Aloës species, quæ in Officinis prostant, ex una eademque planta colligi, atque saltem puritate inter se differre; ex præmissis vero innotescit, diversas Aloës esse plantas ac species. Aloë quidem Epatica vera & Succotrina ex eadem specie elici possunt, & tantum ratione patriæ differunt, illaque, quæ ex China transportatur, Epatica, ex Succotrina Insula Succotrina appellatur; Caballina vero e peculiari specie Aloës maculatæ colligitur foetorem nunquam totum amittit, si multoties etiam aqua solvatur, atque rursus inspissetur. Notæ genericæ Aloës sunt radix perennis, fibrosa vel tuberosa; folia longa, integra, Sedis fere accedentia. Flos monopetalus, tubulatus, infra inter ventrem prominens, supra angustior, ibique in sex segmenta scissus, nudus, sex staminibus præditus. Fructus oblongus, trilocularis, cylindraceus, hexagonus, foetus seminibus planis, quasi semicircularibus. Aloë eligenda Succotrina pura, lucida, odoris non adeo ingrati. Aloë Hepatica, quæ hodie a nonnullis Succotrinæ præfertur easdem notas bonitatis habet, colore tamen dilutior est; sæpius vero, imo semper Aloë Caballina pro Hepatica divenditur, quæ tamen ab illa facile odore nauseoso myrrhato distingui potest. *Aloë, præter vim purgantem, etiam calefacientem habet, sanguinem commovet, menses & hæmorrhoides ciet, lumbricos enecat; frequenter tamen in usum vocata noxia est, præsertim biliosis, hæcticis, ad hæmoptysin, fluxum hæmorrhoidalem nimium, & mulieribus ad abortum dispositis.*

Fuligo, Suie, Ruß. Est substantia sicca, nigra ex substantiis vegetabilibus & animalibus accensis sublimata, & ad solidas, quibus accrescit, parietes collecta. Splendens Spiegel-Ruß obtinetur ex caminis, qui fumum omnis generis lignorum suscipiunt, cujus partes constituentes refrigeratæ camino se agglutinant & in frustra excrescunt fragilia splendentia, nigerrima, Empyrevma olentia, gustu amara & acriscula. Fuligo continet salem ammoniacalem, oleum adustum, partes terrestres gummosas & resinofas. *Virtute gaudet resolvente & sudorifera. Laudatur in affectibus arthriticis. Datur ad drachmam dimidiam.*

Hypocistidis succus, *Suc d'Hypociste*. Substantia est nigra, nonnihil resinosa, aulteri, acidi & adstringentis saporis. Non solum ex Creta insula, sed etiam ex Gallia Narbonensi & Provincia, ubi planta copiose provenit, advehitur. Hypocistis planta est parasitica, quæ sub Cisto assurgit, cujus radicibus inhæret. *Linnaeo* vocatur: *Asarum foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis*. Tota abscissa contunditur, & succus expressus inspissatur. *Refrigerat, siccatur & adstringit. Ad Theriacam & Anthridiatum requiritur.*

Liquiritiæ succus, Glycyrrhizæ, *Suc de Reglisse en bâton, Süß-Holz-Saft, Lakrißen-Saft*. E radice Liquiritiæ exprimitur, ignis calore inspissatur, & in Trochiscos vel Magdaleones formatur. Affertur ex Hispania & Franconia, ubi in agro Bambergensi copiose Liquiritia colitur. Eligitur prior, qui totus in aqua solvit, & saporis est dulcis, parum amaricantis. *Demulcet, expectorationem promovet, nephriticis & tussientibus prodest.*

Lycii succus, *Suc de Lycium, Burdorn-Saft*. Extrahitur coctione & inspissatione e ramulis Lycii, arbuscula spinosa, frequenter in Lycia, Asiæ provincia, occurrente. Saporis est amari, aulteri & adstringentis, coloris nigri. In glebis advehitur; raro verum in usum venit. *Refrigerat & adstringit; ad ulcera oris & gingivarum masticatus commendatur.* Verosimile est, Gallorum *Grana d'Avignon* esse fructus arbusculæ, ex cujus ramulis hoc extractum excoquitur.

Manna Calabrina, *Manne de Calabre, Manna*. Est succus concretus, collectus ex variis Fraxini speciebus, in Calabria, Sicilia & agro Romano. Saporis dulcis, subacris, pinguis, odoris melliti. Arbores Fraxini diebus canicularibus, calidissimis horis, cælo sicco sponte emittunt succum viscidum, subdulcem, qui a sole condensatus & collectus, ulterius exsiccatur, & Manna vocatur. Spontanea *Manna*, a Nicolis *di Corpo* dicta, a die vigesimo primo Julii, ad finem hujus mensis usque, e novellis ramulis effluit; Julio desinente, corticem Fraxinorum incidunt, tunc a meridie ad sextam horam fluit idem liquor, & in grumos crassiores, caloris ope, cogitur, atque *Manna forzata* dicitur. Nonnunquam, ob hujus succi copiam, in cortice arboris elewantur tubercula, unde cortex hincit, & sponte succum plorat, qui solis calore in Mannam condensatur. Mannam non omnes Fraxini ac Orni arbores funt, sed iuniores tantum, quarum cortex non scaber, sed levis est. Optima est in granis, sive granulata, quæ ex Calabria adfertur, alba, parum flavescens, dulcis, linguam tamen modice mordens, levis; *Cannulata* dicitur, quæ ex Arbore vulnerata tillans, canna vel arundine excipitur, condensatur, & in frustulis longis advehitur. *Leniter alvum movet, abstergit. Pueris, mulieribus prægnantibus & senibus tuto dari potest. Dosis drachmæ duæ ad octo vel duodecim.*

Mel, Miel, Honig. Liquida crassiuscula est substantia, dulcis, ex albo flavescens, ab apibus, e variis vegetabilibus collecta. Sunt; qui credunt, Mel nihil esse aliud, nisi extractum Florum, cum subtiliori roris substantia conjunctum; alii Chylum apum in ventriculis earum consummatum, & vomitu intra favos rejectum esse contendunt. Certum est, Apes ad mellis generationem multum conferre, non solum colligendo mel e floribus, ubi a natura paratum prostat, sed etiam in ventriculo ulteriori coctione perficiendo, quamvis etiam fieri possit, ut mel, quod apes intra cavum proboscidis colligunt, quæ plena est granulis, sive glandulis, in ea pariter nonnullam mutationem subeat. Mel differt tam ratione coloris, quam loci & varietatis plantarum, ex quibus collectum fuit. Habetur *Album*, quod Virgineum vocatur, & ex novellis favis, vel juniorum apum examinibus, citra ignem, colligitur; *Flavum*, quod

quod vetustiores favi suppeditant. Pro diversitate loci & plantarum pariter deprehenditur differentia; ubi enim plantæ nobiliores proveniunt, mel etiam gratius & melius existit, quod plantas, ex quibus collectum fuit, redolet, & sapore prodit; sic *Mel silvestre* plerumque pinum & resinam redolet; Mel vero *Narbonense*, ubi Rosmarinus aliæque nobiliores plantæ occurrunt, delicatius deprehenditur, unde reliquis etiam præfertur. Vilioris est pretii, quod ex Polonia advehitur. *Mel calidum est, abstergit; nutrit, aperit, pulmonibus confert, urinam ciet; præcipue senibus & phlegmatici. convenit, junioribus calidisque subjectis parcius propinandum, biliosis & hystericis raro vel plane nunquam.*

Opium, Meconium Thebaicum, Opium de Thebes, ausgetrockneter Mohn-Saft. Colligitur e capitibus *Papaveris sativi*, maturitati proximis, vulneratis. Culter, huic negotio inserviens, quintuplici acie est instructus, qui una sectione quinque infligit vulnera longa, parallela. E vulnusculis statim promanat liquor lacteus, qui a sole condensatur, & postridie scalpro abstergitur; tum altera capitis facies eodem modo vulneratur, & Opium colligitur. Colitur expresse Papaver in agris & in plantis ramosis majoribus superflua capita amputantur, ut reliqua magis grandescant, & succo impleantur majoris efficaciam. Lachryma primæ collectionis præfertur, & majori pollet demulcendi virtute. Opium ita collectum aqua humectant, spatula lignea optime permiscunt, in glebas efformant, & foliis *Papaveris* plerumque involutum, vendunt divitibus sub nomine *Affion*. Pauperes ex foliis ac stolonibus *Papaveris* Opium speciem excoquunt, quam soli porro condensandam exponunt; hoc medicamentum *Pouss* vocant, quod nobis sub nomine *Meconii* venit, & vilioris virtutis & pretii est. Opium, quod in regione Thebaica, Ægypto confini, colligitur, optimum censetur. Copiosissima etiam in Natolia, Cilicia, Cappadocia, aliisque Orientalibus regionibus collectio est. Eligendum, quod coloris e nigro rufescentis est, ponderosum, densum, inflammabile ac ardens, sapore amarum & acre, odoris fortis, narcotici, nauseosi, quod facile aqua diluitur, aut solvitur, nec multas fæces relinquit. Gummosæ substantiæ plurimum, resinosa parum alit. *Variae virtutes Opio adscribuntur, quarum primariae somniferæ, anodynæ, diaphoreticæ & antispasmodicæ; Indi aliique Asiæ incolæ aphrodisiacas addunt. Certum divinum est Medicamentum, quo in Medicina vix aut nullo modo carere possumus; & si Medicis hoc remedio non esset prospectum, tradente Bontio, frustra in calidissimis Indiæ regionibus Medicinam facerent dysentericæ, cholerae, febribus ardentibus, ac reliquis biliosis affectibus, orgasmo turgentibus; sic etiam Confectiones illas celebres, Theriacam, Mithridatium, aliæque Philonia maximam suæ laudis & efficaciam partem Opio debere, extra dubitationis aleam positum est. Crudum apud nos raro in usum venit, sed plerumque Extractum vario modo paratum; an vero hac prætenso correctione revera corrigatur, vel potius castretur? lis inter auctores est. Dosis Opio vix determinari potest; sufficit unum aut alterum granum, imo præstat, in minima Dosi, exempli gratia, quartam granum partem, repetitis vicibus, quam majori, una vice, exhibere quantitate; præsertim in colica spasmodica caute cum illo mercandum, ne funesta paresis illam sequatur. Opio assueti facile majorem dosin perferre possunt, & prostant exempla inter germanos, qui spatio 24. horarum integram drachmam, immo unciam semis, absque ulla secuta noxa, devoraverunt. Spasmo cynico affecti fortiores opii doses non solum ferunt, sed etiam non raro inde convalescunt. Aliquo jure locum sibi hic vindicat.*

Sagu, Zagoe, nonnullis Sego, sunt granula pallida, milii, imo sinapeos femine paulo majora, quæ ex India Orientali afferuntur. Arbor ex qua Sagu colligitur, ad Palmas refertur, & apud Botánicos: *Palma Japonica*, spinosis pediculis, polypodii folio; *Palma Indica*, caudice in annulos protuberante distincto, fructu prunisiformi; *Pal-*
mam

am referens arbor, farinifera, audit. In eo plurimi conveniunt: Sagu parari ex
 rii generis Palmis, quarum non satis determinatus est character. In Insulis Moluc-
 s & Australioribus nec non a Borneo ad Siam usque copiose crescunt. Ex caudice
 almæ medullum eluunt, in pastam efformant & inter lapides foraminibus exsculptos
 nis ad instar coquunt, unde ei forma manet, sub qua ad nos venit. Granula sinapi
 mine vix majora in lacte vel jure carnis cocta, grandescunt ad hordei excorticati ma-
 tudinem. *Non solum delici loco habetur Sagu, sed & morbo consumptis & emaciatis*
nus est cibus, imo medicina refrigerans & demulcens,

Saccharum, Mel Cannæ, Zuccarum, Sucre, Zucker. Est succus ex
 undinibus sacchariferis expressus, dulcis, concretus, & in salis formam redactus.
undo saccharifera herba graminifolia est, floribus imperfectis stamineis, media inter Mi-
ceas & Arundinaceas. Radices sunt succulentæ, dulces, e quibus germina erum-
 unt, quæ transplantata adolefcunt, & in cannas, sex pedes, vel etiam quandoque
 tra longas, geniculatas, foliis angustis, striatis, circa genicula vestitas, excrescunt:
 ngosa medulla dulcissimo succo ubertim referta est. Cannas has, cum ad dimidiam
 altitudinem pervenerunt, abscindunt, atque, separatis foliis, succum certis ma-
 inis exprimunt, statimque, ne acefcant, in ahenis ebullire faciunt, despumant, &
 dito lixivio e cineribus & calce viva, purificant, atque ad justam consistentiam re-
 gunt. Saccharum hoc, quod farinaceum appellant, postea rursus solvitur, magis
 rificatur, &, pro gradu puritatis, & ratione formæ, varias dat Sacchari species,
 od vel in cistulis, vel pyramidibus; variæ magnitudinis, charta cœrulea involu-
 m, ad nos venit, atque vel *Saccharum Farinaceum*, vel *Melis*, *Refinatum*, *Cana-*
nse & Finissimum vocatur. *Saccharum Thomæum*, *Rubrum*, *Thomas Zucker*, nomen
 Insula St. Thomæ habere ajunt; paratur vero etiam e Syrupo, qui in efformatione
 ramidum saccharinarum exstillat, & ad crystallisationem haud idoneus est; propter
 ntorem & pinguedinem facile humescit ac diffluit; saporem cæteris habet dulciorem
 melleum, haud gratum. Quo solidioris & ficioris consistentiæ est, eo melius ha-
 tur.

Saccharum liquidum, Sucre liquide, Syrup-Zucker. Liquor melleus est
 scus, & nunquam ad solidam consistentiam perducipotest, &, si in eam perducatur,
 men sponte iterum diffluit, e conis pyramidatis exstillat, & vilissimum omnium est.
Saccharum candisatum, Canthum, Gallis Candi, Candel-Zucker, Zucker-Candi. pa-
 tur, cum Saccharum pyramidale in aqua solvitur. Solutio ad certum gradum cry-
 allisationi aptum, lente inspissatur, & in vasis, quæ fila hic ibi trajecta habent, ad
 ystallisationem reponitur. Quo purius adhibetur Saccharum, eo albidiores & pul-
 riores ex eo nascuntur crystalli, unde *Saccharum candisatum crystallinum album*, vel
brum, diversæ speciei, obtinetur.

Usus Sacchari est notissimus, & tam medicus, quam culinaris. Sunt, qui credunt, Sac-
arum mucaginem in ventriculo generare; quod tamen non fit ex Sacchari lentore, cum sit.
il potius Essentiale resolvens, & hoc respectu usus saccharinorum in febribus intermittenti-
is, ex visciditate & lentore humorum, & obstructione ortis, non solum plane innoxius,
ad potius commendandus est, juxta nonnullos. Externe ulceribus sordidis mundificandi
spargitur.

Scammonium, Scammonæa, Scamonée, purgirender Winden-Saft.
 Est succus resinofus concretus, e radice *Convolvuli Syriaci*, flore majori, *Scammonæa*
icti, vel *Convolvuli foliis sagittatis poslice truncatis, pedunculis ramosis inflatis Linn.* per
 ncisionem prolectus, vel etiam expressus. Nascitur planta in regionibus calidioribus,
 ræsertim in Syria, circa Antiochiam, in Lesbo & Samo insulis. Optimum censetur

Scammonium Aleppense, & illi, quod e Smyrna venit, longe præfertur. Sit purum, leve, nitidum, splendidum, resinofum, friabile, madefactum lactescens, & linguæ admotum non vehementer acre & urens. *Purgans est catholicum, & bene operatur. Male quidem apud nonnullos audit Scammonium, & sunt, qui illi vim drasticam inflammatoriam, & quod cruciatus & tormina excitet, adscribunt: Verum enim vero Scammonium, si caute adhibeatur, & non delicatulis, siccis, hæticis & debilitate ventriculi laborantibus propinetur, semper bonum edit effectum præsertim, si per liquiritiæ decoctum, ut in posteriori parte hujus Dispensatorii describitur, correctum est, atque salibus permixtum in usum vocatur. Dosis grana tria, ad duodecim. Succis condensatis & concretis subjungimus aliud concretum, terreo-acido-oleoso-falinum, quod*

Tartarus, Tartre, Weinstein, vocatur, & Sal est Essentiale Vini, quo dolia in quibus vinum asservatur, intus quasi incrustantur. Vel ruber, vel albus est; vinum rubra rubrum, alba album Tartarum largiuntur. Optimus censetur albus, cui nullæ fæces adhærent, & qui cristallis albis in superficie ornatus est. Hispanica, Hungarica & dulcia Gallica vina parum suppeditant; Rhenana, Mosellana & Franconica magnam, Neccarina haud ita largam deponunt quantitatem. Difficile, & non nisi in vigecuplo aquæ ferventis, solvitur. Crudus, si in usum vocatur, aqua tepida prius ablui & iterum ficcari debet. Sed si duabus & dimidiæ partibus Cremoris tartari addis Boracis, salis fere æque difficulter solubilis, mixtum habebis in aquæ triplo solubile. Sunt, qui ita ablutum etiam cristallis præferunt, atque a drachma una ad duas exhibent. *Purgat primas vias, absque ulla molestia, incidit, atque resolvit summumque est corrigens biliosorum & acrium humorum. Nullum, præter Tartarum, cognitum est corpus, quod plus aëris elastici, dum crematur vel destillatur, generet, & tanto vapores omnino incoërcibiles exhalet. Non solum ad usus medicos & chemicos, sed & varios mechanicos expetitur.*

Terra Japonica, Terra Catechu, Cachou, Japonische Erde. Ad vegetabile regnum pertinet, estque succus condensatus, ex variis vegetabilibus expressus basin succus Acaciæ Orientalis constituit, vel secundum C. B. fructus sessilis, Palma Arecciferæ, qui *Fausel* dicitur. Advehitur ex India Orientali, Pegu, Malabaria Bengala & Zeilon. Eligenda resinoso-gummosa, dura & purpureo nigricans, & quæ facile in aqua tepida solvitur, menstruis tamen spirituosius pariter auscultat. *Adstringit & in fluxionibus alvi & hæmorrhagiis nimis adhibetur.*

CAPUT XII.

DE FUNGIS ET MUSCIS.

Agaricus albus, Agaricum, Agaric, Lerchen-Schwamm. Est excrescentia fungosa arboris *Laricis*, rotundo-angulosa, inæqualis, pugni, non raro hepatis infantis magnitudine, substantia interna candida, friabili, externa corticosa callosa, cinerea, subrufa, sapore subdulci, mox amaricante & acri, parum adstringente. Signa bonitatis sunt: ut sit fragilis, candidus, & splendens atque levis. Larix arbor juvenis Terebinthinam, quam Venetam vocant, fundit, senescens vero loco Terebinthinæ, Agaricum progignit. In Galliæ Provinciis, Alpibus & montibus Tirolensibus provenit. *Bilem, serum & pituitam educit, asthmaticis & tussi laborantibus confert. Veteres eum adhibere solebant, dum a remotis locis materiam peccantem educere voluerunt. Etiam menstrua ducit; unde & prægnantibus, monente Rajo, ejus usus interdicitur. Crudus nunquam, nisi in infuso, Trochiscatus in pilulis datur. Dosis in infuso drachma*

*drachmæ duæ vel tres. Adduntur pro stimulo Sal gemmæ vel Cremor Tartari; pro cor-
tione Zingiber vel Caryophylli.*

Boletus cervinus, Fungus cervinus, Tubera cervina, Lycoperdon fo-
dum, Linn. Boletus cervinus, Hirsch-Brunst. Est fungus inæqualis, rotun-
as, magnitudine juglandis nucis, aliquando minoris, sub cortice coriaceo fusco in-
udens medullam pulverulentam, ex purpureo nigrescentem subtilissimam, quæ ex-
ccata nullius est odoris. Nascitur in silvis. *Recens habetur pro aphrodisiaco, exsicca-*
interior pulverulenta substantia vero, vix operæ pretium præstabit; ad tingenda Balsa-
orum corpora autem utilis est. Sunt, qui *Fungum Phalloidem foetidum*, penis imagi-
em referentem, & qui insigni odore cæteros omnes antecellit, atque in silvis, men-
Junio & Julio, in locis umbrosis crescit, pro cervino Boletto, qui e spermate cervi
tus fit, false offerunt; qui tamen potius ad noxios fungos pertinet, & nullius usus
in Medicina.

Bovista chirurgorum, Fungus rotundus, orbicularis, pulverulentus,
reptus lupi dictus, sive ovatus, Lycoperdon subrotundum lacerato-de-
scens, Linn. Vesse de Loup, Rosist. Vocatur etiam *Lycoperdon*, & ad fun-
s pertinet noxios. Est levis, & non raro magnitudinem pugni excedit, cortice
nui cinereo vestitus, medulla, sive interiori parte spongiosa & compressa, pulverem
btillissimum, fuscum profundit. In pascuis & pratis siccioribus nascitur, atque co-
ose circa pagum *Deinacum*, ob acidulas ibi scaturientes, celebrem, in silva occurrit.
adstringit & siccat, & abs Chirurgis vulgo ad hæmorrhagias sistendas in usum vocatur
ternum.

Fungus Melitenfis, Cynomorion Coccineum, Linn. Scapus exsiccat, &
rie flexus radicis speciem præ se fert. Profunde est striatus, extus nigricans intus
luteo rufescens, odoris nullius, saporis falsi, levissime adstringentis. Parasitica est
anta, radicibus variarum arborum Italiæ, Mauritanie &c. innascens. *Ad sistendas*
hemorrhagias ad drachmam unam pro dosi commendatur. Cruentatis gingivis, sub forma
ntifricii atteritur.

Fungus Salicis, Peziza Auricula, Linn. Eponge de Saule, Weiden-
schwamm. Fungus pileatus, lamellatus, pileolo, dum recens, superius flavesc-
nte, lamellis candicantibus, salici adnascitur. *In phthisi, etiam consummata & de-*
orata quasi curanda; celebratur; bis de die, a drachma semis ad integram, ex ovo sor-
ti, vel in pulvere, saccharo mixtus, commendatur; ab aliis vero ad noxios fungos refertur.

Fungus Sambuci, membranaceus, Auriculam referens, Auricula Ju-
æ, Oreille de Judas, ou de Juif, Coloris e cinereo nigricantis, in caudice Sam-
uci nascens, Hollunder-Schwamm, Judas-Ohr. Fungis perniciosus accen-
tur; in aqua mollescit, & illam mucilaginosam reddit. *Adhibetur tanquam refrige-*
ans in oculorum inflammationibus, in aqua rosarum maceratus; additur etiam nonnunquam
argarismis, ad faucium inflammationem.

Helminthochorton, Lemitochordon, Melitochordon, Coralline de Corse,
de Maltze. Substantia est ex valde tenuibus fibris sibi invicem intextis constans,
fa, odoris marini nauseosi, saporis salini; inter dentes non stridula, sed lentescens.
mari, quod Corficam alluit, colligitur. Conservæ species esse videtur. Inhæren-
pus fordibus aqua elutis depuratum cum acidis non effervescent. Aqua infusum rube-
nem exuit, & cito putrescit, multum mucilaginis aquæ, in qua agitur impertit,
Mm 2 pauxil-

pauillum admodum resinæ vehit & fere tantundem salis marini, salis mirabilis, seu lenitidis & Alkali mineralis. *Ufus ejus aliquot abhinc sæculis in Corsica scopo anthilminthico celebratus, sed paucis retro lustris in Gallia comprobatus; invaluit nunc per totam Germaniam. Datur ad drachmam unam in substantia. Cum aqua etiam tam infusum, quam decoctum efficaciam servat.*

Spongia Gynosbati, seu Fungus Bedeguar, Éponge de Cynorrhodon, Schlaf-Kunzen, Schlaf-Aepfel, Haagenbitten-Schwamm. Pila hirsuta seu excrementia quædam spongiosa, hirsuta, quæ nonnullis *Fungus comosus* vocatur & in meditullio alveolos, insecti sobole repletos, habet, atque frutici *Rosæ silvestris* adnascitur; coloris est rufi herbacei, odoris, dum recens, rosacei, magnitudinis nuncis juglandis, sæpe ad Mali mediocris accedentis. Ortum habet, sicut Galla, ab insectorum punctura, ovula deponentium, e quibus primo vermiculi, postea Nymphae & tandem Muscæ, colore ex aureo viridi corruscantes, prodeunt. *Adscribitur illi ut adstringens, antinephritica, si in pulverem trita, a scrupulo uno ad duos, exhibeatur, & ab aniculis hypnotica, si pulvinari subdatur.*

Muscus Acaciæ, Mouffe de Prunier sauvage, Schlehen-Moos. Muscu vocatur substantia illa exsucca, incana, tenuibus filis contexta, arida, villosa, arboribus adultis adnascens, *Bryon* quoque dicta. *Muscus, qui Acaciæ Germanicæ vel Prunæ silvestris adnascitur, adstringit, & ad balnea & fetus adhibetur, in prolapsu uteri & ani, aliisque morbis, ubi adstrictione opus est.*

Muscus arboreus, quernus, Mouffe de Chêne, Baum-Moos, Eichen-Moos. Eligendus albus sive candidus, prolixus, qui barbæ instar e ramis *Quercuum* adultorum pendet. *Adstringit, & insigne est anodynum; hinc in tussi clangosa ferina, infusum hujus Musci laudatur. Ventriculum roborat, & fluxiones quascunque prohibet.*


Muscus corallinus, sive marinus, inter Marina quærendus, sub tit. Corallina

Muscus terrestris, clavatus, Lycopodium, Mouffe terrestre, dictus, seu Seminibus descriptus prostat. *Adscribitur plantæ huic vis singularis contra Plicam Polonicam. Virtutem habet traumaticam; scorbuticis, tussientibus, phthysicis, hæmoptycis, calculosis & asthmaticis medetur. Exhibetur in infuso, cum aqua fontana, vel vino albo.*



CLASSIS TERTIA.

REGNUM ANIMALE.



DE ANIMALIBUS ET EORUM PARTIBUS.

Ægagropilæ, Pilæ Damarum, Rupicaprarum, Ægagropila, Bezoard d'Allemagne, Genssen-Kugeln. Ita vocantur, quia in primo, seu secundo ventriculo horum animalium inveniuntur. Raro sunt rotundæ figuræ, frequentius oblongæ, pondere levissimæ. Duplici constant substantia, quarum interior fibri

is radicum, aut filamentis & cauliculis concreta esse videtur; exterior cortex est quasi coriaceus, mollis, interdum etiam lignosus, rarissime lapidescens, coloris utrimum cineritii, fusci, ex luteo obscuri, vel ex pallido viridescantis. Magnitudines sunt variæ, quæ tamen pugni magnitudinem vix vel nunquam excedit. Non in omnibus Damis & Rupicapris pilæ hujusmodi reperiuntur; concretum enim sunt præ-naturale, quod de dispositione animalis morbosa testatu. Per cohæsionem fibrarum cum succo plantarum, nondum perfecte resoluto, ac muco ventriculi, successive mari, vero est simillimum. Ex Helvetia & Tirolensibus Alpibus, quas Rupicaprae colunt, ad nos portantur. Sunt, qui ex fibris herbarum & radicum, additis pilis, hujusmodi Pilas efformare student, atque emtores decipiunt, quæ tamen fraus ab excitato facile detegitur. Eligantur pilæ non adeo magnæ, leves & tamen solidæ, non ex pilis, sed potius e fungosa, fibrosa & foliacea substantia concretæ. *Adscribitur vis antepileptica, cephalica, alexiterica, & Bezoar Germanicum appellantur; prodesse dicuntur in morbis malignis, partu difficili, atque arthriticis commendantur. Sed nostris temporibus usus earum exoluit.*

Album Græcum, Stercus caninum album, Crotte de Chien, weisser Hien. Sunt excrementa alvina canis, ossibus nutriti, alba, non foetentia. *Sic- & abstergit, discutit & apperit. Utiliter interne in Colico dolore & dysenteria, externe ad anginam & ulcera maligna exhibetur.*

Alcis Cornu, Corne d'Elan, Glends-Horn.

Alcis Ungulæ, Ongle d'Elan, Glends-Klaven.

Alce est animal gregarium, bisulcum, cornibus palmatis, in hoc genere maximum; utat cornua, sicut cervus. *Tam Cornu, quam Ungula, præsertim vero hæc, pro in- dubili Antepileptico habebatur, & vix ullus prostat antepilepticus pulvis, cui non admixta Ungula Alcis. Incenditur etiam & naribus admovetur, ad arcendos insultus epilepticos. Cornu cum Cornu Cervi convenit, cum quo easdem virtutes habere a sanioribus creditur.*

Apri Dentes, Dents de Sanglier, wilde Schweins-Zähne. Aper ad por- cum genus pertinet, non ruminat, & bisulcus est. Reliqua sunt notissima. *Dentes specificè in pleuritide vulgo commendantur. Vide Præparata.*

Aselli, five Millepedes, Millepedæ, Centipedes, Cloportes, Mauers- sel, Keller-Esel. Sunt insecta terrestria, non alata, exsanguia; adscribuntur a nonnullis viviparis, ab aliis oviparis; gaudent quatuordecim pedibus, utrimque sep- tem, latera peripheriæ corporis ferræ modo sunt dentata, cutim habent quasi squa- mosam, e novem articulis inæqualibus constantem, quibus sese contrahere & com- micare in orbem piluliformem possunt; instructa præterea sunt antennis prominenti- bus; degunt in cellis, aliisque locis uliginosis, in rimis parietum, & tepido vivunt humore. *Vires possident específicas in visciditate tartarea resolvenda, in obstructionibus viscerum aperiendis, adeoque in morbo regio, dolore nephritico, asthmate, & difficultate urinae adhibentur.*

Bezoar Occidentalis, Bezoard Occidental, Occidentalischer Bezoar. Est concretum lapideum in *Capricervæ occidentalis, Cuguacu*, ventriculo natum. Orien- tali est fragilior, & laxior, minus levis, e multis sibi invicem impositis lamellis, multo crassioribus, coloris & magnitudinis varii, modo nigri, modo cinerei, modo viridescantis. In meditullio plerumque reperiuntur vel paleæ, vel pili. Lapidem hi Bezoardici non in omnibus reperiuntur *Capricervarum* ventriculis, sed, sicut de *Æga-*
Nn
gropilis

gropilis notavimus, præternaturalia & morbosa concreta esse videntur. Propriū hoc habet India occidentalis, quod vix reperiatur animal, in quo non tales lapides inveniantur, qui omnes, sub nomine Bezoar occidentalis, adferuntur, & ideo differētis figuræ & coloris sunt, atque tam vili pretio, respectu orientalium, venduntur. *Adscribitur illis vis alexipharmaca, sudorifera, antepileptica, cordialis, absorbens, acrimoniam temperans, & urinam movens. Sed experimenta prudenter instituta a huc desiderantur.*

Bezoar Orientalis, Bezoard Oriental, Orientalischer Bezoar. In Capricervæ orientalis, *Gazellæ indicæ*, cornibus rectis, longissimis, nigris, prope caput tantum annulatis, ventriculo reperitur. Patria hujus lapidis est Persidis provincia *Laar*, aliæque. Animal pilis brevibus e cinereo rufis vestitur, magnitudinem Capri domesticæ, ejusdemque caput barbatum obtinet; cornua fœminæ sunt vel nulla; vix exigua; Hircus longiora & liberalius extensa gerit, annuli in cornibus annos ætatis animalis referunt; timidissimum & fugitivum est animal, atque asperrimos montes inhabitat; non autem in omnibus regionibus, quas inhabitat, lapides in hisce gignuntur animalibus. Lapidem Bezoar ferre judicantur annosa, valde macilenta, qui circumspectius incedunt, & insidias magis, quam sodales, metuunt. Locus, in quo lapis invenitur, est Pylorus, sive productio quarti, quem vocant, Ventriculi fundum, ad cujus latus plica quædam, sive scrobiculus, mucoso humore oblitus, lapillum fugerit. Lapidem hos, vivente animali, nondum habere eandem duritiem, sed molliores & friabiles esse, perhibent; propterea recens exacti ne improvide frangantur, & contactu nitorem perdant, ab inventore ore excipi, & aliquamdiu foveri, donec induruerint, mox Gossypio involvi & asservari solent. Notæ bonitatis sunt, quod lame latius sint concreti, quod cavitas interna eorum non plane vacua, quod in aquam injecti ejus limpiditatem non turbent, nec pondere vel diminuuntur, vel augeantur, quod chartæ, creta vel calce; oblitæ, affricti, lineam ducant ex luteo viridem; falsum vero est, quod legitimi exinde cognoscantur, quando candens acus intrudi possit, adulterini enim, ex materia resinosa compositi, acum etiam admittunt, legitimi vero plerique ita indurati sunt, ut acum candentem respuant; nec etiam nota est falsitatis lapidis, si interiores laminæ deterioris substantiæ & coloris sunt; ea enim disparitas ex diversitate alimenti provenit, dum genitrix bestia locum pastus mutat. Præ genuinis porro lapidibus orientalibus illi habentur, qui inter resinæ & lapidis substantiam ambigunt, contusi in Spiritu Nitri vel Salis dissolvuntur, ac Menstruum satis rubente colore imbuunt. *Bezoar ut alexipharmacum, absorbens acidum, & humores resolvens a nonnullis adhuc prædicatur, atque ad multas maximam partem exoletas compositiones Pulverum Bezoardicorum requiritur.*

Bezoar sive Lapis Coromandel, Bezoard de Coromandel. A regione, unde advehitur, ita dictus. Variæ hi lapides sunt magnitudinis & coloris diversi. Alii enim dilute virides sunt, alii magis ad fuscum colorem vergentes, alii dilute flavescent, alii ex modo dictis coloribus sunt variegati. Colorem facile attritu chartæ communicant. Intuitu molis sunt leves, substantia fissiles atque friabiles. In centro ut plerique lapides hujus originis, straminum, foliorum aut pilorum particulas inter se convolutas exhibent. Igni admoti flammam concipiunt, & odorem haud ingratus spargunt. Sunt, qui factitios hos lapides, autumant; Certum vero est, in ventriculis & intestinis Bubalorum inveniri, atque genuinas esse concretiones in modo dictis animalibus ortas. Bestiæ hæc in Orientalibus Indiis admodum sunt frequentes, atque loco boum & equorum ad agriculturam adhibentur. Vagantur per sylvas, foliisque arborum gummoso - resinifarum vescuntur, quæ procul dubio ab ipsorum stomacho difficulter

difficulter soluta coagulum hoc formant, quod appositione novæ lamellæ sensim augetur, & in calculi mollioris foliacei substantiam abit. Copiose sæpius inveniuntur, & vel a bestia cum excrementis ejiciuntur hi lapides, vel mole & numero graves hospitum interficiunt. *Vires hujus concreti habentur bezoardicæ ac sudoriferæ, & in febribus malignis commendatur. Dosis scrupulus unus & ultra.*

Bovis sive Tauri Fel inspissatum, Fiel de Boeuf épais, eingetrocknete Ochsen-Galle. Lento igne ad Extracti consistentiam evaporatur & servatur. *Plerumque ad unguenta & emplastra contra vermes adhibetur; interne sumtum alvum movet, & vermes enecat. Bilem animalium in genere magnopere deprædicat in corrigendo glutinoso spontaneo L. B. van Swieten.*

Bufones exsiccati, Rubetæ terrestres majores, Crapaux secs, gedörrte Kröten. Animal hoc omnibus est notissimum. A veneno Bufonis oritur tumor, pallor, ad buxum colorem inclinans, respiratio difficilis, anhelosa, oris halitus gravis, vertigo repentina, syncope, convulsiones, interrupta labia, linguaque nigricans & balbutiens, obtusus torvus, vomitus effrænis, sudor frigidus, tandem mors. *Antidota hujus veneni habentur vomitus ex hydrelæo, theriaca, mithridatium, lac præsertim humanum. Hasta vel palo perfossus siccatur in aëre; uritur in olla, & pulverem vel cinerem contra hydropem summis efferunt laudibus; urinam enim potenter movere fertur. Recentiorum consensu præpostere in medicinam vocatur.*

Cancrorum Chelæ, seu Ungulæ, Pattes des Ecrevisses de Mer, Meer-Scheeren. Sunt denticulatæ Cancrorum marinorum forcipes. *Adscribitur illis vis alexipharmaca, antifebrilis, nephritica & absorbens. Ad Pulverem requiruntur bezoardicum Anglicum.*

Cancrorum oculi, Lapides, Lapilli, Yeux d'Ecrevisses, Krebs-Augen, Krebs-Steine. Sunt lapilli crustacei, duri, albi, orbiculati, pisorum & lentium, non raro fabarum magnitudinis, una parte compressi & sinuati, acetabuli in modum, altera convexi, saporis terrei, ex Astacis fluviatilibus collecti. *Observationes de lapillorum horum ortu sunt sequentes: Astaci quotannis ægrotant, ante testarum exuviam; vigente hoc morbo, per dies novem & amplius, velut semiexanimæ ac immoti sunt; hoc interim spatium stomacho illorum obducitur membranula nova, inter quam & stomachum veterem, ex utroque latere, colligitur liquor quidam lacteus, qui sensim in lapideum obdurescens substantiam, superficiem convexam, illa vero parte, qua ventriculum attingit obducitque, concavitatem exhibet; vetus autem seu interior ventriculus abit in mucilaginem, & Astaco nutrimentum præbet; membranula vero, in qua liquor lacteus collectus fuit, ventriculum novum constituit, qui in veteris locum succedit; liquor lacteus partim coagulatur & abit in substantiam lapideam, quam Lapides seu Oculos Cancrorum vocamus, partim vero in nutrimentum animalis cedit; tandem ipsi lapilli resolvuntur, & cibi loco consumuntur; nihil enim interea, quam diu hi lapilli ad stomachum hærent, Astacus edit, nec quicquam in ejus ventriculo reperitur, vivitque viginti septem circiter dies, tam ex veteri stomacho suo, sensim absumptum, quam ex lapidibus postea resolutis. Oculi seu lapides cancrorum e vivis desumpti ad coeruleum vergunt colorem, e coctis vero albescent. Tanta prostat horum lapidum quantitas, ut vix credibile videatur, omnes esse genuinos. E Polonia, Borussia, Bessarabia & Ucraina maxima pars adfertur, ubi cancrorum tanta est copia, ut fues illis saginari possint. Modus colligendi hic est: Cancri vivi contunduntur in*

Magma, quod aqua diluitur, sic lapides fundum petunt, qui ficcati servantur. Adulterari solent vel ex cretra, vel terra alba confectis, qui tamen facile a genuinis, qui e lamellis sibi superincumbentibus vel striis compositi sunt, dignoscuntur. Affusa calida fraudem optime detegit. *Resolvunt, abstergunt, absorbent, urinam & sudorem movent. Usus est frequentissimus in pulveribus. Supra porphyritem in inpalpabilem pulverem redacti, non semper tuti, cum glutinosis enim in massas difficulter resolubiles abeunt.*

Cantharides, Muscæ Hispanicæ, Meloë vesicatorius Linn. Cantharides, Spanische Fliegen. Sunt insecta alata, oblonga, pedata, vaginipennia, coloris lucentis aurei & viridis, saporis acris, picei, caustici, erodentis, odoris, cum recentia, foetidissimi. Inveniuntur in regionibus calidioribus, Hispania, in Gallia in agro Parisiensi; occurrunt etiam in Germania, & fere tota Europa. Amant, præcæteris, Fraxinum, Ligustrum & Populum albam; reperiuntur tamen etiam super aliis plantis. Cantharides nostræ quidem recentes eundem edunt effectum, ac e regionibus calidioribus allatæ; virtus vero earum brevi perit. Extant diversæ magnitudinis; præferuntur vero minores, integræ recentes, non pulverulentæ &c. Per triginta annos & ultra in officina servatas in vase vitreo satis negligenter clauso vim suam retinuisse observat L. B. van Switen. *Vim habent causticam, quæ in sale acri consistit, potenter urinam cient, venerem stimulant, & pro specifico in hydrophobia habentur. Hungari cantharides in aceto conservare, & tam hominibus, quam equis & vaccis &c. a canibus rabiosis demorsis exhibere solent. Suspectus vero atque noxius est earum internus usus; igitur nunquam, nisi summa necessitate, exhiberi debent, incipiendo a dosi minori, grano dimidio scilicet, & si cum levamine ægroti, ad granum integrum vel duo ascendere licet. Frequentissimus est usus in vesicatoriis. Ardorem urinæ & mictum cruentum a Cantharidibus excitatum, lac, emulsiones, & oleum amygdalarum dulcium, vel seminis lini, mitigat.*

Carpionum Lapides, Pierres des Carpes, Karpfen-Stein. Sunt officula triangularia cartilagine obducta, in acetabulo, quo spina dorsi capiti conjungitur, posita. E Carpionibus sive Cyprinis colliguntur. *Pleuriticis, colicis doloribus vexatis, calculosis & epilepticis commendantur.*

Castoreum, Castorée, ou Castoréum, Bibergail. Folliculi sunt duo, qui tam in maribus, quam in foeminis Castoris Animalis, utrinque in inguinibus statim sub cute, Ovorum gallinaceorum magnitudine, & sæpius majores, reperiuntur, qui liquorem oleosum, vivente Animali, fundunt; exsiccati vero, cum contentis, Castoreum exhibent. Castor animal est amphibium, quadrupes, & magnitudinem felis superat, pedes anteriores sunt canum instar, quibus terram fodit, posteriores anserum pedibus consimiles, quibus inter natandum potissimum utitur; caput non admodum dissimile est Muris montani, cauda non tam piscis caudam, quam piscem integrum refert, plano-compressa est, & pilis in totum nudata, quatuor circiter digitos lata, cineritii coloris, multis rugis & anfractibus, gyrisque instructa, excavata quasi. Castores quidem semper ad ripas fluviorum specus suos ædificare solent, & in Germania quoque nonnunquam, frequentius in Moscovia & Polonia occurrunt, plurimi vero in Canada capiuntur. Probatur Castoreum, quod ex Russia advehitur, ponderosum, carnosum, colore fuscum, saporis acris, odoris gravis. Castoreum Canadense sive Anglicum, quod folliculis minoribus constat, substantiam aridam, minus odorem includentibus, minoris est virtutis, sed multo etiam minoris pretii. *Calefacit, attenuat, aperit, flatum discutit, nervos roborat, venenis resistit anodinum, uterinum est, menses promovet. Dosis grana quatuor ad decem.*

Cervi Cornu, Corne de Cerf, Hirsch-Horn. Cervus animal omnibus cognitum, & cornibus quotannis deciduis, solidis, ramosis, ab aliis ruminantibus cornigeris facile distinguitur. *Adscribuntur cornu crudo vires bezoardicæ; hinc in variolis, morbillis, aliisque morbis malignis, commendatur; Gelatina phthysicis & tabe consumptis præscribi solet. In Officinis prostat Cornu Cervi philosophice præparatum, Cornu Cervi ustum & raspatum.*

Cervi Priapus, Priape de Cerf, Hirsch-Nuthe. Penis Cervi commendatur adversus venenatos morbos, pleuritidem, colicam & diarrhæam; pellit urinam & calculum, atque contra mictum cruentum ac ad venerem stimulam celebratur. *Uusus est in pulveribus & electuariis; sed nostris temporibus obsoletus.*

Ceti Priapus, Priape de Baleine, Wallfisch-Nuthe. Est Penis Balænæ mysticeti, incredibilis magnitudinis, tres & plures ulnas longus nonnunquam invenitur; substantia est carnosa, semipellucida, quasi cornea, odoris non ingrati, saporis carnulenti. *Credunt Venerem excitare; vim suam vero magis adstringendo exserit; hinc in diarrhæa & fluxionibus sanguinis adhiberi potest. Uusus est in pulveribus vel electuariis. Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.*

Ceti Sperma, Sperme ou Blanc de Baleine, Wallrath. Est pinguedinosa, alba, squamose, tenera, mollis, quasi ex parvis fursuraceis squamulis composita substantia, saporis oleosi, odoris unctuarii. Veteres persuasi fuere, substantiam hanc, quam sperma Ceti vocamus, revera esse semen, five Ceti sperma; hodie vero edocti sumus, eam potius esse pinguedinosam materiam, cerebro circumfusam, & ipsissimum pingue cerebrum Balænæ, five Ceti dentati, quæ Orca, Byoris, vel Cachelot, *Phyfeter macrocephalus dorso impenni, fistula in cervice, Potfisch, Nord-Caper*, vocatur. Intra horum piscium crania, imo per totam carneam substantiam piscis tanta hujus materie quantitas invenitur, ut ex unico aliquot tonnæ repleri possint. Materia hæc, postquam ab oleosa substantia, transcolatione per saccum laneum est separata, maceatur in lixivio, ex Calce viva & cineribus facto, & manibus probe subacta per viginti quatuor horas relinquitur. Altero mane per saccum pilosum lixivium exprimitur, & preparatur, quodque restitit, aqua pura abluitur, super linteam explicatur, & digitis eliducitur ac exsiccat; si non satis album deprehendatur, denuo cum lixivio subigitur, atque præscripto modo tractatur. Eligendum est Sperma Ceti probe candidum, pingue, recens, non flavum, nec rancidum. *Resolvit, demulcet, anodinum & cosmeticum est. Cum vitello ovi & melius adhuc cum Gummi Arabico subactum, commodissime ropinatur.*

Coccinilla, Cochinilla, Cochenille, Coccinell, Ruzenell. Insectum est, quod in Ficus Indicæ, Tunæ dictæ, furculis colligitur. Initio velut vesica quædam exigua apparet in furculis modo dictæ Opuntia, five Ficus Indicæ, quæ postmodum calore solis in vermiculum Anthemitem evadit, qui processu temporis in insectum scarabæiforme parvum, quod *Scarabæus nigricans alarum alius rubicundus limbis*, a Meriana in *Descript. insectorum Surinam* appellatur, abit. Hæc insecta, cum jam debitam maturitatem adeptæ sunt, fumo denso ex materia aliqua combustili, ex ea parte, unde ventus in frutices, quos insecta depascuntur, spirat, sita, excitato, substratis prius sub fruticibus linteis, enecantur. Ita fumo suffocata, levi fruticum concussione, in lintea decidunt, adeoque magna copia, parvo vel nullo ferè negotio, colliguntur; deinde super lintea expansa, in arenoso quodam aprico loco, solis calore exponuntur, donec corpusculis contractis, exsiccantur, quæ manibus leniter confricata, alis & pedibus decedentibus, in grana abeunt. Ex nova Hispania & Mexico advehitur.

tur. Eligatur integra, granulata, quæ albicet externe, trita vero purpurea, ponderosa sit. *Adscribuntur Coccinillæ vires cardiacæ, sudoriferæ, alexipharmacæ & antifebri- les, atque in febris malignis (nescimus, quo jure) laudatur. Diuretica est, & ob vim, quam cum millepedibus, & hujusmodi insectis communem habet, leniter stimulantem, commendatur. Alias vero usibus mechanicis tinctoriis plurimum inservit.*

Cochlearum Opercula, Folia, Couvercles d'Escargots, Schnecken-Deckelein. Sunt Cochlearum Domiportarum sive edulium opercula, quibus ante hyemem domunculas claudere solent. *Virtutibus cum lapidibus cancrorum conveniunt; abluta & in pulverem trita pro Specifico diuretico habentur, & hydropicis commendantur.*

Cochlearum testæ, Coquilles d'Escargots, Schnecken-Häuflein. Earundem Cochlearum edulium sunt domunculæ, & eadem pollent virtute. *Præferuntur, absque prævia calcinatione, in pulverem tritæ, calcinatis. Dosis drachma semis.*

Cranium humanum, Crane humain, Menschen-Hirnschale. Nunquam crudum, sed præparatum in usum vocatur. Non sit hominis morbo, sed sani, & violenta morte perempti.

Ebur, Yvoir, Helsenbein. Sunt dentes e maxilla superiore Elephantum, e basi ampliori cava in cuspidem desinentes solidissimam, inflexi, diversæ magnitudinis, longitudinis & crassitie, pro ætate ipsius belluæ, exterius coloris fusci, intus albican- tis. Ex India Orientali & Africa advehitur Ebur. *Refrigerat, & moderate adstringit. In usum vocatur tam Rasura, quam Ebur præparatum.*

Equi testes, Testicules de Cheval, Pferd = Geylen. Testes sive testiculi equorum in castratione excissi, dissecti, vino loti, & exsiccati in clibano. *Commen- dantur, tanquam præsentissimum remedium, ad fætum mortuum & secundinas pellendas, & ad colicos dolores sedandos. Exhibentur plerumque in pulvere. Dosis scrupulus unus, ad scrupulos duos.*

Erinaceus combustus, Herison calciné, gebrannter Igel. Erinaceus qua- drupes est animal terrestre: cuniculi magnitudine, proboscide porcina, aculeis un- dique armatum, uti Hystrix, præterquam in ima parte. Degit hiberno tempore in cavernis, in globum se volvit, cum de fuga desperat; ita in globum convolutus, at- que in aquam calidam immissus, qua delectatur, se evolvit ac dilatat, ut pedibus ap- prehendi, & sic suspendio enecari possit. Enectus in olla, operculo leviter tecta, comburitur. *Cachecticis, ictericis, & hydropicis, specificè vero ad mictum involuntarium, seu incontinentiam urinæ, commendatur. Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.*

Gallinæ ventriculi tunicæ interiores, Gysieres, Hühner = Magen = Häuf- lein. Non solum Gallinarum, sed & Gallorum & Caponum tunicæ membranosæ, ventriculos interne vestientes, lotæ & siccatae promiscue in usum vocantur. *Commen- dantur tam adstringendi & corroborandi ventriculum & intestina, tum & calculum & sa- bulum pellendi fine.*

Hippopotami, Equi Marini Dentes, Dents d'Hippopotame, ou de Cheval marin, Wallbeck, See = Pferds = Zähne. Animal Hippopotamus est amphibium magnum, auriculis caret, & duobus dentibus magnis, prominentibus, recurvis, præditum est. In basi concavi sunt dentes, versus apicem solidi, albidiores, durio- res & ponderosiores Ebore, nec tam facile flavescent. *Laudantur qua antepileptici, antispasmodici, antipleuritici, & sanguinem, nec non fluxiones alvi sistentes. Dosis scru- pulus unus ad drachmam semis.*

Hirci sanguis exsiccatuſ, Sanc de Bouc ſec, Bochs-Blut. Hirci herbis nerariis per tempus paſti, atque poſtea maſtati ſanguinem excipere, & in clibano are jubent. *Commendatur ad ſanguinem concretum reſolvendum, nec non calculoſis & entericis convenire credunt.*

Hirundines combuſtæ, Hirondelles calcinées, gebrannte Schwalben. Hirundo avicula, cauda longa, forcipata, vel bifida, Hauß-Schwalben, Gabel-Schwalben, omnibus nota. Hirundinum pulli adulti integri, in olla operculo teſta, pulverem vel cinerem nigrum comburuntur. *Adſcribitur hiſ cineribus viſ ſpecifica epileptica, & in angina & tonſillarum inflammatione cum melle adhibentur.*

Hirundinum nidi, Nids d'Hirondelles, Schwalben-Neſter. Colligendi ſunt, vel, cum pulli adhuc nido inſident, vel poſtquam adoleverint. *Non tam in niſquam excrementis Hirundinum viſ conſiſtit reſolvendi & diſcutiendi. Adhibentur in aplaſmatibus ad Anginam.*

Ichthyocolla, Colla piſcium, Colle de Poiſſon, Hauſen-Plaſen, Fiſcheim. Paratur e cute, inteſtinis, ventriculo, veſica, pinnis & cauda omnium ex genere Acciperum L. piſcium. Diſtæ partē minutim inciduntur, ſectæ vel inciſæ cerantur in aqua calida, poſtea coquuntur lento igne, ad pultis conſiſtentiam, manantur, & antequam maſſa refrixerit, in pelliculas diducuntur, quæ deinde in ſpicuæ penitus exſiccantur. Maxima pars advehitur ex Moſcovia, & optima cenſetur alba, ponderoſa, ſolida, & facile ac tota diſſolubilis. *Uſus Ichthyocollæ eſt rarus Medicina; ad inviſcandos tamen tenuē & acroſ humoreſ commendabilis; a coquiſ ad genas parandas adhiberi ſolet; frequentiffimū ejus eſt uſus ad clarificanda vina, & continandas varias reſ.*

Lac, Lait, Milch. Eſt liquor ex mammis animalium emulſus, vix odorū, ſapore dulciſ ſpiſſiuſculus, ſponte in Cremorē, ſerum & caſeum ſecedens. Vaccinum ſimilitudine feri vincit humanum & caprinum, cedit cremoriſ & caſei copia ovillo & cano. Ovillum vero ſuperat reliqua omnia cremoriſ abundantia. Lac leni calore in ſerum reductum *Franchipane* dicitur, cui ſi aquam ſuper fuderis obtinebis ſerum ſimile dulce Hoffmanni. *Nutriendi, demulcendi & relaxandi ergo adhibetur.*

Lepus combuſtus, Lievre calciné, gebrannter Haſe. Animal notiſſimum ſimile medicinale; non ſolum enim ejus viſcera & plurimæ partē, ſed totuſ in uſum veniunt. Lepuſ junior totuſ, vel in fruſtra diſſectuſ, in olla operculo teſta, comburitur, & in pulverem trituſ aſſervatur. *Præſtantiffimū creditur eſſe remedium in caliditate, ad ſcrupulū unū vel duōſ exhibitum.*

Leporum tali, Talons de Lievre, Haſen-Sprünge. Taluſ, ſive Aſtra-ſtuſ eſt primum oſ inter oſſa Tarſi Leporiſ, in ſuffragine poſteriore, ſuperius per ſtylium tibiæ conjungitur, ex altera vero parte capitulo rotundo donatur. Oſſuſ eſt ſatiſ ſoliduſ. *Commendatur ad epilepſiam, pleuritidem, colicoſ doloreſ, & facilitandū partuſ.*

Lucii piſciſ mandibulæ, Machoires de Brochet, Sechſ-Kieffer. Luciuſ piſciſ fluviatiliſ, non aculeatuſ, unica pinna in dorſo donatuſ, dentibuſ acutiſ edituſ. In uſum veniunt præcipuē Mandibulæ, ſive Maxillæ inferiores. *Dantur in ſimilitudine ceu ſpecificuſ. In calculo & fluore albo pariter conferre paſſim creduntur.*

Lumbrici terreſtreſ, Vers de terre ſecſ, getrocknete Regen-Würmer. Lumbrici animalcula ſunt apoda, longa, pennæ anſerinæ plerumque craſſitie, mollia, carnoſa

carnosa & annulata; dilute sanguinei coloris. Capiuntur per æstatem, & mun-
atque vino extincti, mox in clibano calore lento exsiccantur. *Sunt virtutis anodi-
diureticæ, antispasmodicæ, diaphoreticæ; discutunt, resolvunt, podagricis conveniunt,
specificè in arthridite scorbutica laudantur. Dosis scrupulus unus, ad grana triginta.*

Lupi epar, Foye de Loup, Wolfs-Leber. Lupus bestia ferocissima, &
persimilis, diversas partes pro Medicina exhibet, præcipue vero hepar in usum ve-
tur, quod, vino & absinthio parum coctum & exsiccatum, in usum venit. *Hydr-
cis, arthriticis & atrophicis commendatur; sunt, qui ad hydrophobiam laudant.*

Manati lapis, Auris Ceti, Pierre de Vache marine, Seefube = Ste-
Manati nonnullis *Vacca marina* dicitur. Linnæo *Trichecus marinus*. Amphibi-
est magnum, bipes, auriculis carens, phytivorum. Mare Americanum & Asiaticum
inhabitat. Lapis Manati est os crustaceum, album, Ebori fere simile, circa aur-
bestiæ situm, petrosum. Alii pro dente molari habent. *Summe commendatur ad
num & vesicæ calculos, & dolores colicos sedandos; cum dentibus Hippopotami conveni-
adstringit. Sunt, qui etiam vim, vomitus ciendi, adscribunt, quod tamen experientia
comprobatum est. Datur a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

Moschus, Musc, Bisam. Substantia hæc granulosa, pinguis ac unctuo-
sanguini congruato fere similis, coloris ferruginei, saporis subacris, amaricant-
odoris fragrantissimi est. Animal Moschiferum neque e caprino, neque cervino ge-
nere esse videtur; cutis est variegata, caput lupinum, ex ore duo deorsum e-
porriguntur dentes, & infra umbilicum folliculo quodam instructum est, qui extus
lofus, magnitudine ovum gallinaceum adæquat; & in sua cavitate Nucistam continet
valet, interiore vero superficie adhuc specialem habet pelliculam, Moschum cinge-
tem, in qua præter vasa sanguifera, circa meatus moschiferi orificium, complur-
glandulas, procul dubio ad Moschi secretionem facientes, invenire licet. Reperit
autem hoc animal *Dorcas caprea* vocatum, in Tartaria, China & India, & occi-
animalibus, folliculi moschiferi exscinduntur. Optimus Moschus censetur, qui e fe-
rrugineo nigricantis coloris, unctuosus, saporis grati, amaricantis, odoris fragrant-
raminæ impositus ignitæ fere totus evaporat; verum, si carbonis ad instar multu-
cemaneat, adulteratus est. *Moschus ab Anglo quodam, nomine Cobb, commendat-
dontra hydrophobiam, sive rabiem caninam. Exhiberi debet ad grana 16. usque, pro u-
posi, cum æquali pondere Cinnabaris, in vehiculo spirituofo. Dosis modo dicta, sco-
præservativo, singulis mensibus saltim dari debet. Ubi autem symptomata rabiei se ja-
Lrodunt, secundam dosin, trium horarum spatium, post priorem, exhibendam esse James
nexico medico scribit, additque, plerumque duas doses hujus remedii sufficere pro curati-
e mali. Cæterum Moschus calefacit, attenuat, discutit; cardiaca, alexipharmaca
aphrodisiaca pollet virtute. Mulieres autem raro odorem perferre queunt; caute igitur
Præscriptione procedendum. Plurimus usus est ad Odoramenta.*

Mumiæ, Momies ou Mumies d'Egypte, Mumien. Sunt cadavera huma-
na, Aloë, Myrrha & Asphalto, aliisque aromaticis & balsamicis speciebus condita
& exsiccata. Raro integra cadavera, sed in partes divisa, advehuntur, & in substan-
tia fusca, ad nigredinem inclinante, saporis amari, odoris fragrantis, venduntur. E
Ægypto adportatur, atque, quo fragrantior & splendidior est, eo melior habetur.
*Laudantur ejus virtutes traumaticæ; frequentius tamen a veterinariis expetitur, & mag-
in emplastris, quam interne dari solet.*

Mumia Persica nativa, Momie ou Mumie naturelle de Perse, natürliche Persianische Mumie. Mentionem hujus facimus hoc loco nominis causa; pertinet enim ad Regnum Minerale, & est bitumen valde pretiosum, in caverna quadam, sub radice montis Caucaſi, e rupe exsudans, cui miras adſcribunt in conſolidandis offibus & vulneribus virtutes. Coloris eſt nigri, odoris grati, & ex parte balsamici, ſaporis paſſim dulcis. Raro vel nunquam apud nos occurrit, niſi Ambram nigram pro Mumia perſica ſumere velimus.

Mures marini, Souris marines, See-Mäuſe. Non ſunt mures, ſed duplicatae & intus cavæ, e nigro fuſcæ pelliculæ, latitudine circiter unius ac dimidii pollicis, glabræ, ſtriatae, & quadrangulæ, inſtar pulvinaris; in quatuor angulis oblongos anguſtoſque apices habent. In Seelandia & Hollandia potiffimum inveniuntur, & ob figuram muris compreſſi, quam exhibent, ita a vulgo vocantur. Ova veſunt *Rajæ piſcis*, atque in iſtis, tanquam ovis membranaceis, juniores *Rajæ* naſciuntur, interdum adhuc in illis reperiundæ, quæ, ſi per anteriorem aperturam exierint, a mari ad littus projiciuntur. *Ad hæmorrhoides cæcas dolentes in uſum vocantur, quæ locus dolens his pelliculis ſumigatur.*

Mustelæ piſcis ſpinæ dorſi, ſive vertebræ, Arêtes de Murene, Alarupen-Gräten. Piſcis eſt *Mustela* anguilliformis, fluviatilis, ſquamis carens. *Spina dorſi exſiccata, atque in pulverem trita, ad epilepſiam ſeu caducum morbum commendatur.*

Oſſa de cordibus cervi, Os de cœur de cerf, Hirsch-Creuz, Hirschherz-Bein. Sunt oſſicula fere cruciformia, ex Aortæ fibris oſſificatis & induratis ſubſtantiâ. In cervis non ſolum annofiſ, ſed etiam bobus, reperiuntur. Eligenda ſunt candida, non nimis magna & alba; alias bovina ſe magis eſſe produnt. *Habentur cordialia, antepileptica, & alexipharmaca.*

Oſſa Sepiæ, Os de Seiche, Fiſch-Bein, Black-oder Ruttelfiſch-Bein. Candida, teſtacea, & levis eſt ſubſtantiâ, ſupina parte duriuſcula, corticoſa, lævis & glabra, inferna fungoſa, mollis, leviter aſpera, & friabilis, nata in dorſo Sepiæ piſcis. Capitur piſcis in Oceano, Mediterraneo mari, aliisve locis littoralibus, & in ſiccam cedit. Oſſa eligantur alba, levia, integra, mediocriter magna & craſſa; friabilis, fungoſa vero ejus ſubſtantiâ interior ſaltem vocatur in uſum. *Exſiccant, abſtergent, urinam movent, in gonorrhœa conferunt, & Septicum leniſſimum præbent. Ad denſificia quoque expetuntur.*

Ovorum teſtæ, Coques des Oeufs, Eyer-Schalen. Quamvis teſtæ omnium ovorum viribus ſint eædem, tamen in uſum medicum vocantur potiffimum gallinaceorum teſtæ, & cum in genere teſtæ ovorum præſcribuntur, hæ intelliguntur. Lotæ a pellicula interiore mundatæ, in pulverem teruntur. Qui ſi pollinem ſubtilitate læquat a nonnullis *Alcali Rocou* vocatur. *Cum oculis cancrorum conveniunt, & eadem oſi exhibentur. Teſtæ ovorum, e quibus per incubationem pulli excluſi fuerunt, præſtantiores ad nephritidem & calculum pellendum creduntur; præferendæ etiam ſeccatæ, tritæ, calcinatis.*

Pavonis ſtercus, Crotte de Paon, Pfauen-Roth Sunt excrementa alvina pavonis utriuſque ſexus, avis, ob pulchritudinem notiſſimæ. *Commendatur epileptico & vertiginofiſ. Uſus eſt in pulvere ad drachmam integram, vel in infuſo ad unciam didiam; adduntur etiam enematibus pro epilepticis. Sed relegamus pulcherrimæ avis ſtercus, cum tota familia, ad medicinam ſtercorariam.*

Percarum lapides, *Pierres de Perche*, *Kaulpersich* = *Bersing* = *Stein*
Officula, ovalis figuræ, quodammodo in uno latere crenata, lapideæ duritie, col-
 ris albicantis, in capitibus Percarum, juxta spinæ dorsi exortum reperiuntur, bin-
 quæ sicut in Carpionibus, *Carpionum*, ita hæc in Percis, Percarum lapides vocantur.
Perca piscis est satis cognitus fluviatilis, pinnis dorsalibus spinosus, ichthyophagu.
Lapilli hi cum Carpionum lapidibus conveniunt viribus; magis tamen diuretici creduntur.

Porcinus lapis, *Hystricinus Malacensis*, *Bezoar porci*, *Pedra de po-
 co*, *Pierre de Malacco*, *Bezoard de Porc* - *épi des Indes*, *Bezoor vom St-
 chelschwein*. Coagulum est biliosum, rotundum, compactum, ut plurimum nuc-
 Myristicæ vel Juglandis magnitudine, leve, coloris rufi, substantiæ quodammodo u-
 guinosæ, saporis amarescentis. Reperitur in vesicula fellea Hystricum, terræ Mala-
 cæ, unde *Lapis Malacensis* vocatur. Plerumque sphaeris vel circulis aureis armatu-
 adnexa ex eodem metallo catenula, cujus adminiculo commodius tractari queat. Us-
 ejus est, ut suspendatur per horas aliquot, vel una alteraque vice agitetur in haur-
 aquæ communis, quam, vix grani pondere imminutus, amarore imbuit. *Concretu-
 hoc, ob raritatem & eximias virtutes, valde pretiosum; habetur cordiale & alexipharm-
 cum, tum in ictero; febribus putridis, malignisque, & in quibuscunque viscerum obstructi-
 nibus medicamentum efficacissimum. Sed saniores inter recentes medicos pretiosissimo huic la-
 pidi anteponunt adhuc bovis vel alius cujuscunque animalis bilem inspissatam.*

Advehitur etiam ejusmodi coagulum biliosum ex insula Ceylana, quod a *Kæmpfer*
Pedra de Porco spuria vocatur; Malacensi quodammodo simile, sed nigrius, in form-
 & pilis permixtum est. Coagulum hoc non in vesicula biliari, sed in ventriculis H-
 ystricum invenitur, proditque bestia crebro ructu ac vomitione latitantem lapidem. *Ea-
 dem de illo prædicantur vires, debiliores tamen, licet majori propinetur dosi.*

Rana, *Rana esculenta*, Linn. *Grenouille*, *Frosch*. Est Amphibium noti-
 simum quadrupes, cujus femora in cibum recipiuntur. *Cum jure decocta demulcendi &
 relaxandi scopo adhibentur.* Ranarum Sperma, *Frais des Grenouilles*, *Froschlaid*. E-
 substantia alba viscida, albumini ovi similis, germina novorum animalium sub form-
 corpusculorum rotundorum nigrorum vehens; verno tempore stagnis & paludibus in-
 natans, è varii generis ranis enixa. *Extus demulcendi & refrigerandi scopo adhibetur.*

Reguli usti, *Motacilla troglodytes*, Linn. *Roitelets brulées*, *gebrannt-
 Zaun-Könige*, *Zaunschlüpferlein*. *Regulus* seu *Passer Troglotydes* in olla com-
 bustus. *Valdopere ad nephritidem, & calculum pellendum & præservandum commendatur.*

Rhinocerotis Cornu, *Corne de Rhinoceros*, *Rhinoceros* = *oder Nashorn*
Horn. *Rhinoceros* bellua, Elephantis magnitudine, cruribus tamen brevioribus.
 Cornu foris nigrum, intus album, fissile, ulnam circiter longum, firmum, grave &
 solidum, incurvatum, in basi crassum, in superiori vero parte acutum, e proboscide
 vel naso hujus animalis exsurgit. *Pro vero habetur unicornu veterum, & ad venena-
 contagiosos morbos, & epilepticos motus commendatur.*

Scarabæus unctuarius, *Vermis majalis*, *Meloe Proscarabæus*, *Escar-
 bot*, *Scarabée onctueux*, *Proscarabée*, *Maywurm*. Insectum in campi-
 apricis habitans, vivum melli immergendum; conservandum. Tactum, vel mani-
 captum animal liquorem e lateribus emittit flavum & unctuosum, unde nomen forti-
 tum est. *Tanquam medicina certissima ad hydrophobiam a morsu canis rabidi celebratur.*
An Scarabæus majalis, scarabæus melolontha. Linn. *Hanneon*. *Maykäfer*. male sub-
 stituitur?

Sericum crudum tostum, Soye brulée, gebrannte Seyden = Bälglein. Folliculi sericei, sive textura Bombycum aperiuntur, & si forsan Aurelia vel Bombyx fortua in illis latet, separatur, folliculi vero in olla comburuntur. *Ufus est rarus; Species tamen temperatas cordiales requiritur, & antepilepticum habetur. Olim ex folliculis, Spiritus destillari solebat, cui virtutes cordiales, alexipharmacas & antepilepticas adscribebant.*

Serpentum exuviae, Depouilles de Serpent, Schlangen = Häutlein, Bälge. Cutis animalis est sponte deposita, quæ colorem nativum cum figura retinuit. Serpens distinguitur a Vipera, quod sit ovipara, atque ova sua in fimetum, aliumve locum calidum deponat, ubi calore fota excluduntur. *Exuviae partum facilitare, ventri lumbis alligatae; hydropicis in forma pulveris conferre, & ad vulnera conglutinanda valere perhibentur.*

Stinci marini, Scinci, Zinci marini, Scinc marin, Meer = Sting. Animalcula sunt quadrupedia, ovipara, Lacertis similia, nisi, quod dorsum habeant minus, magis glabrum, cuti squamosa albicante testa, coësa a capite ad caudam decurrente linea. In Nilo fluvio, & Mari rubro degunt; vescuntur herbis odoriferis, Polio vel Absinthio condita adportantur. *Diuretici sunt Scinci; creduntur etiam rhodifaca & bezoardica virtute pollere. Theriacam, Mithridatium & Diasatyrium inediuntur.*

Struthionis ova, Struthio - Cameli ova, Oefs d' Autrüche, Strauseneier. Struthio avis in Africa haud infrequens, maxima, ob corporis molem, & alarum parvitatem ad volatum inepta, Ova ponit infantis caput magnitudine æquantia, imo superantia, testa est crassitie calami straminei, foris pallide flavescens, intus alba. In Africa, circa promontorium Bonæ Spei copiose sunt obvia, indeque adferuntur. *Adscribitur testis horum Ovorum peculiaris vis diuretica & calculum pellendi.*

Talpæ combustæ, Taupes brulées, gebrannte Maulwürfe. Talpa animal terreneum, notum, quadrupes, pilis mollissimis; e cinereo nigricantibus, rostro molli, oculis minimis, cruribus brevissimis. Capitur, atque integra in olla comburitur. *Intrinfecus laudatur ad arthritidem vagam; externe opponitur lepris, strumis, ulceribus & fistulis.*

Tauri Priapus, Priape de Taureau, Ochsen = Senne, Ochsen = Ruthe. *Uti Priapo cervi convenit; præcipue in diarrhæa & dysenteria laudatur.*

Viperarum spinæ, Epine des viperes, Vipern = oder Mattern = Rückgrat. Differt Vipera a cæteris serpentibus non modo, quod segnius serpat, neque in altum exiliat, sed præcipue, quod illius foetus in utero materno omnimodam perfectionem consequuntur, & vivi prodeant. Mares & foeminae, cum adultæ sunt, medio sui corporis pollicem crassitie adæquant; in foeminis vero, cum foetus maturos gerunt, crassior est truncus, longitudinem ut plurimum bipedalem attingunt, plus minus; columnam in maribus plerumque crassius est, quam in foeminis; cauda in maribus semper longior & crassior continet membra generationi dicata, & longitudinem digitorum quatuor transversorum, in foeminis trium tantummodo habet. Viperæ pellis semper est variegata, fundi tamen color variat, modo enim candicat, modo subrubescit, alias est cineracei coloris, alias flavi, alias ferruginei; fundum hunc distinguunt perpetuo maculae nigrae; pellem totam obtegunt squamæ, quas cum cute bis in anno mutare solent. Viperæ nunquam terram effodiunt, latebras quæsituræ, sed ut plurimum inter lapides & ruinas ædificiorum reperiuntur, sereno tempore Rubos quærunt

& densas herbas; morfu tantum sunt venenosæ, venenum in duabus vesiculis, circumdentes posteriores delitescens, ira percitæ, in hostem vibrantes, intus suntæ tot medicinales. Non solum in Italia & aliis regionibus calidioribus reperiuntur, sed etiam in Germaniæ quibusdam locis occurrunt; præferuntur vero ex Italia allatæ. *Adscribitur vis alexipharmaca, diuretica & restaurativa. Laudantur ad sanguinem purificandum in lue venerea, lepra, scabie ferina, & ulceribus malignis. In usum veniunt cute, capite & cauda exutæ, vel recentes in jusculis medicis, vel exsiccatae & in pulvere tritæ. Dosis a scrupulo dimidio, ad drachmam semis. Theriacam ingrediuntur, & Ezoardicum animale constituunt.*

Umbilici marini, inter Marina occurrunt.

Unicornu marinum, verum **Monoceros**, *Licorne veritable*, **Einhorn**. E Cetaceo animali, quod in Mare boreali, circa Groenlandiæ & Islandiæ littora, dedit, & *Narhval* vocatur, depromitur. Alii putant esse dentem, alii, quia non habetur animal unico dente præditum, cornu vocant. Est candidum, teres, striatum & tornatile, aliquot ulnas, plus minus, longum, durum, grave, in basi excavatum vel secundum longitudinem, ad apicem fere usque, perforatum, odoris & sapor nullius. *Cum aliis dentibus & cornibus convenit. Veteres adscripsere ei virtutem alexipharmacam, & contra omnia venena valentem: potius vero virtus ejus demulcens, antacidæ, antispasmodica, & diaphoretica reputatur. Dosis a scrupulo uno ad drachmam dimidiam.*

Unicornu fossile, **Ebur fossile**, *Unicorne mineral*, **gegraben Einhorn**. Sunt dentes vel cornua, vel alia ossa animalium in lapideam quasi substantiam, longo temporis successu, mutata, vel quasi calcinata. Reperiuntur, quæ sicut ossa calcinata friabilia, & alia, quæ Margæ speciem referunt; alia autem cum sic dictis philosophice calcinatis conveniunt, atque artificio parari possunt, si cornu Cervi vel Eboris frustum magnæ quantitati Calcis vivæ immergatur, & Calx, aqua affusa, extinguatur, sic brevi tempore calcinabitur, & speciem sic dicti Unicornu fossilis exhibebit. Invenitur hoc fossile in multis Germaniæ locis, etiam in Ducatu Wirtenbergico, prope Cantstadium maxime. Elephantini dentes, incredibilis magnitudinis, reperiuntur, in Cimeliarchio prostant Stutgardienfi, quos animalis esse prosapiæ, igni probavit aperte. *Absorbet, adstringit, & sudorem movet.*

Vulpis pulmones, *Poumons des Renards*, **getrocknete Fuchs-Lungen**. Pulmones recentes vino abluuntur & siccantur. *Ad vitia pulmonum commendantur & pro Loch de vulpis pulmone requiruntur.*

Zibethum, **Civette**, **Zibeth**. Pinguis & unctuosa est substantia, a natura secreta, & collecta in folliculo glanduloso, in mare inter penem & testes, in foemina inter vulvam & anum sito, *Cati Zibethici*, sive *Hyæncæ odoriferæ*, seu *Viverræ* Zoologorum. Animal lupum potius æmulatur, quam felem; corpus habet albicans & cinereum, lupi colore, maculis aspersum nigris, crura & pedes parvos, pedis digito quatuor & hallucem simul, a reliquis digitis parum distinctum; ungues sunt canini nigri, breves, crassi & obtusi, minime adunci. Reperitur in pluribus Indiæ Occidentalis & Orientalis regionibus. Delectari videntur cicurata animalia, dum folliculi auriscalpio exinaniuntur. Optimum censetur, quod subpallidum habet colorem, pingue, moderate liquidum, tractu temporis crassescens, papyro impositum & affricturn solubile, sine crassamento, quo ipso distinguitur ab adulterino, odoris fragrantis, saporis amaricantis. *Calidum atque anodinum est. Usus ad odoramenta, & in dolore colico umbilico inungitur.*

Regnò animali etiam adscribenda sunt Seva, Axungiae & Ceræ. Sunt vero atiora:

Sevum Bovinum, *Suif de Bœuf*, Rinder = In Schlitt.

Cervinum, *Suif de Cerf*, Hirschen = In Schlitt.

Hircinum, *Suif de Bouc*, - Bocks = In Schlitt.

Sevum, Sebum est adeps liquatus, & a membranis separatus, consistentia duriora. Distinguitur vero adeps a pinguedine, quod adeps sit crassior, durior, calore facilius solvatur, & prompte coeat, ac præsertim in brutis bifulcis inveniatur, bovibus scilicet, hircis, cervis, ovibusque. Seva omnia virtute ut plurimum conveniunt molliente & leniente. Usus plurimus est in emplastris.

Axungiae usitatiora in nostris Officinis sunt:

Axungia Anatis, - - *Axonge de Canard*, Enten = Schmalz.

Anguillæ, - - - *d' Anguille*, Ahl = Aal = Schmalz.

Anseris, - - - *d' Oye*, Gans = Schmalz.

Ardeæ, - - - *de Heron*, Reiher = Schmalz.

Aschii, Aschiæ, f. Thy-

malli piscis, - - - *de Thymallus*, *de Barbote*, *d' Ombre*,
Aschen = Schmalz.

Canis, - - - *de Chien*, Hund = Schmalz.

Caponis, - - - *de Chapon*, Capaunen = Schmalz.

Castorei, - - - *de Castoreum*, Biber gail = Schmalz.

Castoris, - - - *de Castor*, Biber = Schmalz.

Cati silvestris, - - - *de Chat sauvage*, wild Katzen = Schmalz.

Ciconiæ, - - - *de Cicogne*, Storch = Schmalz.

Coturnicis, - - - *de Caille*, Wachtel = Schmalz.

Cuniculi, - - - *de Lapin*, Caninchen = Schmalz.

Equi e collo,

f. juba, - - - *de Col de Cheval*, Ramfett, Pferdes
Schmalz.

Gallinæ, - - - *de Poule*, Hühner = Schmalz.

Hominis, - - - *Humaine*, Menschen = Schmalz.

Leporis, - - - *de Lievre*, Hasen = Schmalz.

Lucii, piscis, - - - *de Brochet*, Hecht = Schmalz.

Lupi, - - - *de Loup*, Wolfs = Schmalz.

Muris Alpini,

Montani, - - - *de Marmotte*, *de Liron*, *de Loir*, Mur-
melthiers = Schmalz.

Axungia Porci,

Axonge du panne de Porc, Sain doux, Schmalz
nen = Schmalz.

Serpentum, - - de Couleuvre, Schlangen = Schmalz.

Taxi, - - de Blaireau, ou de Taïsson, Dachshund
Schmalz.

Viperarum, - - des Viperes, Bippenn = Schmalz.

Ursi, - - d' Ours, Bären = Schmalz.

Vulpis, - - de Renard, Fuchs = Schmalz.

Axungiae sunt pinguedines animalium eliquatae, & a partibus membranaceis cellularum, in quibus reconditae fuerunt, separatae; suntque partim consistentiae liquidae, instar olei, partim vero crassescunt; quo liquidiores vero, eo penetrantiores etiam sunt. *Omnes axungiae vim habent emolliendi, digerendi, & leniendi; praesertim vero:*

Axungia Anatis,

Anseris,

Canis,

Caponis,

Castoris,

Equi,

Gallinae,

Hominis,

Porci.

Attenuandi & resolvendi vis adscribitur sequentibus;

Axungiae Ardeae,

Cati silvestris,

Ciconiae,

Coturnicis,

Cuniculi,

Leporis,

Lupi,

Muris Alpini,

Serpentum,

Taxi,

Viperarum,

Ursi,

Vulpis.

im autem calefaciendi, detergendi & septicam habent:

**Axungia Anguillæ,
Aschiæ, sive Thymalli,
Lucii Piscis.**

Eligantur seva & pinguedines, & imprimis axungiae liquatæ recentes, non vetustæ & rancore corruptæ, & quæ foetore nares feriunt; præcipue vero, ubi in linimentis adhibentur, quæ lenire & demulcere debent; rancidæ enim omnes calorem constant, & affluxum augent. *Axungia Canis* etiam haud raro interne, ad leniendos spasmos, & acrimoniam humorum temperandam fumitur, quo in casu vero ex animali recens mactato, & non per vetustatem rancida esse debet.

Axungia Castorei pretio reliquas axungias multum superat; hinc tanta copia, ut membra ea inungi possint, vix præscribitur, etiamsi antispasmodicum & nervinum egregium. *In affectibus vero hystericis, balsamis ad odoratum, & unguentis abdomini leniendis admiscetur.*

Cera alba, Cire blanche, weisses Wachs. E flava, frequenti adspersione quæ, & insolatione paratur.

Cera flava, Cire jaune, gelbes Wachs. Est substantia pinguis oleosa, condensata, flavescens, e favis apum, ignis calore liquata & expressa, saporis lenti, levis, odoris grati. Per se neque aqua neque Spiritu vini solvitur, sed cum tenuissimo Gummi Arabici pulvere exacte mixta, saponacea fit & aquæ patet.

Propolis, Propolis, Stopp- Wachs. Est crassa illa cerosa materia, quæ favos agglutinant, rimas & latera alveorum obducunt, atque domicilium non solum firmant, sed & externi aëris accessum impediunt.

Cera & Propolis digerunt, maturant, emolliunt & dolores mitigant. Usus plurimus est emplastris; a nonnullis cum pomo Cydonio tosto, interne sumta, ad dysenteriam commendatur.

APPENDIX.

Cajeput Oleum ex India Orientali advehitur, & pro oleo, ex specie quadam Cardamomi destillato, habebatur. Nunc certius novimus, esse oleum essentiale foliorum Malaleucæ Levcodendræ, Indiæ Arboris, destillatione prolectum. *Usus ejus tam internus, quam externus. Laudatur specificè ad colicam flatulentam, menstrua suppressa & fœtum mortuum pellendum. Ad dentium dolores, sugillationes & suffusiones discutendas vix simile haberi dicunt remedium. Dosis guttæ tres, quinque vel sex, saccharo albo instillatæ, cum infuso theæ. Usus ejus externus in doloribus arthriticis & rheumaticis commendatur.*



To the Honorable Secretary of the
War Department
Washington, D.C.

1914
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter of the application of [Name] for a commission in the [Service]. The same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
[Signature]

Enclosed for you are the reports of the [Authority] in relation to the application of [Name] for a commission in the [Service]. The same are for your information and guidance.

**HARMACOPOEÆ
WIRTENBERGICÆ
PARS ALTERA
COMPOSITA ET PRÆPARATA
EORUMQUE
MODUM PRÆPARANDI
EXHIBENS.**

THE
LIBRARY
OF THE
ATLANTA
HISTORICAL SOCIETY
ATLANTA, GA.
1900



ACETUM BEZOARDICUM.

REC. Radicum Angelicæ,
Enulæ,
Imperatoricæ,
Hirundinariæ,
Zedoariæ ana drachmas
sex,

Herbarum Scordii,
Rutæ,
Salviæ ana unciam unam,
Baccarum Juniperi unciam semis,
Flavedinis Corticum Citri drachmas sex.

Minutim incisis affundantur:

Aceti Vini optimi, non destillati, libræ
tres.

Post sufficientem digestionem exprimantur,
& filtratum acetum ad usum reponatur.

*In morbis contagiosis, præcipue peste, tam in-
ternus quam externus usus ad odoratum &
collutionem oris commendatur.*

Propinatur ab uncia dimidia ad integram.

ACETUM COLCHICUM.

Vide infra Oxymel colchicum.

ACETUM LAVENDULÆ.

REC. Florum Lavendulæ libram dimidiam,
Aceti Vini boni albi libras tres.

Macerentur vel insolentur per aliquot dies,
& fiat cum expressione colatura.

*Usus est externus. Epithematibus & odora-
mentis inservit.*

Nota. Durabilia quidem sunt aceta
composita e destillato parata, at non effi-
caciore; imo, tam quoad externum quam
internum usum, longe præferendum est
acetum simplex destillato: gratius enim,
odoratius & securius est; ut autem hujus-
ce modi aceta infusa a se præcipitantibus fe-

cibus & mucore diutius defendantur, iis
una pars vicesima spiritus vini rectificati
addatur.

ACETUM ODORATUM.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana unciam semis,

Herbarum Rorismarini,
Salviæ,

Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Ligni Rhodii,

Cinnamomi,

Caryophyllorum aromaticorum,

Corticum Citri recentium, ana drachmas duas,

Aceti Vini albi libras duas.

Incisis & contusis superfundatur acetum, & post
digestionem per triduum ad usum reponatur.

*Usus est externus, pro odoramentis & epithemati-
bus ad pulsus. Rescit, atque spirituosus longe
præferendum est.*

ACETUM PAPAVERIS ERRATICI,
ROSARUM,
RUBI IDÆI,
RUTÆ,
SAMBUCI,
TUNICÆ.

Eodem modo, quo Acetum Lavendulæ, pa-
rantur.

*Vires habent vegetabilium, quibus imprægnantur, &
præcipue ad usum externum commendantur.*

ACETUM SATURNINUM, SIVE LYTHARGYRII.

REC. Lythargyrii triti libram unam,
Aceti Vini destillati libras quatuor.

Coquantur lento igne in vase figulino pro-
be vitreato, spatula lignea perpetuo agi-
tata,

tata, donec acetum probe saturatum sit, quod per chartam filtratum servetur.

Ad inflammationes, ulcera maligna exsiccanda, & affluxum prohibendum, applicari solet.

ACETUM SCILLITICUM.

REC. Scillæ præparatæ & exsiccatae uncias octo.

Aceti Vini albi acerrimi libras octo.

Scillæ radices minutim incisæ macerentur in aceto per plures dies, acetum per pannum colatum ad usus reponatur.

Adhibetur in pectoris infarctu viscido expediendo, tussi difficili, asthma humido: Gravitationem auditus, a pituita ortam, gargarizatione emendat.

Dosis drachma una ad unciam dimidiam.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

REC. Aceti Vini fortis, quantum libet.

Destilletur e cucurbita magna vitrea lento igne; prodit primo phlegma, quod sequitur, acetum est. Continuetur destillatio, usque dum a duodecim vel quindecim libris, vix libra una & dimidia restet, alioquin, si ad siccitatem acetum abstraheretur, empyrevma contraheret.

Potest acetum etiam frigore concentrari, sed facile corrumpitur. Maxime meracum acetum, si desideratur, obtinetur, si acetum bonum limpidum ope sodæ depuratæ saturatur, filtratur, usque ad siccitatem inspissatur, huic siccato intra retortam vitream dimidium pondus olei vitrioli superaffunditur, & modico igne destillatio in balneo arenæ instituitur.

Ad internum usum ordinarium acetum simplex ex nobiliori vino paratum sufficit & merito destillato præfertur.

ÆS VIRIDE CRYSTALLISATUM, SIVE ÆRIS FLORES.

REC. Æruginis, five viridis æris, in pulverem triti, libram unam,

Aceti Vini destillati libras sex.

Immittantur cucurbitæ vitreæ, macerentur in loco calido, acetum tinctum per

inclinationem vasis effundatur, novumque affundatur. Hoc fiat aliquoties, & tandem in vase cupreo æs viride, addita sufficienti aceti quantitate, coquatur, ut solvatur. Tincturas omnes, per filtrum trajectas, leni calore evaporari permittite ad cuticulam, & ad crystallandum in locum frigidum repone. Crystallolos inter chartam lenissimo calore exsiccatas serva.

Rarus in Medicina usus, nisi ad unguenta mundificantia & Spiritum Veneris destillandum. A pictoribus & mechanicis frequentius expetuntur.

ÆS USTUM.

Æris laminæ stratificantur Sale culinari, atque in crucibulo probe lutato cæmentantur per duodecim horas, vel usque dum friabiles existant, quæ in pulverem tritæ ad usum reponuntur.

Usus est externus, in exsiccandis præsertim ulceribus.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

REC. Antimonii crudi purissimi optime triti uncias duas,

Mercurii vivi bene depurati unciam unam.

Terantur multum & diu in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evanescant, quod longa & patienti tritura efficitur. Serventur in vitro, vel pyxide lignea.

Vires sunt eadem, ac sequentis Æthiopis mineralis.

Dosis a scrupulo dimidio, ad drachmam dimidiam.

ÆTHIOPS MINERALIS.

REC. Mercurii vivi bene depurati uncias tres.

Florum sulphuris uncias duas.

Misceantur & terantur in mortario vitreo vel marmoreo diu & diligenter, donec Mercurius plane dispareat, & cum floribus Sulphuris in pulverem nigrum reductus sit.

Eximie huic pulveri sulphurato mercuriali adscribuntur vires, in tumoribus glandularum colli, exulcerationibus antiquis, fistulosis, scabie

bie sicca maxime venerea, febre quarta-
 , & ubi vermium suspicio est. Sunt
 ro etiam, qui omnem, præter anthelmin-
 am, ei denegant virtutem.

in infanti tenero ad grana tria vel quin-
 te, adultiori ad scrupulum dimidium, ho-
 mini adulto ad drachnam dimidiam, &
 per complures dies, absque metu salivatio-
 nis, usus ejus continuari potest.

ÆTHIOPS VEGETABILIS.

1. Fuci marini, vesicularis seu quercus ma-
 rinae vesiculas habentis, quantum placet.

Datur & in crucibulum intra prunas arden-
 tes collocatum operculoque postea tegendum
 jiciatur. Massa ope fistulae tabacariae argil-
 leæ, ut æqualiter candescat, agitur; sic
 mus densus cum aliquali crepitatione &
 amma mox ob operculum reponendum eva-
 pescens oritur. Relinquitur massa æqualiter
 ardens, tecto crucibulo, per quadrantem
 horæ, & crucibulo sponte refrigerato habe-
 re pulvis nigerrimus saporis subfalsi & ad
 omni quomocunque accedentis, quem he-
 re sulphuris habet.

is ab ea, quam spongia marina combusta ha-
 bet, parum differre videtur; adposuimus præpa-
 rationem partim ob laudes a RUSSELIO & DE-
 TO in morbis glandularum recentius tributas,
 partim ne cum Æthiope vegetabili confundatur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

Agaricus albissimus radula comminuitur, atque
 per cribrum transmittitur, postea in mortario
 lapideo, pistillo ligneo, cum vino, in quo
 ginger infusum fuit, & exigua portione
 tragacantæ, in massam cogitur, quæ massa
 in trochiscos majores formatur, qui, ut eo
 magis albescant, hieme sunt parandi, & in
 frigore exsiccandi.

sudores immoderatos & colliquativos coercendos
 circa dosi conducere nonnulli observant.

trochiscationem, quam vocant, correctior habe-
 tur, atque in vinis medicatis infusus, pectoris vi-
 tiis, humores crassos & viscidos educendo, mederi
 creditur.

Pars II.

ALOE DEPURATA, SIVE LOTA.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam,
 solvatur in

Aquæ fontanæ calidæ libris quinque,
 Succu Citri depurati libra una.

Solutio reponatur in vase vitreo per unum
 aut alterum diem, ut resinosa substantia
 cum fæcibus subsideat, quo facto clarum
 a spisso separetur per decantationem &
 colationem, lentoque igne ad extracti
 consistentiam evaporetur.

Longe securius, promptius, & minori quanti-
 tate sumpta, alvum laxat, quam sola Aloë
 Succotrina. Per hanc depurationem sepa-
 ratur illa resinosa substantia, hæmorrhoida-
 lium motuum sæpius causa, qui frequentio-
 rem aloëticorum usum sequuntur. Tale
 Aloës extractum basis est Pilularum Celeber-
 vimi STAHLII, & pro basi Pilularum la-
 xantium adhiberi potest.

Grana octo, quin tria, sufficiunt pro alvo sti-
 mulanda; pro laxanda vero dari possunt
 grana quindecim.

ALOE ROSATA aut VIOLATA voca-
 tur, quæ cum succo vel infuso ROSA-
 RUM aut VIOLARUM, INSUCCATA
 autem, quæ cum succis quatuor combi-
 natis BORRAGINIS, BUGLOSSI, RO-
 SARUM & VIOLARUM paratur. Vix
 aliquid virtutis accessorie ab istis succis
 accipere, adeoque nec prærogativam
 præ Aloë depurata simplici habere vide-
 tur, hinc talis insuccatio omitti potest.
 Majorem attentionem meretur EX-
 TRACTUM ALOES POERNERI,
 quod, dum Aloës succotrinæ libra una
 opè aceti boni librarum sex depuratur,
 paratur.

ALUMEN SACCHARINUM.

REC. Aluminis crudi vulgaris uncias sex,

Cerussæ Venetæ albæ drachmas sex,

Vitrioli albi drachmas tres,

Sacchari albi Canariensis unciam unam semis.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui albumine
 ovorum & aceti destillati æquali portione,
 in mellis liquidi consistentiam, diluatur, pro-

B

beque

beque agitatus, formis chartaceis, parvis, conicis infundatur & siccetur.

Ufus præcipuus est in Collyriis & Cosmeticis; detergit & carnem luxuriantem aufert.

ALUMEN USTUM.

REC. Aluminis vulgaris albi quantum volueris, coquatur & calcinetur in olla fictili, nova, donec totum Alumen, spiritibus expulsis, leve, porosum, & quasi spumofum evaserit.

Ad dentrificia & carnem luxuriantem absumendam, adhiberi solet.

ANTIHECTICUM POTERII, S. DIAPHORETICUM JOVIALE.

REC. Reguli Antimonii simplicis uncias sex, Jovis, five Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur in crucibulo, fusa effundantur, terantur in pollinem, & cum Nitri puri, probe siccati, triplo, vel unciis viginti quatuor mixta, in crucibulo detonentur. Refrigerant, massa alba cœrulescens iterum teratur, & sufficienti copia aquæ fontanæ calidæ edulcoretur, tandem aqua copiosa diluatur, ut ponderosior pars fundum petat, levior autem cum aqua, per inclinationem vasis, ab illa separari queat. Pulvis subtilior ita paratus eluatur, leni calore siccetur, & usui fervetur.

Ad sanguinis & seminis fluxus cohibendos inservire, & hæcticorum etiam colliquativos sudores minuere credebatur. Dudum frivolum medicamentum & inepta nominis assignatio, quæ falsissime hæcticis medelam promittat, STAHLIO aliisque censebatur. Proscripsissemus ex hac Dispensatorii editione, nisi cogitassemus, eos, qui recentiores laudes huic calci in sudoribus phthysicorum colliquativis ad drachmam dimidiam mane & vespere propinatæ a Claro Viro, VOGELIO, tributas audiunt, forsitan præparationis cognoscendæ cupidos esse, eamque in ampliori Dispensatorio expectare.

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

REC. Mercurii sublimati corrosivi duodecim,
Antimonii crudi quinque partes.

Trita in mortario vitreo optime miscetur, & per aliquot dies relinquuntur humida inde fit miscela, quæ immittitur retortæ, cui præponitur excipulum & sublimatio ex arenæ balneo instituitur; moderato calore ascendit substantia spissa, quæ, si difficilius ex rostro profluit, prunis candentibus admotis liquida est. Hæc *Butyri Antimonii* nomen venit; quo obtento & liquefacto, summum urgendus est ignis, ut ascendat *Cinnabaris Antimonii*. Refrigerantur omnibus, Cinnabaris sublimata, reje sulphure, quod superiori ejus parti hæret, conteratur subtiliter, abluta aqua fontana, & denuo e cucurbita frangitur. Semper magis nigricans propria ac factitia apparet. Ejus quantitas ad quantitatem Antimonii ad laborem adhibiti proxime solet accedere. Butyrum seorsim fervetur, quod una tertia parte cedit quantitati Mercurii sublimati, quæ recepta fuit.

Butyrum Antimonii a chirurgis, loco caute adhibetur; est enim concentratissimus Spiritus, Regulo Antimonii corrosivo unito, & ad varios chymicos & pharmaceuticos labores est utilis.

Cinnabari huic specifica quædam virtus antiepileptica & antispasmodica adscribitur, verum, an a vulgari factitia, rite elaborata, differat? merito dubitatur.

Alia præparatio BUTYRI ANTIMONII five CAUTERII ANTIMONIALIS.

Cum Cinnabaris Antimonii recte nostris temporibus rarius desideretur, & præparatio, qua simul Butyrum Antimonii obtinetur, & pretiosior & periculosior sit, aliam pro solo Butyro Antimonii acquirendo merito subjungimus.

REC. Vitri Antimonii bene pulverisati uncias quatuor,

Salis culinaris uncias sedecim,

Terantur invicem & immittantur retortæ vitreæ, affundantur cum aquæ puræ unciis octo diluti

Olei Vitrioli unciae duodecim,

ANTIM.

Retorta ponatur in balneum arena, præponatur excipulum amplius bene lutandum, & fiat initio leni postea augendo igne destillatio usque ad siccitatem, sic uncix circiter viginti Butyri sive Olei fortioris fumantis Antimonii in excipulo deprehenduntur.

ANTIMONII CLYSSUS, sive MINERALIS.

REC. Antimonii crudi,
Nitri,
Sulphuris, ana libram semis.

Pulverifata misce, & in retortam tubulatam candentem, recipiente magno, cui aquæ simplicis libra una infusa, adaptato, nec exacte nimis lutato, successive ad drachmas duas unaingere, ac mox frustulo luti madidi, linteolo involuto, tubulum bene claude; ubi nebulæ in recipiente cessaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingesta detonerit; tum liquorem omnem, in recipiente collectum, recipientem hinc inde agitando, effunde, filtra, atque aquam ad dimidias abstrahere, & clyssum sive liquorem acidum residuum in vase clauso ferva.

Antimonia & calorem nimium extinguunt, & in febribus etiam malignis, loco spiritus vitrioli, potui ordinario & julapiis addi, & ad tincturas florum rosarum & aliorum exaltandas adhiberi solet.

Dosis ægre determinari potest, sufficiunt plerumque guttæ quindecim.

Rix amplius in usu est.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

REC. Limaturæ Martis,
Antimonii crudi, bene triti, ana uncias octo.
Misceantur & immittantur crucibulo candenti, agitentur baculo ferreo, usque dum in scorias mixtura abiisse videatur, quæ accurate contrita, & cum triplo nitri crudi purissimi & siccissimi mixta, in crucibulo candenti detonetur, atque, post lenem calcinationem, in aquæ tepidæ sufficienti copia solvatur: sic subsidebit pulvis e luteo fuscus, qui, addita copiosa aqua, diluatur, ut levior ac subtilior a graviori separetur, quem edulcoratum atque leni calore siccatum ferva.

ANTIM. AQUÆ.

7

Propter Martis particulas leniter adstringit, tonum ventriculi & intestinorum roborat, cachecticis & ictericis prodest.

Dosis grana quindecim ad scrupulum.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

REC. Mineræ Antimonii purissimæ libram unam,

Nitri crudi crystallini siccissimi libras tres.

Exacte misceantur, atque in crucibulo magno, per vices ingesta, detonentur. Agitentur spatula ferrea inter detonationem, ut materia æqualiter deflagret & calcinetur. His peractis, massa albicans sufficiente quantitate aquæ dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosa affusa aqua diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quæ edulcorata atque siccata usui fervetur. Est vera Reguli Antimonii calx, nitro cicurata. Tres quartas partes ponderis Antimonii, quod receptum fuit, æquat. Si aqua falsa, nitrum antimoniatum continens, non decantatur, sed una cum calce evaporando exsiccat, Antimonium diaphoreticum non ablutum dicitur, quod post Boerhaviu a multis ceu medicamentum efficacius expetitur.

Adscribuntur vires absorbentes, alexipharmacæ, diapnoicæ, sanguinem purificantes. Datur in febribus cujuscunque generis. Purgantibus admixtum eorum vires acuit. Non ablutum incidens, expectorans, in glutine pulmonum & in morbis cutaneis utile habetur.

Dosis a granis quindecim ad drachmam dimidiam.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Vulgo plures in pharmacopoliis prostant, quam usus rationalis requirit. Exulent itaque, quæ nullum saporem odoremve habent, quippe inefficaces, aquæ fontanæ puriori haud præferendæ, & faciliori corruptioni obnoxix, quales plerumque è plantis merè succosis & viscosis destillari recepta consuetudo jussit.

Possunt, quæ pro aquis destillatis infer-
viant, adhiberi:

- 1) Herbæ recentes succo acri turgentes,
e quibus usitatiores sunt:

ARUM,
BECCABUNGA,
COCHLEARIA,
NASTURTIUM AQUATICUM.

Hæ in duplo aquæ macerari, & postea
destillari debent, atque ex qualibet
libra herbæ, libra una & dimidia
aquæ prolici.

- 2) Herbæ odoriferæ, plus minusve oleo
æthereo dotatæ, sunt:

ABSINTHIUM,
ANGELICA,
ARTEMISIA,
CHAMÆMELUM, five CHA-
MOMILLA,
CHÆREFOLIUM,
FOENICULUM,
HEDERA TERRESTRIS,
HYSOPPUS,
LAVENDULA,
LEVISTICUM,
MAJORANA,
MATRICARIA,
MELISSA,
MENTHA,
MENTHA PIPERITIS,
MILLEFOLIUM,
PETROSELINUM,
PULEGIIUM,
ROSMARINUS,
RUTA HORTENSIS,
SABINA,
SALVIA,
SERPILLUM,
TANACETUM,
VERONICÆ.

His omnibus quadruplum aquæ affundi,
& duæ libræ destillatione elici possunt.

- 3) Flores integri atque recentes:

ACACIÆ,
AURANTIORUM,
CITRI,
LILIORUM ALBORUM,

LILIORUM CONVALLIUM,
NYMPHÆÆ,
POEONIÆ,
PRIMULÆ VERIS,
ROSARUM,
SAMBUCI,
TILIÆ.

Affuso triplo aquæ, statim cum his de-
stillatio instituenda, & ex qualibet li-
bra florum, libra una cum dimidia
aquæ elicienda.

- 4) SEMINA ANISI,
CARVI,
CORIANDRI,
FOENICULI.

- 5) BACCÆ JUNIPERI,
LAURI.

- 6) RADICES ANGELICÆ,
CALAMI AROMATICI.

- 7) LIGNA SASSAFRAS,
RHODIUM.

- 8) CORTICES CHACARILLÆ,
WINTERANI.

Omnia sextuplum aquæ, & maceratio-
nem per aliquot dies, ante destillatio-
nem, exposcunt. Ex quavis libra
aquæ lacteæ, oleosæ, libræ tres elici
possunt.

CORTICES FRUCTUUM AURAN-
TIORUM & CITRI.

Absque prævia maceratione, statim de-
stillantur, atque ad libram corticum
aquæ libræ quatuor affundi, & libræ
duæ destillatione abstrahi debent.

- 9) FRUCTUS HALICACABI, five
ALKEKENGI, minus suo
culenti

quatuor partes aquæ exposcunt, atque
unam semis reddunt.

CERASORUM,
FRAGORUM,
RUBI IDÆI

duplum aquæ poscunt, & e qualibet li-
bra, libram unam aquæ destillatæ
fragrantis exhibent.

tes harum aquarum destillatarum ex alitate vegetabilium simplicium aditorum æstimari debent; rarius folie propinantur, sed inserviunt plerumque pro vehiculo aliorum medicamentorum.

endum adhuc est, quod aquæ ex multis odoratis herbis, floribus, fructibus statæ vix in annum durabiles ideoque plantis renovandæ, atque omnes & gulæ in cella subterranea frigidior servandæ sint.

ad destillationis rationem notandum, quod ea pro diversa vegetabilium indole aliquid discriminis, uti ex præscriptibus præscriptionibus patet, omnia habeat, quatenus scilicet quædam bæ magis aut minus succulentæ, quædam sicciore, aliæ succo acriores, aliæ aromaticæ & odoriferæ sunt, ideoque plus vel minus aquæ addendæ requirunt. Verum quidem est, quod, quo parcius aqua plantis deandis adjiciatur, eo liquor stillatitius, ceteris paribus, efficacior obtineatur, tamen cavendum, ne vel ob nimis cam mox initio adhibitam aquam vel nimis diu protractam destillationem liquor empyrevma contrahat, hinc c lente instituenda justoque tempore cenda est, atque excipulum, prodante liquore ingrato, mox removendum.

hæ aquæ majori quantitate parandæ ra velicam cupream destillari soleant, lem stanno intus obducatur, alembici autem ipsi imponendus una cum deuntibus tabulis è puro stanno constructus esto.

AQUA ACUSTICA.

Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ,
Levistici,
Valerianæ ana unciam semis,
barum recentium Majoranæ,
Origani,
Rorismarini,
Rutæ hortensis,
Salviæ hortensis,

Herbarum Serpilli,
Florum Lavendulæ,
Sambuci ana drachmas tres,
Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Rutæ,

Baccarum Juniperi,
Lauri ana unciam semis,
Ceparum incisarum uncias duas semis,
Castorei drachmas duas.

Incisa & contusa immittantur cucurbitæ vitreæ,
& superaffundantur

Aquæ epilepticæ Langii,
Spiritus Baccarum Juniperi ana unciam quindecim,

Succi Raphanorum libra una semis.

Digerantur per biduum, postea additis
Cinerum clavellatorum drachmis quatuor,
Salis ammoniaci drachmis duabus,
Camphoræ drachma una.

Aquæ fontanæ quantum sufficit, ad præcavendum empyrevma.

Destillantur ex cucurbita vitrea, & liquoris spirituosus volatilis unciam sedecim proliciantur, qui in vase probe clauso servandus.

Applicatur vel in frusto panis calidi, è clibano modo extracti, auribus, vel gossypio aliquot guttæ exceptæ immittuntur auri. Crassos humores, nervos & auditorios meatus obstruentes attenuat, atque tympani atoniæ roborando, medetur.

AQUA ANHALTINA.

REC. Radicum Galangæ minoris,
Florum Anthos ana drachmas sex,
Seminis Fœniculi,
Baccarum Lauri ana unciam dimidiam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi acuti,
Mastiches ana drachmas sex,
Thuris unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ libram dimidiam.

In pulverem contrita infundantur in spiritus vini rectificati libris sex, & digesta per dies sex, addita aquæ fontanæ libra una, destillantur, lenissimo balnei caloris, libræ quinque.

C

Vires

Vires hujus aquæ spirituosæ sunt insignes in ventriculo roborando, colica flatulenta, urina pellenda; verum adhibenda prudenter, ne sanguis nimium commoveatur. Externus usus est frequentior, ventriculo applicata, vomitum & diarrhæas sistit, & in roborandis membris, debilitatis a paralyfi, valet.

**AQUA ANTISCORBUTICA
TEMPERATA.**

REC. Herbarum omnium recentium,
Acetosæ,
Nummulariæ,
Beccabungæ,
Bellidis minoris,
Chærefolii,
Fumariæ,
Trifolii fibrini,
Veronicæ ana uncias octo,

Fruetuum Rubi idæi libram unam.

Incisa misceantur, superfusis aquæ fontanæ libris quindecim, destillantur, atque libræ sex eliciantur.

Parata est ex herbis antiscorbuticis temperatis, & æque omnibus convenit, ubi affectus æstiosi, febiles, cum diatresi scorbutica, complicantur.

Dari potest ad uncias duas tresve.

AQUA APOPLECTICA SPIRITUOSA.

REC. Florum Liliorum convallium recentium,

Lavendulæ recentium,
Primulæ veris,
Tiliæ,
Betonicæ,
Tunicæ ana unciam unam,

Herbæ Rorismarini,
Majoranæ,
Basilici,
Salviæ,
Serpilli,
Mari veri ana unciam unam
femis,

Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas sex,

Nucum moschatarum unciam unam,
Cardamomi minoris,

Cubebæ,
Zedoariæ,
Galangæ,
Sandali citrini ana unciam semis.

Flores & herbæ recentes colligantur successively per æstatem, & in spiritus rectificati libris quinque macerentur. Postea aromata, minutim incisa & cotusa, vini generosi libris quinque infundantur, & post digestionem per biduum cum priori infuso commixta, addi prius, ad præcavendum empyremum sufficiente aquæ fontanæ quantitate, vesica, lento igne, destillantur. Clarum & magis spirituosum seorsim, pro usu externo, servandum; quod sequitur oleosum albicans, pro usu interno.

AQUA APOPLECTICA MINUS SPIRITUOSA.

REC. Herbæ, cum floribus, Salviæ uncias octo,

Majoranæ,
Serpilli ana unciam unam

Florum Liliorum convallium uncias tres
Lavendulæ,

Anthos ana uncias duas,
Cinnamomi electi unciam unam semis,
Cubebæ unciam semis,
Caryophyllorum drachmas tres,
Macidis drachmas duas,
Vini albi generosi libras duodecim.

Macerata per triduum destillantur ad dimidiæ partis remanentiam.

Aquæ hujusmodi spirituosæ in Apoplexiâ quam sanguineam vocant, interne sumi non conveniunt; externe autem ad partem debilitatam roborandas, & ad odorandum præcipue adhibentur. In morbis vero causa frigida ortis, colica flatulenta, & ventriculi debilitate, bono cum effectu, drachmis duabus ad sex, vel integram unciam, propinari possunt.

AQUA ASTHMATICA.

REC. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,
Iridis Florentinæ ana uncias duas,

AQUÆ.

Herbarum Hederæ terrestris,
Tuffilaginis,
Botryos ana libram semis,
Hyssopi,
Marrubii albi,
Pulegii,
Salviæ ana uncias tres,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana unciam unam.

Incisa infundantur spiritus vini rectificati libra una, aquæ fontanæ libris duodecim, & præmissa digestionem per triduum, libræ sex vel septem e vesica destillantur.

Senes tussi humida vexatos, mane ad unciam unam vel duas sumta, juvasse visa est.

AQUA BALSAMICA AD GONORRHOEAM RIVERII.

REC. Radicis Iridis Florentinæ uncias tres,
Foliorum Dictamni Cretici,
Menthæ siccæ ana unciam unam semis,
Seminis Fœniculi uncias duas,
Rutæ unciam unam,
Terebinthinæ claræ Venetæ libram semis,
Vini albi libras decem.

Post infusionem per triduum destillantur ad dimidium ex vesica.

Ad gonorrhoeam virulentam, tam inveteratam, quam recentem, minis congrue laudabatur, & a drachmis quatuor ad unciam unam propinari solebat.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

REC. Herbæ Serpilli in umbra siccatae libras duas,
Saturejæ florentis,
Thymi florentis,
Florum Chamomillæ Romanæ ana uncias duas,
Cinnamomi uncias tres,
Macidis unciam semis.

Incisa & contusa misce, atque, per biduum vini albi generosi libris octodecim infusa, lento igne libræ octo eliciantur.

Prodest illis, qui catarrhis & defluxionibus vexati sunt, nervos & ventriculum, cum reliquis visceribus, corroborat, asthmaticis subvenit, urinam, calculum & menses mo-

AQUÆ.

II

vet, omnibusque aquis, quas vocant apoplecticas, fortasse præferenda est.
Dosis ab uncia semis ad integram.

AQUA CALCIS VIVÆ.

REC. Calcis vivæ libram dimidiam.

Superfundantur aquæ fontanæ libræ quinque; post ebullitionem decantetur aqua supernatans, atque fervetur.

Notatu dignum est, aquam Calcis vivæ etiam decimæ, vigesimæ &c. infusionis ejusdem esse virtutis ac primæ; cum demonstrandum sit, quod Calcis in aqua solubilis pars una vel 1500. partes aquæ imprægnare valeat.

Usus plerumque externus est ad inflammationes, ambusta (vel simpliciter adhibita, vel cum oleo, in linimenti formam subacta) ulcera, & id genus affectiones. Interne in frigidis morbis, chronicis imprimis, fluore albo, diarrhæis chronicis, calculo, ad uncias duas plures, bis de die, imo ad libram unam, quibusdam cum æquali, vel majori portione lactis mixta propinatur, scopo siccandi & detergendi.

AQUA CARBUNCULI.

REC. Herbæ Majoranæ,

Salviæ ana unciam unam semis,

Florum Lavendulæ uncias quatuor,

Liliorum convallium,

Rorisinarini,

Rosarum,

Cinnamomi,

Cardamomi minoris ana unciam unam,

Nucis moschatae,

Macidis,

Caryophyllorum ana unciam semis,

Zinziberis,

Galangæ,

Baccarum Juniperi ana drachmas tres,

Spiritus vini rectificati libram unam,

Aquæ rubi idæi,

lavendulæ ana libras tres.

Fiat infusio per octiduum, in loco tepido, postea destillatio ad dimidias. Liquori destillato, splendoris vulgo expetiti causa, folia auri immergi solent.

Ufus frequens est externus ad epithemata cordis & pulsuum; ad fætum roborandum gravidarum abandoni, cum aqua embryonum imponitur. Internus usus rarior est. Nomen inde habere ajunt, quod carbunculos & bubones pestilenciales expellat, & retrocessionem eorum prohibeat.

AQUA CARMINATIVA.

REC. Herbæ Absinthii pontici unciam
femis,

Centaurii minoris,

Pulegii,

Origani ana drachmas duas,

Florum Chamomillæ Romanæ,

Chamomillæ vulgaris, ana li-
bram unam semis,

Seminis Anethi uncias duas,

Anisi,

Fœniculi ana unciam unam,

Carvi unciam semis,

Corticum aurantiorum exteriorum un-
cias duas.

*Incisa & contusa infundantur per quatri-
dum in aquæ fontanæ libris duodecim,
postea ad residuum unius tertiæ destil-
lentur.*

*Probatu usus est in affectibus colicis, hystericis,
doloribus post partum, & in mensibus do-
lorificis; cum non adeo calida sit, ubique
tutius adhibetur.*

Dosis ab uncia dimidia ad integram & ultra.

AQUA CARMINATIVA SPIRITUOSA.

REC. Calami aromatici,

Herbæ Menthæ crispæ,

Serpilli florecentis ana uncias
duas,

Florum Chamomillæ Romanæ libram
femis,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana uncias duas semis,

Cinnamomi acuti uncias tres,

Nucum moschatarum,

Baccarum Lauri,

Juniperi ana unciam semis,

Corticum Aurantiorum recentium un-
cias duas.

*Incisa infundantur spiritus vini rectificati
libris novem, aquæ fontanæ libris quin-*

*que, digerantur per triduum, postea
destillentur ex vesica libræ decem.*

*Prodest contra flatu, & loco alterius spiritus,
post pastum, ad unciam unam dari potest.*

AQUA CARMINATIVA PER
INFUSIONEM.

REC. Seminum Coriandri,

Fœniculi,

Dauci,

Anisi,

Carvi,

Anethi, ana unciam semis,

Parum contusis affunde

Spiritus vini optimi libras quatuor.

*Stent per aliquot dies in digestionem, post-
ea addantur*

Sacchari clarificati unciae duodecim,

& liquor per chartam emporeticam filtra-
tus usui fervetur.

*Flatu discutit & pellit; dosis uncia dimidia
ad unam usque. In Codice medicamenta-
rio Parisiensi sub nomine: Claretum e sex
feminibus venit; aliis ob eximias virtutes,
Aqua immortalis & Rossolis des fix
graines vocatur.*

AQUA CARYOPHYLLORUM
AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum aromaticorum un-
cias tres, in pulverem tritis adde
Aquæ fontanæ libras quatuor.

*Macerentur per triduum, postea destillen-
tur leni igne, & aquæ oleosæ lacteæ
libræ tres eliciantur.*

*Inter aquas cordiales & stomachicas referri
meretur, & ob gratum saporem mixturis
cordialibus addi potest.*

AQUA CEPHALICA CAROLI QUINTI.

REC. Summitatum Majoranæ,

Melissæ,

Origani,

Florum Anthos,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Rosarum rubrarum,

Salviæ ana uncias duas,

Caryo-

Caryophyllorum,
Nucum moschatarum ana uncias duas,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Cubebæ,
Granorum Paradisi,
Macidis ana unciam semis.

Incisa & contusa grosso modo infunde in spiritus vini optimi libris octo, stent per dies sex in loco calido, & postea, addita aquæ fontanæ libra una semis, destillentur.

Si libuerit,

Ambre griseæ &
Moschi grana aliquot
aliquotæ illius destillatæ parti, aut rostro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qui odorem ferre possunt, & tunc completa vocari solet.

Quæ de Aqua apoplectica diximus, etiam hic repetenda esse censemus: hanc nempe pariter in affectibus, a causa frigida ortis, feliciter adhiberi; si vero in morbis sanguineis in usum vocetur, majus damnum ab usu interno expectandum esse.

AQUA CHAMOMILLÆ ANISATA.

REC. Florum Chamomillæ recentium libras quatuor,
Seminis Anisi libras duas,
Vini albi generosi libras viginti octo.
Post digestionem aliquot dierum destillantur ad dimidias, sive Mensuras tres cum dimidia.

Uso frequenti tanquam carminativum se commendat:

Dosis uncia dimidia ad unam usque.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

REC. Succu Cydoniorum expressi, & vinosam indolem, mora temporis, natu libras sex,
Cinnamomi electi uncias quatuor.

Fiat infusio per triduum, postea destillantur, ut residuum tertiam partem æquet.

AQUA CINNAMOMI SINE VINO.

REC. Cinnamomi acuti uncias octo,
Aquæ cerasorum nigrorum libras duodecim.

Pars II.

Misceantur, digerantur per triduum, destillantur ex vesica, donec tertia pars solum restet.

NB. Si cinnamomum cum aqua Buglossi, **BUGLOSSATA**, si cum aqua quatuor sic dictorum florum cordialium eodem modo destillatur, aqua Cinnamomi **COR-DIALIS** vocatur, sed neutra prærogativam habet, & egregie hac utraque caremus.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

REC. Cinnamomi acuti uncias sedecim,
Vini albi spirituosu libras duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duas & semis.

Infusa per biduum destillantur per vesicam, lentissimo igne, & liquoris spirituosu lactescentis libræ octo proliciantur.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

REC. Cinnamomi electi uncias novem.
Minutim concisis superfundantur

Vini albi generosi libræ duodecim,
macerentur in vase clauso, postea destillantur ad dimidias.

Cum Cinnamomi virtus analeptica sit & nervina, sapor vero & odor omnibus gratus esse soleat, cunctis aquis cordialibus, analeptics & apoplecticis hæc admiscuntur, & certe vix ullum est, in totius materiæ medicæ farragine, suavius ac efficacius aroma. Hinc in omnibus morbis adhiberi potest, habita ratione, quo cum liquore aqua fuerit destillata. Phlegmaticis & senibus spirituosu, aliis sine vino destillata propinetur. Admiscuntur vero potionibus analeptics, vel solæ etiam ad cochlearia duo vel tria offerri possunt.

AQUA CONFORTATIVA, sive PERLATA.

REC. Aquæ Cerasorum nigrorum libram unam & semis,

Tiliæ uncias sex,

Cinnamomi vinosæ unciam unam semis,

Margaritarum occidentalium præparatarum scrupulos duos,

D

Coral-

Coralliorum alborum præparatorum drachmam unam,
Cornu cervi usti præparati scrupulos quatuor,
Julepi rosati uncias tres.

Est aqua, quam confortativam vocant, ordinaria, & infantibus ac aliis, qui medicamenta reformidant, offerri solet.

Dosis est ab uncia dimidia ad integram.

Hic autem pharmacopœi monendi sunt, ne nimiam ejus quantitatem saccharo temperatam, sed potius, ne ace scat, non saccharatam reponant, & si necesse sit, Julepum rosarum, ad edulcorandum, addant, vel potius suadendum, ut præparationem differant, donec forte desideretur.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

REC. Cinnamomi acuti uncias duas & semis,

Corticum citri recentium e pomis octo,
Sandali citrini unciam unam,

incisa & contusa infundantur in

Aquæ Buglossæ,

Acetosæ ana libra una,

Ceraforum nigrorum,

Rosarum fragrantissimæ,

Rubi idæi ana libra una & semis,

Misceantur, destillentur ad tertiæ partis remanentiam e vesica.

In morbis acutis ac malignis febribus, ubi calida, & nimium aromatica, merito fugiuntur, optimi effectus est, & admiscetur potionibus & mixturis.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

REC. Cinnamomi acutissimi uncias tres, drachmas duas,

Corticum citri exteriorum recentium unciam unam,

Sandali citrini unciam semis,

Galangæ,

Caryophyllorum,

Macidis,

Nucum moschatarum ana drachmam unam semis,

Cardamomi minoris drachmas tres,

Florum Lavendulæ drachmas sex,

Borraginis unciam unam,

Rosarum uncias duas semis.

Incisis & tritis adde

Vini albi generosi,

Succi Pomorum redolentium,

Fructuum Rubi idæi ana libram unam,

Aquæ Borraginis,

Buglossi ana libram unam semis,

Rosarum libras duas semis,

Rubi idæi,

Ceraforum nigrorum,

Melissæ ana libram semis.

In vase vitreo bene clauso, per dies quatuor, digerantur, deinde in balneo destillantur ad dimidias, id est libras sex.

In morbis malignis & inde prostratis viribus, potionibus additur; prodest etiam a morbo convalescentibus, ad vires restaurandas.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rasuræ cornu cervi uncias sex,

Pomorum citri, cum corticibus incisorum, numero quatuor.

Infunde per nycthemeron

Aquæ Rosarum,

Scabiosæ,

Acetosæ,

Cardui benedicti,

Melissæ,

Scordii ana libra una.

Postea destilla ad quartæ partis remanentiam.

Analeptica & alexipharmaca deprædicatur, & in febribus malignis utilis præter rationem credebatur. Receptam reliquimus formulam nequaquam de utilitate medicamenti convicti, sed ut ii, qui medicamenti & olim sæpius & nunc subinde ab his illisve adhibiti præparationem evolvere cupiunt, invenient. Nostra sententia egregie pharmacopœlia & hac & subsequente aqua e Corde Cervi carere possunt.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO.

REC. Corticum aurantium recentium libram unam;

Concisi in

Vini albi libris octo

infundantur & destillantur ad dimidias.

Car-

AQUÆ.

Carminativa & stomachica est.

Dosis uncia una, vel una semis.

AQUA E CORDE CERVI.

REC. Cor cervi recens scindatur in partes minores, addantur

Foliorum Melissæ,

Borraginis recentium ana uncia
duæ,

Florum Rosarum,

Tunicæ ana uncia una,

Corticis ligni Sassafras,

Cinnamomi,

Sandali citrini ana drachmæ sex,

Caryophyllorum,

Nucis moschatæ ana drachmæ duæ.

Incisus & contusis affundantur

Vini albi libræ quatuor,

Aquæ Melissæ,

Borraginis ana libra una semis.

Destillantur statim ex vesica, leni igne, ut residuum libras tres æquet.

In confesso quidem est, aquas destillatas ab animalium partibus tantum haud accipere, quod vulgo creditur, ideoque hanc aquam vix quidquam virtutis e corde cervi nancisci; cum vero abs plebe frequenter e pharmacopoliis petatur, in Dispensatorio hoc nostro locum illi concedere volumus.

Habet autem eandem, a reliquis ingredientibus, vim, quam aqua cordialis temperata, & ab uncia semis ad unciam unam sola hauriri, vel potionibus admisceri potest.

AQUA sive BALSAMUM EMBERTONUM.

REC. Nucum moschatarum uncias tres semis,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Cubebæ,

Granorum Paradisi,

Zedoariæ ana uncias duas,

Macidis unciam semis,

Galangæ drachmas tres,

Croci orientalis drachmas duas,

Florum Tunicæ,

Tiliæ ana libram unam,

Lavendulæ,

Herbæ Salviæ,

AQUÆ.

15

Seminum Carvi,

Fœniculi ana uncias tres,

Menthæ crispæ,

Radicum Pœoniæ,

Seminum ejusdem,

Visci querni ana uncias duas,

Medullæ panis tritici a furno calentis libras
duas.

Incisa & contusa infundantur in

Vini malvatici libris decem,

Aquæ Borraginis,

Buglossæ ana libris quatuor,

Florum Liliorum convallium libris
duabus & unciis octo,

Fragorum,

Rosarum ana unciis sedecim,

Digerantur per triduum, postea destillantur lento igne ex vesica ad dimidias.

Descriptio, quam modo dedimus, est Pharmacopœæ Augustanæ, in qua, cum a longo tempore apud nos in usu fuerit, nihil immutare volumus.

Constat ex aromatibus & calidis sanguinem commoventibus, unde caute mulierculis ad abortum dispositis, siquidem plethoricæ sint, commendanda est, ne hæmorrhagias excitet. Prodest vero flatulentis & debilibus, potestque loco aquæ carminativæ adhiberi; externe non sine fructu, cum crusta panis calida, abdomini imponitur.

Ab uncia semis ad integram hauriri potest.

AQUA vel BALSAMUM EMBERTONUM correctior, sive ELIXIR VITÆ MULIERUM.

REC. Galangæ,

Zedoariæ ana unciam semis,

Herbæ Menthæ,

Melissæ ana unciam unam,

Florum Stœchadis Arabicæ,

Tunicæ,

Tiliæ ana drachmas quinque,

Seminis Sileris montani,

Fœniculi Cretici ana unciam semis,

Nucum moschatarum unciam unam,

Cinnamomi drachmas sex,

Corticum Aurantiorum recentium,

Citri recentium ana unciam unam
semis.

D 2

Incisa

Incisa & contusa infundantur Vini albi libris decem. Post digestionem viginti quatuor horarum, destillentur ad dimidias.

Cum præcedenti convenit, tamen non adeo aromatica, calida & pretiosa, atque ad internum usum magis commendabilis est.

Dosis cochlearia duo vel tria.

AQUA EPIDEMICA LONDINENSIS.

REC. Radicum Angelicæ,

Tormentillæ,

Gentianæ,

Zedoariæ,

Liquiritiæ,

Herbarum Chelidonii majoris,

Rorismarini,

Rutæ,

Salviæ,

Artemisiæ,

Abfinthii,

Anagallidis,

Draconticæ,

Scabiosæ,

Agrimoniæ,

Melissæ,

Scordii,

Centaurii minoris,

Cardui benedicti,

Betonicæ,

Roris folis ana unciam unam.

Macerata in vini albi libris duodecim, destillentur ad dimidias.

Medicis Anglis magni usus erat hæc aqua in febribus epidemice grassantibus, malignis, & cum paucæ apud illos aquæ destillatæ simplices prostant, aquam hanc, cujus vires theriacales, vel, si mavis, bezoardicæ sunt, salubri instituto, in usum vocasse videntur.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

REC. Florum Liliorum convallium recentium uncias sex,

Lavendulæ unciam unam,

Rorismarini,

Stœchadis Arabicæ,

Tiliæ ana unciam semis,

Cinnamomi drachmas sex,

Nucum moschatarum unciam semis,

Piperis longi,

Cubebæ ana drachmas duas,

Visci querni,

Radicum Pœoniæ,

Fraxinellæ, five Dictamni nostratis ana unciam semis.

Macerata in Vini generosi libris octo per tri-duum, destillentur ad dimidias.

Ad epilepsiam, vertiginem, apoplexiam, tum præservandi, tum curandi fine, in ipso paroxysmo, vulgo commendari solet; cum vero aqua sit aromatibus dives, facilis erit conjectura, quid in his morbis valere possit.

Assumi potest ea quantitate, qua alix aquæ spirituosæ.

AQUA FLORUM OMNIUM.

REC. Stercoris vaccini recentis, mense Junio collecti, quantum placet.

Includatur sacco lineo; & cum triplo aquæ fontanæ, ex vesica, leni igne destilletur, atque ex qualibet libra stercoreis, libra una semis aquæ, proliciatur.

Vix ulli nostris temporibus placebit, sufficiat indicasse, quid per flores omnes intellexerint, quin quod contra arthritidem, colicam, calculum & urinx suppressionem laudarint, atque externe inter cosinetica numerarint.

AQUA FORTIS.

REC. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati,

Nitri purissimi ana libras duas.

Trita misceantur & destillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui aquæ fontanæ libra una ante sit infusa.

Rarus ejus usus in medendo, sed plurimum a chymicis & artificibus aliis expetitur.

Spiritus Nitri, ope acidi vitriolici paratus, ab omni, quæ ipsi adhæret, labe vitriolica liberatur, abstractione a novo Nitro.

AQUÆ.

AQUA AD GONORRHOEAM HOFFMANNI.

REC. Radicum Iridis Florentinæ uncias duas,
Herbæ Menthæ ficcæ uncias tres,
Dictamni Cretici unciam unam,
Seminis Agni casti,
Rutæ ana uncias duas semis,
Terebinthinæ Venetæ uncias decem,
Vini albi generosi libras decem.

Fiat destillatio ex Mariæ balneo ad dimidias.

*Non solum in gonorrhœa, sed & fluore albo fœmi-
narum, præmissa purgatione, insignis utilitatis
esse credebatur, sed caute adhibenda est.*

*Dentur, suadente auctore, ægrotis mane horis dua-
bus vel tribus ante pastum, & vesperi quatuor
horis a cæna duo cochlearia.*

AQUA GRISEA.

REC. Mercurii vivi,
Aquæ fortis ana unciam unam,
reponantur in locum calidum, ut solvatur
Mercurius; solutioni adde decoctum se-
quens:

REC. Radicis Chelidonii majoris,
Aristolochiæ longæ,
Herbæ Rutæ hortenſis,
Scordii,

Florum Rosarum ana unciam unam.

Coque in aquæ fontanæ libris novem, ut
post colaturam remaneant libræ octo.

Misceantur calide, & statim abibunt in
mixturam grisei coloris.

*Commendatur ad ulcera phagedænica, &
specifice ad Synoviam.*

Convenit cum Liquore BELLOSTII.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum vivorum, in par-
tes dissectorum, numero quadraginta,
Foliorum Rutæ hortenſis recentium uncias
duas,
Castorei orientalis veri unciam unam,
Vini albi libras octo.

Misceantur, & statim e vesica destillentur ad
dimidias.

Vires sunt antepilepticæ & hystericæ.

Pars II.

AQUÆ.

17

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam per se vel
cum aliis.*

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum dissectorum nu-
mero triginta,

Visci querni,

Radicis Pœoniæ ana unciam unam semis,

Seminis ejusdem unciam unam,

Florum Liliorum convallium uncias quatuor,

Sambuci unciam unam semis,

Aquæ fontanæ libras decem.

Misceantur, destillentur ad dimidias.

*Convenit cum præcedente, & infantibus etiam, qui
castoreum plerumque nauseant, & spirituosâ non
ferunt, cum potionibus & mixturis, a drachmis
duabus ad sex, præscribi potest.*

AQUA HUNGARICA, sive REGINÆ HUNGARIÆ.

REC. Herbæ & florum Rorismarini, una
collectorum, libras quatuor,
Herbæ & florum Salviæ libram semis,
Zinziberis uncias duas.

Parum incisa infundantur Spiritus Vini re-
ctificati libris duodecim, aquæ fontanæ
libris duabus, & destillatione ex vesica,
leni igne, libræ undecim eliciantur.

Si spiritus prolectus denuo cohobetur de
novis floribus, odoratui se magis com-
mendabit.

*Usus omnibus notus est externus, quippe in
decubitu humorum, contusionibus, tumori-
bus &c. adhibetur, vel sola, vel aliis spi-
rituosis admixta.*

AQUA HYSTERICA.

REC. Radicum Pœoniæ,
Zedoariæ,
Levistici,
Imperatoris ana unciam
unam,

Herbarum Melissæ,

Matricariæ,

Menthæ,

Florum Chamomillæ Romanæ ana
unciam unam semis,

Seminis Carvi,

E

Se-

AQUÆ.

Seminis Sileris montani,
Fœniculi,
Corticis Citri exterioris ana unciam
unam.

Incisa & contusa infundantur

Spiritus vini rectificati libra dimidia,
Aquæ fontanæ libris septem.

Digesta per biduum destillantur lento igne,
ex vesica, donec libræ quatuor liquoris
habeantur.

*Carminativa est & anodyna. Prodest fœmi-
nis hystericis, & in defectu mensium, do-
loribus post partum, colicis & similibus
affectibus, non sine successu adhibetur.*

Dosis ab uncia una ad unam semis.

AQUA LIGNI SASSAFRAS
COMPOSITA.

REC. Lign. Sassafras odorati libram semis,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Vini generosi libras decem.

Stent in digestionem per aliquot dies, postea
destillantur ad dimidias.

*Carminativa & stomachica est, atque senibus
& phlegmaticis in affectibus catarrhalibus
conducit, & cephalalgiam mitigat.*

Dosis drachmæ duæ vel tres.

AQUA LILIORUM CONVALLIUM
CUM VINO.

REC. Liliorum convallium recentium,
absque stipitibus, libram unam,
Vini albi libras octo.

Post digestionem per triduum destillantur
leni igne, ex vesica, ad dimidias.

*Commendatur apoplecticis & paralyticis, ner-
vina, cordialis & stomachica est.*

Dosis uncia una.

AQUA LOCH SANI ET EXPERTI.

REC. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbarum Hyssopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ,
ana uncias duas,

AQUÆ.

Seminum Anisi,
Fœniculi ana unciam
unam,

Cinnamomi electi uncias duas.

Incisa & contusa macerentur in aquæ fon-
tanæ libris decem, & post digestionem
per triduum, destillantur ex vesica, us-
que dum libræ quatuor restent.

*Est saporis & odoris grati, nec etiam effectu
pectoralis destituta. Cum illa paratur Loch
sic dictum sanum & expertum.*

*In dosi copia non facile exceditur, & ab un-
cia una semis ad duas exhiberi potest.*

AQUA MAGNANIMITATIS.

REC. Formicarum, Majo vel Junio collecta-
rum, libras duas,

Spiritus Vini rectificati libras tres.

Macerentur per quinque vel sex dies, & post-
ea in Balneo Mariæ abstrahatur spiritus ad
siccitatem, in quo denuo infundantur

Cinnamomi electi uncia una,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris ana drachmæ sex,
Cubebarum uncia semis,
Zedoariæ drachmæ decem.

Post digestionem per triduum abstrahantur in
Balneo Mariæ.

*Commendatur ad vitia nervorum frigida, Venerem
languidam, & id genus alia; articulos a para-
lysi debilitatos externe adhibita mire corroborat.*

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

AQUA MASTICHINA.

REC. Mastices uncias quatuor,
Nucum moschatarum unciam unam.

Contusis, & per triduum in spiritus vini
rectificati libra una maceratis, addan-
tur aquæ fontanæ libræ quatuor, destil-
lentur ex vesica, leni igne, donec resi-
duum sit librarum duarum, liquor la-
cteus prodiens fervetur.

*Aqua hæc vires habet stomachum confortan-
tes, hinc in singultu, ciborum fastidio, fla-
tulentia, diarrhœa & vomitu commendatur.*

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA

AQUA ANTI-MELANCHOLICA.

REC. Radicum Buglossi recentium uncias quatuor,

Florum Borraginis,

Buglossi,

Anthos ana unciam unam,

Croci Austriaci drachmas duas,

Flavedinis corticum Citri uncias duas,

Fructuum five pomorum Cydoniorum recentium, odoratorum uncias sex.

cisa infundantur in vini albi libris octo, maceratione per viginti quatuor horas peracta, destillantur ad dimidias.

commendatur melancholicis, atque mentis torporem, inæstítiam & timorem auferre creditur.

Dosis uncia una vel duæ.

AQUA MELISSÆ ANTIHYSTERICA.

REC. Foliorum Melissæ recentium libram unam,

Baccarum Lauri,

Seminis Cumini ana unciam unam,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Castorei drachmas duas,

Vini albi spirituosi libras duodecim,

post sufficientem digestionem destillantur ad dimidias.

Vires ex titulo patent, nimirum antihystericæ, carminativæ.

Dosis uncia semis ad integram.

AQUA MELISSÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Melissæ recentis libras duas, Vini albi libras octo.

Destillantur ad dimidias.

Censetur stomachica, cordialis & hysterica.

Dosis uncia una vel una semis.

AQUA MELISSÆ SPIRITUOSA.

COMPOSITA, EAU DES

CARMES, DICTA.

REC. Herbæ Melissæ recentis libram unam semis,

Flavedinis corticum citri recentium uncias quatuor,

Nucum moschatarum,

Seminis Coriandri ana uncias duas, Cinnamomi acuti, Caryophyllorum ana unciam unam.

Incisis affundantur

Spiritus vini rectificati libræ sex,

Aquæ Melissæ libræ duæ.

Post digestionem per biduum, destillantur ad quintæ partis remanentiam; spiritus eductus servetur.

Inter aquas spirituosas eminet; commendatur adversus apoplexiam, paralysin, & quoscunque morbos nervorum, a causa frigida ortos. Stomachicum & carminativum est egregium; externe adhibetur ad spasticos & rheumaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam &c.

Dosis a drachma una ad drachmas tres.

Pro usu externo tinctura Croci tingi solet.

AQUA MERCURIALIS AD USUS EXTERNOS.

REC. Cerussæ Venetæ unciam unam,

Aluminis crudi drachmas sex,

Lithargyrii unciam semis,

Mercurii sublimati corrosivi,

Salis ammoniaci ana drachmam unam,

Aquæ Solani,

Plantaginis,

Rosarum,

Nymphææ ana uncias quatuor,

Aceti Vini libram semis.

Trita & commixta modicum bulliant, postea non colata servantur.

Prodest cuti deformatæ, ad verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficos, fissuras, ulcera venerea, vel ubi septico & mundificante opus est, penicillo illita. Unciam unam ingrediuntur mercurii sublimati grana duo semis.

AQUA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubræ uncias octo,

In pulverem comminutis, infunde

Aquæ fontanæ libras sex,

& post digestionem per triduum, in loco calido

calido factam, destilla lento igne, atque aquæ oleosæ, suavissimi odoris, libras quatuor elice.

Commendatur in affectibus, a vitio mensum ortis, & morbis pectoris atque ventriculi.

Dosis uncia una.

E residuo in vesica extractum Myrrhæ parari potest, si per pannum laneum colatur, & leni igne ad mellis consistentiam evaporatur.

AQUA ODORIFERA.

REC. Herbæ Rorismarini,
Majoranæ ana unciam unam,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum ana uncias duas,
Ligni Rhodii,
Corticis citri recentis ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam semis.

Mixtis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ octo,
Aquæ fontanæ libræ quatuor,
& post digestionem per triduum, leni igne tres quartæ inde destillentur.

Ob odoris fragrantiam in animi deliquiis non solum naribus, sed & pectori & pulsibus applicari solet.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

REC. Aquæ calcis vivæ libram unam,
Salis armoniaci drachmam unam,
Misceantur, stent per viginti quatuor horas in vase cupreo, a quo aqua, colorem sapphireum nacta filtretur & fervetur.

Præfertur aliis collyriis, atque ad plerosque oculorum affectus commendatur. Vim habet refrigerantem, desiccantem & mundificantem. Instillatur vel oculis, vel mediantibus linteis applicatur.

AQUA PANIS.

REC. Crustæ panis recentis e clibano extracti, & adhuc calentis, libras duas,

Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum ana unciam dimidiam,

Vini albi spirituosii libras octo.

Destillantur leni igne ad dimidias.

Inter aquas stomachicas & analepticas eminet, & gustui grata est.

Dosis uncia dimidia ad integram.

AQUA PHAGEDÆNICA.

REC. Aquæ calcis vivæ uncias sedecim.
In hac dissolve
Mercurii sublimati corrosivi grana viginti quatuor.

Serva.

Ad exulcerationes externas, carnem luxuriantem & fæda inprimis ulcera venerea mundificanda & consolidanda feliciter adhibetur.

Hac mercurii sublimati ad aquam calcis proportionem mercurius fere omnis colore aurantio præcipitatur. Obtinetur ita medicamentum mite, dolorem non excitans. Si major mercurii sublimati quantitas additur, hic aqua solutus tenetur, nec ultra præcipitatur; eritque aqua talis phagedænica leniter corrosiva, carnem luxuriantem magis exedens. Pro ratione circumstantiarum & sine Chirurgi dosi mercurii sublimati vel prudenter minui, vel augeri potest.

AQUA PHTSAGOGA.

REC. Seminis Anisi libram unam,
Sileris montani unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Nucum moschatarum,
Galangæ,
Macidis,
Caryophyllorum aromaticorum ana unciam semis,

Contusa macerentur per triduum in
Vini albi generosi libris sedecim,
Spiritus vini rectificati libris duabus,
& destillantur leni igne ad dimidias.
Ventriculum & intestina roborat, & nomen suum tuetur.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUÆ.

AQUA PROPHYLACTICA, five ACETUM BEZOARDICUM SYLVII.

REC. Radicum Angelicæ,
Zedoariæ ana unciam
unam,
Petafitidis uncias duas,
Foliorum Rutæ hortensis uncias
quatuor,
Melissæ,
Scabiosæ,
Florum Calendulæ ana uncias duas,
Nucum juglandium immaturarum,
confissarum libras duas,
Pomorum Citreorum recentium, con-
fissorum libram unam.

Contusis omnibus affunde aceti vini opti-
mi libras duodecim. Digerantur per
noctem, mane destillentur igne lento, ad
ficcitatem fere, cavendo empyrevma.

*Summis laudibus celeberrimus Autor effert ad
curationem februm, continuarum imprimis,
& admisceri jubet potui ordinario, mixtu-
ris, potionibus, jusculis &c. exhibet eam
ad sudores modeste proliciendos, bilis acri-
moniam obtundendam, sitim compescen-
dam, vomitum cohibendum, oris amaro-
rem emendandum, præsertim in peste &
cunctis affectibus epidemicis eximiam esse
vult; externus ejus usus est, ut pulsibus &
naribus admoveatur.*

*Exhiberi solet ab uncia semis, ad unciam
unam semis.*

AQUA REGIS.

REC. Aquæ fortis uncias sex,
Salis ammoniaci albi unciam unam.
Mixta ferventur.

*Usus chymicus potissimum est ad solvendum
aurum; medicus non, nisi rarissime, si un-
quam.*

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

REC. Foliorum Salvie recentium uncias
octo,
Rorismarini,
Serpilli,
Thymi ana unciam unam,
Cardamomi utriusque drachmas sex,

Pars II.

F

AQUÆ.

21

Macidis,
Nucum moschatarum,
Caryophyllorum,
Zedoariæ,
Galangæ,
Calami aromatici ana unciam dimi-
diam,
Vini spirituosii libras octo,
Spiritus vini rectificati libras quatuor,
Post sufficientem digestionem destillantur
lento igne ad quartæ partis remanentiam.
*Vires cum Aquæ apoplecticæ spirituosæ viri-
bus conveniunt.*
Dosis uncias semis ad drachmas sex.

AQUA SAPPHIREA.

Videatur AQUA OPHTHALMICA
SAPPHIREA.

AQUA SPLENETICA.

REC. Aquæ Melissæ,
Menthæ,
Epilepticæ Langii ana uncias tres,
Mixturæ simplicis Ludovici drachmas
tres,
Essentiæ Castorei drachmam unam,
Elæosacchari Succini drachmas duas.
Misceantur.

*Usus in affectibus splenetico-hysterici ad unciam
semis, vel drachmas sex.*

AQUA STOMACHICA.

REC. Summitatum Menthæ crispæ recen-
tis uncias tres,
Galangæ,
Nucum moschatarum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Vini spirituosii libras octo.
Destillantur ad dimidias.

Vires ex ipsa denominatione patent.

Dosis uncia semis ad integram.

AQUA THERIACALIS COMPOSITA.

REC. Radicum Angelicæ,
Valerianæ,
Cardopatii,
Ostrutii,

Radi-

AQUÆ.

Radicum Zedoariæ ana unciam unam,
Herbarum Scordii,

Rutæ ana unciam unam
femis,

Corticum Citri recentium uncias
duas,

Baccarum Juniperi unciam unam,
Theriacæ Andromachi libram femis,
Aquæ fontanæ libras decem.

Misceantur & proliciantur per destillationem aquæ libræ sex.

Est alexipharmaca, stomachica, atque carminativa, & in febribus malignis, affectibus ventriculi, vomitu, torminibus, dysenteria, additur mixturis & potionibus.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA THERIACALIS SIMPLEX.

REC. Theriacæ Andromachi uncias quatuor.

Vini albi libras quinque.

Abstrahantur libræ duæ femis.

Alexipharmaca censetur, & a theriacæ ingredientibus vim habet stomachum confortandi & carminativam.

AQUA TRAUMATICA THEDENII.

Vide infra LIQUOR VULNERARIUS THEDENII.

AQUA TYPHORUM CERVI COMPOSITA.

REC. Typhorum Cervi succulentorum libras duas femis,

Radicum Pœoniæ unciam unam,

Herbæ Melissæ,

Florum Borraginis,

Buglossi,

Rorismarini,

Tunicæ ana unciam unam femis,

Rosarum unciam femis.

Incisis affundantur

Vini albi spirituosæ libræ duodecim.

Destillantur leni igne ad dimidias.

Vires habentur alexipharmacæ, cordiales & anti-melancholicæ, sed revera hæc & sequens typhorum aqua eandem censuram idemque fatum cum supra notata aqua Corn. C. citr. & e Corde Cervi meretur.

Dosis uncia una, vel duæ.

AQUÆ.

AQUA TYPHORUM CERVI SIMPLEX.

REC. Cornua cervi recentia succulenta con-
scindantur in frustula, & ad libram
unam addantur libræ tres Vini ge-
nerosi, destillantur ex Mariæ Bal-
neo ad dimidias.

*Destillatur etiam per se, absque vini additione ex
M. B. grata satis, sed & cara.*

AQUA VEGETO-MINERALIS
GOULARDI.

REC. Aquæ destillatæ simplicis libras
duas,

Spiritus vini unciam unam,

Extracti Saturni unciam dimidiam.

Misceantur & ferventur in vase vitreo.

*Egregium est remedium externum in inflam-
mationibus, maxime a causis externis ortis,
luxationibus, contusionibus, fracturis, ocu-
lorum variis affectibus, ulceribus, fistulis, ad
ambusta, in panaritio, & in genere, ubi
repellentia & exsiccantia sine damno adhi-
beri possunt.*

AQUA VERONICÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Veronicæ florecentis libras
tres,

Vini albi libras octo.

Postquam per aliquot dies ad incipientem
usque fermentationem in loco tempera-
to steterunt,

Destillantur lento igne ad dimidias.

*Balsamica, vulneraria & tonica est. Com-
mendatur tam in tussi pulmonali, quam hy-
pochondriaca, in primis senibus asthmaticis
& ad marasimum dispositis convenit.*

*Dosis bis vel ter in die ab uncia una ad un-
ciam unam femis.*

AQUA VISCERALIS MAUCHARTI.

REC. Rad. recent. Symphiti majoris,

Liquiritiæ,

Farfaræ ana uncias quinque,

Herb. recent. Bugulæ,

Chærefolii,

Hederæ terrestris,

Hyperici florentis,

Herb.

Herb. recent. Plantaginis minoris,
Scabiosæ,
Veronicæ, ana manipulos
quatuor,

Seminis Anisi stellati drachmas sex,
Macidis drachmam unam,
Mastiches electæ drachmas tres,
Cancrorum fluviatilium vivorum Nro.
triginta,
Pulmonem vituli recens mactati,

Incisis superfundantur

Aquæ Buglossi,
Chærefolii,
Hederæ terrestris,
Veronicæ, ana libra una semis,

Destillantur per Balneum Mariæ, atque libræ
quatuor liquoris eliciantur.

*Vulneraria est, demulcet, & præsertim phthisicis,
atrophicis & hæcticis convenit.*

Dosis uncia una, aut altera.

AQUA VITÆ MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM
correctior.

AQUA VULNERARIA, Gallis
Eau d'arquebusade dicta.

REC. Herb. recent. Agrimonixæ,
Alchimillæ ana mani-
pulos duos,
Aristolochiæ,
Artemisiæ ana mani-
pulos quatuor,
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicæ,
Buglossi ana manipu-
los duos,
Consolidæ Saraceni-
cæ manipulos qua-
tuor,
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis utriusque,
Saniculæ ana mani-
pulos duos,
Salviæ hortensis ma-
nipulos quatuor,

Herb. recent. Scrophulariæ,
Verbenæ ana mani-
pulos duos.

Incisis affundantur vini spirituosii libræ qua-
draginta, & post digestionem aliquot
dierum, donec fermentare paululum in-
cipiant, destillantur lento igne, ex vesi-
ca ad dimidias; aqua spirituosa fervetur.

*Laudatur aqua hæc ad contusiones, sugilla-
tiones, luxationes, ambusta, inflammatio-
nes, gangrænam præcavendam, ad vulne-
ra, nec non ad partes roborandas. Sunt,
qui etiam interne adhibere solent, ad flatum
& tormina discutienda, spirituosissima enim est
& aromatica.*

*Descriptio est e Dispensatorio Brandenburgi-
co, atque pro genuina habetur, idcirco in
officina aulica regia usualis.*

AQUÆ VULNERARIÆ descriptio Pharmacopææ Parisiensis.

REC. Radicis recentis Symphyti majoris,
Foliorum ejusdem,
Bellidis majoris & minoris,
Bugulæ,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimonixæ,
Hyperici cum summitati-
bus,
Vincæ pervincæ,
Hederæ terrestris,
Artemisiæ,
Veronicæ,
Verbenæ,
Telephii majoris,
Millefolii ana uncias qua-
tuor,
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Absinthii,
Chelidonii majoris,
Fœniculi,
Aristolochiæ clematitidis,
Menthæ,
Hyssopti,

Foliorum Nicotianæ ana uncias octo,
 Rutæ,
 Chamomillæ,
 Scordii,
 Majoranæ,
 Rorismarini ana uncias
 quatuor,
 Summitatum & Florum,
 Lavendulæ,
 Origani,
 Calaminthæ, ana
 uncias sex.

Macerentur per quadriduum in vini generosi libris quinquaginta, ponderis civilis, postea destillantur ad dimidias.

Si spirituosa expetitur hæc aqua vulneraria, loco vini, herbis modo præscriptis spiritus vini non rectificati superaffundantur libræ quinquaginta, atque destillantur.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

REC. Zedoariæ uncias sex,
 Seminis Anisi uncias tres,
 Corticum Citri unciam unam.

Incisa infunde per triduum in vini generosi libris decem.

Postea destillantur ad dimidias.

Easdem cum succedenti habet vires, flatus discutit, & tormina exinde oborta.

Ab uncia dimidia ad unciam integram assumi potest.

AQUA ZEDOARIÆ SIMPLEX.

REC. Zedoariæ uncias octo,
 Vini generosi libras octo.

Destillantur ad dimidias.

Est carminativa & alexipharmaca.

Dosis uncia dimidia ad integram.

ARCANUM CORALLINUM.

REC. Mercurii vivi purissimi uncias quatuor.

Solvantur in Spiritus nitri sufficienti quantitate, vel unciis circiter octo; solutio committatur retortæ, & leni igne liquidum evocetur. Tunc augeatur ignis, & retorta undique car-

bonibus vivis obruatur, ut omnes spiritus expellantur; quo peracto refrigescat. Retorta caute diffracta, invenietur in ejus fundo Mercurius præcipitatus, coccineo colore splendens; sublimatum quod ad collum retortæ hæret, corrosivum, provide separari debet. Præcipitatum rubrum, quod in fundo reperitur, in mortario vitreo optime tere, interterendum Olei Tartari per deliquium uncias tres vel quatuor affunde, atque diu & multum pistillo agita; tandem, affusa aqua copiosa, omnem falsedinem elue, & pulverem rubrum exsicca. Cicurari hac trituratione cum Oleo Tartari alcalino, corrosivum acidum creditur, præsertim si super pulverem aqua elutum aliquoties spiritus vini accensus deflagretur.

Ufus Arcani corallini, in diaphoresi promovenda, a multis commendatur, stimulum alvum ducentibus pharmacis addit, & ad ciendum salivæ fluxum interdum adhibetur. Rectius tamen plurimi ab usu interno præparati hujus, licet mitigati, quod cum mercurio præcipitato rubro convenit, abstinent.

ARCANUM DUPLICATUM, five NITRUM VITRIOLATUM.

REC. Vitrioli Ungarici, vel alius martialis, libras duas,

solvantur in

Aquæ calidæ fontanæ libris octo, vel decem;

Nitri fixi tantundem in aquæ fontanæ libris quinque soluti.

Ambas solutiones filtratas sensim commisce, Nitri fixi solutionem Vitrioli lente infundendo; præcipitabitur terra metallica; cum quodam effervescentiæ indicio; affundatur solutio alcalina ad punctum saturationis usque; filtretur postea permixtus liquor. Terra præcipitata eluatur affusa aqua calida, ut omnis extrahatur falsedo. Evaporentur permixti liquores ad cuticulam, & ad crystallisationem reponantur.

Sal medium hoc, Tartaro vitriolato Tacheniano per omnia simile; medicamentum in malo hypochondriaco, febribus, verbo, in obstructionibus, & detergendis ventriculo atque

atque intestinis a viscidis humoribus, egregios effectus præstat. Alvum ducit, a scrupulo ad scrupulos duos & drachmam integram exhibitum. Commiscetur vero plurimumque absorbentibus, & ita etiam administratum, ad incidendos viscidos humores in primis viis, multum valere deprehenditur. Animadvertendum magnopere est, ut bene sit præparatum, atque metallicæ particulæ penitus sint præcipitatae, (quod fit sufficiente solutionis Nitri fixi additione,) alias facile nauseam & vomitum excitat.

Nota. Parari plerumque solet sic dictum hoc Arcanum duplicatum ex residuo Aquæ fortis, vehementissimo igne calcinato, & sufficiente quantitate aquæ soluto. Si affusione portione quadam liquoris Nitri fixi residuæ forsitan metallicæ Vitrioli particulæ penitus fuerint præcipitatae, filtratione & crystallisatione æque securum, idque minori constans pretio, præbet Arcanum duplicatum, ac superior præscriptio.

ARCANUM TARTARI, sive TERRA FOLIATA TARTARI.

REC. Cinerum clavellatorum antea bene depuratorum uncias quatuor, mmitte vitro amplo & successive affunde Aceti Vini destillati quantum sufficit ad perfectam saturationem.

Liquor obtentus per chartam emporeticam filtretur & in vase figulino probe vitreato ad siccitatem evaporetur, sub finem lenissimum ignis gradum adhibendo &, ne massa grumosa fiat, continuo agitando. (Si forsitan, uti subinde contingit, alcali non satis ab aceto saturatum fuerit, quod gustu aliisve experimentis deprehendetur, denuo acetum vini destillatum affundatur, usque dum nulla amplius effervescencia oriatur, atque eodem modo tractetur.) Remanentia salina aqua frigida solvitur, atque solutio per chartam bibulam filtrata, rursus, uti antea dictum, evaporatur, & siccata in vitro probe clauso, loco calido, ne liquecat, fervatur.

Pars II.

Est medicamentum blandum, saponaceum, incidens, resolvens, abstergens, urinam & alvum movens.

A scrupulo uno ad drachmam unam in vehiculo aquoso exhibetur.

Solvitur pariter penitus in spiritu vini egregiamque tincturam solventem, infra sub nomine LIQUORIS TERRÆ FOLIATI TARTARI commendatam, præbet.

Nota. Præscripsimus loco alias usitati Salis Tartari albiissimi cineres clavellatos depuratos, quippe non minus efficaces & longe viliori pretio prostantes. Posset eximii medicamenti sæpissime applicabilis pretium magis imminui, si loco aceti destillati acetum simplex meracum adhiberetur, verum tunc post evaporationem massa nigra remanet, cum terra foliata tartari albidior vulgo desideretur & æstimetur. Hæc nigredo quidem ipsi exuitur, si massa salina in cacabo ferreo super prunas sub continua agitatione æqualiter liquefit, post refrigerium in aqua frigida solvitur, per filtrum transmittitur, & tunc denuo inspissatur; ast veremur merito, ne ob albedinem obtinendam repetita tali operatione pars oleosa destruat & ipsa pars saponacea medicamenti hoc artificio pereat, attamen cum terra foliata tartari non forma sicca sed soluta præscribi soleat, posset cinerum clavellatorum libra dimidia saturari cum aceti vini simplicis acerrimi sufficiente quantitate, & lixivium per filtrum antea trancolatum inspissari ad remanentiam libræ unius & dimidiæ; haberetur sic medicamentum minus pretiosum & æque activum, quod sub nomine *Liquoris terræ foliatæ tartari VULGARIS* sive *PRO PAUPERIBUS* asservari meretur.

Ab alio quodam artificio, quo Arcanum Tartari ope Sacchari Saturni bene albidum præparatur, dehortamur potius, quam ut id doceamus; sufficiat monuisse, quod ex tali artificio

AURUM.

ficio huic fali non provide præparato labes saturnina adhærere possit.

AURUM FULMINANS.

REC. Auri purissimi drachmas duas,
Solvantur in

Aquæ Regis unciiis duabus,
Solutioni instilletur spiritus falis armoniaci volatilis aquosi, quantum satis, ad plenariam auri præcipationem; præcipitatum, repetita affusione & ablutione aquæ fontanæ, edulcora, & pulverem luteo-fusci coloris, charta bibula exceptum, & lenissimo calore exsiccatum, in vitro ad usum serva.

Assumptum Auri pondus una tertia parte solet superare, ob falia Auro præcipitato arcte adhærentia.

Nota. Aurum fulminans, si non ex puro Auro, ut vulgo fieri solet, præparatum fuerit, tormina vehementia excitat. Neque vero nummi, quos *Ducatos* vocant, ex purissimo Auro cusi sunt, sed semper aliquid & circiter vigesima quarta pars cupri vel argenti additur, quod monetarii *legare* dicunt; Cuprum vero ab aqua regis etiam solvitur, & cum auro præcipitatur. Opus igitur est, ut depuretur antea, quod optime per encheirefin illam, quam in arte separatoria periti *quartam* vocant, fit: Auri nimirum pars una, cum tribus argenti, funditur, postea in aqua forti solvitur; ita aurum in fundo remanet. Ut autem constet, omne argentum auro extractum & ab aqua forti solutum esse, superaffundatur alia, repetatur tertio, & leni calore ebulliat; denique effundatur aqua fortis, & regia ejus loco affundatur, qua solvetur aurum, purum jam & aptum, ex quo fulminans paretur.

Expectabatur olim ab hoc pharmaco, quippe e nobilissimo metallo, auro, præparato, quod & per se a grano uno usque ad quinque scopo purgandi dabatur, & alia composita ingrediebatur, haud exigua efficacia, maxime in pertinacissimis intestinorum obstructionibus, ast suspectum omnino est & noxium; hinc nostris temporibus merito prudentiores ab eo abhorrent, cum facile ex ipsa præparatione per principia chemica vis ejus arrodens intelligatur.

BACILLI. BALSAM.

BACILLI AD FORNACEM.

Videatur MASSA AD FORNACEM.

BACILLI DE LIQUIRITIA ALBI.

REC. Gummi Arabici,
Specierum diaireos simplicium,
diatragacanthæ ana unciam semis,

Radicis Liquiritiæ,
Amyli ana unciam unam.

Terantur omnia in pollinem subtilissimum, cui addantur

Sacchari albi pulverisati libræ duæ,
Mucilaginis tragacanthæ quantum satis;

Pinfantur in mortario, fiat massa, ex qua formentur, pro lubitu, bacilli; qui sub nomine LIQUIRITIÆ ALBÆ COCTÆ reponantur.

BACILLI DE LIQUIRITIA CITRINI.

REC. Liquiritiæ pulverisatæ unciam unam,
Iridis florentinæ,
Amyli albi ana unciam semis,
Croci subtilissime triti scrupulum unum,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthæ, massa, ex qua formentur bacilli.

In catarrhis & defluxionibus acribus ad fauces, indeque orta tussi sicca, & raucedine profunt.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

REC. Olei Nucistæ expressi uncias tres semis,
Jasmini,
Cinnamomi,
Ligni rhodii ana drachmam unam semis,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Rutæ,
Succini ana scrupulum unum,
Moschi,
Ambræ ana grana sedecim,

Zibethi

BALSAM.

Zibethi scrupulum semis,
Balsami Peruviani scrupulos duos,
Spodii nigri præparati quantum satis pro
colore.

Oleo nucistæ lento igne liquato, instillantur
olea destillata, Moschus & Ambra cum spiri-
tu rosato trita, Zibethum & Balsamum Peru-
vianum in fine addantur.

Parari etiam absque Moscho, Ambra & Zibe-
tho debet, pro illis, qui horum odorem per-
ferre nequeunt.

*Apoplecticorum naribus, vertici, temporibusque il-
litum, potissimum vero, ob odoris commendatio-
nem, expeti solet.*

BALSAMUM ARCÆI.

REC. Terebinthinæ Venetæ,
Gummi, vel potius resinæ Elemi,
Sevi cervini ana uncias duas,
Olei Hyperici unciam unam,
Sandali rubri drachmam unam.

Gummi Elemi in Terebinthina lenissimo
igne solvitur, quibus successive addun-
tur sebum & oleum Hyperici, in alio
vase liquata.

*Præstans vulnerarium & digestivum est, quod
in vulneribus feliciter adhibetur.*

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

REC. Olei destillati Caryophyllorum
drachmam unam,
Nucistæ expressi drachmas
duas semis,

Mixtis colorem concilia pulvere tenuissimo
caryophyllorum, vel Boleti cervini.

*Balsama simplicia ex olei virtute, e quo pa-
rata sunt, æstimantur.*

BALSAMUM CEPHALICUM SAXONICUM.

REC. Olei destillati Lavendulæ,
Succini albi ana scrupu-
lum unum,
Pulegii,
Majoranæ,
Salviæ,
Anthos,

BALSAM.

27

Olei destillati Saturejæ ana grana quin-
decim,

Macidis,
Rutæ ana scrupulum semis,
Menthæ,
Origani ana grana duo-
decim,
Nucis moschatae expressi
unciam unam.

Misceantur, & fiat Balsamum.

*Cephalicum est, nervinum, stomachicum, robo-
rans, &c.*

BALSAMUM CINNAMOMI.

REC. Olei destillati Cinnamomi drach-
mam unam,
Nucistæ expressi, ope spiritus
Vini, odore suo privati,
drachmas duas semis,

Fiat Balsamum, Bolo Armena tingendum.

*Præstantissimum est in omnibus affectibus, in
quibus balsamo opus est, & propter suavis-
simum odorem, quem nemo facile fastidit,
omnibus commendari potest.*

BALSAMUM COMMENDATORIS DE PERNE, sive PERSICUM, Gallis BEAUME DE COMMANDEUR.

REC. Balsami Indici ficci unciam unam,
Styracis in granis uncias duas,
Benzoës electæ uncias tres,
Olibani electi unciam semis.

Trita solvantur in
Spiritus Vini rectificatissimi unciis
quindecim.

Solutio per chartam filtrata fervetur.

Seorsim infundantur in
Spiritus Vini rectificatissimi unciis
decem,

Radicis Angelicæ,
Herbæ Millefolii,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana uncia dimidia.

Digesta & sufficienter extracta expriman-
tur; Essentia, pariter per chartam fil-
trata, superiori solutioni addatur, & op-
time per digestionem mixta servantur.

Multis laudibus evehitur hoc balsamum a Pometo, qui nobis descriptionem, quam alii diversimode variatam exhibent, suppeditavit, & tam internus ejus usus, quam externus, magnopere in variis morbis, & omnis generis vulneribus & ulceribus commendatur; nec etiam laude sua Essentiam hanc balsamicam privandam esse censemus. Moneamus tamen, interne illud cum circumspectione, & in parva dosi, ne sanguinem exæstuet, præscribere; sufficiunt guttæ decem, vel quindecim, vitello ovi vel sacchari pulvere, mixtæ, cum vehiculo aquoso exhibere. Completum hoc balsamum dicitur, si adhuc Ambra & Moschus adduntur.

BALSAMUM EMBRYONUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM LAVENDULÆ.

REC. Olei destillati Lavendulæ drachmam unam,
Nucistæ expressi, odore & colore ope spiritus vini viduati, drachmas duas semis.

Mixta tingantur coeruleo montano.

BALSAMUM LOCATELLI.

REC. Olei Olivarum uncias sex,
Cerae citrinæ uncias quatuor,
Vini Canariensis uncias quinque.

Leni igne, ad consumptionem vini coctis, adde
Terebinthinæ Venetæ claræ uncias sex,
Balsami Peruviani drachmas duas,
Sandali rubri unciam semis.

Ad vulnera, contusiones, variasque læsiones internas pariter, ac externas, commendatur;

Interne propinatur a drachmis duabus, ad unciam semis in jusclo.

BALSAMUM MAJORANÆ.

REC. Olei Majoranæ destillati drachmam unam,
Nucis moschatæ expressi drachmas duas semis.

Misceantur.

Vires sunt cephalicæ, nervinæ & errhinæ.

BALSAMUM NUCISTÆ.

REC. Olei Nucistæ expressi drachmas duas,
destillati scrupulos duos,

Misceantur.

Vires habet stomachicas, cephalicas, nervinas, atque bono cum effectu in diarrhæa infantum adhibetur.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

REC. Olei ligni sancti drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opium,
Camphoræ ana scrupulos duos,
Olei Nucistæ expressi drachmas sex,
Opium & Camphora spiritus vini pauxillo soluta, misceantur cum reliquis.

Vires in sistendis gravissimis dentium doloribus compertæ sunt, si vel solum, vel gossypio exceptum, cavitatibus dentium applicetur.

BALSAMUM OPHTHALMICUM
St. YVEANUM.

REC. Butyri recentis non saliti uncias tres,

Cerae albæ unciam dimidiam.

Liquefactis & parum refrigeratis admisce
Mercurii præcipitati rubri subtilissime pulverisati drachmas duas cum dimidia,
Florum Zinci drachmam unam,
Camphoræ in oleo ovorum solutæ scrupulos duos cum dimidio.

Misceantur in mortario lapideo, & fiat lege artis balsamum.

Conducit in diversis oculorum inflammationibus, serosis præcipue & venereis, quin etiam in corneæ maculis & ulcusculis. Adhibendi modus est, ut granum dimidium vel & integrum oculo bis in die usque ad sanationem infricetur.

BALSAMUM RUTÆ.

Fit eodem modo, quo Balsamum Lavendulæ, loco Olei Lavendulæ, Oleum Rutæ

tæ fumendo, atque pauxilla florum viridis æris quantitate tingendo.

commendatur hystericis atque epilepticis.

BALSAMUM SAPONIS.

REC. Saponis Hispanici exsiccati & pulverisati libram dimidiam,

admisce contundendo in mortario

Olei Terebinthinæ libram dimidiam,

fiat massa asservanda sub nomine corporis pro balsamo saponis. Jam ulterius

REC. Hujus corporis pro balsamo saponis libram unam,

Spiritus vini rectificati libras quatuor.

Digere leni igne & filtra.

Eximium est medicamentum resolvens. Conducit in luxationibus, fracturis, panaritio, tumoribus varii generis. Pari modo vel balsamum hoc, vel ejus corpus in spiritu serpilli solutum, vel cum oleo Cornu Cervi sætido mixtum, addita quoque pro lubitu camphora, auxilium affert in paralyti & tabescentia membrorum, arthritica ariditate partium, tumoribus œdematosis & in ipsa anchylosi, si partibus affectis ad ignem a guttis triginta ad quinquaginta circa articulos inungitur.

BALSAMUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti Populei,

Olei Nucistæ expressi ana unciam unam,

Opii, in spiritu vini dissoluti, drachmam unam,

Olei ligni Rhodii guttas sedecim.

Misce, fiat balsamum.

Varibus, temporibus, & pulsibus illitum, in capitis dolore sopiendo, & impediendis nimis vigiliis, prodest.

BALSAMUM STOMACHICUM.

REC. Olei Absinthii destillati,

Corticum Aurantiorum,

Caryophyllorum,

Macidis,

Menthæ ana drachmam semis,

Balsami de Peru drachmam unam,

Olei Nucistæ expressi unciam unam.

Pars II.

Misce, fiat balsamum.

Ventriculum confortat, vomitus & singultum sistit, flatus & ructus pellit ac discutit, epigastricæ regioni illitum.

BALSAMUM SUCCINI.

REC. Olei Nucis Moschatæ expressi drachmas duas semis,

Olei destillati Succini drachmam unam.

Misce, fiat balsamum.

In affectibus hystericis, cephalalgia mulierum, & spasmodis infantum externe adhiberi solet.

BALSAMUM SULPHURIS
AMYGDALATUM.

REC. Florum Sulphuris unciam unam,
Olei Amygdalarum dulcium recens expressi uncias sex.

Digerantur in arena calore convenienti per dies aliquot, donec oleum colore sit tinctum rubro. Refrigerato vase Balsamum separetur a sulphure non soluto.

Convenit ad ulcera tam interna, quam externa, & secure dari potest a guttis quindecim ad triginta, in subjectis phlegmaticis. Recentius quoque contra mala ex deglutito arsenico & ærugine orta laudatum est.

BALSAMUM SULPHURIS
ANISATUM.

Eodem paratur modo, quo præcedens, substituto Oleo Anisi destillato, loco Olei Amygdalarum; quod & de eo notandum, quod succinatum & therebinthinatum vocant & subinde parari jubent.

Prodest in colica flatulenta, & affectibus catarrhalibus, pectus infestantibus.

Dosis guttæ quinque ad duodecim.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDI.

REC. Sulphuris citrini uncias duas,

Olei Therebinthini uncias tres,

Lini libras duas.

Sulphuri liquato adde oleum lini, & coque lentissimo igne, donec acquisiverit colorem

H

rem

rem fuscum; his aliquantum refrigeratis infunde oleum therebinthinæ, digere lenissimo calore, & ferva usui.

Usus est externus, resolvens, discutiens, vulnerarius; præcipue vero ad Emplastrum sulphuris Rulandi adhibetur.

BALSAMUM VITÆ AD MODUM HOFFMANNI.

REC. Olei destillati Lavendulæ,
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Macidis,
Cinnamomi, ana scrupulum unum,
Rutæ,
Succini albi ana scrupulum semis,
Citri, e corticibus recens expressi, scrupulum unum,
Ambræ griseæ scrupulum semis.

Olea cum Ambra & Balsami Peruviani scrupulo uno misceantur, atque in spiritus vini rectificatissimi tartarifati unciis decem solvantur.

Balsamum vitæ non solum externe ad odorandum, & partes debilitatas confortandas, ad ventriculi affectus, nauseam, ructus, colicam & diarrhæam adhibetur, sed & interno usui ad eosdem morbos, tanquam nervinum, cephalicum, stomachicum, præcipue senibus ac serosis, a guttis decem ad viginti feliciter commendatur.

BALSAMUM VULNERARIUM.

REC. Spiritus vini rectificatissimi uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ unciam unam semis.

Mixta solvantur in liquorem aurei coloris.

Ad vulnera recentia, præcipue nervosarum partium, punctim inflicta, non sine insigni fructu adhibetur.

BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

Videatur LIQUOR.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

REC. Terebinthinæ claræ Venetæ unciam unam semis,
Gummi Elemi pulverisati unciam semis.

Solvatur lenissimo igne, postea addantur Olei Hyperici, ex floribus per infusionem parati, uncia una semis,

Ceræ destillati scrupuli duo.

Misce, fiat balsamum.

In vulneribus noviter inflicis, linteis applicatum, laudatur.

BALSAMUM VULNERARIUM STAHLII.

REC. Essentiæ Succini ordinariæ uncias duas,

Myrrhæ unciam unam.

Olei Therebinthinæ unciam semis.

Misce, digere loco calido.

Conducit ad vulnera, & ulcera partium exsanguium, etiam cariosa. In partibus sanguineis proportio Essentiæ Myrrhæ augetur. Ita vices supplere potest pretiosioris Balsami Commendatoris.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum Italicarum.

Vim ipsi tribuebant alexipharmacam, sudoriferam, in morbis malignis, & a morsibus venenatorum animalium ortis, nec non in lepra, morbo venereo & Arthritide commendabant, verum hic pulvis viperarum exsiccatarum inefficax & insigniori corruptioni per moram obnoxius est, atque nequaquam istis & olim & recentius celebratis curationibus cum decocto viperarum vivarum & integrarum substitui potest.

BEZOARDICUM JOVIALE.

REC. Reguli Antimonii simplicis uncias quatuor,

Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur simul in crucibulo, effusa atque refrigerata pulverisentur, postea additis Mercurii sublimati unciis octo,

atque

BEZOARD. BOLI.

atque optime in mortario vitreo mixtis, ad intimiorem solutionem, reponantur per aliquot dies noctesque in cellam, tum retortæ immiffa destillentur, butyri Antimonii instar; liquor, qui prodit, affusa magna aquæ fontanæ quantitate diluatur, & præcipitabitur pulvis albus, qui, repetita aquæ tepidæ affusione, edulcoratus & ficcatus, cum triplo Nitri detonetur. Postea, affusa multa aqua, omni falsedine privatus fervetur.

Commendatur ad hystericos affectus, & ei magnæ attribuuntur vires diaphoreticæ & anodynæ.

Dosis a granis decem, ad scrupulum unum.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Eadem methodo, qua præcedens Bezoardicum joviale paratur, loco reguli jovialis, regulum martialem fumendo.

Parum de Marte participat, & viribus a diaphoretico Martiali superatur; hinc, cum multo pretiosior etiam ejus præparatio sit, merito a Dispensatorii Brandenburgici editoribus Diaphoreticum martiale Ludovici substituitur, quibus & nos subscribimus. Viennenses specificum stomachale Poterii ejus loco commendant.

Adscribuntur vires roborantes, acidum absorbentes, & transpirationem promoventes.

Dosis grana XV. ad grana viginti quinque.

BEZOARDICUM MINERALE.

REC. Mercurii vitæ uncias duas,
Nitri crySTALLIFATI exsiccati uncias sex.

Misceantur, & in crucibulo, per vices ingerendo, lenissime detonentur. Massa alba salina aqua fontana solvitur atque edulcoratur. Pulvis subsidens leni calore exsiccat.

Eandem cum Antimonio diaphoretico simplici virium est, & eadem dosi ab iis propinatur, quibus forsitan adhucdum ejusmodi calces placent.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulverisata aqua fontana diluitur, aqua turbida, tenuissimis Boli particulis mixta, leni inclinatione separatur a spisso, novaque aquæ quantitas toties affunditur, & effunditur leniter, donec, præter arenulas & crassiores par-

BOLI. CAUTER.

31

tes nihil remaneat. Bolus, quæ paulatim in aqua decantata subsedit, effusa illa, fervatur exsiccata.

Tribuuntur Bolo vires alexipharmacæ & acidum absorbentes; merito vero inter adstringentia refertur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

BUTYRUM ANTIMONII.

Vide ANTIMONII BUTYRUM.

BUTYRUM CACAO.

Vide OLEA EXPRESSA.

BUTYRUM MAJORANÆ.

RUBRUM.

VIRIDE.

Vide UNGUENTA.

CANDELÆ FUMALES.

REC. Styracis calamitæ unciam unam
semis,

Benzoës,

Mastiches,

Caryophyllorum aromaticorum,

Sacchari albi ana drachmas sex,

Carbonum Tiliæ, vel ex alio ligno
levi optime exustorum uncias
quindecim.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui mucilaginis Tragacanthæ sufficiente quantitate, in justam consistentiam, sive massam, redigendus est, ex qua, pro lubitu, candelæ formari poterunt.

Si massæ modo præscriptæ

Balsami Peruviani uncia semis,

Olei destillati Caryophyllorum,

Ligni Rhodii,

Lavendulæ ana scrupulus unus,

addantur, candelæ fragrantiores, & sic dictæ COMPLETÆ formari possunt.

CASSIA EXTRACTA.

Vide PULPA CASSIÆ.

CAUTERIUM ANTIMONIALE.

Vide ANTIMONII BUTYRUM.

CAUTER. CERA.

CAUTERIUM POTENTIALE, f. LAPIS
SEPTICUS, f. LAPIS CAUSTICUS
CHIRURGORUM.

Lixivium saponariorum, (quod ex Calcis vivæ partibus tribus, cinerum clavellatorum parte una & aquæ communis partibus sex vel decem, facta post sufficientem agitationem solutione & filtratione, paratur,) in sartagine ferrea tam diu coquitur, donec omnis humiditas aquosa ablata fuit, residuum salinum sine ebullitione, ferè olei ad instar, fluit, atque extra ignem siccescit & concrescit. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescere incipiens spatula ferrea eximitur, vel super laminam ferream effunditur & in minores partes usui accommodatas dividitur, quæ vase accurate clauso propè fornacem asservari debent, ne humiditate attracta liquecant.

Inservit ad varias partes, v. g. excrescentias præternaturales corrodendas & destruendas atque ad fonticulos excitandos.

CAUTERIUM POTENTIALE MITIUS.

REC. Lixivii saponariorum uncias octo, coque ad uncias duas, dein liquori bullienti adde opii depurati drachmas duas, calcis vivæ pulverisatæ drachmas quinque vel tantum, quantum ad omnem liquorem absorbendum requiritur, ut pasta fiat vase optime clauso ad usus servanda.

Mitius est quam prius & minus dolorificum, loco celebrati arcani, septici Sutoriani, inservire potest & in hydrocele potissimum ab ELSE & GAHN commendatur.

CERA ARBOREA.

REC. Cerae citrinæ,
Resinæ Pini,
Colophonix ana libram semis,
Terebinthinæ vulgaris,
Adipis suillæ ana uncias duas,

Liquefiant & colentur.

Utuntur ea hortulani ad insitionem & læsiones arborum.

CERA. CERATUM.

CERA SIGILLARIS RUBRA.

REC. Cerae citrinæ uncias sedecim,
Resinæ Pini uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ uncias tres,
Cinnabaris factitiæ præparatæ uncias tres.

Liquetur cera & resina, atque mixturæ colatæ addatur cinnabaris modico olei lini trita, & effundatur in formas consuetas.

CERA SIGILLARIS VIRIDIS.

Eodem modo paratur, loco Cinnabaris, addendo æruginis, sive viridis Æris probe triti, & in olei lini drachmis duabus soluti, unciam unam.

Cerae rubrae in Medicina nullus usus est, viridi ad clavos & verrucas nonnunquam utuntur Chirurghi.

CERATA.

Ab emplastris parum differunt, nisi, quod sint molliora ac tractabiliora, hanc ob causam omnia in classem Emplastrorum retulimus, præter unicum

CERATUM SATURNINUM
GOULARDI.

REC. Lithargyrii uncias quatuor,
Aceti vini uncias sedecim,
coque invicem, per integram horam, sub perpetua agitatione cum spatula lignea, Solutionem decanta & filtra, quæ ab Autore vocatur *Extractum Saturni*.

Jam recipe

Olei olivarum uncias quatuor,
Cerae unciam unam,

mixta liquentur leni igne, huic massæ refrigeratæ successive adde Aquam Saturninam, ex unciis viginti quatuor aquæ & uncia una extracti saturni paratæ, ea adhibita encheiresi, ut in patina ampla, in loco frigido, per vices exiguæ saltem doses aquæ forti agitatione & concussione opè spatulæ lignæ commisceantur, donec tandem aquæ quantitas omnis, vel quantum fieri potest, subacta cum oleo & cera formam cerati albi, in magnam molem excrescentis, induerit. Labor hic commixtionis tribus quatuorve horis absolvi potest.

Vires

Vires extracti, aquæ & cerati ex saturno magnis laudibus in peculiari libello extolluntur a Goulardo, contra inflammationes externas, contusiones, ambusta, ulcera, fistulas, caneros, serpigines, scabiem, imo etiam, ope admixti saponis, contra anchyloses. Notissimis aceti lithargyrii & sacchari saturni viribus prudens Chirurgus laudatorum præparatorum usum facile metiri potest.

CHALYBS SULPHURE PRÆPARATUS.

Vide infra LIMATURA MARTIS SULPHURATA.

CHOCOLATA.

REC. Fructuum Cacao, parum tostorum, & a corticibus mundatorum, libram unam.

Pinfantur diu & diligenter in mortario calido, ut abeant in massam pultiformem tenuissimam, addatur successe

Sacchari albi, subtilissime triti, libra una,

& in fine

Vanigliarum, optime tritarum, Nro. quatuor.

Misceantur, atque pro lubitu, tabulæ vel cylindri formentur.

Nonnulli etiam

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas, & guttas aliquot Balsami Peruviani nigri

addere solent.

Vires sunt nutrientes, corroborantes & demulcentes; sine aromatibus parata hædificis & tabe consuntis prodest, atque senibus convenit.

CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur ANTIMONII CINNABARIS.

CINNABARIS FACTITIA.

REC. Florum Sulphuris uncias quatuor, Mercurii vivi purissimi uncias duodecim.

Pars II.

Fluat Sulphur in vase figulino satis capaci, cui per vices Mercurius, in tigillo calefactus, addatur; misceantur fistula, qua fumum Tabaci haurimus, exacte; solet tum fieri subito magnus sibilus, & exoriri fumus densus atque cum sonitu inflammari materies; operculo igitur vas tegendum. Refrigerata postea massa nigra, in pulverem trita, immittatur cucurbitæ vitreæ, vel vasi sublimatorio, cui imponatur alembicus; lutetur luto ex argilla & calce facto, ponatur in furnum sic, ut vas sublimatorium fere fundum capellæ attingat, obruatur arena paulo altius, quam materies; adhibeatur ignis per gradus, ad summum usque. Ascendit primo parum phlegmatis, deinde flores subalbidi, postea nigri, & tandem cinnabaris. Ubi ignis summus per tres horas applicatus est, frigescent sponte, & cinnabaris ab adhærente nigredine separata fervetur.

Nigredo oritur a sulphure abundante, pulcherrima enim Cinnabaris non nisi unam partem sulphuris, cum septem partibus Mercurii unitam, continet.

Cinnabaris talis factitia, minori constans pretio, non minores habet virtutes quam cinnabaris nativa.

Datur secure in eadem dosi, atque pulveribus addi potest, ubi alias cinnabaris nativa adhiberi solet. Cinnabaris tenerrime pulverisata venalis si minio adulterata esset, detegi potest fraus, vel instituta sublimatione, ut appareat, an sine residuo elevetur, vel affuso aceto, quod ex minio dulce redditur.

CINNABARIS NATIVÆ RECTIFICATIO.

Cinnabaris nativa cruda, in pulverem trita, immittitur vitro sublimatorio, atque igne arenæ per tres horas adhibito fortissimo, sublimatur, quæ, postea super marmore lævigata & aqua pura lota, vocatur

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA,

Quæ ex nonnullorum observatorum testimonio subinde arsenicales partes continet,

CLAR. COND.

net, & ob hanc quoque causam laudes olim obtentas non meretur.

CLARETUM E SEX SEMINIBUS.
Vid. AQUA CARMINAT. PER INFUS.

COLCOTHAR.

Est Vitriolum viride ad rubedinem calcinatum.

Ufus est in emplastris siccantibus.

CONCHÆ CITRATÆ.

REC. Concharum a mucore mundatarum & subtilissime pulverisatarum, libram unam, affundatur

Succi Citri libra semis, & leni calore, in patina vitrea, exsiccatæ servantur ad usum.

Loco Succi Citri, etiam aceto destillato faturari possunt.

Vires cum succedentium præparatarum conveniunt, magis tamen diureticæ deprehenduntur.

Dosis a scrupulo dimidio ad drachmam dimidiam.

CONCHARUM PRÆPARATIO.

Affundatur testis concharum oblongarum, acetum forte, macerentur, ut sordes atque mucor abradi queant. Mundatæ exsiccentur, pulveriscentur subtilissime & super marmore lævigentur.

Absorbentes sunt, febrifugæ, & sudorem ac urinam cient.

Dosis eadem quæ citratarum.

CONDITA.

Corticibus AURANTIORUM & CITRI recentibus superfundatur lixivium e cineribus clarum, sic, post unam vel alteram ebullitionem in vase figulino, mollescent. Quo facto abluantur aqua fontana calida, &, mundati ab albedine, cribro inverso imponantur, ut superfluo humore orbentur. Postea in vase vitreo repositis affundatur Saccharum clarificatum, & fere ad consistentiam tabulati

COND. CONF.

coctum, ad supereminentiam unius digiti, servantur.

FRUCTUS CYDONIORUM,
RADICES CALAMI,
CICHOREI,
ENULÆ,
SATYRII,
ERYNGII, & cæteræ

in aqua fontana coquuntur, usque dum mollescant, & a superflua humiditate exsiccatis, saccharum superfunditur, ad consistentiam tabulati coctum, quantum sufficit.

FRUCTUS vero BERBERUM,
CERASORUM,
RIBIUM, &
RUBI IDÆI,

sine prævia coctione, saccharo, ad consistentiam tabulati cocto immerguntur.

NUCES JUGLANDES immaturæ festuca perforantur, atque per sex vel octo dies in aqua frigida macerantur, quotidie aquam recentem superaffundendo. Postea ad mollitiem coquuntur, caryophyllis aromaticis & cinnamomo hinc inde stipantur, & saccharo clarificato, ad consistentiam tabulati cocto, immerguntur.

CARYOPHYLLI,
NUCES INDICÆ, &
ZINGIBER
ex Indiis condita advehuntur.

CONFECTIO ALKERMES.

REC. Succi Granorum Kermes tepesfacti & colati libras tres,
Aquæ rosarum uncias sex,
Olei Cinnamomi scrupulum dimidium,
Sacchari purissimi libram unam.

Saccharum cum aqua rosarum balnei calore liquefac in syrupum, dein succum Kermes immisce, &, postquam refrixerit, oleum cinnamomi adde, vel (id quod magis commodum) oleum cinnamomi frustulo sacchari instilla, in elæosaccharum tere, & tunc demum, ut eo facilius & æquabilius distribuatur, forma pulveris admisce.

Est hæc confectio gratum & cardiacum remedium, quod a scrupulo ad drachmam & ultra propinari potest, & a medicis anglis frequentius adhibetur. Recepimus ideo hanc e Pharmacopœa Londinensi desumptam formulam, & studio omisimus alias usitatam, pretiosam & minus congruam præscriptionem, quæ præter saccharum & succos pomorum Borsdorffianorum granorumque Kermes adhuc lignum aloës, cinnamomum, lapidem lazuli, margaritas orientales, folia auri & coccinellum pro hac confectioe requirit, eamque, si moschus & ambra additur, confectioem completam appellat.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA.

*REC. Seminis Anisi electi unciam unam semis,
Sacchari albi libram unam,
Diacrydii sulphurati drachmam unam,
Mechoacannæ albæ,
Jalappæ resinosæ ana unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmam unam.*

Immittitur Semen Anisi integrum aheni confectorio, super ignem collocato, atque affunduntur aliquot cochlearia Sacchari clarificati, moxque inspergitur de purgantium pulvere subtilissimo non nihil, exsiccato leni calore Aniso, denuo affunditur Saccharum & inspergitur pulveris portio, atque labor, Saccharum affundendo, pulverem inspergendo & Anisum rursus exsiccando, continuatur, usque dum omnis pulvis inspersus, & Anisum Saccharo probe incrustatum fuerit.

Inservit pueris, atque illis, qui alia medicamenta laxantia reformidant.

Datur a drachma ad unciam dimidiam & ultra.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

*REC. Specierum de Hyacintho unciam unam,
Syrupi acetositis Citri uncias tres.*

Mixta reponantur in vase porcellano fatis magno, ne ob effervescentiam vas rumpatur.

Attribuuntur vires cardiacæ & stomachicæ, atque in nimis hæmorrhagiis, aliisque fluxionibus moderandis, ad drachmam integram, ab iis, qui a lapidibus pretiosis & osse de corde cervi opem expectare audebant, adhibebatur.

CONFECTIONES SICCÆ,

ANISI,
CORIANDRI,
CUBEBARUM,
FOENICULI,
SINAPIS,

& reliqua non tam a Pharmacopœis, quam sic dictis Conditoribus parantur, atque pro tragea grossa expetuntur.

SEMEN CYNÆ

vero, Saccharo incrustatum, pro pueris, qui reliqua anthelmintica nauseant, in usum vocatur.

CONSERVA MILLEPEDUM.

*REC. Millepedum vivorum libram unam,
Sacchari albissimi libras duas semis.*

Contundantur in mortario marmoreo, & in vase vitreo vel porcellano ferventur.

In ictero, tussi ferina, asthmate, febre quartana & nephritide, optimo cum effectu, adhibetur.

Dosis drachma una ad duas.

CONSERVÆ SIMPLICES

parantur

E floribus & herbis recentibus minutissime incisis. Singulis libris adduntur libræ duæ Sacchari albi, in pulverem triti, deinde in mortario marmoreo, pistillo ligneo, probe contunduntur. Siccioribus herbis & floribus modicum aquæ additur, & omnes in vasis porcellanis vel vitreis servantur. Usitatiores

Conservæ, quæ ex herbis sive foliis parantur, sunt

ABSINTHII,
ACETOSÆ,
ACETOSELLÆ,
BECCABUNGÆ,
COCHLEARIÆ,

FUMA-

FUMARIÆ,
 HEDERÆ TERRESTRIS,
 MAJORANÆ,
 MENTHÆ,
 NASTURTII AQUATICI,
 VERONICÆ,

Ex floribus

ANTHOS,
 BELLIDIS,
 BETONICÆ,
 BORRAGINIS,
 BUGLOSSI,
 CICHOREI,
 FARFARÆ,
 PAPAVERIS ERRATICI,
 PÆONIÆ,
 PRIMULÆ VERIS,
 ROSARUM RUBRARUM,

quæ VITRIOLATA dicitur, si ad libram Conservæ Rosarum rubrarum spiritus Vitrioli drachmæ duæ adduntur.

SALVIÆ,
 TUNICÆ,
 VIOLARUM.

CITRI ex PULPA, abjectis seminibus, corticosa albedine, & tunicis, quæ cellulas constituunt, parari solent.

Calices nonnullorum florum, e. g. Borriginis, Buglossi, Primulæ veris, Violarum, demuntur.

Conservæ vires vegetabilium, ex quibus parantur, retinent, & pro basi electuariae inserviunt. Paucae in pharmacopolio requiruntur; eligantur efficaces, & cum corruptioni obnoxiae sint, neque diu asservari queant, usitatiores maxime e plantis antiscorbuticis quotannis recenter parentur.

CONSERVA SPAGTRICA.

REC. Salis Absinthii uncias duas,

Melissæ,

Urticæ ana unciam unam,

Tartari vitriolati unciam semis,

Arcani duplicati uncias duas.

Misceantur, & fiat pulvis, cui affundantur

Spiritus Sulphuris per campanam, drachmæ duæ.

Postquam deferbuerint, addantur

Conservæ Florum Rosarum rubrarum,
 Tunicæ ana libra una,

Olei Cinnamomi,

Corticum Citri,

Anisi ana drachma una,

Fœniculi,

Menthæ ana drachma semis,

Misceantur, & si completa hæc conserva desideretur, addantur

Ambrae griseæ grana quindecim, in spiritu Rosarum solutæ.

Per incompletam intelligunt nonnulli, quæ non Ambra modo, sed & oleis destillatis caret.

Laudatur ad obstructions viscerum referandas, in ictero, febribus quartanis chronicis, & mensium obstructione.

Vires hujus conservæ aperientes salibus mediis potissimum sunt tribuendæ; & quia olea destillata, in vasis non bene munitis servata, multum virtutis perdere possunt, ideo non consultum est, illam diu asservare. Loco Salis Absinthii, Melissæ, Urticæ sumatur Sal herbarum, si forsitan hoc non adeo concinne compositum remedium adhuc desideretur.

A drachma una ad unciam semis dari potest.

CORALLIORUM ALBORUM ET RUBRORUM PRÆPARATIO.

Probe trita cum aqua, super Porphyrite, subtilissime, usque dum nullum stridorem inter dentes edant, lævigentur, & rursus exsiccata, atque in pulverem redacta, servantur ad usum.

Absorbent, leniter adstringunt, & antepileptica vulgo censentur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

CORNU ALCIS PRÆPARATUM.

Lima in scobem redigitur, deinde in pollinem subtilem teritur, & servatur.

Vires antepilepticas ei adscribunt superstitiose potius, quam veritate effectus.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

CORNU CERVI AURATUM.

REC. Cornu Cervi usti præparati unciam unam,
 Foliorum auri purissimi libellos octo.

Mis-

Misceantur & terantur in mortario marmoreo, donec Aurum dispareat; postea calcinentur in crucibulo probe tecto, per tres horas, & pulvis purpurei coloris fervetur.

Iners & inutile medicamentum est; quod certe omissemus, nisi olim ob vires ab auro cordiales & alexipharmacas laudatum & pro desideratissimo arcano; quin pro sacra quasi anchora in morbis periculosis habitum fuisset. Inserviat heic ejus descriptio ad arcana ejusdem furfuris diducanda, quæ subinde ab ignorantibus, credulis alchemistis, vel & fraudulentis circumferuntur, & ob aurum contentum laudibus extolluntur.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE, sive SINE IGNE PRÆPARATUM.

REC. Cornu Cervi, in majora frusta secti, quantum placet.

Coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, donec mollescant; postea medulla & cortex exterior nigricans cultro separetur, & cornu albicans exsiccatum in polinem subtilissimum teratur.

Vires habet adstringentes & absorbentes. Laudatur olim in variolis, morbillis, & aliis febribus malignis.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

CORNU CERVI USTUM.

Calcinatur C. C. in frusta dissectum, aperto igne, ad albedinem.

Majorem possidet vim adstrictivam, quam philosophice præparatum; vires etiam anthelminticæ illi tribuuntur.

CREMOR vel CRYSTALLI TARTARI.

REC. Tartari albi, aqua calida aliquoties a fordibus externis abluti & in pulverem contusi, libras duas.

Coquendo in libris viginti quatuor aquæ fontanæ, in vase figulino, dissolvantur, & fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrigerit, crystallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam, cremoris nomine notam, qui, cum crystallis, frigida fontana aqua ablua-

Pars II.

tur, & exsiccatus, super Porphyrice, in pulverem albißimum conteratur.

Crystalli Tartari sal sunt essentielle Vini. Crassos & viscidos humores incidunt, alvum blande stimulant, appetitum excitant, hypochondriacis, biliosis, febricitantibus & cachecticis prosunt. Purgantibus additæ vires eorum augent.

Dosis scrupulus unus ad drachmas duas, imo ad unciam dimidiam. Difficulter, & non, nisi in liquore calido, solvi possunt.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ ferri uncias quatuor.

Dissolve in spiritus Vitrioli & aquæ fontanæ ana unciis octo, solutionem ad siccitatem in vase ferreo evapora, & forti igne in pulverem rubicundum calcina.

Vires ex nomine patent; verum ad internum usum vix commendatur, sed emplastris exsiccantibus & adstringentibus addi solet.

CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS STAHLII.

REC. Clavorum ferreorum libram unam, Antimonii libras duas.

Fluant optime in crucibulo, quibus adde Cinerum clavellatorum uncias quinque.

Cum omnia colliquata fluxerint, effunde in conum fusorium, & regulum a scorriis separatum ferva.

Scorix, fusci coloris, frustillatim contusæ, sive aëri umbroso, humida tempestate, vel cellæ expositæ, dilabuntur in pulverem subnigrum. Hunc pulverem, aqua tepida multa dilutum & probe agitatum, ita separa, ut quicquid ejus, post crassiorum particularum subsidientiam, ac aliquam moram, aquæ turbidum adhuc internatat tenuissimum, cum hac effundas; crassiore parte, sedimenti instar, in fundo remanente. Exit vero tenerioris hujus substantiæ oppido parum, quæ seorsim asservanda est, & cum triplo Nitri purissimi, in crucibulo levissime candescente, detonanda; Massa inde

K

inde nata rubicunda, edulcoretur, atque pulvis dilute rubens, sub titulo: *Croci Martis aperitivi tenuioris*, servetur. Subsidens vero illa altera portio similiter tractanda, edulcoranda, ficcanda, & cum triplo Nitri detonanda, quæ rursus edulcorata & ficcata, dat *Crocum Martis aperitivum*, obscurioris coloris, quam præcedens tenuior.

In hæmorrhagiis uteri, hæmorrhoidum nimio fluxu, diarrhæis, febribus intermittentibus, laudatus est. Dandus tamen vix tenuior ille ultra quatuor vel sex grana, cum effectu satis luculento; quemadmodum in lochialibus puerperarum turbis, non tam hæmorrhagicis, quam spasticis flatulentis, per frequenter Cl. Auctor eo usus est, & non minus, atque in atrophicis affectibus puerorum, quibus tincturam suam commendat Ludovici, cum Arcano duplicato exhibitum, expectationi satisfecisse testatur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS VULGARIS.

REC. Vitrioli Martis uncias quatuor, solvantur in aquæ fontanæ calidæ libra una. Solutioni instilletur salis alcali vel cinerum clavellatorum lixivii aqua fontana calida facti, & per chartam emporeticam filtrati, quantum ad saturationem acidi vitriolici, & præcipitationem Martis, fatis. Pulvis præcipitatus aqua fontana calida edulcoretur, & leniter ad rubedinem calcinetur. Liquor salinus evaporari ad cuticulam potest, qui ad crySTALLISATIONEM repositus, largitur Tartarum vitriolatum.

A præcedenti non differt, nisi quod magis adstringere deprehendatur. Dantur adhuc diversæ aliæ methodi crocos martis præparandi, quas studio omittimus & annotamus potius distinctionem in crocos aperientes & adstringentes non esse stricto sensu veram atque omnes hujusmodi crocos martiales sistere ferrum principio suo inflammabili plus minusve spoliatum, quodsi plenarie pro diversa præparationis ratione ami-

serunt, tunc in ventriculo & intestinis insolubiles sunt.

Dosis grana tria ad quatuor.

CROCUS METALLORUM.

REC. Antimonii crudi in pulverem triti, Nitri purissimi & ficiissimi ana libras duas.

Probe mixta detonentur in mortario, & cum refrixerit massa, ob colorem ad illum hepatis accedentem vocatur *Hepar antimonii*. Quod pulverisatum & edulcoratum, donec calx fusco-fulva maneat insipida, *Croci metallorum* nomine venit, cujus color, prout ad edulcorationem aqua vel fervida vel frigida fuerit recepta, sive magis est exaltatus sive minus.

Vehemens est emeticum, & nunquam in substantia præberi debet. Grana tria vel quatuor per noctem in vini uncias duabus infusa, virtute emetica vinum imbuunt. Veterinarii ad equos purgandos, pro una dosi, ad unciam semis, imo ad drachmas sex, devorandum præbent. Paratur etiam ex hoc Croco metallorum, Tartarus emeticus.

CROCUS SOLIS.

REC. Auri, per Antimonium depurati, partem unam,

Mercurii depurati partes sex.

Fiat amalgama, cui probe commisceatur duplicum Sulphuris triti, & sub tegula fulminatoria rudicula ferrea continue movendo, donec omne Sulphur & Mercurius avolarit, igne sufficienti calcinetur, sic Aurum in pulverem abibit rufum, subtilissime super marmore terendum.

Bezoardicas & cordiales vires illi tribuere vulgo sed male solent.

Dosis gramum unum ad duo.

CROCUS VENERIS.

Ex vitriolo vel crySTALLIS Veneris, per calcinationem, paratur, & affusa aqua calida edulcoratur.

Internus

Internus nullus, externe in unguentis ad depurandum & exedendum, & in emplastris exsiccantibus ejus est usus. Aquis ophthalmicis etiam, sed cum circumspectione jungi potest.

CRYSTALLUS MONTANA
PRÆPARATA.

Sicut de Coralliis supra dictum est, paratur.

Usus ejus in Diarrhœa biliosa æque male commendatur ac ad lac augendum. Contra vertiginem & Arsenicum assumtum vulgo etiam, sed frustra laudant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

DENTES APRI.

In pollinem subtilissimum terantur & ferventur.

Specifice sed absurdissime in pleuritide, & in nimis hæmorrhagiis adhibentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

DIACRYDIUM LIQUIRITIA
EDULCORATUM.

Solvitur libra dimidia Scammonei Alepensis in mortario, sub perpetua agitatione, decocto Liquiritiæ fervente; solutio lactea a fecibus nigricantibus, per inclinationem mortarii, separatur, atque lenissimo igne, vel in-Balneo, ad extracti consistentiam, evaporatur, residuum, leni calore exsiccatum, in pulverem teritur.

Decoctum ex unciis duabus Liquiritiæ, in aquæ fontanæ libris tribus, ad consumptionem libræ dimidiæ coctis, paratur. Si loco decocti liquiritiæ infusum rosarum sumitur, DIACRYDIUM ROSATUM, uti vocant, paratur.

Multum, per hanc præparationem, de suo nauseoso odore & sapore perdit, nec tamen sua efficacia purgandi privatur Scammoneum. Facile solvitur a ventriculi humoribus, & sine torminibus serum & viscidos humores educit. Hydropicis, omnibusque, quibus purgatione opus est, convenit. Datur, uti Diacrydium sulphuratum, verum in aliquantum majori dosi.

DIACRYDIUM SULPHURATUM.

REC. Scammonei electi uncias tres. In pulverem teratur, & supra chartam albam, acu perforatam, tenuiter ac æqualiter expandatur, atque supra cratem, cui carbo vivus sit subditus, in quem Sulphuris uncia successive injiciatur, suffumigetur, & ne liquefiat vel chartæ adhæreat, neque comburatur, spatula ferrea diligenter moveatur.

Est ingrediens & basis pulveris Cornachini. Purgat satis valide, & vel pilulis additur, vel sale quodam neutro miscetur.

Dosis a granis quatuor ad grana duodecim, raro ultra grana quindecim ascendendo.

DIAPHORETICUM JOVIALE
est

ANTIHECTICUM POTERII.

DIAPHORETICUM MARTIALE
est

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM
MARTIALE.

EBUR USTUM ALBUM seu SPODIUM.

REC. Eboris, in tenues lamellas seu frustula dissecti, libram unam,

Igni aperto ad albedinem calcinetur, tandem cum aqua, super marmore, lævigetur, & exsiccetur.

Vires, & dosis, quæ Cornu Cervi uesti.

ELATERIUM.

REC. Cucumerum agrestium sive asinorum, intra octiduum collectorum, quantum volueris.

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli insertionem, ut matura femina e fructibus profiliant, semen reliquum & mucago super cribrum proliciantur, quæ postea in mortario, pistillo ligneo, affuso sensim liquoris tenuis, e fructibus concisis exstillantis, & aquæ pluviae tantilla quantitate, contendantur, dum liquor pinguis & oleosus, e medulla seminis in pulpam contritus, per cribrum setaceum tenuissimum & novum, transmitti possit;
qui

qui lenissimo calore evaporatus, redigatur in consistentiam massæ pilularis.

Violenter, præsertim humores serosos, per alvum educit.

In hydropse aliis purgantibus, ad grana tria vel quatuor, addi solet.

ELÆOSACCHARA,
ANISI,
CINNAMOMI,
MACIS,
SUCCINI.

Fiunt, oleorum eorundem destillatorum guttas sedecim, cum uncia una Sacchari albissimi, terendo.

AURANTIORUM,
CITRI.

Saccharum Canariense pomis Aurantiis vel Citreis recentibus affricatur, donec sapore & odore bene imbutum sit.

Præstat vero illa, dum exposcuntur, demum parare.

Vires ex oleis destillatis, unde parata sunt, dijudicantur.

Adduntur pulveribus & trageis, dosi ea, quam commodam duxerit medicus.

ELÆOSACCHARUM ERRHINUM.

Videatur PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS.

ELECTUARIUM DE ACORO.

REC. Radicum Pseudoacori recentium, mediante instrumento culinari, quod scabinam (Reibeisen) vocant, in rasuram redactarum, uncias sex.

Coque in vase figulino, addita

Vini rubri libra una,

ad remanentiam unciarum decem; adde

Sacchari albi uncias triginta,

Radicum Calami aromatici, conditarum & minutim incisarum,

Zinziberis, in India conditi, minutim incisi, ana uncias quatuor,

Corticum Aurantium conditorum,

Corticum Citri conditorum ana unciam unam semis,

Cardamomi minoris,

Nucis Moschatæ,

Piperis longi ana drachmas tres,

Caryophyllorum aromaticorum drachmas quinque,

Cinnamomi acuti unciam unam,

Conservæ Rosarum libram unam.

Misce, fiat electuarium.

Electuarium hoc non solum se commendat gratissimo sapore, sed & virtute sua, ventriculum roborandi; digestionem juvat, in senibus, frigidis, & phlegmaticis, quibus etiam præcipue dictatum est.

Dari potest ab uncia dimidia ad integram.

ELECTUARIUM CATHOLICUM.

REC. Polypodii querni libram semis, decoquatur in

Aquæ communis libris quatuor, ad consumptionem quartæ circiter partis. In decocto colato dissolvantur

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum ana unciae quatuor,

Sacchari albi libræ quatuor, quibus, leni igne, ad mellis consistentiam redactis, pulveres subtilissime tritos cribratosque

Radicum Polypodii,

Rhabbarbari veri ana uncias duas,

Liquiritiæ drachmas duas,

Foliorum Sennæ orientalium uncias quatuor,

Florum Violarum,

Seminis Anisi ana uncias duas, paulatim insperge, & misce pro electuario.

A majoribus nostris valde æstimatum fuit: & pro purgante universali habitum; blande laxat alvum, ab uncia dimidia ad integram exhibitum. Admiscetur etiam clysmatibus in eadem dosi.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

REC. Limaturæ Chalybis, in alcohol redactæ, uncias septem,

Cinnamomi,

Nucis

Nucis moschatæ ana drachmas sex,
 Rhabarbari electi drachmas quatuor,
 Specierum aromaticarum rosatarum
 drachmas sex,
 Sacchari albi, in Succo Cydoniorum un-
 ciis sex soluti & rursus ad tabulati
 consistentiam cocti,
 Mellis despumati ana libram unam.

at miscendo electuarium.

audatur ad virginum morbos, retentionem men-
 suum, cachexiam; & ad drachmam unam; quæ
 Martis grana duodecim continet, præscribi solet.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

REC. Radicum Satyrii recentium, succulentarum,
 uncias quatuor.

minutim incisus & contusus in mortario lapideo
 adde

Sacchari albi, ad consistentiam tabulati
 cocti, uncias duodecim,
 Nucis Indicæ conditæ,
 Zinziberis conditi,
 Pinearum recentium,
 Pistaciarum non rancidarum, omnium
 minutim incisorum, ana unciam
 unam,

Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi acuti,
 Stincorum marinorum ana unciam semis,
 Brodii Zinziberis conditi, quantum satis
 ad consistentiam electuarii.

Analepticum, venerem languidam excitans, semen-
 que augens venditatur.

Dosis uncia dimidia ad drachmas sex.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORII.

REC. Radicum Bistortæ,
 Tormentillæ,
 Gentianæ,
 Herbarum Dictamni Cretici ana un-
 ciam semis,
 Scordii nostri unciam
 unam,
 Seminis Acetosæ drachmam unam
 semis,
 Cinnamomi acuti,
 Cassiæ lignæ ana unciam semis,

Pars II.

Piperis longi,
 Zinziberis ana drachmas duas,
 Opii Thebaici drachmam unam semis,
 Gummi Arabici,
 Galbani,
 Styracis ana unciam semis,
 Boli Armenæ unciam unam semis,
 Terræ Lemniæ unciam semis,
 Conservæ Rosarum rubrarum libram
 unam,

Mellis despumati uncias triginta.

Opium, Gummi Arabicum & Galbanum
 in uncis tribus vini albi solvantur, &
 optime cum melle misceantur, postea
 reliqua, in pollinem subtilem trita, ad-
 jiciantur, tandem conserva Rosarum ad-
 datur, atque omnia, probe agitando, in
 electuarium redigantur.

Est pharmacum a longo tempore usita-
 tum, & sudorifera, ac inprimis alexi-
 pharmaca, anodyna & styptica virtute
 commendabile; hinc ad diarrhæam quoque
 sistendam laudatur. Quælibet uncia hujus
 electuarii circiter grana duo habet Opii.
 Dosis drachmæ duæ vel tres.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

REC. Laccæ pictoriæ in globulis uncias
 duas,

Terræ Japonicæ,
 Mastichis,
 Myrrhæ electæ,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Aluminis usti,
 Tabaci Hispanici,
 Seminis Cochleariæ ana drachmas
 duas,

Salis armoniaci drachmam unam,
 Balsami Peruviani scrupulos duos.

Optime in pulverem tritis & Balsamo Pe-
 ruviano irroratis, adde
 Mellis rosati uncias octo.

Fiat electuarium.

Dentes firmat, mundat, & a carie præser-
 vat, gingivarum laxitati & scorbuto oris
 medetur.

Gingivæ & dentes mane & ante somnium hoc
 electuario fricandi, & os Aqua Salviæ vel
 fontana eluendum.

L

ELEC-

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ
SIMPLEX.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duodecim,
 Afari,
 Cinnamomi,
 Croci,
 Mastichis,
 Spicæ Indicæ,
 Xylobalsami, aut ejus loco ligni Aloës
 ana drachmas sex,
 Mellis libras quatuor cum semisse.

Misce pulveres melli fere refrigerato pro elec-
 tuario.

*Nullus ejus hodie fere usus est, præterquam in
 clysteribus.*

Dosis uncia semis ad drachmas sex.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

REC. Foliorum Sennæ electorum uncias
 octo,
 Seminum Coriandri uncias quatuor,
 Pulpæ prunorum libras duas.

Folii & feminibus in pulverem tenuem
 tritis adde pulpam & cum syrupi rosa-
 rum solutivi sufficiente quantitate in con-
 sistentiam electuarii redige.

*Elegimus hoc electuarium loco magis compo-
 siti, quod Electuarium lenitivum Floren-
 zolæ in priore Dispensatorii editione dice-
 batur. Blande alvum subducit, & a drach-
 mis duabus ad unciam dimidiam datur.*

ELECTUARIUM DE MANNA.

REC. Mannæ electæ,
 Sacchari albi ana uncias duas,
 solvantur in
 Aquæ florum Acaciæ unciis duabus,
 per linteum colatis addatur
 Radicis Iridis Florentinæ, in tener-
 rimum pulverem tritæ, drach-
 ma una,
 Olei Amygdalarum dulcium uncia
 una.

Misceantur, fiat Electuarium.

*Alvum leniter laxat. Tenellis, & præsertim
 recens natis, ad educendos humores vitiosos
 & meconium datur.*

Dosis drachma una ad quatuor.

ELECTUARIUM MELOES PROSCA-
RABÆI CONTRA RABIEM
CANINAM.

REC. Proscarabæos, rejectis capitibus,
 XXIV.

Electuarii Theriacæ uncias duas,
 Ligni Ebeni drachmas duas,
 Radicis serpentariæ virginianæ
 drachmam unam,
 Spongiae Fraxini grana viginti.

Proscarabæi minutim conscinduntur, ad-
 miscetur theriaca, & forma pulveris subti-
 lissimi, adduntur lignum ebenum, radix
 serpentariæ & spongia fraxini atque to-
 ta massa ope mellis, in quo proscarabæi
 enecti sunt, in electuarium redigitur.
 Præter meloën proscarabæum & alia
 species, meloë majalis, (*Mayvourm-
 fâfer*) adhiberi potest, neutra vero con-
 fundi debet cum scarabæo vulgari melo-
 lontha, *Mayenfâfer*. Meloe proscarab. &
 maj. hanc singularem qualitatem habet, ut
 sub contrectatione succum flavum dimit-
 tat, (ideo subinde scarabæus unctuosus
 nonnullis vocatur,) hinc ne hujus, tan-
 quam partis activæ, jactura fiat, debet
 cautè forcipe prehensus mox in vasculum
 melle repletum injici ejusque caput reji-
 ciendum forcice abscindi.

*Dudum quidem scarabæus unctuosus contra
 rabiem caninam laudatus fuit, sed usus ra-
 rior erat. Recentius, scilicet ante hos sex
 septemve annos, Rex Borussicæ hoc electua-
 rium tanquam arcanum specificum data pe-
 cunia sibi conciliavit & hanc præscriptio-
 nem, quam heic fideliter omiſſis tantummo-
 do plumbi limati granis viginti, quæ se-
 cundum formulam Borussicam adhuc reci-
 piuntur, nobisque noxia videntur, exhibe-
 mus, publicandam curavit. Certitudo ef-
 fectus contra rabiem hætenus nondum evic-
 ta est; plura huc spectantia, præsertim
 quoad dosin, quæ in viro adulto drachmam
 unam & dimidiam vel ad summum duas
 explet, caute observandam, deprehendun-
 tur in ista apud nos publica auctoritate edi-
 ta instructione: Medicinische Anweisung
 wegen der tollen Hunderout. 1782.*

ELECT.

ELECTUARIUM MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

REC. Radicum Aristolochiæ rotundæ veræ,
Phu pontici ana uncias quatuor
femis,
Calami aromatici uncias quin-
que, drachmas tres,
Gentianæ uncias septem semis,
Meiathamantici uncias tres, &
drachmas sex,
Zingiberis albi uncias quindecim,
Herbarum Dictamni Cretici uncias sep-
tem semis,
Polii montani,
Scordii Cretici ana uncias de-
cem semis,
Foliorum Indorum uncias duodecim,
Florum Hyperici uncias tres semis,
Stoechadis Arabicæ uncias duo-
decim,
Rosarum rubrarum,
Spicæ Celticæ ana uncias septem semis,
Nardi Indicæ uncias quindecim,
Schoenanthi uncias tredecim,
Seminum Thlaspios uncias quindecim,
Seseleos uncias duodecim,
Dauci Cretici uncias decem se-
mis,
Petrofelini Macedonici,
Fœniculi ana uncias septem
femis,
Anisi uncias quatuor semis,
Baccarum Juniperi unciam unam,
Piperis longi uncias duodecim,
albi,
Carpobalsami ana uncias decem semis,
Cardamomi minoris uncias septem semis,
Crocii optimi uncias quindecim,
Cinnamomi uncias quindecim semis,
Costi veri uncias duodecim,
Cassiae lignæ uncias decem semis,
Agarici trochiscati uncias quindecim,
Castorei uncias duodecim,
Stincorum marinorum uncias tres semis,
Myrrhæ electæ uncias sedecim,
Olibani uncias quindecim,

ELECT.

43

Bdellii uncias decem semis,
Gummi Arabici uncias septem semis.

Radices, herbæ & femina, leni calore ficcata,
cum aromatibus & reliquis mixta, in subti-
lissimum pulverem rediguntur, & per cri-
brum trajecta, seorsim servantur; his peractis

REC. Gummi Galbani,
Opopanacis ana uncias duo-
decim,
Sagapeni uncias quatuor semis,
Succi Hypocistidis uncias duodecim,
Acaciæ uncias quatuor,
Opii electi uncias septem semis.

Solvantur in
Vini generosi libris octo,
soluta commisceantur cum
Mellis despumati libris centum & sedecim,
& successe, inter perpetuam agitationem,
pulvis reliquorum inspergatur, tandem
Styracis in granis uncia duodecim, in
Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim,
liquatis, &

Opobalsami uncia duodecim addantur,
atque agitatio, ad perfectam ingredientium mix-
tionem, per aliquot horas continuetur. De-
nique in vase satis magno, ut fermentare &
commode singulis octiduis, spatula magna
lignea, agitari ac commoveri queant, repo-
nantur.

*Cumulus ingredientium jure multis displicet in hoc
remedio, quod ab antiquissimis temporibus pro
insigni alexipharmaco, stomachico, confortante,
anodyno, quæ pro universali medicina habitum
fuit, ut vel ideo ejus compositionem nosse juvet,
quamvis minus frequenter quam Theriacæ usur-
pari soleat. Quælibet uncia grana habet duo opii
& grana quatuor Croci.*

Dosis a drachma ad drachmas quatuor.

ELECTUARIUM sive PHILONIUM ROMANUM.

REC. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami ana drachmas de-
cem,
Apii drachmas duas,
Petrofelini Macedonici,
Fœniculi,

Seminum Dauci Cretici ana scrupulos
quatuor,

Cassiae lignae,

Cinnamomi ana drachmas tres;

Castorei,

Myrrhæ ana drachmas duas,

Croci orientalis,

Spicæ Indicæ,

Zedoariæ,

Pyrethri ana scrupulos duos,

Opium drachmas quinque,

Mellis despumati uncias octodecim,

Opium, in

Vini albi uncia una semis
solutum, cum reliquis, optime tritis, melli
admiscetur, & sic probe mixta servantur.

*Qualibet drachma hujus electuarii ultra gramma
unum & semis Opium continet, ex hoc & reliquo-
rum pondere facile dosis constitui potest, adulto
scilicet nunquam ultra drachmas duas in summo.*

*Somniferum est, & dolores sedat; hinc in colica
flatulenta a nonnullis adhiberi solet. Veteres
etiam tussi vehementi, & imminenti hinc vasorum
pulmonis crepaturæ destinabant.*

ELECTUARIUM sive REQUIES NICOLAI.

REC. Florum Rosarum rubrarum,

Violarum ana drachmas sex,

Seminis Hyoscyami albi,

Papaveris albi,

Lactucæ,

Psyllii ana unciam dimidiam,

Corticum radicum Mandragoræ,

Nucum moschatarum,

Cinnamomi,

Zingiberis albi,

Opium depurati ana drachmas tres,

Sandali albi,

rubri,

Tragacanthæ,

Spodii ex Ebore ana drachmas duas,

Sacchari albi uncias viginti,

Opium

Vini albi unciis tribus diluatur.

reliqua in pulverem terantur, & Saccha-
rum in

Aquæ florum Rosarum unciis decem sol-
vatur,

atque omnia optime permisceantur.

*A longo tempore in nostris officinis in usu est hoc
electuarium, atque infantibus, ad conciliandum
somnum, dari solet; monemus, ut caute exhi-
beatur, cum ejus usum vel abusum non plane pro-
scribere possimus.*

Uncia una habet Opium grana quinque.

Infanti tenero non ultra grana duo, vel tria, facile
adhibentur.

ELECTUARIUM RESUMPTIVUM.

REC. Radicum Liquiritiæ,

Herbæ Hederæ terrestris,

Veronicæ ana unciam semis.

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis libris quinque,
macerentur per noctem, mane colentur, in
colatura coquantur

Radicum Farfaræ recentium, minutim in-
cifarum,

Passularum minorum ana uncia sedecim,
usque quo mollescant; contundantur in mor-
tario marmoreo, atque per cribrum traji-
ciantur. Magmati vel pulpæ addantur

Sacchari albi uncia triginta duæ,
coquantur leni igne ad justam consistentiam;
refrigeratis admisceantur

Amygdalarum dulcium, minutim incisa-
rum, uncia septem,

Flavedo citri a tribus pomis recentibus
derasa,

Cinnamomi acuti uncia semis,

Caryophyllorum aromaticorum drachmæ
tres.

Fiat Electuarium.

*Hæticis, tabidis, nec non tussi acri sicca laboranti-
tibus convenit.*

*Dosis uncia semis ad integram, bis vel ter per
diem sumenda.*

ELECTUARIUM SANANS FULLERI.

REC. Spermatidis ceti recentis drachmam
unam,

Ceræ citrinæ odoratæ drachmas tres,

Olei Amygdalarum dulcium unciam
unam,

Liquen-

ELECT.

Liquentur leni igne, atque ab igne remotis & probe, usque refrixerint, agitatis, addantur

Conservæ Rosarum rubrarum uncias duæ,

Mellis despumati uncia una.

Commendabile est ad primarum viarum erosiones, tussim acrim, nec non in dysenteria.

Dosis drachmæ duæ vel tres.

NB. Quia facile rancorem contrahit hoc electuarium, non, nisi dum expetitur, parandum.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

REC. Pulpæ Tamarindorum uncias quatuor,

Passularum minorum,

Prunorum ana unciam unam semis.

Misceantur; postea adde

Foliorum Sennæ electæ pulverisatorum; unciam unam semis,

Cremoris Tartari drachmas sex,

Cinnamomi acuti,

Seminis Fœniculi ana drachmas duas,

Olei Nucistæ destillati guttas decem.

Misce, fiat, addita sufficienti quantitate syrupi rosati solutivi, electuarium.

Biliosos humores blande educit.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

ELECTUARIUM THERIACÆ ANDROMACHI.

REC. Radicum Dictamni albi, five

Fraxinellæ,

Scillæ præparatæ ana libras duas,

Iridis Florentinæ libram unam,

Pentaphylli uncias sex,

Calami aromatici,

Phu pontici ana uncias quinque,

Rhabarbari veri,

Zingiberis albi ana uncias sex,

Angelicæ,

Gentianæ ana uncias quatuor,

Aristolochiæ longæ veræ uncias duas,

Asari drachmas quinque, scrupulum unum,

ELECT.

45

Herbarum Scordii Cretici libram unam,

Dictamni Cretici uncias sex,

Chamædryos uncias quatuor,

Marrubii albi,

Calaminthæ montanæ ana uncias sex,

Polii Cretici,

Chamæpityos ana uncias quatuor,

Centaurii minoris uncias duas,

Majoranæ,

Mari veri ana unciam semis, scrupulos quatuor,

Foliorum Indorum uncias quinque,

Florum Rosarum rubrarum libram unam,

Stœchadis Arabicæ uncias sex,

Hyperici uncias quatuor,

Seminum Napi libram unam,

Amomi racemosi uncias octo,

Petroselini Macedon. uncias sex,

Anisi,

Fœniculi Cretici,

Ammios,

Seseleos,

Thlaspios ana uncias quatuor,

Dauci Cretici uncias duas,

Schoenanthi uncias septem,

Spicæ vel Nardi Indicæ uncias octo,

Celticæ uncias quatuor,

Piperis longi libras duas,

albi,

nigri ana uncias sex,

Cardamomi minoris,

Carpobassami vel Cubebarum ana uncias quatuor,

Cinnamomi acuti uncias octo,

Costi aromatici uncias septem,

Ligni Aloës five Xylobassami unciam unam,

Asphalati drachmas quinque, scrupulum unum,

Agarici trochiscati libram unam,

Myrrhæ electæ uncias octo,

Olibani electi uncias sex,

Mastiches scrupulos octo,

Gummi Arabici uncias quatuor,

Bituminis judaici, vel Asphalti uncias duas,

Terræ Lemniæ uncias quatuor,
Castorei uncias duas,
Viperarum Italicarum libras duas.

Eligantur simplicia præscripta optimæ notæ,
quæ herbis, floribus, radicibus, & aliis fic-
cationis indigis, leni calore ficcatis, admif-
ceantur, & simul in pulverem subtilissimum
redacta, seorsim servantur.

Squinanthum & Spica Indica, minutim incisa,
cum Gummi Arabico, in aqua soluto, probe
pissantur, & leni calore rursus exsiccata, in
pulverem redacta, reliquis addantur.

Flores Rosarum seorsim terantur, & cum
Chalcitidis, sive Vitrioli Martis, ad albe-
dinem calcinati, unciis quatuor,
Crocii Austriaci, optime triti, unciis octo,

Vino diluantur; sequentia vero in Vini Malva-
tici sufficiente quantitate solvantur:

Opium Thebaicum libræ duæ,
Succi Liquiritiæ libra una,
Hypocistidis,
Acaciæ,

Sagapeni ana uncia quatuor,
Galbani uncia duæ.

Soluta & colata commisceantur cum
Mellis optime despumati triplo, vel libris
centum & sedecim;

Addantur Crocus, Chalcitis, & flores Rosarum
vino diluta, agitentur diligenter, semper de
pulvere priori inspergendo per cribrum.
Tandem

Styracis in granis uncia quatuor, in
Terebinthinæ claræ unciis sex solutæ, &
Opobalsami veri, vel in ejus defectu Olei
Nucistæ expressi uncia tredecim

adjiciantur, & per horæ unius spatium, ut ex-
actissime misceantur, agitentur, atque in va-
se capaciori, ut fermentare, & aliquoties per
mensem moveri queant, reponantur.

*Farraginem ingredientium hoc electuarium continet,
ex quibus certe ejus virtus non calculari aut æsti-
mari potest. Attamen ab antiquissimis temporibus
in usum vocatur, ut hinc haud raro vel a plebe va-
rio scopo desideretur, ejusque, licet tam varia &
multiplici ratione compositi, virtus longa experien-
tia cognita, esse supponi queat. Ex variis causis*

*optandum esset, ut ejus usus magis magisque in
dies obsoleceret, cum & pro præparationis &
pro temporis ratione, per quod asservatur in phar-
macopoliis, ejus vis activa diversa sit & esse
debeat.*

*Quælibet uncia continet Opium grana sex, & Croci
grana duo. Datur vel per se, vel cum commodo
quodam vehiculo.*

Dosis est a drachmis duabus ad tres.

ELECTUARIUM THEBAICUM Disp. Edinb.

REC. Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris,
Zingiberis ana uncias duas,
Radici serpentariæ Virginianæ un-
cias tres,
Opium in vini albi Hispanici quantitate
sufficiente soluti drachmas tres,
Mellis despumati triplum pondus pul-
verum.

Misce, fiat Electuarium. Adposuimus e
Pharmacopœa Edinburgensi hoc Elec-
tuarium, quod multo minus compositum
est, ut Theriacæ Andromachi commode
substituatur.

*Scrupuli quinque unum granum opium continent,
unde dosis præcipue æstimenda.*

ELIXIR ACIDUM DIPPELII ET HALLERI.

REC. Spiritus Vini rectificatissimi uncias
sex,
Olei Vitrioli, successive instillandi,
unciam unam,
Granorum Kermes,
Crocii ana drachmas duas.

Mixta digerantur leni calore, vitro bene
clauso, per aliquot dies, tandem clarum
decantetur & servetur.

*Commendatur ab Auctore in febribus putri-
dis, ardentibus, morbis arthriticis, calcu-
losis, obstructionibus mensium.*

*Dosis guttæ quindecim ad viginti ex multa
aqua.*

NB. Si æquales partes spiritus vini & Olei
Vitrioli, omissis reliquis ingredientibus;
miscentur, vocatur Elixirium acidum HAL-
LERI,

LERI, ex quo guttulæ sex decemve in vasculo larga aqua repleto sumuntur.

ELIXIR ANTICOLICUM CROCATUM.

Videatur ELIXIR CORDIALE & STOMACHICUM, vulgo GARRUS. Pharmacop. Parisiens.

ELIXIR ANTIFEBRILE.

REC. Radicum Gentianæ rubræ unciam unam,
Serpentariæ Virginianæ,
Herbarum Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Trifolii fibrini,
Absinthii Pontici ana drachmas tres,
Corticis Peruviani unciam unam semis,
Chacarillæ,
Winteriani ana unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium drachmas sex.

Incisa infunde in
Spiritus Vini rectificati libris duabus,
post digestionem per quatuor dies, exprimantur, & Elixir per chartam filtratum usui servetur.

In declinatione febrium intermittentium, ad tonum restaurandum, & appetitum excitandum, inservit.

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

REC. Salis Tartari, vel cinerum clavel-lorum depuratorum, unciam unam,

Solvantur in
Aquæ Florum Sambuci,
Cochleariæ,
Nasturtii ana unciis quinque;
solutio filtretur, & affundatur
Aloës,
Myrrhæ ana unciae uni,
Crocii unciae semis.

Per triduum digerantur, filtretur & ad usum servetur Elixir.

Ad obstructions viscerum referandas, & menses pellendos inservit. Hypochondriacis, scorbuticis, atque obstructione alvi laborantibus convenit.

Dosis drachma dimidia ad integram.

ELIXIR BALSAMICUM RECTORALE EDINBURGENSE.

REC. Balsami Tolutani,
Benzoës electæ,
Styracis Calamit.
Myrrhæ electæ ana drachmas tres,
Crocii optimi drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.

Digerantur, atque post sufficientem extractionem filtrentur.

Vere balsamicum est hoc Elixir, & tam ad internos, quam externos usus commendabile.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta usque.

ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

REC. Herbæ Scordii unciam unam,
Centaurei minoris,
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Myrrhæ electæ ana unciam semis,
Zedoariæ,
Nucistæ ana drachmas tres,
Ligni Aloës drachmam unam semis,
Crocii Austriaci drachmam unam,
Succini drachmas tres.

Incisis & contusis superfundatur
Spiritus Vini rectificati libra una semis,

digerantur, post sufficientem digestionem exprimantur, & liquori per filtrum trajecto addantur

Olei Cardamomi,
Caryophyllorum ana guttæ decem, in spiritus salis armoniaci vinosi uncia una solutæ.

Alexipharmacum & anticatarrhale est, ventriculum roborat, chylicationem promovet, & ab Illustri Auctore, præsertim ad diarrhæas chronicas, ex intestinorum lævitate, commendatur.

Dosis guttæ 60. bis in die.

ELIXIR BALSAMICUM STOMACHI-
CUM TEMPERATUM
HOFFMANNI.

REC. Extracti Absinthii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Gentianæ ana unciam
unam,
Flavedinis corticum aurantiorum
amarorum, ab omni albedine
mundatorum, uncias quatuor.

Affunde
Vini Hungarici optimi libras duas,
Spiritus corticum aurantiorum recti-
ficati uncias duas.

Stent per triduum infusa in digestionem,
postea filtrata reponantur.

Viennenses extractis adhuc addunt:
Salis Tartari unciam unam.

*Tonum ventriculi roborat, appetitum & con-
coctionem auget, atque inprimis iis, qui
spirituosa non ferunt, inservit.*

Dosis drachma una ad duas.

ELIXIR CORDIALE & STOMACHICUM,
vulgo GARRUS.

Pharmacop. Parisiens.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duas semis,
Myrrhæ unciam semis,
Crocii Orientalis drachmas duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ ana scrupulum unum.

Pulverifatis affunde:

Spiritus Vini rectificati libras duas,
Aquæ fontanæ uncias duas.

Digerantur per viginti quatuor horas, postea
ex M. B. ad siccitatem destillentur.

REC. Spiritus hujus prolekti,
Syrupi capillorum Veneris ana libram
unam,
Aquæ Naphæ unciam unam.

Misceantur.

*Vires sunt anodynæ, stomachicæ & carminativæ,
præsertim vero in colica, a menstruo fluxu mulie-
rum non rite succedente orta, commendari potest.*

Dosis cochlear unum, vel duo.

ELIXIR MYRRHÆ LONDINENSE.

REC. Extracti Sabinæ unciam unam,
dissolvatur in
Essentiæ Myrrhæ unciis octo,
Castorei unciis sedecim,
post sufficientem digestionem Elixir fil-
tretur.

*Multum cum Elixir uterino Crollii convenit,
atque ad mensium & uteri vitia commen-
datur.*

*Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta
usque.*

ELIXIR PECTORALE REG. DAN.

REC. Radicis Angelicæ uncias tres,
Levistici, unciam semis,
Florum Chamomillæ Romanæ un-
ciam unam semis,
Seminis Anisi uncias octo,
Fœniculi uncias quinque,
Macidis drachmas tres,
Nucum moschatarum,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Cinerum clavellatorum uncias octo-
decim.

Incisis & contusis affundantur, in cucurbi-
ta vitrea,

Spiritus Vini rectificati libræ quatuor,
Aquæ fontanæ libræ duæ;

Stent in digestionem per triduum.

Tunc adde:

Salis Armoniaci pulverisati libram
unam,

destillantur, juncturis vitri probe clausis,
lento igne, ad residuum libræ unius,
liquor prolektus volatilis superfundatur
Succi Liquiritiæ Hispanicæ unciis
quinque,

in

Aquæ Fœniculi libra una

soluti;

Crocii Orientalis drachmis duabus.

Digerantur per aliquot dies, postea Elixir,
per chartam filtratum, fervetur.

*Est spiritus vini sale volatili & oleis vegetabi-
lium imprægnatus, succo liquiritiæ edulco-
ratus, & multum convenit cum spiritu salis
armoniaci.*

armoniaci anisato, & liquore oleoso Sylvii, tonum pulmonum roborando, & decubitus humorum tenacium dissipando. Excellens etiam est remedium carminativum, atque ad colicos dolores mitigandos, ventriculum roborandum, & urinam pellendam commendabile.

Dosis guttæ triginta sex ad quinquaginta.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

*REC. Radicum Helenii,
Iridis Florentinæ,
Scillæ præparatæ ana un-
ciam unam,
Liquiritiæ unciam semis,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Herbæ Rorellæ unciam unam semis,
Seminis Anisi unciam semis,
Benzoës drachmas sex,
Myrrhæ unciam semis,
Gummi Ammoniaci drachmas duas,
Crocii drachmas tres.*

Extrahantur

Spiritus Vini rectificati libris duabus;

Exprimantur & filtrentur.

Commendatur ab Autore ad asthma, catarrhos, tussim & raucedinem. Resolvit, & in hujus generis morbis non sine fructu adhibetur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Nota. Gummi Ammoniacum, Myrrha & Benzoë seorsim infundi, atque post sufficientem digestionem & expressionem, ambæ extractiones commisceri debent.

ELIXIR POLYCHRESTUM.

REC. Extracti Panchymagogi unciam unam,

*Spiritus Vini rectificati uncias sex,
Vitrioli drachmas tres.*

Misceantur, digerantur & ferventur.

ELIXIR POLYCHRESTUM
HALENSE.

Constat ex

*Extracti panchymagogi uncia una, &
Mixturæ simplicis unciis sex.*

Pars II.

Vim habet cathartica, atque tam ad alvum stimulanda, in minori dosi ad guttas triginta vel quadraginta, quam in majori, ad alvum ducendam, a guttis sexaginta, usque centum datur.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM
HELMONTII.

*REC. Aloës Succotrinæ lucidæ,
Myrrhæ electæ,
Crocii optimi ana unciam unam,*

In pulverem trita indantur cucurbitæ vitreæ, quæ alembico cæco munita, ad digestionem in Mariæ Balneum reponatur; augeatur ignis per gradus, ut aqua ebulliat, & materia in massam coalescat, atque guttulæ flavæ ad latera cucurbitæ in conspectum veniant, Frigescant & massæ affundatur

Aquæ Cinnamomi spirituosæ libra una,

post digestionem, e Balneo destillantur, & liquor prodiens, sub nomine Elixirii albi, fervetur.

Vires sunt balsamicæ, stomachicæ & carminativæ.

Dosis drachma una, vel duæ.

ELIXIR PROPRIETATIS HELVETII.

*REC. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ ana unciam unam,
pulverifatis superfundantur
Tincturæ Tartari unciae octo.*

Post solutionem & sufficientem digestionem clarum separetur, atque cum tinctura ex uncia una croci Orientalis & tincturæ tartari unciis quatuor parata permisceatur.

Addantur

*Olei Cinnamomi scrupuli duo,
ferventur.*

Vires cum ELIXIRIO PROPRIETATIS DULCI conveniunt; gratius tamen est propter Oleum Cinnamomi, & penetrantius propter Tincturam Tartari.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta cum vino vel vehiculo aquoso exhibendæ.

N

ELIXIR

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO BOERHAAVE.

REC. Myrrhæ,
Aloës,
Crocī Austriaci ana unciam unam.

Tritis affunde
Aceti vini albi libras quatuor;

Immittantur cucurbitæ vitreæ, ebulliant
lenissimo igne, per aliquot horas. Fri-
gefacta requiescant, ut fæces subsideant;
liquorem clarum per inclinationem a fæ-
cibus effunde, residuo adde

Novi acetī libras duas,

Ebulliant iterum, ut prius; frigescent, at-
que, ut spissum a claro separetur, quies-
cant, effundatur clarum, & cum priori
extractione per telam raram coletur.

Tincturas mistas leni igne, ex cucurbita
vitrea, destilla, ut unciae decem restent,
quibus adde

Spiritus Vini rectificatissimi uncias
decem.

Digerantur, filtrentur & serventur.

*Egregium celeberrimo Autore est remedium,
acidum, aromaticum, in praxi medica in-
finiti usus. In febre intermittente, scorbu-
to, hypochondriaco malo, ictero, cachexia,
sanguinem sua balsamica virtute imbuat,
putredini resistit, vermes necat. Externe
ulcera putrida, saniosa, foetida, fistulosa
emendat, depurat, labiorum, gingivarum,
linguæ & faucium ulcera sanat.*

*Dari potest juxta Auctorem a drachma dimi-
dia, ad drachmas duas, ex vino, vel alio
vehiculo; qui & vel mane vacuo ventriculo,
vel ad minimum, duodecim horis a pastu,
sumere jubet.*

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO BOERHAAVE.

REC. Aloës optimæ,
Crocī,
Myrrhæ ana unciam unam.

Trita immittantur cucurbitæ vitreæ, affun-
datur liquor ex

Tartari tartarifati uncis tribus, in
Aquæ fontanæ uncis sex solutis,
paratus.

Digerantur per triduum in Balneo, & spe-
ciebus integre solutis superfundantur
Spiritus Vini rectificatissimi libræ
duæ,

Denuo digerantur, eò calore, ut ad finem
ebulliant. Frigescent, & postquam per
quietem spissum subsederit, clarum ef-
fundatur, novaque

Spiritus Vini libra una superfusa
Digestio continuetur; separetur dehinc
clarum, & repetatur, donec omnia fere
soluta sint, omnes liquores filtrentur per
chartam bibulam, & spiritus superflui eo
usque, per distillationem evocentur,
donec unciae viginti restent, quæ ser-
ventur pro Elixirio.

*Elixir hoc sale medio paratum prodest in ob-
structionibus chronicis & inveteratis morbis;
potenter resolvit, nec acido, nec alcalino
suo principio, noxium est.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam dimidiam.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO PARACELSI.

REC. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ ana uncias duas,
Crocī optimi unciam unam,

In pulverem tritis affunde

Spiritus Vini rectificati, per octiduum
cum Spiritus Sulphuris uncis
tribus digesti, libram unam semis.

Stent in digestionem per aliquot dies; liquo-
rem tinctum effunde, atque speciebus
denuo

Spiritus ejusmodi libram dimidiam
superfunde.

Post digestionem extractiones conjunge,
atque per chartam bibulam filtratas serva.

*Multum de hoc Elixirio autor Paracelsus,
pro more suo, promittit, ad vitam sanam
& longam, ad plerosque morbos, etiam
pestem, vincendos. Ventriculum roborat,
digestionem adjuvat, vermes necat, menses
& hæmorrhoides movet. Cautè igitur hoc,
& aliis medicamentis aloëticis uti debent
hypochondriaci, biliosi, hæmorrhoidarii,
& ad hæmorrhagias dispositi.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

ELIXIR

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO five DULCE.

REC. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ,
Crocī optimi, ana unciam unam semis,
In pulverem redactis addantur
Olei Tartari, per deliquium parati,
unciæ duæ misceantur,
ut pultis consistentiam induant, & digestis
in vitro commodo, probe obturato, per
viginti quatuor horas, affunde
Spiritus Vini rectificati libras duas;
Stent in digestionē balnei quatuor dies, va-
se exactissime clauso, agitando aliquoties
de die vas, donec saturate rubens ex-
tractum sit Elixir.

*Satis efficax remedium est ad morbos ventri-
culi, a causa frigida ortos, alvum simul
stimulat, digestionem promovet, sanguinem
autem exagitat, uti reliqua aloëtica.*

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO.

REC. Aloës Succotrinæ drachmas sex,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Crocī Orientalis drachmam unam
semis,
Rhabarbari optimi unciam semis.
Concisis & contusis, in phiala capaci affunde
Vini Malvatici generosi uncias octo,
Spiritus Salis rectificati unciam unam;
Stent, vase optime obturato, in loco te-
pido, per octiduum, tum filtrentur &
serventur.

*Ad ventriculum & intestina expurganda &
roboranda, hepatis & hypochondriorum
obstructiones expediendas, appetitum exci-
tandum, mulierum menstruas purgationes
in ordinem redigendas, & vermes necandos
atque expellendos commendatur.*

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

ELIXIR SALUTIS.

REC. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,

Radicum Rhabarbari veri ana un-
ciam unam,
Foliorum Sennæ Orientalium uncias
duas,
Seminis Anisi,
Carvi,
Coriandri ana unciam unam,
Uvarum passarum, absque acinis,
uncias quatuor,
Salis Tartari drachmas duas.
Incisis & contusis affunde
Aquæ fontanæ ferventis libram
unam, refrigeratis adde
Spiritus Vini rectificati libras duas,
Digerantur, & post sufficientem extractio-
nem exprimantur & filtrentur.

*Commendatur illis, qui a tarditate alvi &
flatibus vexantur.*

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI;

juxta Dispensat. Viennens.

REC. Radicum Galangæ minoris,
Zinziberis,
Zedoariæ ana unciam unam,
Calami aromatici,
Foliorum Majoranæ,
Menthæ,
Thymi,
Serpilli,
Florum Rosarum,
Salviæ,
Rorismarini ana unciam semis,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ,
Macidis ana unciam unam,
Cubebæ,
Ligni Aloës,
Sandalī citrini,
Cardamomi minoris ana unciam semis,
Corticum Citri recentium uncias tres,
Incisa & contusa macerentur in
Spiritus Vini rectificati libris duodecim
per triduum, postea addantur
Aquæ fontanæ libræ quatuor,

& lento igne ex Balneo destillentur circiter
libræ tredecim.

Si completum desideretur Elixir,
Ambræ griseæ &
Moschi ana scrupuli duo,
addantur, atque, pro lubitu,
Croco tingatur.

*Singularis efficacie prædicatur hæc aqua spirituosæ,
Elixir vitæ dicta, tam interne, quam externe
adhibita. Epilepticis, animo deficientibus, præ-
cipue autem in morbis a causa frigida ortis, com-
mendatur. Flatus discutit, ventriculum roborat.*

Dosis a drachma una ad unciam semis.

ELIXIR VITÆ MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM
correctior.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

REC. Calami aromatici unciam unam,
Galangæ minoris unciam unam semis,
Zinziberis albi drachmas tres,
Menthæ crispæ,
Salviæ acutæ ana unciam semis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi ana drachmas tres,
Cubebarum,
Nucis moschatæ ana drachmas duas,
Ligni Aloës ponderosi,
Corticum Citri ana drachmam unam.

Incisis & contusis superfunde
Spiritus Vini rectificati libram unam
semis,

Maccerentur per quatuordecim dies, de-
inde addantur

Spiritus Vitrioli unciae duæ,

Digerantur per sex dies, tum expressa per
emporeticam colentur.

Residuo

Spiritus Vini uncias quinque vel sex
affunde,

Digere, & essentiam reliquam extrahe,
quam cum priori conjunge, &

Sacchari albi, parum tosti, unciis
quatuor superfunde,

atque post digestionem, a fecibus in quiete
subsidentibus separatam, serva.

*Stomachicum est egregium, præsertim biliosis
convenit, & appetitum excitat.*

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta quinque.

ELIXIR UTERINUM.

REC. Herbæ Artemisiæ uncias tres,

Incisis affunde

Spiritus Vini rectificati uncias quindecim,

Extracta per digestionem, exprime, & colatam
hanc essentiam affunde

Castorei Orientalis unciae uni semis,

Croci pulverisati unciae semis.

Digerantur leni calore, exprimantur, & per
chartam bibulam filtratis adde

Olei destillati Anisi,

Angelicæ,

Succini ana guttas quadra-
ginta.

Serventur.

Perfpicit B. L. præcipua Elixiris Crolliani ingre-
dientia heic servari. reliqua, ex justis ratio-
nibus, partim omitti, partim ipsum præpara-
tionis modum mutari.

*Commendatur ad uteri morbos, mensium retentio-
nem, fluorem album, &c.*

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM
EDINBURGENSIUM.

REC. Emplastri diachylon simplicis libram
semis,

Picis Burgundicæ uncias tres.

Misce, liquecant, ut fiat Emplastrum.

*Est pro uniendis vulnerum labiis, absque
futura.*

Vices insuper supplet Emplastri ad hærnias.

Possunt & alia emplastra sibi invicem sub-
stitui, ut revera non tot in pharmacopo-
lio requirantur, quot heic separatim sub
diversis titulis habentur. Ast cum huic
hæc illi alia compositio placeat, cum tot
ægroti sine consilio vel chirurgi vel me-
dici emplastra ipsi e pharmacopoliis pe-
tant, & in hoc illove præ alio ob solum
nomen prærogativam quærant, diversas
compositiones dudum receptas, quas for-

EMPLASTRUM.

forſitan non ob uſum ſolum ſed & ob hinc inde contingentem abuſum noſſe juvat, reliquimus & monemus, recte noſtris temporibus per ſaniora Artis Chirurgicæ principia nimium emplaſtrorum uſum, præſertim in vulneribus, rejici.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM WADSTOOKII.

REC. Ichthyocollæ finiſſimæ minutim incilæ unciam unam,

Reſinæ Benzoës,

Storacis Calamitæ ana drachmam unam,

Spiritus vini rectificati libram unam.

Miſce & ſolve leni digeſtione in cucurbita vitrea per viginti quatuor horas, quæ refrigerata dein cola. Tunc holoſericum nigrum & tenue (vulgo Caſſet) ſupra regulam netricis fortius extenditur. Maſſa emplaſtri in Catinum, & hic in aquam ferventem immittitur, ut gelatinosa maſſa diffluat. Hæc nunc penicillo magno & molli in holoſericum expanſum, quantum fieri poteſt, parcifſime transferatur, idque exſpectata antea exſiccatione, ter quaterve repetatur, donec holoſericum ſpeculi polituram induerit. Hoc facto emplaſtrum probe ſiccatum & dein ex regula exentum in fruſtula minora ſecatur.

Parvis vulneribus carnoſis dictum & vulgo ſub nomine emplaſtri anglici notum eſt.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

REC. Olei olivarum libras duas,

Ceruſſæ libram unam ſemis,

Ceræ albæ uncias quatuor,

Ceruſſam cum oleo, leni igne, ad debitam conſiſtentiam coquendo, ſub coctione modicum aquæ fontanæ continuo inſtillando, & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat emplaſtrum.

Leves cutis exulcerationes, intertrigines ſanat: ſiccatur, refrigeratur, & vulneribus ac ulceribus cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

REC. Unguenti Dialtheæ unciam unam ſemis,

Pars II.

EMPLASTRUM.

53

Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Reſinæ Pini unciam unam.

Super ignem colliquatis & colatis adde

Pulveris radicis Bryoniæ,

Iridis Florentinæ,

feminis Fœni græci ana

drachmas ſex.

Miſceantur, & in ſine addantur,

Gummi Ammoniacy, in aceto ſoluti, uncie duæ,

Emplaſtri de Meliloto uncia una.

Fiat emplaſtrum.

Emollit & diſcutit, maturat & dolores mitigat.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM.

REC. Olei feminis Hyoſcyami,

Papaveris,

Lini ana uncias quatuor,

Minii rubri libram unam,

Aquæ Sambuci libram ſemis.

Coque lento igne, ad ſolutionem Minii; adde

Saponis Veneti uncias tres;

Hoc ſoluto adjiciantur,

Ceræ citrinæ uncie duæ.

Fiat lege artis emplaſtrum.

Viribus paregoricis hoc præfertur emplaſtro ſaponato Barbette, tenuiter ſuper lintea extenſum, partibusque dolentibus & ſpafmo affectis ſuperpoſitum, dolores mitigat.

Nobis tamen, uti tantum non omnia, maxime vero repellentia, emplaſtica, contra dolores podagricos minus tutum videtur.

EMPLASTRUM PRO APOPLECTICIS.

REC. Gummi Galbani,

Opopanacis ana drachmas duas,

Radicum Pyrethri,

Piperis longi,

Caſtorei ana drachmam unam,

Terebinthinæ Venetæ drachmas tres,

Olei deſtillati Succini ſcrupulum unum.

Fiat emplaſtrum.

In morbis ſoporosis, apoplexia & paralyſi, capiti raſo applicari poteſt.

O

EM-

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

REC. Baccarum Lauri uncias quatuor,
 Cyperi rotundi,
 Costi amari, vel corticis Winterani,
 Thuris,
 Mastiches,
 Myrrhæ ana unciam unam.

Fiat omnium pulvis; postea

REC. Cerae citrinæ uncias octo,
 Resinæ uncias duas,
 Super ignem liquatis adde
 Olei laurini,
 Terebinthinæ ana uncias duas.

Quibus pulverem reliquorum immisce, ut fiat emplastrum.

Discutit & resolvit; hinc in tympanitide, hydrope, & affectibus a fletibus ortis, abdomini superimponitur.

EMPLASTRUM DE BELLADONNA.

REC. Succi recentis Herbæ Belladonnæ,
 Olei Lini ana uncias novem,
 Cerae citrinæ uncias sex,
 Terebinthinæ venetæ drachmas sex,
 Pulveris herbæ Belladonnæ uncias duas.

Misceantur & fiat emplastrum.

*Est hoc emplastrum ad instar illius, quo ex Hyoscyamo paratur, compositum. Egre-
 gie emollit & dolores sedat, præcipue ad
 mammarum & scroti tumores duros resol-
 vendos, vel ad bonam suppurationem per-
 ducendos utile deprehenditur.*

EMPLASTRUM, sive CERATUM DE
 BETONICA.

REC. Cerae flavæ,
 Resinæ Pini,
 Terebinthinæ ana uncias duas.

Liquefactis resina & cera, colatisque, ac ali-
 quantum refrigeratis Terebinthinam adde,
 hisque unitis pulveres subtilissimos

Betonicæ unciam unam,

Mastiches,

Mumiæ,

Thuris ana drachmas duas.

M. Fiat emplastrum.

*Chirurgi nonnulli hoc emplastro utuntur in contu-
 sionibus & vulneribus capitis; est etiam ad ce-
 phalalgiam, catarrhos & alios capitis morbos
 in usu; capillis prius derafis vertici imponitur,
 & temporibus applicatur.*

EMPLASTRUM CAPUCINORUM.

REC. Gummi Ammoniacy,
 Olibani,
 Mastichis,
 Tutia præparata ana unciam unam,
 Euphorbii,
 Pyrethri,
 Salis communis ana uncias duas,
 Picis navalis uncias tres,
 Terebinthinæ unciam unam,
 Cerae flavæ uncias tres.

Pix, terebinthina & cera leni igne fundan-
 tur, quibus colatis reliqua in pulverem
 trita immisceantur.

*Rev. Patres Capucini, qui preces per multas
 horas, genibus flexis exsequuntur, hoc em-
 plastro uti solent, ad nodos duros resollen-
 dos; unde nomen.*

*Potenter resolvit & discutit. Propter Eu-
 phorbium etiam rubefaciens est, hinc cum
 circumspeditione & caute applicandum.*

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

Videatur EMPLASTRUM ALBUM
 COCTUM.

EMPLASTRUM DE CICUTA, CUM
 AMMONIACO.

REC. Succi Herbæ Cicutæ uncias sedecim,
 Aceti scillitici,
 Gummi Ammoniacy ana uncias octo.

Dissolvatur Gummi ammoniacum in Aceto
 scillitico, coletur, & addito Succo ci-
 cutæ, rursus inspissetur ad pultis consi-
 stentiam, addantur,

Pulveris Cicutæ uncia octo,

Cerae liquatæ libra una,

Olei Capparum uncia quatuor.

Misceantur leni calore, ut fiat emplastrum.

*Potentissimum est resolvens & emolliens, hinc
 in scirrhis & tumoribus, præcipue lienis,
 adhibetur.*

EMPLASTRUM.

EMPLASTRUM, five CERATUM CITRINUM.

REC. Resinæ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat emplastrum, omnia liquando & colando, atque pro colore pulveris

Curcumæ unciam semis addendo.

Ad ulcera & vulnera maturanda valet.

EMPLASTRUM AD CLAVOS ET VERRUCAS PEDUM.

REC. Galbani unciam unam,
Picis navalis unciam semis,
Diachyli simplicis drachmas duas,
Viridis æris,
Salis armoniaci ana scrupulum unum.

Galbano in aceto dissoluto, & ad spissitudinem evaporato, addatur pix & emplastrum diachylon, in fine sal armoniacum & viride æris pulverisata. Fiat emplastrum.

Super verrucas & clavos in pedibus, dolorem & impedimentum incessui adferentes, positum, tertio aut quarto die juvisse, deprehensum est.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

REC. Crustæ panis, abunde fermentati, mediocriter tostæ, in pulverem tritæ, & aceto forti maceratæ, uncias duas.

Tacamahacæ unciam unam,
Mastiches electæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis Moschatæ,
Menthæ ana unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias sex,
Terebinthinæ,
Olei Mastiches,
Cydoniorum ana unciam unam.

Ceræ, cum terebinthina colliquatæ, olea & reliqua commiscendo, fiat emplastrum.

Stomachale est, inque vomitionibus puerorum, & ubi concoctio non recte succedit, ventriculi regioni applicatur.

EMPLASTRUM.

55

EMPLASTRUM DE CUMINO.

REC. Ceræ citrinæ,
Emplastri Diapalmæ,
Olei Olivarum,
Seminis Cumini ana uncias sex,
Baccarum Lauri uncias duas,
Olei destillati Cymini drachmam unam.

Cera, oleum & emplastrum leni igne liquentur, quibus pulvis ex cumino & lauri baccis optime immisceatur; tandem Oleum destillatum Cymini addatur & emplastrum, vésicæ bubulæ involutum, reponatur.

Resolvit, flatus discutit, roborat, tympaniticis & hystericis prodest.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM FELICIS WURZII.

REC. Ceræ citrinæ libram unam,
Resinæ uncias duas,
Sevi hircini uncias sex,
Terebinthinæ unciam unam,
Pulveris herbæ Alchimillæ uncias sex.

Misce, fiat emplastrum.

NB. Si viridius desideretur, singulis libris emplastri hujus adjicito Indici coloris cærulei, optime triti, scrupulum unum, vel drachmam dimidiam.

Leniter adstringit, refrigerat, & nimium affluxum humorum a partibus affectis arcet.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

REC. Ceræ flavæ libras duas,
Resinæ unciam unam,
Olei Rosarum uncias quatuor,
Calcis vivæ, in aqua rosarum lotæ, & iterum exsiccatæ
Laterum, vel tegularum,
Boli armenæ ana drachmas decem,
Minii subtilissimi unciam semis,
Camphoræ, in oleo solutæ, drachmas duas.

Calx, tegulæ & bolus in pollinem subtilissimum redacta, immisceantur ceræ & resinæ cum oleo liquefactis, quibus se-

mi refrigeratis camphora additur, & fiat emplastrum.

Imponitur ad inflammationes arcendas, præcipue in vulneribus & ulceribus, ad præcavenda symptomata, & partes roborandas.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM WEPFERI.

REC. Butyri recentis,
Olei Lini ana uncias sex,
Corticum viridium Sambuci recentium uncias quatuor.

Coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem; exprimantur. Expresso addantur

Ceræ flavæ,
Minii rubri ana uncia sex.

Misceantur, fiat emplastrum.

Usus est in ulceribus antiquis, & per vesicatoria excitatis, ubi inflammationis metus est; in cancro ipso exulcerato palliative confert, & dolores mitigat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM BLONDELLI.

REC. Herbarum recentium, cum radicibus
Bardanæ,
Petasitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Chamæpytheos,
Levistici,
Valerianæ majoris,
Angelicæ hortensis,
Enulæ campanæ,
Raphani rusticani,
Cucumeris silvestris,
Scrophulariæ,
Illecebræ five Sedi teretifolii,
Chelidonii majoris,
Chelidonii minoris,
Gratiolæ ana uncias tres.

Coque in aquæ fontanæ libris viginti, ad dimidias, cola, & expressis adde

Succorum Cicutæ,
Chelidonii majoris,

Hormini ana libras duas,
Illecebræ libram semis,

Evapora ad extracti mollioris consistentiam; hujus extracti

Recipe libram semis, admisce

Gummi Galbani,

Ammoniaci,

Opopanacis,

Sagapeni, omnium in aceti scillitici sufficienti quantitate solutorum, & iterum inspissatorum; uncias duas, reponere. Dehinc

REC. Lithargyrii pulverisati libram unam,
Olei Lumbricorum,

de Catellis,

Meliloto,

Mucilaginibus ana uncias quatuor.

Aquæ fontanæ uncias decem.

Coque una ad emplastri consistentiam, cui successive admisce extractum, cum gummis permixtum, &

Sulphuris vivi, tenuissime triti, uncias septem semis,

Radicum Iridis Florentinæ,

Cyclaminis,

Ranunculi tuberosi,

Coronæ imperialis,

Serpentariæ,

Ellebori albi ana drachmas tres,

Sigilli Salomonis,

Ari ana unciam semis,

trium Aristolochiarum ana drachmam unam,

Baccarum Lauri drachmas duas,

Seminum Angelicæ,

Nasturtii ana drachmas tres,

Cumini unciam unam semis,

Fimi columbini unciam semis,

Pulveris Bituminis judaici,

Olibani,

Mastiches ana uncias quatuor,

Tacamahacæ uncias sex,

Bedellii.

Myrrhæ ana unciam unam semis.

His permiscendo adde successive

Ceræ

EMPLASTRUM.

Ceræ citrinæ &
Picis liquatæ ana libram semis;

tandem admisce

Styracis liquidæ repurgatæ uncias sex,
Camphoræ drachmas sex, in
Olei Caryophyllorum uncia semis solutæ,
Olei de Lateribus drachmas decem.

Fiat emplastrum.

Nota. Oleum de Mucilaginibus parari potest ex
Mucilaginibus, emplastrum diachylon
simplex ingredientibus, cum olei oliva-
rum anatica portione, ad humiditatis
consumtionem coctis.

Nomen habet ab insigni vegetabilium quantitate,
ex quibus componitur.

Resolvit tumores pituitosos & scirrhusos, & præ-
fertur a nonnullis Emplastro de ranis. Liben-
ter vero caremus Emplastro tantæ farraginis.

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS.

Vide EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

EMPLASTRUM DIACHYLON COM- POSITUM, five CUM GUMMI.

REC. Emplastri Diachyli simplicis libram
unam, adde
Gummi Ammoniacy,
Galbani, in aceto solutorum,
ana unciam unam,
Crocī pulverisati drachmam unam
semis.

Misceantur.

Emollit, maturat, & digerit abscessum fien-
tem, jam vero facti atque rupti reliquam
duritiem resolvit, ac emollit egregie.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

REC. Mucilaginum Fœni græci,
Lini,
Radicum Althææ ana
libram unam,
Olei clari Olivarum libras tres,
Lithargyrii, in subtilissimum pulve-
rem triti, libras duas,

Pars II.

EMPLASTRUM.

57

Coque Oleum & Lithargyrium leni igne,
perpetua agitatione, semper unciam
unam aut alteram aquæ fontanæ instil-
lando, ad solutionem Lithargyrii, &
emplastri albi, subgrisei consistentiam.

Postea addantur mucilagines, & continu-
ata lenta coctione, ad justam emplastri
consistentiam redigantur.

Juvat maturationem tumorum durorum, ad
suppurationem tendentium.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ, five DIACHALCITEOS.

REC. Axungie porcine,
Olei Olivarum,
Foliorum Quercus teneriorum ana
libras duas,

quæ conscindantur & impastentur cum
axungia & oleo; postea coquantur ad
humiditatis consumtionem, colentur &
exprimantur. Colaturæ adde

Lithargyrii, in subtilissimum polli-
nem triti, libras duas.

Lentissimo igne, sub perpetua agitatione,
una coquantur, semper de solutione

Vitrioli unciarum trium, in
Aquæ fontanæ libris duabus

facta, parum instillando, donec consisten-
tiam emplastri acquisiverint, coloris al-
bi subcinerei.

Desiccat; hinc ad ulcera sordida, ædemata
& contusiones, abs chirurgis adhibetur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

REC. Ceræ flavæ uncias undecim,
Colophonie,
Bdellii ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi Ammoniacy,
Terebinthinæ puræ ana uncias duas.
Galbani,
Sandarachæ ana unciam unam,
Mastiches,
Thuris electi ana unciam semis.

Cera cum Colophonia liquetur & coletur;
quibus, ab igne sepositis & semifrigera-
tis,

P

tis, Terebinthina & reliqua in pulverem contrita immiscendo, fiat secundum artem emplastrum.

Potenter discutit ac humores extrahit, tonum confortat, in ischiadico malo, parotidibus, tumoribus œdematosis pedum, & luxationibus applicari solet.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Solani libras duas semis,
Ceræ albæ uncias triginta,
Cerussæ,
Plumbi usti ana libram semis,
Pompholygos,
Olibani ana uncias quatuor,

Cerussa & oleum lenissimo igne, una cum
Aquæ Solani libra una

coquantur, ad unguenti spissioris consistentiam; quibus addatur Cera alba, & cum sub perpetua agitatione fere refrigerint, reliqua subtilissime trita, admisceantur.

Refrigerat, exsiccat & dolores lenit.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS
RULANDI.

REC. Balsami Sulphuris Rulandi,
Ceræ citrinæ,
Colophonix ana uncias sex,
Pulveris Myrrhæ uncias octodecim.
Misce, fiat emplastrum.

Resolvit, mundat, exsiccat, & consolidat: atque inprimis ad resolvendas strumas laudatur.

EMPLASTRUM DIVINUM.

REC. Lithargyrii optime triti libram unam semis,
Olei Olivarum libras tres.

Coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, ad emplastri consistentiam, adde

Ceræ flavæ uncias octo,
Lapidis Magnetis præparati libram dimidiam,
Gummi Ammoniæ,
Galbani,

EMPLASTRUM.

Opopanax,
Bdellii ana uncias tres,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches,

Æruginis,

Aristolochiæ rotundæ, omnium subtilissime tritorum, ana unciam unam semis,

Terebinthinæ uncias quatuor.

Probe mixta ferventur.

Cum emplastro Opodeldoch convenit, & nomen videtur sortitum esse ob egregias vires resolventes, detergentes & confortantes.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

REC. Ceræ albæ,
Sevi cervini ana libram unam,
Axungix Anseris,
Gallinæ ana libram semis,

Fundantur lento igne, fiat emplastrum.

Anodynum est, resolvit, ad pleuriticos & spasticos dolores, pectori applicitum, commendatur.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS ET
LUXATIONES.

REC. Ceræ libram semis,
Picis libram unam,
Terebinthinæ uncias duas.

Super ignem liquatis inspergantur

Pulverum radices Consolidæ majoris,
Barbæ caprinæ,

Boli Armenæ ana uncias duas.

Probe mixta ferventur.

Luxationibus ac fracturis ossium a Chirurgis imponitur.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM
MYNSICHTI.

REC. Gummi Galbani in aceto soluti,
Emplastri de Meliloto,
Diachyli simplicis ana uncias tres,

Ceræ,
Terebinthinæ ana unciam unam,
Croci Orientalis pulverisati drachmas sex.

Misce,

EMPLASTRUM.

Misce, fiat emplastrum.

Tumores duros emollit, resolvit, dolores mitigat.

EMPLASTRUM GRISEUM sive DE LAPIDE CALAMINARI.

REC. Lapidis calaminaris præparati unciam unam,

Lithargyri uncias duas,

Thuris electi,

Mastiches ana unciam semis,

Myrrhæ drachmas duas,

Tutiæ præparatæ unciam semis,

Ceræ uncias tres,

Sevi cervini uncias quatuor,

Terebinthinæ unciam unam semis,

Camphoræ drachmam unam semis,

Cera & sevo liquatis, Terebinthina addatur, quibus semi-refrigeratis pulveres, sub perpetua agitatione pistillo ligneo, admisceantur, tandem Camphora, cum pauxillo Spiritus vini trita, adjiciatur.

Fiat emplastrum.

Siccat ulcera, & cicatricem accelerat.

EMPLASTRUM PRO HERNIOSIS.

REC. Terebinthinæ Venetæ uncias quatuor, Mastiches electæ unciam unam semis.

Liquefiant invicem, quibus adde

Ceræ flavæ uncias sex,

Pulveris Myrrhæ,

Olibani,

Sanguinis Draconis ana drachmas sex,

Radice Symphyti majoris,

Seminis Perfoliatæ ana unciam unam,

Lapidis Hæmatitæ præparati,

Vitrioli ad flavedinem calcinati ana unciam semis,

Fiat emplastrum.

Plus emolumenti infantibus, quam adultis, ab ejusmodi emplastris expectare licet, & adultioribus, nisi brachio commodo muniti sint, vix quidquam proderit.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

REC. Olei e feminibus Hyoscyami expressi,

EMPLASTRUM.

19

Succi Hyoscyami ex herba ana libram unam.

Coquantur ad humiditatis consumptionem; colaturæ adde

Ceræ citrinæ uncias quindecim,

Terebinthinæ unciam unam semis,

Pulveris herbæ Hyoscyami uncias duas.

Misceantur, fiat emplastrum.

Ad rheumaticos dolores, tumores partium glandulosarum, earum inflammationes, atque splenis affectus laudatur.

EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur EMPLASTRUM SANTALINUM.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

REC. Picis navalis uncias duas.

Gummi Galbani unciam unam,

Sulphuris vivi,

Succini citrini ana drachmas duas,

Seminis Cymini,

Florum Chamomillæ ana drachmam unam semis,

Olei petræ rubri unciam dimidiam.

Galbanum in aceto solvatur, atque cum pice optime permisceatur, quibus addantur reliqua in pulverem trita, & denique oleum petræ instilletur, præstat tamen emplastrum tempore usus demum Petroleo malaxare.

Discutit, resolvit & roborat, atque egregie in doloribus ischiadicis, aliisque rheumaticis conducit.

EMPLASTRUM DE LAURI BACCIS.

Videatur EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMI.

REC. Ceræ citrinæ uncias tres,

Terebinthinæ drachmas decem,

Sevi cervini,

Resinæ ana unciam unam,

Gummi Ammoniaci,

EMPLASTRUM.

Galbani,
Pulveris Curcumæ,
Fœni græci,
Lini ana unciam semis,
Altheæ drachmas duas,
Farinæ Fabarum,
Tritici ana drachmas tres.

Ceræ, sevo & resinæ liquefactis, colatis,
postea ab igne sepositis & semi refrige-
ratis, pulveres ac terebinthinam immi-
scendo, fiat emplastrum.

Emollit, resolvit, & maturat.

EMPLASTRUM MALACTICUM SINE
GUMMI.

REC. Ceræ citrinæ uncias octo,
Terebinthinæ,
Colophonix ana uncias tres,
Olibani uncias duas.
Tartari albi drachmas duas,
Myrrhæ,
Seminis Fœni græci,
Lini ana unciam unam,
Radicum Altheæ,
Curcumæ,
Farinæ Fabarum ana uncias duas,
Olei Lini unciam unam semis.

Misceantur, fiat emplastrum.

Viribus cum antecedente convenit.

EMPLASTRUM MAMMILLARE.

REC. Spermatidis ceti uncias duas,
Emplastri de Spermate ranarum, un-
ciam unam semis,
Olei Chamomillæ cocti, drachmas
sex.

Fundantur leni igne; addantur

Pulveris feminis carvi uncia,
Olei destillati carvi drachmæ duæ,
Camphoræ drachma una.

Misceantur, fiat Emplastrum.

*Tensiones dolorosas mammarum, a lactis
abundantia, mitigat, coagulationem lactis
impedit, & coagulatum resolvit.*

EMPLASTRUM.

EMPLASTRUM MATRICALE.

REC. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Asæ foetidæ ana unciam
unam semis.

Solvantur in aceti Rutæ sufficienti quanti-
tate, atque ad spissitudinem pultis redi-
gantur; adde

Terebinthinæ Venetæ unciam unam
semis,

Ceræ citrinæ, seorsim liquatæ & ali-
qualiter refrigeratæ, uncias qua-
tuor,

Myrrhæ unciam unam,

Castorei drachmam unam,

Olei destillati Angelicæ,

Succini ana scrupu-
lum unum.

Misce.

*In uteri affectibus prodest; calefacit, flatus
discutit, & dolores sedat, abdomini im-
positum.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

REC. Herbæ & florum Meliloti uncias
quatuor;

Florum Absinthii,

Chamomillæ,

Baccarum Lauri,

Seminis Apii ana drachmas sex,

Styracis unciam semis,

Gummi Ammoniaci unciam unam.

Optime in pulverem trita excipiantur

Ceræ citrinæ unciis octo,

Sevi hircini unciis quatuor,

Terebinthinæ,

Resinæ ana uncia una semis,

Olei Chamomillæ unciis duabus.

Fiat emplastrum.

*Ad inflammationem & tumores glandularum
maxillarium, & parotidum resolvendos
adhibetur.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

REC. Emplastri diachyli simplicis libram
unam,

Gummi ammoniaci libram semis,
Mercurii

EMPLASTRUM.

Mercurii vivi uncias octo,
Terebinthinæ unciam unam,
Styracis liquidæ unciam semis.

Misce secundum artem.

Cum Emplastro de ranis cum mercurio, convenit & breviori manu paratur.

EMPLASTRUM five CERATUM DE MINIO RUBRUM.

REC. Cerae citrinæ,
Sevi cervini,
Olei Rosarum ana libram semis,
Cera & Sevo liquatis atque fere refrigeratis, adde
Minii rubri, cum Oleo rosato optime triti, uncias sex,
Camphoræ drachmam unam semis.

Fiat emplastrum molle.

Ad partes inflammatas; ambustas, & e vesicatorio applicito suppurantes & dolentes, demulcendas, leniendas atque consolidandas inservit.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

REC. Cerussæ libras duas,
Lithargyrii,
Minii ana libram semis,
subtilissime tritis adde
Olei Olivarum libras tres.
Coquantur lenissimo igne, addantur
Saponis Veneti rasi uncia quatuor,
solutis, & ad emplastri paulo durioris consistentiam coctis, admisceantur
Camphoræ uncia una,
Baccarum Lauri, subtilissime tritarum, uncia semis.

Polychrestum & miraculosum quasi habetur ad ulcera antiqua & vulnera etiam noviter inflata.

EMPLASTRUM NERVINUM HOFFMANNI.

REC. Gummi Ammoniacy,
Elemi ana unciam semis,
Tacamahacæ,
Mastiches,
Olibani ana drachmas tres,

Pars II.

EMPLASTRUM.

61

Carannæ drachmas sex,
Succini citrini drachmas duas.
Omnia pulverifata excipiantur
Terebinthinæ Venetæ unciis duabus,
Cerae flavæ libra semis.

Fiat emplastrum.

Ad nervorum, artuum & ischiadicos dolores utile est, roborat & attrahit; hinc etiam ad luxationes adhiberi potest.

EMPLASTRUM DE NICOTIANA LE MORT.

REC. Nicotianæ uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Vini rubri uncias quinque.

Coquantur leni igne ad consumptionem humiditatis, exprimantur, & expresso addantur

Cerae citrinæ,
Colophonii ana libra una.

Admisceatur

Tacamahacæ,
Elemi,
Myrrhæ,
Aloës ana uncia una,
Olei Tabaci per descensum destillati uncia duæ.

Fiat emplastrum.

Commendatur ab Auctore spleneticis. Abdomini impositum, alvum obstructam reserare expertum est.

EMPLASTRUM NORICUM.

REC. Olei rosati libram unam,
Minii rubri uncias octo,
Aceti Vini uncias quatuor.

Coque ad emplastri, brunei coloris & mollioris consistentiam; adde

Cerae citrinæ unciam unam semis,
Camphoræ drachmas duas.

Misce, effunde in scatulas.

Ulcera exsiccat, & nervosos partes roborat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

REC. Gummi Tacamahacæ,
Elemi,

Masti-

Q

EMPLASTRUM.

Mastiches electæ ana un-
ciam unam,
Opii drachmas duas;
Omnia probe trita excipiantur
Terebinthinæ claræ Venetæ drach-
mis duabus.
Misce, fiat emplastrum.

*Non solum ad dolores dentium, sed & cepha-
lalgiam & defluxiones catarrhales inservit.
Spatula calefacta super sericum extenditur,
atque temporibus applicatur.*

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

REC. Lithargyrii triti libram unam semis,
Olei Olivarum libras duas.

Coque lento igne, additis
Aceti Vini, &
Aquæ fontanæ ana uncias quatuor,
ad colorem dilute fuscum.

His adde

Ceræ flavæ libram semis,
Terebinthinæ uncias quatuor,
agitantur pistillo ligneo, ut citius refrigerant
& spissescant, addantur

Gummi Ammoniaci,
Bdellii ana uncia duæ,
Galbani,
Opopanax ana uncia una,
in Aceto solutis, & in mellis consistentiam
redactis

Pulveris Aristolochiæ rotundæ veræ,
Aristolochiæ longæ veræ,
Lapidis calaminaris præparati,
Thuris,
Myrrhæ,
Mastiches ana uncia una,

Olei Laurini uncia una semis.

Commisceantur, semper agitando, usque dum
refrigerant.

*Vulnera sanare, spicula, tela, aut vulneribus il-
lapsa extrahere, affluxus humorum arcere, &
symptomata periculosa præcavere credunt.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

REC. Ceræ,
Picis,
Colophonix ana libram unam,
Crocis,

EMPLASTRUM.

Terebinthinæ,
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches ana uncias qua-
tuor,

Cera, pix & colophonia invicem liquen-
tur & colentur, quibus dein, ab igne
sepositis & semirefrigeratis, terebinthi-
na addatur, postea reliqua, in pulve-
rem subtilissimum redacta, ammoniac-
um, galbanum & crocus, aceto solu-
ta, jungantur, fiatque emplastrum.

*In luxationibus, & doloribus inde ortis, re-
solvendo & vi paregorica efficax deprehen-
ditur; propter calorem vero, quem concii-
liat, ab usu diuturno abstinendum esse, non-
nulli monent.*

EMPLASTRUM DE PANIS CRUSTA.

Videatur EEMPLASTRUM DE CRUSTA
PANIS.

EMPLASTRUM DE RANIS, SINE
MERCURIO.

REC. Ranarum viventium decem,
Lumbricorum terrestrium viventium
uncias quatuor,
Schœnanthi,
Stœchadis Arabicæ,
Matricariæ,
Crocis orientalis ana unciam semis,
Radicum Enulæ,
Ebuli ana uncias tres,
Vini albi libras duas,
Aceti Vini optimi libram unam semis.

Incidentur incidenda, & lento igne ad di-
midias coquantur & colentur; colatu-
ram serva. Postea recipe

Olei Olivarum uncias duodecim,
Lithargyrii optime triti totidem.

Coquantur lenissimo igne, spatula semper
agitando, & decocti superioris subinde
addendo, ad consistentiam emplastri du-
rioris. Ab igne remotis adde

Olei Laurini expressi,

Tere-

EMPLASTRUM.

Terebinthinæ claræ,
Ceræ flavæ ana uncias duas,
his liquatis
Pulveris Olibani drachmas sex,
Euphorbii drachmas quinque,
Styracis liquidæ unciam semis,
probe pistillo ligneo commiscendo, fiat
emplastrum.

*Commendabile est ad solvendos & emolliendos
tumores frigidos, & ad dolores a causa
frigida ortos mitigandos.*

EMPLASTRUM DE RANIS; CUM MERCURIO SIMPLO.

Fit, si
Emplastri modo præscripti libræ uni
additur
Mercurii vivi, in Terebinthina ex-
tincti, uncia una semis.

*Ad tumores & dolores glandularum, præfer-
tim ex inquinamento venereo ortos, adhi-
betur.*

EMPLASTRUM REGIUM BURRHI.

REC. Ceræ citrinæ libram unam semis,
Resinæ Pini libram semis,
Terebinthinæ Venetæ libram unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asæ foetidæ,
Hederæ,
Tacamahacæ,
Elemi,
Olibani,
Sanguinis Draconis ana un-
ciam unam,

Tragacanthæ uncias decem,
Castorei unciam semis,
Extracti Opii,
Crocī ana drachmas duas,
Salis volatilis Ammoniaci,
Cornu Cervi ana drach-
mas sex.

Cera & resina lento igne liquentur & co-
lentur, quibus, ex parte refrigeratis,

EMPLASTRUM.

63

admisceantur Tacamahaca, Elemi, Oli-
banum, Sanguis Draconis, omnia in
subtilissimum pollinem trita; postea Gum-
mi Ammoniacum, Galbanum, Opopa-
nax, Bdellium, Asa foetida, Hederæ,
cum extractis, in aceto soluta, & ex-
pressionem per linteum colata, atque leni
igne in mellis consistentiam redacta, ad-
dantur. Tandem Terebinthina Veneta,
Tragacantha, Castoreum & Salia vola-
tilia adjungantur, & perpetua ac dili-
genti mixtione fiat emplastrum, quod
in cylindros crassiores formatum, vesi-
cæ bubulæ involvatur & fervetur.

*Nervinum est, resolvit, dolores sopit; in tu-
moribus, imprimis œdematosi commendatur.*

EMPLASTRUM, five CERATUM SANDALINUM, alias INCO- GNITUM.

REC. Ceræ novæ,
Resinæ ana uncias quatuor,
Sandali rubri unciam unam semis,
Crocī drachmas duas,
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Aluminis ana drachmam unam semis.

Cera cum resina liquefacta & colata, ite-
rumque semi-refrigerata, Sandalum &
Crocus, trita, atque Vini spiritu soluta,
cum reliquis in pulverem redactis, mis-
ceantur, fiatque emplastrum.

*Hepatis indurationi & obstructioni dicatum
olim fuit. Prodest etiam ad ischiadicis do-
lores.*

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

REC. Olei rosati libram unam,
Cerussæ,
Minii rubri ana uncias quatuor.

Coquantur, sub perpetua agitatione & ad-
ditione aliquot unciarum aquæ fontanæ;
ad solutionem Cerussæ & Minii promo-
vendam, atque adustionem emplastri
præcavendam, in emplastri mollioris
consistentiam; addantur

Saponis Veneti rasi unciae quatuor; Misceantur, fiat emplastrum.
quibus solutis, ab igne removeantur, & *Laudatur ad ulcera antiqua & scrophulas etiam exulceratas.*

Camphoræ in spiritu Vini solutæ uncia semis

admisceatur:

Ad dolores arthriticos & spasticos leniendos communiter laudatur; alvum quoque infantibus, abdomini impositum, reſerasse observatum est. Resolvit tumores frigidos, & ictericis, ubi durities sub hypochondriis sentitur, commendari solet.

EMPLASTRUM SATURNINUM MYNSICHTI.

REC. Sevi hircini,

Ceræ citrinæ ana uncias quinque;
Terebinthinæ claræ,
Plumbi usti, optime loti & subtilissime triti, ana uncias duas,
Lapidis Calaminaris præparati,
Cerussæ albæ ana unciam semis,
Nihili albi,
Tutiae præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ,
Mastiches,
Olibani,
Aloës,
Nitri ana drachmam unam,
Camphoræ drachmam semis.

Omnia in subtilem pulverem redacta, Ceræ, Sevo & Terebinthinæ liquatis, & ab igne remotis, admisceantur. Fiat emplastrum.

Ab auctore Mynsichto ad ulcera fætida exesa, inflammationes & ambusta commendatur.

EMPLASTRUM DE SCROPHULARIA.

REC. Foliorum Scrophulariæ,
Digitalis purpureæ recentium ana uncias octo.

Axungiae fuillæ libram unam.

Coque ad humiditatis consumptionem, expresso adde

Ceræ citrinæ,
Resinæ Pini ana uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ,
Æruginis ana unciam unam.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

REC. Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Olei Amygdalarum dulcium,
Gummi Galbani ana unciam semis,
Terebinthinæ claræ unciam dimidiam.

Cum cera liquata commisceantur, oleum, terebinthina, sperma ceti, & tandem gummi galbanum tritum. Fiat emplastrum.

Dicitur etiam mammillare, quia mammis puerperarum & lactantium imponi solet. Lac coagulatum resolvere, & tumores glandularum duros emollire creditur.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

REC. Olei spermatis ranarum,
Cerussæ tritæ ana libras quinque.

Coquantur perpetua agitatione, lenissimo igne, semper aliquid aquæ fontanæ & aceti destillati addendo, tam ob adustionem præcavendam, quam solutionem cerussæ promovendam, ab emplastri albi consistentiam; cui, ab igne remoto & pistillo ligneo probe agitato, adde

Aluminis crudi uncias quinque,
Camphoræ unciam unam in Spiritu Vini solutæ.

NB. Præstat Alumen in aquæ fontanæ libra una semis vel duabus dissolvere, & inter coquendum semper parum hujus solutionis addere; Ita perfectius uniuntur, & citius cerussa solvitur.

Ad ulcera sordida antiqua mundificanda & curanda, inflammationes & dolores arcentes laudatur; refrigerat, adstringit & exsiccant.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

REC. Cicutæ,
Foliorum Ebuli ana uncias duas,

Nico-

EMPLASTRUM.

EMPLASTRUM.

65

Foliorum Nicotianæ,
Florum Genistæ ana unciam unam,
Aceti Vini libram unam.

Macerentur per biduum, ebulliant, & exprimantur. In colatura dissolve

Gummi Ammoniaci libram unam;

Solutioni per pannum colatæ, & ad mellis consistentiam inspissatæ, adde

Ceræ citrinæ libram semis,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ,
Olei Capparum ana uncias duas;

Quæ, seorsum in sartagine liquata, & femirefrigerata, misceantur exactissime.

Usus ex nomine cognoscitur. Resolvit, discutit, & cum emplastro de Cicuta convenit.

EMPLASTRUM STICTICUM, sive STIPTICUM.

REC. Lithargyrii,
Lapidis Calaminaris,
Minii ana libram semis,
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam,
Vitrioli albi unciam unam,

Oleum Lini & Olivarum, cum Lithargyrio, Minio, & Lapide calaminari tritis, lenissimo igne, perpetua agitatione coquantur; quibus Vitriolum, in libra una aquæ fontanæ solutum, successive additur, donec justam acquisiverint consistentiam; adjiciantur

Colophonæ,
Ceræ citrinæ ana libra una,
Terebinthinæ claræ,
Olei Laurini expressi ana libra semis.

Mixtis addatur

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhæ,
Aloës hepaticæ,
Aristolochiæ longæ veræ,
Sanguinis Draconis,
Lapidis Hæmatitæ præparati ana uncia una.

Probe misceantur, & fiat emplastrum, coloris spadicei.

Non solum ad recentia vulnera, sed etiam ad antiqua ulcera, egregium est remedium. Exsiccat, mundificat, ac in rheumaticis doloribus bono effectui non destituitur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM DE TACAMAHACA.

REC. Ceræ citrinæ uncias octo,
Tacamahacæ uncias quatuor,
Terebinthinæ unciam unam,
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam.

Ceræ cum Terebinthina liquefactæ & femirefrigeratæ admisceatur Tacamahaca trita, ac tandem Balsamum cum oleis.

In vomitu, diarrhæa, & aliis ventriculi morbis, ex imbecillitate ortis, ad ventriculum roborandum convenit, flatus etiam dissipat.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

REC. Minii optime triti,
Aceti Vini albi ana libram unam,
Olei Rosarum libras duas.

Coquantur, leni igne, ad emplastri consistentiam, coloris fuscospadicei, cui nonnihil refrigerato adde

Camphoræ, cum spiritu Vini tritæ, unciam unam semis.

Misceantur, & emplastrum in scatulas effundatur.

Cum emplastro Norico convenit, siccatur, & ad ulcera antiqua commendari meretur.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES.

REC. Pulveris Aloës hepaticæ,
Trochiscorum Alhandal,
Radiciis Asari,
Herbarum Tanacetii,
Sabinæ,
Absinthii,

Myrrhæ ana drachmas tres,
Fellis Tauri recentis uncias tres.

Misce,

R

Misce, ut fiant pultis instar, cui successive,
una liquata, sub perpetua agitatione, ad-
dantur

Ceræ citrinæ unciz tres,
Olei Absinthii cocti,
Terebinthinæ Venetæ ana drachmæ sex.

Tandem adjiciatur

Olei destillati Sabinæ,
Petræ albi ana drachma una.

Fiat emplastrum.

*Pueris alia medicamenta reformidantibus præscri-
bitur. Abdomini nimirum impositum vermes
necat, atque alvum movet.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

REC. Cantharidum in pulverem tritarum
uncias quatuor,

Ceræ flavæ uncias decem,
Terebinthinæ Venetæ,
Olei Rosarum ana uncias duas semis,
Camphoræ drachmas tres.

Misce, fiat emplastrum.

*Ad vesicas excitandas, supra corium exten-
sum. imponitur; globuli exinde formati,
atque fonticulis impositi, fluorem promo-
vent.*

EMULSIO EXTERNA E NUCLEIS.

REC. Nucleorum Perficorum unciam unam,
Seminis Cannabis,
Papaveris ana unciam dimidiam,
Aquæ Meliloti,
Nymphææ ana uncias quatuor.

Fiat Emulsio. Adde

Spiritus Vini camphorati unciam semis.

*Ufus est externus. Linteis quadruplicatis fronti
& temporibus imposita, in dolore capitis ex
febri & catarrho. bonam præstat opem.*

EMULSIO VIOLATA MYNSICHTI.

REC. Amygdalarum dulcium unciam unam
semis,
Seminum Violarum drachmas tres.
Papaveris albi drachmam unam
semis.

Contundantur cum

Aquæ Nymphææ,

ESSENTIA.

Aquæ Lactucæ ana unciis sex,
Violarum libra una.

Expressæ Emulsioni addantur

Julepi violati drachmæ duodecim.

*Refrigerat & humectat, dolores mitigat, somnum
conciliat, & in febribus malignis, ad æstum
temperandum, nec non in Nephritide feliciter
adhibetur.*

Dosis unciz quatuor ad sex.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

REC. Comarum Absinthii vulgaris unciam
unam,

Radicum Zedoariæ unciam semis,
Caryophyllatæ drachmas
duas,

Foliorum Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris ana un-
ciam semis,

Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum
drachmam unam.

Incisis & contusis affunde

Spiritus Vini rectificati libram unam,

Stent in digestionem per dies quatuor, in
vase optime clauso; postea prelo expri-
mantur, expressum per chartam bibu-
lam filtretur & servetur.

Stomachica & carminativa est.

Datur a drachma dimidia ad integram.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

REC. Summitatum Absinthii floridarum,
& ad maturitatem proxime ac-
cedentium, cum foliis minori-
bus, in umbra ficcatarum, un-
cias quatuor,

Spiritus Vini rectificati libras duas,

Post digestionem exprimantur, expressum
aliis superaffundatur

Absinthii unciis duabus,

atque, post sufficientem digestionem, ex-
primantur & filtrentur.

*Vires Absinthii habet, stomachicas, carmina-
tivas, anthelminticas.*

Dosis drachma una ex vino.

ESSEN-

ESSENTIA.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Helenii ana unciam unam,
Carlinæ,
Hirundinariæ,
Pimpinellæ ana unciam
unam semis,
Herbæ Scordii uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas
semis.

Post sufficientem extractionem expriman-
tur, & per filtrum trajecta Essentia ser-
vetur.

*Medicamentum est vere polychrestum. Ven-
triculum roborat, flatus dissipat, urinam
& transpirationem promouet; hinc in omni-
bus fere morbis, febribus etiam malignis;
catarrhalibus & intermittentibus, lymphæ
& sanguinis vitiis prodest.*

*Commendatur a guttis quadraginta ad quin-
quaginta.*

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEM- PERATA STAHLII.

REC. Radicum Pimpinellæ albæ,
Hirundinariæ ana uncias
tres,

Herbæ Scordii uncias duas.

Incisa infundantur & extrahantur

Spiritus Vini rectificati libris tribus.
Exprimantur & filtrentur, atque tertia
pars Spiritus per destillationem ex Ma-
riæ Balneo evocetur, residuum fervetur.

*Temperatior & mitior est ordinaria, ideoque
secure, etiam ad exæstuationem sanguinis
promis, dari potest.*

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA AMARA.

REC. Herbarum Tanaceti unciam unam,
Scolopendrii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Radicis Gentianæ,

ESSENTIA.

67

Radicis Lapathi acuti ana drachmas
tres,

Corticum Aurantiorum recentium
viridium unciam semis.

Incisa macerentur in

Spiritus Vini tartarifati unciis duo-
decim,

Post sufficientem extractionem expriman-
tur, & expressum per chartam filtretur.

*Digestionem promouet, ventriculum roborat,
flatus dissipat, vermes necat.*

*Dari potest a guttis quinquaginta ad septua-
ginta, ex vino.*

ESSENTIA AMBRÆ BALSAMICA DIPPELII.

REC. Ambræ griseæ,

Balsami Peruviani ana drachmas duas,
Salis Tartari drachmas sex.

Terantur & exacte misceantur in mortario
marmoreo, addantur

Spiritus Vini rectificatissimi unciae no-
vem,

Digerantur, in fine augeatur calor, ut mixtu-
ra ebulliat, refrigescant, & liquor tinctus,
a facibus separatus, filtretur.

*Vires sunt analepticae, stomachicae & balsamicae.
Præscribitur cum aliis essentis tonicis & sto-
machicis.*

Dosis guttæ quindecim ad triginta.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

REC. Ambræ veræ griseæ scrupulum unum;
Immittatur phialæ, & lenissimo igne carbo-
num liquetur. affundantur postea

Liquoris anodynii parum calefacti unciae
duæ,

addantur

Moschi Orientalis grana quatuor.

Servetur usui.

*Analepticum, cordiale & cephalicum est medica-
mentum, sed multum calefaciens. Commenda-
bile in apoplexia, vertigine, memoria confor-
tanda; additur etiam aphrodisiacis.*

Dosis guttæ viginti ad quadraginta.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

REC. Ambræ griseæ drachmam unam,

R 2

Moschi

ESSENTIA.

Moschi in spiritu Rosarum soluti scrupulum semis,
 Olei Cinnamomi destillati guttas quinque,
 Sacchari albissimi uncias duas,

Misce & asserva in vase vitreo, bene clauso.
Analepticum est, & cum pulvere cordiali, sive Elæosaccharo Cinnamomi cinnabarino, mixta, in apoplexia serosa, & aliis capitis morbis, illis, qui Ambram & Moschum perferre queunt, dari potest. Trageis etiam additur.
Dosis a granis decem ad scrupulum unum.

ESSENTIA ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ uncias tres, in Spiritus Vini optime rectificati uncias quindecim

macerentur per aliquot dies, ut extrahatur essentia, filtranda & fervanda.

Vires habet Angelicæ radices alexipharmacas, stomachicas, diureticas, carminativas.

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

ESSENTIA ANODYNA OFFICINALIS.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
 Aquæ Cinnamomi spirituosæ uncias novem,

Post sufficientem digestionem filtrentur.

Dolores sedat, somnum conciliat, & easdem, quas Laudanum opiatum, virtutes possidet.

In scrupulo uno duo sunt grana opii.

Dosis guttæ quinque, decem, quindecim, ad viginti.

ESSENTIA ANODYNA LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
 Aquæ apoplecticæ spirituosæ,
 Spiritus Vitrioli roridi, cum spiritu volatili mixti, ana uncias quatuor.

Extrahe, ut artis est, essentiam, filtra & serva.

Vires ex nomine patent, anodynæ scilicet, dolores mitigantes & somnum conciliantes.

ESSENTIA.

Dosis guttæ septem, duodecim, ad quindecim. Drachma una hujus Essentiæ grana sex & dimidium habet opii.

ESSENTIA ANTARTHRITICA, J. M. HOFFMANNI SINE OPIO.

REC. Lumbricorum terrestrium præparatorum uncias tres,

His affunde

Olei, sive liquoris Salis Tartari per deliquium, uncias duas:

stent in vitro bene clauso per viginti quatuor horas, postea affundantur

Spiritus Vini rectificati uncia duodecim,

addantur

Castorei drachmæ duæ,

Croci drachma una;

Stent denuo per triduum in digestionem. Liquor tinctus, per chartam emporeticam filtratus, servetur.

ESSENTIA ANTARTHRITICA CUM OPIO EIUSDEM.

REC. Lumbricorum terrestrium præparatorum uncias duas,

Radice Cynoglossæ unciam unam,

Castorei drachmas duas,

Croci austriaci drachmam semis,

Opii drachmam unam.

Affunde tritis

Spiritus Vini rectificati libram unam,

Post sufficientem extractionem & filtrationem adde

Spiritus Cochleariæ unciam unam.

Ambæ commendantur a clarissimo autore in doloribus arthriticis, aliisque scorbuticis & spasmodicis mitigandis; ad icterum, asthma convulsivum, retentionem urinæ.

Dosis prioris, sine opio, guttæ quinquaginta ad septuaginta: posterioris, cum opio, guttæ quindecim ad triginta.

Uncia una habet opii circiter grana quinque.

ESSENTIA ANTHYDROPICA HOFFMANNI.

REC. Radicum Hirundinariæ,

Radi-

Radicum Bryoniæ ana drachmas sex,
 Herbæ Absinthii,
 Florum Sambuci ana unciam semis,
 Aloës Succotrinæ drachmas sex,
 Myrrhæ drachmam unam,
 Gummi Ammoniacy drachmas tres,
 Macis,
 Caryophyllorum aromaticorum ana
 drachmas duas,
 Millepedum,
 Lumbricorum terrestrium ana drach-
 mam unam semis,
 Croci drachmam unam,
 Salis armoniaci,
 Salis Tartari ana drachmas duas.

Incisis & contusis superfundantur
 Aquæ florum Sambuci uncia quatuor,
 Digerantur per aliquot horas, postea addatur
 Spiritus Vini optime dephlegmati libra
 una semis,
 Fiat, lento calore digerendo, Essentia.

*Celeberrimus auctor hanc essentiam in cachexia,
 leucophlegmatica & hydropo commendat.*

Dosis sunt scrupuli duo, mane sumendi.

ESSENTIA ANTISCORBUTICA.

REC. Radicum Ari,
 Lapathi acuti ana unciam unam.
 Herbæ Trifolii fibrini unciam unam,
 Sedi vermicularis,
 Centaurii minoris,
 Seminis Lapathi acuti ana drachmas sex,
 Corticum Winterani uncias duas,
 Fraxini,
 Sassafras ana unciam unam,
 Myrrhæ electæ unciam unam.
 Salis Tartari unciam unam semis.

Incisa & contusa infundantur in
 Spiritus Cochleariæ libris tribus;
 Digerantur per aliquot dies, postea exprimantur,
 expresso addantur
 Essentiæ Succini uncia tres,
 Spiritus Vitrioli dulcis uncia una semis.
 Digerantur & filtrentur.

*Vires sunt antiscorbuticæ, incidentes, attenuantes,
 resolventes, diureticæ, stomachicæ.*

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.
 Pars II.

ESSENTIA ASÆ FOETIDÆ.

REC. Asæ foetidæ,
 Salis tartari purissimi ana uncias
 duas,

Spiritus Vini libram unam.
 Tridua digestionem leni calore extrahatur
 essentia, quæ filtrata usui servetur. Po-
 test etiam ad instar dudum in nostro di-
 spensatorio receptæ essentiæ Succini G.
 cum liquore anodyno extractio fieri.

Vires sunt nervinæ, antihystericæ.

Dosis guttæ viginti.

ESSENTIA BALSAMICA FRID.
 HOFFMANNI.

Videatur ELIXIR.

ESSENTIA BALSAMICA GMELINI.

REC. Corticum Aurantiorum,
 Citri ana uncias duas,
 Cinnamomi,
 Nucis Moschatæ ana drachmas quinque,
 Caryophyllorum aromaticorum drach-
 mas duas,
 Salis Ammoniacy uncias quindecim,
 Cinerum clavellatorum tantundem,
 Spiritus Vini non dephlegmati libras
 quatuor.

Destillantur ex cucurbita, & spiritus volatilis
 libræ duæ cum dimidia proliciantur, in qui-
 bus infundantur

Corticum Aurantiorum,
 Citri ana uncia tres.

Digerantur post octiduum, postea clarum a
 spisso, per inclinationem vasis separetur. Re-
 siduum exprimatur, & post filtrationem,
 claro admisceatur.

Stomachica & carminativa est.

Dosis guttæ triginta, quinquaginta.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balsami Peruviani optimi unciam
 semis, cum
 Spiritus Vini optime dephlegmati un-
 ciis tribus,

per dies aliquot, loco tepido digere, essen-
 tiam extractam per bibulam cola ac serva.

S

Reverend

Revera balsamicum est, calidum tamen medicamentum, quod cum circumspeditione offerri debet; Ventriculum roborat, & vitia lymphæ corrigit.

Externus usus est ad ulcera, abscessus & vulnera. etiam partium tendinosarum.

Interne dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

ESSENTIA BENZOES COMPOSITA.

REC. Benzoës electæ pulverisatæ unciam unam,

*Styracis calamitæ unciam semis,
Balsami Peruviani drachmam.*

Affunde

Spiritus Vini rectificati uncias octo, digerantur, & post sufficientem solutionem filtrentur.

Nota. Balsamum Peruvianum cum pulvere Benzoës commisceri debet.

Usus externus est cosmeticus innocens, nimirum aquæ calidæ instillata reddit eam laetam, quæ nitorem gratum cuti conciliat, & eam mollem servat. Interne pectorale præbet medicamentum non contemnendum.

ESSENTIA BENZOES SIMPLEX.

*REC. Florum Benzoës drachmas tres,
Spiritus Anisi uncias tres.*

Digere lenissimo calore, atque solutio sive essentia flavi coloris fervetur.

Pectoralis, stomachica, carminativa & alexiterica est.

Dosis guttæ octo ad viginti.

ESSENTIA CALAMI AROMATICI.

REC. Radicis Calami aromatici unciam unam semis,

concisæ adfundantur

Spiritus Vini uncia sex.

Digestione ad sufficientem extractionem peracta essentia filtretur.

Vires habet egregias, stomachicas, carminativas, potestque utiliter hæc essentia, cum calamus aromaticus in multis nostræ patriæ

regionibus sponte crescat, aliis ex exoticis aromatibus paratis essentiis substitui.

Dosis drachma semis ad integram.

ESSENTIA CARDAMOMI.

REC. Cardamomi minoris in pulverem triti uncias tres,

affunde

Spiritus Vini rectificatissimi uncias sedecim.

Digerantur, exprimatur & filtretur essentia.

Flatus potenter discutit, ventriculum & cerebrum confortat, urinam movet.

Dosis drachma semis, ad drachmam unam, cum vehiculo idoneo.

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

Paratur ad normam Essentiæ Absinthii simplicis, superius descriptæ; cum qua etiam viribus convenit, & in eadem dosi exhiberi potest.

ESSENTIA CARMINATIVA.

WEDELII.

REC. Radicum Zedoariæ uncias quatuor,

Carlinæ,

Calami,

Galangæ ana uncias duas,

Florum Chamæmeli Romani,

Seminum Anisi,

Carvi ana unciam unam,

Caryophyllorum aromaticorum,

Baccarum Lauri ana drachmas sex,

Macidis unciam semis,

Corticum Aurantiorum unciam unam.

Concisa & contusa grosso modo macerentur, in

Spiritus corticum Citri libris quatuor semis,

Spiritus Nitri dulcis uncis duabus semis, per sex dies.

Expressa & filtrata essentia usui fervetur.

Vires sunt stomachicæ, carminativæ, & diureticæ.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

ESSEN-

ESSENTIA.

ESSENTIA CASTOREI.

REC. Castorei Orientalis veri, minutim incisi, uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Per octiduum macerentur, exprimantur, & postea filtretur essentia.

Commendatur interne ad affectus spasticos, hystericos & colicos, etiam ad odoratum præbetur mulieribus, atque Clysteribus in Colica hysterica, ad drachmam integram, addi potest.

Interne exhibetur a guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA CATECHU.

Videatur ESS. TERRÆ CATECHU.

ESSENTIA CENTAURII MINORIS.

Uti Essentia Absinthii simplex, spiritu Vini optime rectificato, parari solet.

Dosis eadem.

Stomachica est & anthelmintica, atque in febribus intermittentibus conducit.

Ad drachmas duas exhibita alvum movere compertum est.

ESSENTIA CEPHALICA.

REC. Radicis Calami aromatici drachmas tres,
Herbarum Betonicæ,
Mari veri,
Salviæ,

Florum Lavendulæ ana drachmas duas,

Ligni Aloës ponderosi,

Sandali citrini odoratissimi,

Corticum Culilawan ana drachmas tres,

Cinnamomi acuti,

Nucis Moschatæ,

Cubebarum,

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum ana drachmas duas.

Incisus & contusus superaffundantur

Aquæ apoplecticæ spirituosæ,

Elixirii vitæ Matthioli incompl. ana uncias octo.

Digerantur, & sufficienter extracta, exprimantur atque filtrentur.

ESSENTIA.

71

Senibus & phlegmaticis conducit, quibus cerebrum & ventriculum confortat; ad colicam flatulentam, eructationes & cardialgiam valet, atque essentiis vel elixiriis stomachicis admisceri potest. Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ SIMPLEX.

REC. Corticum Chinæ Chinæ pulverisatorum uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Digerantur aliquamdiu, postea essentia bene saturata expressa filtretur.

Præstat quidem Corticem Peruvianum in substantia exhibere; quia vero multi pulveres & electuaria reformidant, essentia ex illo parata dari potest, non solum autem in febribus, sed etiam, ubi tonum relaxatum oportet roborare.

Dosis guttæ sexaginta ad octoginta.

ESSENTIA CHINÆ COMPOSITA HELWIG.

REC. Corticum Chinæ Chinæ uncias tres,
Radicis Serpentariæ Virginianæ uncias duas,

Contrayerv. unciam unam.

In pulverem tritis affunde

Spiritus vini rectificati uncias sedecim.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & essentia, per chartam bibulam filtrata, reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica & carminativa est.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SPIRITUOSA.

REC. Corticum Aurantium, ab interiori albedine separatorum, libram unam;

affundantur

Spiritus Vini rectificati libræ tres semis,

Post sufficientem extractionem exprimantur, & per chartam emporeticam filtrentur.

Egregium est stomachicum, carminativum & tonicum.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.

Nota. E corticibus fructuum Aurantiorum immaturorum recentibus, vel ex ipsis tenellis fructibus pari modo essentia parari potest, quæ, si ordinariæ efficcis maturis corticibus non præcellit, tamen haud inferior est virtutibus.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO MALVATICO.

REC. Vini Malvatici libram unam semis, Flavedinis corticum Aurantiorum siccatum uncias tres.

Macerentur per biduum, colentur & filtrentur.

Stomachica, tonica & carminativa est.

Dosis uncia semis ad integram.

ESSENTIA CORTICIS CHACARILLÆ.

REC. Corticum Chacarillæ griseæ & resinose uncias quatuor.

In pulverem grossum tritis affunde Spiritus vini rectificati libram unam semis.

Digere per quatrimum, filtra & ferva.

Ventriculi vitiis medetur & pulmonibus prodest, tonum viscerum relaxatum instaurat, sedativum est, & stricturas partium dolentes blande resolvit.

Dosis guttæ triginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA CULILAWAN.

Eodem modo, quo præcedens essentia Chacarillæ, paratur.

Aromatica est, ventriculum roborat, flatus discutit.

ESSENTIA DULCIS.

REC. Terræ foliatæ Tartari drachmas duas,

Sacchari albi uncias duas,

Aquæ fontanæ unciam unam semis.

Coquantur in vase figulino probe vitreato, sub perpetua agitatione, usquequo colorem acquisiverint subnigrum vel fuscum; removeantur ab igne & affundantur

Menstrui infra descripti unciae duodecim.

Digerantur, atque essentia, per chartam emporeticam filtrata, servetur.

MENSTRUUM pro ESSENTIA DULCI.

REC. Spiritus vini gallici, vel alius purissimi, rectificati; libras quatuor, Aluminis vulgaris puri, in pulverem triti, uncias octo,

Aquæ fontanæ libram unam.

Misceantur & destillentur, e cucurbita vitrea, atque libræ tres primo prodeuntes seorsum ferventur pro menstruo.

Fuerunt, qui medicamentum corroborans, sapore & odore gratum, quodque delicatioribus atque infantibus, alia medicamenta reformidantibus, in parva dosi exhiberi posset, expetiverunt; quibus ut satisfaciamus, Essentiam hanc, quæ virtutem non solum habet corroborantem, sed & aperientem, balsamicam, diureticam & expulsvam, ac quæ sapore & odore grato se commendat, adponere volumus. Neque tamen illam pro Essentia dulci Halensi venditamus, proderit ceterum tantum, quantum hæc ipsa.

Dosis pro adultis guttæ triginta ad sexaginta; infantibus & pueris guttæ tres, quatuor, vel duodecim sufficiunt. Datur in vehiculo aquoso, vel silibet, adultis in vino.

ESSENTIA FULIGINIS CLAUDERI: alias HÆMATO - CATHARTICA ET ALEXIPHARMACA DICTA.

REC. Cinerum clavellatorum purissimorum uncias sex,

Salis Armoniaci unciam unam.

Solve separatim, & quidem Cineres clavellatos in libris duabus, & Sal Armoniacum in libra una aquæ fontanæ puræ vel pluviae;

ESSENTIA.

pluviæ; liquores salinos separatim per chartam emporeticam filtra, filtratos commisce, atque superfunde

Fuliginis ex camino splendentis pulverisatæ unciis duabus.

Digere in vitro probe clauso, per aliquot dies, postea liquorem tinctum, per chartam bibulam filtratum, serva.

Liquor salinus est oleo fuliginis imprægnatus, & præbet medicamentum resolvens, atque excretiones omnis generis promovens, in morbis chronicis, asthmate, febre quartana, ictero, cachexia, fausto cum successu adhibendum.

Dosis guttæ quinquaginta ad centum.

ESSENTIA GALANGÆ.

REC. Rad. Galangæ minor. minutim incisarum uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Extrahatur essentia leni calore, exprimatur, & per chartam filtretur.

Commendatur interne ad ventriculum confortandum & humores viscidos resolvendos: Externe ad cariem ossium, membra tabida & paralyfin linguæ.

ESSENTIA GENTIANÆ.

Fit eodem modo, quo Essentia radicum Angelicæ.

Amarum quidem, præstantissimum tamen stomachicum, tonicum, anthelminticum & antifebrile est medicamentum.

Datur a guttis quinquaginta ad octoginta.

ESSENTIA HYPERICI.

REC. Florum Hyperici uncias quatuor, Spiritus Vini rectificati libram unam & uncias tres.

Digerantur per triduum, postea exprimantur & filtrentur.

Commendatur specificè melancholicis, vulneratis, verminosis, nec non ad morbos fascino imputatos. Etiam externe vulneribus applicatur.

Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA LEVISTICI.

REC. Radicum Levistici uncias duas,

Pars II.

ESSENTIA.

73

Seminis ejusdem unciam unam, Incisa & contusa infundantur in Spiritus Vini unciis decem.

Digerantur, & post sufficientem extractionem exprimantur, atque essentia per chartam filtrata servetur.

Alexipharmaca, carminativa & diuretica est, atque in hydropo, nec non doloribus post partum commendabilis.

ESSENTIA LIGNI ALOES.

REC. Rasuræ ligni Aloës resinosi unciam unam semis,

Spiritus Vini tartarifati libram semis.

Macerentur & filtrentur.

Tribuuntur illi vires stomachicæ, uterinæ cephalicæ & analepticæ. Additur aliis medicamentis, ad virtutes eorum exaltandas; caute tamen adhibendam esse, ob vim inebriantem, nonnulli perhibent.

Dosis guttæ viginti ad quadraginta.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS SIMPLEX.

REC. Corticum ligni Sassafras unciam unam semis,

Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Macerentur per triduum, postea filtrentur & ferventur.

Anticatarrhalis est, & ad vitia lymphæ & sanguinis commendatur.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Corticum ligni Sassafras uncias quatuor, Salviæ nobilis uncias duas, Nucis Moschatæ unciam unam, Cinnamomi unciam semis, Anisi stellati drachmas tres, Spiritus Vini rectificati libras duas.

Digerantur per triduum, exprimantur; expressum filtretur & servetur.

Ad catarrhales affectus, arthritidem, flatulentias & scabiem humidam laudari meretur.

Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta quinque.

T

ESSEN-

ESSENTIA.

ESSENTIA LIGNORUM.

REC. Rasuræ Ligni Sassafras cum cortice
 uncias duas,
 Sancti uncias tres,
 Rhodii unciam semis,
 Sandali rubri,
 citrini ana
 unciam
 unam.

Affundantur

Spiritus Vini libræ duæ,
 per octiduum digerantur, postea expri-
 mantur & filtrentur.

*Ad massam sanguinis purificandam & lym-
 pham corrigendam, ad gonorrhæam etiam
 & luem veneream inservit.*

*Dosis drachma semis ad integram, in idoneo
 vehiculo.*

ESSENTIA LUMBRICORUM TER-
RESTRIUM.

REC. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum,
 in pulverem tritorum, uncias qua-
 tuor,

affunde

Olei Tartari per deliquium unciam unam;

Misceantur, addatur

Spiritus Vini rectificati libra una.

Digerantur & filtrentur.

*Commendatur arthriticis, scorbuticis & ictericis,
 urinam & sudorem cit.*

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta.

ESSENTIA MARTIATA APÉRITIVA.

REC. Radicum Galangæ,
 Calami aromatici,
 Zedoariæ,
 Cinnamomi acuti, ana drachmas duas,
 Flor. Hyperici,
 Tanaceti ana drachmam unam,
 Limaturæ Martis, unciam semis.

Minutim incisus superaffundantur

Spiritus Vini rectificati uncix sex,

Vitrioli uncia semis.

Digerantur leni calore per aliquot dies, &

ESSENTIA.

post sufficientem extractionem exprimatur
 & filtretur essentia.

*Est Tinctura Martis aromatizata, atque liensis
 & atonia viscerum laborantibus commendari me-
 retur, nec non inter anthelmintica, locum invenit.*

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA MILLEFOLII.

REC. Millefolii uncias tres,
 Spiritus Vini rectificati uncias fede-
 cim.

Infundantur, & post digestionem per tri-
 duum exprimantur; in expresso denuo

Millefolii uncix duæ

macerentur, & post sufficientem extractio-
 nem expressa Essentia per chartam bibu-
 lam filtretur.

*Commendatur ad motus hæmorrhoidales mo-
 derandos, ad nimium fluxum mensium;
 nephriticorum vomitum, & reliquos mor-
 bos viscerum, cum vena portæ connexorum.
 Cum essentia creci mixta, dolores & tor-
 mina, a quibus menstruata sæpius vexan-
 tur, mitigat.*

*Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta quin-
 que.*

ESSENTIA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum in pulverem satis tenuein
 tritorum uncias tres.

Irrorentur

Olei Tartari per deliquium drachmis
 duodecim,

postea statim affundantur

Spiritus Vini rectificati uncix decem.

In vase bene obturato digerantur per triduum;
 Essentia filtrata ad usum reponatur.

*Vires easdem, quas millepedes habent, possidet,
 potenter resolvit, urinam pellit; hinc in ictero,
 asthmate, & obstructionibus viscerum utiliter
 adhibetur.*

Dosis a scrupulo uno ad scrupulum unum semis.

ESSENTIA MUMIÆ PURIFICANS
CLAUDERI.

REC. Mumiæ Ægyptiacæ, in pulverem tritæ,
 Salis Tartari ana unciam unam,

Aquæ

ESSENTIA.

Aquæ Fumariæ libram unam.

Misceantur & digerantur per triduum, postea filtrentur.

Ab auctore ad sanguinem depurandum magnopere laudatur, sed merito a prudentioribus hæc compositio mumiam recipiens rejicitur.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

ESSENTIA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubræ electæ uncias duas, tritæ affunde

Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Digere, filtra & ferva.

Alexipharmaca est, balsamica & anthelmintica, sanguinem valde expandit, ejusque modum accelerat, datur igitur ad menstrua pellenda.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta. Externus usus est vulnerarius, ad ulcera purganda & consolidanda.

ESSENTIA MYRRHÆ ALCALISATA.

REC. Myrrhæ electæ, in pulverem tritæ, libram dimidiam,

Salis alcali, sive cinereum clavellatorum uncias octo,

Aquæ fontanæ libram unam semis.

Digerantur per sex vel octo dies, postea aqua ex cucurbita, lento igne, ad mellis consistentiam abstrahatur, residuo autem unciae viginti Spiritus Vini rectificati affundantur, atque essentia per digestionem extrahatur, quæ filtretur.

Magis recluditur Myrrha alcali, quod & essentiam saturatiorem reddit. Cum præcedente ejusdem est virtutis, ad vulnera vero non facile adhiberi debet, propter alcali, quod dolores excitat.

ESSENTIA PAREIRÆ BRAVÆ.

Paratur ad normam Essentiæ Angelicæ.

Vires sunt diureticæ & anticatarrhales.

Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ.

Spiritu Vini optime rectificato, Essentiæ Angelicæ instar, paratur.

ESSENTIA.

75

Diaphoretica, alexipharmaca & diuretica est, in torminosis, colicis affectibus, & lymphæ vitiis corrigendis, in Angina catarrhali, sine vehiculo deglutita, convenit.

Dosis a guttis quadraginta ad septuaginta.

ESSENTIA PINI.

REC. Extracti turionum Pini aqua fontana parati, uncias tres,

Spiritus Cochleariæ libram unam.

Fiat digerendo essentia.

Scorbuticis convenit, atque arthriticis commendatur.

Dosis guttæ sexaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA POPULI VULNERARIA.

REC. Oculorum Populi arboris recentium libram semis,

Spiritus Vini rectificatissimi libram unam semis.

Digerantur per aliquot dies, exprimantur, & filtretur essentia, cui adde

Essentiæ florum Hyperici libram semis, atque post digestionem, spiritus dimidia pars abstrahatur in Balneo, liquor residuus servetur.

Commendari meretur hæc Essentia, non solum ad externos usus in vulneribus, sed etiam interne in ulceribus pulmonum, renum & aliarum partium, alvi fluxione diuturna, gonorrhæa & fluore albo conducit.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta & ultra.

ESSENTIA SCILLÆ.

REC. Salis Tartari unciam semis,

Aceti scillitici, per infusionem aceto destillato parati, & probe saturati uncias duodecim.

Misceantur, & evaporetur acetum leni igne ex vase figulino probe vitreato ad mellis spissitudinem. Massa salina residua dissolvatur in Spiritus Vini rectificatissimi uncias sex.

Stent in digestionem per aliquot dies, postea clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur & servetur.

Censetur antasthmatica, resolvens & diuretica, atque hydropicis commendari meretur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA SCORDII.

Ad modum essentiae Millefolii paratur.

Egregium est alexipharmacum & diaphoreticum temperatum.

Dosis guttæ sexaginta.

ESSENTIA DE SCORDIO COMPOSITA,
sive DIASCORDIUM LIQUIDUM, JOH.
MAUR. HOFFMANNI.

REC. Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Levistici,
Zedoariæ,
Contrayervæ,
Tormentillæ,
Valerianæ ana unciam semis,
Gentianæ drachmas sex,
Herbæ Scordii uncias duas,
Florum Sambuci drachmas duas,
Myrrhæ electæ drachmas sex,
Crocī drachmas duas semis,
Corticum Citri unciam unam,
Succini,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Opī drachmam unam.

Misce, fiat omnium pulvis; superaffundantur
Spiritus Vini a baccis Juniperi abstracti
libræ tres.

Digerantur loco calido in vitro probe clauso;
post sufficientem extractionem filtrentur, &
serventur.

*Virtutes sunt alexipharmacæ, anodynæ, stoma-
chicæ, feliciter in febribus epidemicis, dysente-
ria, & ubi tinctura bezoardica locum habet,
adhibetur.*

*Uncia una Essentiæ continet duo circiter grana
Opī.*

ESSENTIA SERPENTARIÆ
VIRGINIANÆ.

REC. Radicum Serpentariæ Virginianæ, mi-
nutim incisarum, uncias duas semis,
affunde

Spiritus Vini rectificati libram unam;

Post digestionem & sufficientem extractionem
exprime, & essentiam, per chartam filtra-
tam, serva.

*Alexipharmaca, stomachica, sudorifera & diure-
tica est; in febribus tam malignis, quam inter-
mittentibus atque catarrhalibus, feliciter adhi-
betur.*

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SPICÆ INDICÆ.

REC. Spicæ Indicæ unciam unam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias sex vel
septem.

Stent in digestionem ad sufficientem extrac-
tionem, exprimatur & filtretur Essentia.

Alexiterica, carminativa, diuretica & uterina est.

Dosis guttæ quadraginta & sexaginta.

ESSENTIA SPLENETICA STAHLII.

REC. Herbarum Verbenæ,
Rutæ hortensis,
murariæ,
Salviæ,
Plantaginis acutæ ana unciam
semis,
Florum Hyperici unciam unam.

Incisa infundantur in

Spiritus Vini libra una,

Post sufficientem extractionem exprimantur &
filtrentur.

*Vires ex nomine cognoscuntur; prodest hypochon-
driacis, resolvit, urinam movet.*

Dosis guttæ sexaginta ad octoginta.

ESSENTIA STOMACHICA POLTCHRE-
STA GUNDELSHEIMERI.

REC. Piperis longi,
nigri,
albi ana drachmas duas,
hispanici, sive Capfici unciam
unam,

Cardamomi minoris drachmas decem,

Tritis affundantur

Liquoris terræ foliatæ Tartari,

Spiritus Salis Armoniaci vinosi ana li-
bra semis.

Digerantur, exprimantur & filtrentur.

*Potenter resolvit, atque cachecticis, hydropicis &
phleg-*

ESSENTIA.

phlegmaticis convenit; cholericis & sanguinei vero ab ejus usu caveant.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

ESSENTIA SUCCINI ALCALISATA.

REC. Succini flavi, probe triti, uncias quatuor,

Salis, ex duplo Nitri & una parte Tartari crudi per detonationem parati, uncias sex;

Tere invicem, affunde

Spiritus Vini non rectificati uncias sedecim.

Stent in digestionem per aliquot dies, postea e cucurbita vitrea destilla, & spiritus circiter uncias octo prolice; residuum lento igne ad siccitatem evapora, & spiritum per destillationem prolectum de novo affunde, post digestionem, clarum a spisso separatim filtra & ferva.

Saturatior est succedenti, sed, propter sal alcali, in vulneribus minus convenit.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SUCCINI, G.

REC. Succini citrini optime triti uncias duas,

Spiritus vitrioli dulcis, sive Liquoris anodynini uncias septem.

Digerantur in vase optime clauso lenissimo calore, atque post sufficientem extractionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, & in vitro epistomio clauso fervetur.

Optimam ac balsamicam partem succini hæc essentia continet, saporis est amaricantis, odoris grati, & paucae guttæ, aliquot uncias aquæ, sapore & odore inficiunt.

Vires sunt nervinæ, anticatarrhales, uterinæ &c.

Dosis guttæ quindecim ad viginti, vel sacchari frustulo exceptæ, vel vehiculo aquoso.

ESSENTIA SUCCINI ORDINARIA.

REC. Succini flavi subtilissime triti unciam unam & semis;

Pars II.

ESSENTIA.

77

Spiritus Vini rectificatissimi tartarificati uncias sex.

Leni calore in phiala optime clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Anticatarrhalem, balsamicum & nervinum edit effectum, ac in vulneribus etiam locum habet.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU.

REC. Terræ Catechu, sive Japonicæ unciam unam,

Spiritus Cydoniorum uncias quatuor.

Solutione per digestionem peracta filtretur.

In hæmoptysi atque nimis hæmorrhagiis, diarrhæa, vel, ubi adstrictione opus est, utiliter adhibetur.

Dosis a guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,

Calami,

Serpentariæ Virg.

Spicæ Indicæ,

Herbarum Scordii,

Dictamni Cretici ana drachmas tres,

Cinnamomi acuti,

Cardamomi minoris,

Cubebarum,

Caryophyllorum ana drachmam unam semis,

Opii Thebaici,

Croci Orientalis ana drachmam unam,

Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur, & Essentia per chartam bibulam filtrata, fervetur.

Vires ex titulo patent, scil. theriacales, i. e. bezoardicæ, stomachales.

Uncia una hujus Essentiæ fere grana quinque opii habet.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta usque.

ESSENTIA TRAUMATICA.

REC. Radicum Tormentillæ,

Herbæ Saniculæ ana unciam semis,

U

Herbæ

Herbæ Rorellæ,
 Florum Hyperici,
 Rosarum rubrarum ana drach-
 mas duas,
 Sanguinis Draconis purissimi,
 Mumiae,
 Terræ Catechu,
 Myrrhæ electæ ana drachmas tres.
 Sandali rubri drachmas duas,
 Nucis Moschatæ drachmam unam.

In pulverem redacta misce, & affusis
 Spiritus Vini unciis sedecim,
 tridua leni digestionem, vase optime clauso,
 elice essentiam, quam, post modicam ex-
 pressionem, per chartam emporeticam fil-
 tra, ac serva.

*Vulneraria habetur, in Hæmoptysi, Hæmorrhagia,
 uteri profluvio, & Diarrhœa adhibetur, quam-
 vis revera minus congrua sit.*

Dosis guttæ quinquaginta vel sexaginta.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

Ad normam Essentiæ Absinthii, spiritu
 proprio abstractio paratur.

Antiscorbutica, stomachica & antifebrilis est.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta.

ESSENTIA VALERIANÆ COM- POSITA.

REC. Rad. Valerianæ,
 Serpentariæ Virginianæ ana
 unciam unam,

Camphoræ drachmam unam,
 infundantur in Spiritus Vini rectificati un-
 ciis octo;

post sufficientem extractionem exprimatur
 & filtretur essentia.

*Vires sunt alexitericæ; uterinæ &c. commen-
 datur etiam ab Hermanno epilepticis.*

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA VINCE TOXICI.

Paratur, ut Essentia Angelicæ.

*Viribus cum Essentia Pimpinellæ convenit, & in
 eadem dosi exhibetur.*

EUPHORBII CORRECTIO.

REC. Euphorbii triti uncias quatuor,
 affunde

Succi Citri depurati libram.

Digere, ut Euphorbium solvatur, cola per
 linteum, & ad extracti consistentiam eva-
 pora.

*Acrimonia caustica est in Euphorbio, quam per
 acidum Citri infringere voluerunt auctores; vio-
 lenter purgat alvum, & non nisi hydropicis
 præscribi debet. Veteres etiam philoniis ad cor-
 rectionem Opii addebant.*

Dosis grana octo ad quindecim.

EXTRACTUM ABSINTHII.

REC. Summitatum Absinthii, in umbra
 ficcatarum, vel potius recentium,
 libram unam.

Concisæ macerentur in

Aquæ fontanæ libris sex, vel saltem
 quatuor,

per quatrimum, in loco calido, postea le-
 niter ebulliant, exprimantur, liquor inde
 expressus & colatus coquatur igne
 lento ad justam extracti consistentiam.

*Vires habet Absinthii stomachicas, tonicas,
 anthelminticas.*

*Pilulis hoc & alia extracta sunt destinata,
 quibus pro necessitate pulveres adduntur.*

Dosis a scrupulo dimidio, ad unum.

Probe autem notandum est, quod ex ve-
 getabilibus, quæ non gummosis solum
 sed & resinosis constant partibus, ut Ab-
 sinthium, Centaurium minus, Carduus
 benedictus, Fumaria &c. extracta lon-
 ge nobiliora obtineantur, si aquæ, in
 qua macerantur, portio quædam spiri-
 tus vini, e. g. libris singulis uncie duæ
 addantur. Menstruum tale aquoso spi-
 rituoso ad paranda extracta gummo-
 resinosa præstat vino, cujus residuum
 post evaporationem extractum Herbæ
 desideratum contaminat.

Eadem methodo parari debent, si deside-
 rantur

EXTRACTUM ARNICÆ,

ARTEMISIÆ,
 CARDUI BENEDICTI,
 CENTAURII MINORIS,
 EXTRA-

EXTRACTUM CHAMOMILLÆ ROMANÆ,
FUMARIÆ,
HEDERÆ TERRESTRIS,
MILLEFOLII,
PLANTAGINIS,
RUTÆ,
SCORDII,
TANACETI,
TRIFOLII FIBRINI,
VERONICÆ,

omnia ex plantis florentibus, adhibita cum floribus herba.

EXTRACTUM PINI &
SABINÆ,
ex summitatibus.

Vires habent simplicium; ex quibus parata sunt, & pro pilulis conficiendis inserviunt.

EXTRACTUM ACONITI.

REC. Herbarum recentis Aconiti quantum libet.

Exprimatur succus, & lento igne coquatur ad consistentiam Extracti.

Recentiora Stærckii experimenta docent, quod pulvis ex granis quatuor Extracti hujus cum Sacchari uncia semis mixtus salutarem quandoque effectum præstet in morbis arthriticis, serum acre vitiosum per sudorem, urinam, vel alvum eliminando, tumores glandularum scirrhusos, vires Cicutæ eluentes, quandoque resolvat, & ulcera refractaria consolidet.

Dosis pulveris saccharati est a granis quatuor ad scrupulum unum semel, bis, terve quotidie per aliquot dies, vel plures hebdomades continuandi.

EXTRACTUM AGARICI.

REC. Rasuræ Agarici albi & levis libram unam; Affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, digerantur, in vase vitreo arctissime clauso, in loco calido per dies tres; postea exprimantur, expressum filtretur, & in Balneo Mariæ, lenta destillatione, Vini spiritus evocetur, ac residuum extractum fervetur.

Libra una Agarici, ut plurimum uncias quatuor extracti resinosi largitur.

Agaricus, pectoris affectibus, tussi & asthmati convenire censetur, ita etiam extractum ejus, pilulis laxantibus additur, ubi ejusmodi affectibus correptis succurrendum est. Resinosum est extractum, & vi purgante admodum debili præditum, hanc ob causam nunquam solum, sed vel trochiscis Alhandal, vel alio acri purgante atque extracto quodam commixtum, in forma pilulari, vel amygdalis tritum, in pulvere dari solet.

Datur vero a scrupulo dimidio, ad grana quindecim.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

REC. Aloës Succotrinæ optimæ uncias sex.

Redige in pulverem, ac in cucurbita vitrea affunde

Aquæ fontanæ libras duas.

In vase tecto, loco calido, duos vel tres dies digere, ut solvatur; solutionem a fecibus separatam, leni igne, ad extracti consistentiam evapora.

Alvum laxat, & pro basi pilularum inservit purgantium.

Dosis scrupulus semis.

EXTRACTUM ANGELICÆ.

REC. Radicum siccarum Angelicæ libram unam;

Incisis superfundantur

Spiritus Vini rectificati libræ quinque vel sex.

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur, atque spiritus tinctus, per filtrum colatus fervetur;

Radices vero

Aquæ fontanæ libris tribus denuo infundantur, digerantur, & post unam aut alteram ebullitionem exprimantur.

Expressum albumine ovi clarificetur, & cum spirituoso commisceatur, lentoque igne, spiritu per alembicum abstracto, ad consistentiam extracti inspissetur.

U 2

Carmina-

Carminativas, anodynas, alexipharmacas & pectorales habet virtutes; additur pilulis catarrhalibus, vel Laudano mixtum in colica exhibetur.

Dosis grana duodecim, ad viginti.

Præscripto modo etiam parantur:

EXTRACTUM ARISTOLOCHIÆ CLEMATITIDIS,
ARISTOLOCHIÆ LONGÆ,
ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ,
ASARI,
CALAMI AROMATICI.
CORTICUM CHACARILLÆ,
CORTICUM CHINÆ CHINÆ,
ENULÆ,
HYPERICI ex FLORIBUS,
PIMPINELLÆ,
SASSAFRAS,
TURPETHI,
ZEDOARIÆ.

EXTRACTUM ANODYNUM.

REC. Extracti Angelicæ,
Calami aromatici ana unciam unam,
Cardui benedicti drachmas quinque,
Opium, aqua fontana parati, drachmas tres,

Olei Caryophyllorum guttas decem,
Misceantur & ferventur.

Vires sunt anodynæ, sudoriferæ, leniter adstringentes. Quælibet drachma grana septem semis habet Opium.

A granis octo, quæ granum unum habent opium, ad grana duodecim, dari potest.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Paratur ad instar Extracti Aconiti.

Potens remedium est, quod recentius in variis desperatis morbis, rabie canina, cancro, epilepsia tentatum & laudatum est. Inci-

piendum a parva dosi grani unius, quam postea nonnulli audacter auxerunt. Annotari meretur, quod oculos in nonnullis subiectis insigniter afficiat.

EXTRACTUM BEZOARDICUM CAMERARII.

REC. Extracti specierum Elixirii vitæ uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Radicum Angelicæ ana unciam unam,
Melissæ,
Salviæ,
Tormentillæ,
Opium ana unciam semis,
Papaveris erratici,
Castorei ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretiosorum præparatorum,
Succini albi præparati ana scrupulos quatuor,
Unicornu marini,
Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana scrupulos duos,
Confectionis Alkermes completæ,
de Hyacintho ana drachmas duas.

Misceantur exactissime, quod fit, extracta omnia in aqua Menthæ solvendo, & denuo in debitam consistentiam reducendo.

Alexipharmacum & sudoriferum est, lene etiam præbet anodynum. Vix amplius in usum veniens merito exulat ex officinis.

Dosis per se grana octo, ad quindecim adultioribus.

Drachma continet circiter grana tria, & scrupulus granum unum extracti Opium.

EXTRACTUM BRYONIÆ.

REC. Radicum Bryoniæ incisarum libram unam,

infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libris sex.

Macerentur per triduum, postea leniter ebulliant, exprimantur & colentur, expresse, leni igne, ad extracti consistentiam evaporetur.

Pari

EXTRACTUM.

Pari modo parantur; si unum alterumve desideretur

EXTRACTUM ESULÆ,
GENTIANÆ,
HELLEBORI NIGRI,
IRIDIS FLORENTINÆ,
IRIDIS NOSTRATIS,
PÆONIÆ,
RHABARBARI,
SARSAPARILLÆ,
TORMENTILLÆ,

Omnia ex radicibus.

Hæc, & alia ex simplicibus parata extracta, vim habent vegetabilium, e quibus parata sunt.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI
GUMMOSUM

juxta methodum Garayanam.

REC. Corticis Peruviani optime triti uncias quatuor.

Adfundantur

Aquæ fontanæ ferventis mensuræ quatuor.

Concutiatur vas sæpius de die. Horis quadraginta sic finitis coletur infusum per chartam bibulam, & evaporetur igne moderato ad libram unam usque, quæ postea quam refrigeruerit, iterum filtretur. Colatum nunc patinis vitreatis bene amplis infundatur, quæ fornaci superimponantur, ut exhalet usque ad pulveris ficitatem, qui sub forma squamarum nitentium in conspectum venit. Pulvis hic jam bene ficcus cultroque abrasus conservetur in vitro optime clauso, ne aëris accessu humiditatem attrahat. Id est idem remedium, quod Comes de la Garaye sal essentielle corticis nuncupat, ejusque vires laudibus justo majoribus effert, nec non magis laboriosam id conficiendi methodum, quam necessum est, in peculiari libello tradidit. Pretiosum est medicamentum; adposuimus hanc compositionem, cum a nonnullis & medicis & ægrotis magna cum fiducia expetatur, ut pro desiderantibus quivis pharmacopœus sine ista machina Garayana parare sciat.

Pars II.

EXTRACTUM.

81

EXTRACTUM CASTOREI.

REC. Castorei libram semis;

Per repetitam Spiritus Vini affusionem extrahatur essentia; residuo addantur

Aquæ fontanæ libræ duæ,

& lento igne ad dimidias coquantur, decoctum exprimatur, coletur, ac clarificetur, atque cum superioribus per spiritum vini factis extractionibus commisceatur, & spiritu lento igne abstracto, in extracti consistentiam reducatur.

Specificum creditur esse Castoreum antihystericum & antispasmodicum, quas etiam vires habet ipsum extractum; admiscetur pilulis nervinis, antispasmodicis, narcoticis, atque anticolicis.

Dosis grana tria vel sex.

EXTRACTUM CATHARCTICUM,
PHARMACOP. LONDINENSIS.

REC. Aloës Succotrinæ unciam unam semis,

Colocynthis drachmas sex,

Scammonii electi,

Cardamomi minoris, ana unciam semis.

Infundantur in Spiritus Vini rectificati sufficiente quantitate, & repetitis vicibus liquor a fæcibus, mediante filtro, separetur, Spiritus leni igne abstrahendo in extracti formam redigatur.

Cum extracto catholico convenit. Vis drastica scammonii & colocynthis per additionem Cardamomi corrigitur.

Dosis grana decem ad quindecim in forma pilulari.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

REC. Extracti Aloës Succotrinæ, aqua fontana parati, unciam unam,

Ellebori nigri drachmas duas,

Colocynthis scrupulos tres,

Resinæ Jalappæ,

Scammonii ana drachmam unam semis.

Misce.

Ex inscriptione patet, universale existimari alvum ducens, ex natura ingredientium, esse drasticum.

Dosis scrupulus semis, ad grana quindecim.

X

EX-

EXTRACTUM.

EXTRACTUM CICUTÆ.

REC. Herbæ recentis Cicutæ quantum vis,

exprimatur succus, isque recens lentissimo igne, in vase terreo, sæpius agitando, ne amburatur, coquatur ad spissi extracti consistentiam. Hoc extractum sufficiente quantitate pulveris herbæ Cicutæ in massam pilularem subigatur, ut fiant pilulæ granorum duorum.

Resolve, vel ad benignam suppurationem redigere indurata mala scirrhusa, scrophulosa, cancrosa; sanare fistulas & alia ulcera, cataractas incipientes solvere, & pluribus aliis morbis conclamatis mederi observavit Stærck.

A minima dosi incipiendum suadet, mane & vespere pilulam unam, sensim ascendendo; observato effectu, ad drachmam unam, quin ad unciam semis de die dedit, per plures menses continuando. Superbibitur infusum Theiforme. Vel extractum aqua stillatitia dilutum, forma mixturæ propinari potest.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Paratur, fructum Colocynthidis Spiritu Vini extrahendo postea aqua fontana coquendo, & ambas extractiones clarificatas, leni calore, in extracti consistentiam evaporando.

Fortiter purgat, & stimuli loco aliis purgantibus additur; hydropicis præsertim conducit.

Dosis grana tria ad octo.

EXTRACTUM CROCI.

REC. Croci Orientalis optimi libram semis, vel quantum libet,

Aquæ fontanæ puræ libras duas.

Digere loco tepido, vase optime clauso per biduum, liquorem tinctum decanta, aliam aquam affunde, digere, idque continua, donec omnis vis & tinctura extracta sit; extractiones omnes commisce, ac in balneo abstrahere ad justam consistentiam.

Easdem vires, quas crocus, possidet; anodynas, alexipharmacas, cordiales & antihystericas.

Dosis grana duo ad quatuor.

EXTRACTUM.

EXTRACTUM DIACARTHAMI, seu CNICO-PHARMACUM.

REC. Seminis Carthami excorticati uncias quatuor,

Rhabarbari veri unciam unam,

Polypodii querni uncias duas,

Zingiberis albi drachmas duas,

Turbith albi resinosi,

Foliorum Sennæ electorum ana uncias duas semis,

Myrobalanorum chebulorum uncias tres,

Agarici albi drachmas sex,

Scammonii Aleppensis drachmas decem,

Mannæ electæ uncias duas semis.

Agaricus, Scammonium & Turbith infundantur in

Spiritus Vini libris duabus,

& repetita affusione extrahantur; reliqua vero interim in

Aquæ ferventis libris tribus

macerentur, leni igne coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & in fine coctionis adjiciatur residuum prioris spirituosæ extractionis; exprimantur & colentur, atque in colatura Manna dissolvatur, solutio clarificetur, & cum superiori spirituofo extracto permisceatur, lentoque igne spiritus evocetur; residuum vero ad extracti mollioris consistentiam inspissetur.

NB. Pro pilulis etiam absque

Manna parari debet.

Ad vitiosos humores evacuandos accommodatissimum & multimoda experientia comprobatum celebratur. Cachecticis, scorbuticis & hydropicis convenit.

Dosis absque Manna, scrupulus unus, ad drachmam semis; cum Manna, ad drachmam integram, vel scrupulos quatuor exhiberi potest.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

Paratur ex succo expresso, ut Extractum Cicutæ.

In motibus convulsivis particularibus & quibusdam melancholicis, profuisse, notavit Stærckius.

Dosis granum unum, ad summum tria quatuorve, bis terve de die.

EXTRACTUM.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Eodem modo, quo Agarici extractum, paratur, in fine resinam cum extracto diligenter miscendo, ut gummosæ partes resinosis interponantur.

Vires cum resina conveniunt, & vix majori dosi dandum est extractum hoc; sufficiunt grana sex, vel decem, extracto alii laxanti, Aloës scilicet, vel pilulis de Succino, pro una dosi, scopo laxandi, admixta.

EXTRACTUM LACTUCÆ SYLVESTRIS f. VIROSÆ.

REC. Herbæ recentis Lactucæ sylvestris f. virosæ quantum vis.

Exprimatur succus & per viginti quatuor horas in cella subterranea vel alio loco frigido, ne in fermentationem ruat, aservetur. Decantatus per aliquot momenta ebulliat, dein per manicam Hippocratis coletur. Colatus sufficiente quantitate albuminum ovorum, subsequente denuo brevi ebullitione & per pannum laneum traiectione, clarificetur, & dein leni igne ad medietatem evaporatus, ab igne semotus & refrigeratus, secunda vice albuminibus ovorum brevi coctione & per manicam Hippocratis traiectione clarificetur, & demum leni igne in extracti consistentiam reducatur. Sic optimum obtinetur extractum non raro spiculis salinis micans.

Ab H. I. Collino in observ. circa morbos acutos & chronicos aliisque medicis Vinnensibus in hydropse impense laudatur.

EXTRACTUM LIGNI ALOES.

Paratur extrahendo lignum Aloës rectificatissimo Vini Spiritu, & spiritum rursus in balneo abstrahendo.

Additur pilulis & pulveribus cephalicis & analepticis.

Sufficit granum unum vel duo pro dosi.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

Lignum Guajacum in scobem tenuem redactum fortiter coquitur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ; decoctum lento igne in extracti formam redigitur.

EXTRACTUM.

83

Extractum exigua quantitate tali modo & ex libra una ligni vix drachmæ duæ obtinentur; Spiritu Vini vero rectificatissimo ex libra una ad minimum unciae tres extracti resinosi extrahuntur.

Usus est in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis, vel ubicunque sanguinem & lympham depurare volumus.

Dosis grana octo ad duodecim.

Naribus exceptum sternutationes insignes, citra capitis imbecillitatem efficit.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam, dissolve in

Succorum depuratorum

Abfinthii,

Apii,

Fœniculi ana unciis tribus,

Cichorei,

Fumarizæ,

Pimpinellæ ana unciis octo,

Rosarum,

Citri ana unciis viginti.

Stent in digestionem, ut clarum a spisso separatur, & fæces subsideant, solutionem claram separa, & lento igne evapora ad mellis consistentiam; adde

Extracti Rhabarbari drachmas sex,

Croci drachmam semis,

Myrrhæ unciam semis,

Gummi Ammoniaci, in aceti scillitici quatuor unciis soluti, unciam unam semis.

Redigantur in extractum, mollioris consistentiæ, cui adde

Mari veri optime triti unciam semis,

Costi corticofi drachmas sex.

Exacte mixta servantur.

Nunquam solum, vel sine additione activorum purgantium præscribitur. Inservit potius pro basi pilularum cephalicarum: Aloë enim, per solutionem in succis corrigitur, atque, additione Mari veri & Costi, aromatizatur, hinc pilulæ laxantes inde compositæ nunquam, vel rarissime, tormenta excitant.

Dosis est grana duodecim ad viginti & ultra.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

REC. Limaturæ Martis non rubiginosæ, sive ferri, purissimæ libram unam, superfunde

Succi pomorum acidorum recens expressi & depurati libras quatuor. Stent in digestionem loco calido, in cacabo ferreo, per plures dies. Postea coquantur, spatula perpetuo agitata, lento igne, ad dimidiæ partis consumptionem; clarum a spisso colando separetur; & ad extracti consistentiam inspissatum reponatur.

Tonicum excellens est, atque hypochondriacis, cachecticis, ac ubi suspicio vermium est, convenit.

Datur in forma pilulari, cum aliis, a granis quindecim ad viginti.

EXTRACTUM MYRRHÆ AQUOSUM.

REC. Myrrhæ rubræ, electæ, pulverisatæ libram dimidiam.

Irrora

Liquoris nitri fixi uncia una, & spatula lignea probe misce. Repone in cellam per dies quatuordecim. Tandem affunde aquam fervidam, agita massam; dein quæta relinquatur, donec crassius sedimentum deposuerit. Clarum decantetur. Residuo aquam fervidam denuo affunde, donec tingi desinat. Tandem aqua omnis myrrha imprægnata moderato calore ad debitam consistentiam evaporetur.

Extractum hoc resinoso - gummosum nobile est balsamicum, uterinum, pectorale, vulnerarium.

Dosis grana quinque, decem.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

Folia Nicotianæ integra exsiccata, per noctem, in aqua fontana (scilicet libra una Nicotianæ in sex libris aquæ) macerentur; mane infundantur cribro, ut aqua effluat; folia ita macerata atque aqua abluta in libris decem aquæ fontanæ, magna ebullitione, ad dimidiæ partis consumptionem, coquantur. De-

coctum, albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad consistentiam extracti inspissetur.

Maceratio & ablutio Nicotianæ instituitur, ut particulæ salinæ acres maxime in hac prima maceratione extrahantur; Ebullitio fortis & coctio longa, cum copiosa aqua, eandem ob rationem præscribitur, ut volatiles & vomitum creantes particulæ cum vapore evolent.

Commendatur hoc extractum, secundum hanc formulam paratum, in tussi pectorali & phthifica diuturna mitiganda & cohibenda, quod etiam præstare solet, si ejus grana tria, vel quatuor, in aqua quadam vinosâ soluta, mane in lecto propinentur; & si forte nauseam vomibundam excitaret, mox, post vini calidi aromatizati, & parum saccharati, haustum, cessabit; in febribus etiam diuturnis, tertianis & quartanis, nec non ictero & hydropo magni effectus est.

Ad grana quinque vel sex exhibitum, per secessum & superiora nonnunquam purgat.

EXTRACTUM OPII.

REC. Opii Thebaici optimi uncias quatuor,

in frustula minutim scissum in cucurbita vitrea,

Aquæ communis, succi Citri libram femis acidulatæ, libris quatuor solve;

Solutum deple, & per emporeticam filtra, ac calore moderato balnei; ad extracti consistentiam inspissa.

Vires Opii depurati narcoticas aliasque notorias possidet.

In dosi, apud adultos, ultra duo, vel tria grana vix ascendere solemus.

EXTRACTUM OPII, seu OPIUM CYDONIATUM PER FERMENTATIONEM.

REC. Opii purissimi libram unam; successive solve in

Succi Cydoniorum &

Aquæ fontanæ frigidæ ana libris quinque.

Stent

EXTRACTUM.

Stent in loco temperato, semper impuritates liquori supernatantes auferendo, per aliquot dies; postea liquor per linteum coletur, ut a spisso & fordibus resinosis liberetur. Colaturæ, adde

Sacchari albi uncias quatuor;

Reponantur in vase satis capaci, leviter, saltem operculo tecto, ad fermentationem, in locum temperate calidum, per multos menses; sed cave, ne hoc fiat in conclavi clauso.

Durante fermentatione moveatur sæpius liquor baculo ligneo, & denuo reponatur, usque dum ne minimum quid de fermentatione, aut motu intestino liquoris, percipiatur; deinde per pannum colatur liquor, ad extracti consistentiam inspissandus.

Opium fermentatione non solum corrigitur, sed etiam in sua virtute exaltatur; pariori igitur dosi præscribendum est, licet saccharum & succus Cydoniorum dimidiam fere partem extracti constituent, ultra granum non offerri adulto debet, in teneris subjectis decima vel duodecima, imo vigesima pars grani sufficit.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

REC. Scammonii Aleppensis unciam unam,
Rhabbarbari veri,
Seminis Ebuli ana drachmas sex,
Agarici albi drachmas septem,
Turbith. resinosi,
Hermodactylorum ana drachmas quinque,
Hellebori nigri unciam semis,
Foliorum Sennæ electorum uncias duas,
Colocynthidis drachmas decem.

Rhabbarbarum, Hermodactyli, Helleborus, & folia Sennæ minutim incisa infundantur in

Aquæ fontanæ bullientis libris duabus,

Macerentur per viginti quatuor horas, atque, post unicam ebullitionem, exprimantur, in expresso dissolvantur

Aloës Succotrinæ unciae tres, atque seorsum servantur.

Pars II.

EXTRACTUM.

85

Reliqua vero, Scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & Colocynthis per repetitam affusionem spiritus Vini rectificati s. q. extrahantur, extractiones, per chartam emporeticam filtratæ, cum solutione Aloës colata misceantur, atque spiritus in balneo abstrahatur, residuum vero, leni igne, ad extracti consistentiam redigatur.

Purgans creditur esse universale, quod quidem valde compositum est, sed dudum frequenti usu cognitum & ad omnes vitiatos humores e corpore educendos celebratur.

Dosis grana decem ad quindecim.

EXTRACTUM PHLEGMAGOGUM QUERCETANI.

REC. Agarici trochiscati uncias quatuor,
Hermodactylorum,
Turbith,
Foliorum Sennæ,
Seminis Carthami ana uncias tres,
Radice Esulæ unciam unam,
Colocynthidis unciam semis,
Macis,
Salis gemmæ ana drachmam unam semis.

Præparetur ad normam *Extracti panchymagogi*; Hermodactylos, Folia Sennæ & Esulam, aqua fontana, Sale gemmæ acuata, reliqua vero spiritu vini rectificato extrahendo, & in extracti consistentiam, leni calore, redigendo.

Serum educit, & additis fortioribus purgantibus, præscribitur hydropicis.

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

EXTRACTUM RHABARBARI SIMPLEX.

Seligitur optimæ notæ Rhabbarbarum, & aqua simplici, ad modum aliorum, sit extractum.

Pro basi pilularum, ubi aloëtica locum non inveniunt, adhiberi solet.

Dosis scrupulus semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM SATURNI.

Vide CERATUM SATURNI.

Y

EX-

EXTRACTUM FOLIORUM SENNAE.

REC. Foliorum Sennae mundatorum libram semis;

Macera viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris tribus,
loco calido.

Extractum tinctum exprime, ac dein, lenissimo igne, & ebullitione vix conspicua, evapora; alias enim fere omnem perdit vim alvum laxandi.

Inservit pro basi pilularum laxantium, ubi Aloë uti non licet.

Dosis grana duodecim ad scrupulum.

EXTRACTUM STRAMONII.

Paratur ex succo eodem modo, quo Cicutæ Extractum.

Tentavit vires medicamenti Stœrckius in dementia, mania, morbis convulsivis, effectu nonnullo, attamen nondum satis comprobato.

Dosis a grano semis ad integrum bis terve de die.

FÆCULA ARI RADICUM.

REC. Radicum Ari succulentarum, a fordibus
& externa pellicula liberatarum,
libras duas.

Minutim incisæ, & addita
Aquæ fontanæ libra una,

in mortario marmoreo probe contusæ, immittantur sacco cannabino, & sub prelo fortissime exprimantur. Succus expressus in vase vitreo, vel fictili vitreato, in loco frigido reponatur, ut pulvis albißimus subsideat, a quo liquor supernatans per inclinationem separetur, fæcula vero remanens in umbra exsicceetur.

Ujus fæcularum obsoletus est: Zwelferus putat, fæculas plane e foro medico esse excludendas, & si quis præcise hujus generis medicamentum requirat, simplicem radicum mitiorum pulverem efficaciorum esse; acriorum vero fæculas facile admitti posse.

Modum præparandi adposuimus, ut, si forsan expetantur, etiam reliquæ fæculæ BRYONIAE,

POEONIAE, &c. secundum hanc præscriptionem, parari possint.

FLORES BENZOES.

REC. Benzoës, quantum lubet; pulverisata immittatur cucurbitæ humili officio ampliori; superimponatur, loco alembici, charta convoluta ad pyramidis vel coni, formam, in superiore parte perforata; adhibeatur ignis arenæ lenissimus, sic sublimabuntur flores albi nivei, penetrantissimi saporis & odoris; singulis horis vel dimidiis, alembicus, seu pyramis chartacea mutetur, & flores sublimati colligantur, atque vitro inclusi servantur. Ex libra una Benzoës, non plus, quam uncia una & dimidia, vel duæ florum sublimantur. Signum sublimationis absolutæ est, si chartaceus alembicus oleo imbutus apparet.

NB. Alia facilior magnamque florum sub vulgari præparatione contingentem jacturam magis evitans hæc est.

REC. Benzoën pulverisatam libram unam, coque in sufficiente quantitate aquæ fontanæ unâ cum cinerum Clavellatorum depuratorum libris tribus. Liquorem decanta & residuum denuo aqua sine novo additamento alcalino excoque. Utrumque decoctum misce & inspissa ad remanentiam mensuræ unius, eique sic inspissato instilla bene dilutum spiritum Vitrioli; præcipitabitur materies subflava quasi caseosa flores Benzoës continens, quæ post plenariam factam præcipitationem una cum liquore supernatante filtro papyraceo infunditur. Materies in filtro remanens aliquoties aqua abluitur. Vasi vitreo immittitur, adfunditur denuo aquæ fontanæ mensura, quæ ad ebullitionem perducitur, & tunc denuo adhuc fervens per filtrum laneum transmittitur. Nascuntur post refrigerium pulchri argentei flores. Singuli liquores post transcolationem collecti ad lucrandos in iis restantes flores porro inspissantur, & similem in modum tractantur; acquiruntur sic ex libra una bonæ Benzoës plerumque sedecim drachmæ

FLORES.

mæ Salis benzoici crySTALLISATI, atque residuum massæ excoctæ adhucdum ad candelas fumales adhiberi potest.

Laudantur ad asthma, & omnes pulmonum affectus; coagulum lymphæ mucido-serosæ solvunt, & sudores movent.

Dantur grana duo ad quatuor, ex ovo sorbili.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES, five HÆMATISATI.

REC. Limaturæ Martis, vel Lapidis Hæmatitæ, subtilissime triti, uncias quatuor,

Salis Armoniaci purissimi libram semis.

In pulverem redacta & optime mixta, ac aliquandiu loco frigido reposita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenæ, gradatim aucto; primo destillabit liquor salinus penetrantissimus, tandem, fatis intenso, sublimantur in collum retortæ flores, qui, præter alios usus, ad essentiam martialem parandam adhibentur.

Residuum in fundo retortæ, per deliquium in cella solvitur in liquorem acerrimum, badium, qui *Olei Martis* nomine venit, estque usu externo adstringens insigne, & ischæmum.

Incidendi & dissolvendi, tonicam ac anodynam habent virtutem. Laudantur specificè ad Rhachitidem, in febris, dolore capitis, suppressione mensium, lumbricis, & ad tonum ventriculi restituendum, nec non appetitum excitandum.

A nonnullis in medicamentorum infidorum classem referuntur, quæ sulphure vaporoso cum sale volatili subacri explicito spirituum animalium facultates & sensationes hebetant, & somnum inducunt, si largius sumantur; caute igitur in præscribendis illis, ob vim tam adstringentem, quam ob narcoticam, versandum esse censent.

In dosi, pro tenera ætate, haud ultra granum dimidium, aut integrum; in adultioribus ad grana quinque, octo, vel decem ascendere omnino licet.

NB. Est hæc consueta fere in omnibus pharmacopœis recepta Flores Salis Ar-

FLORES.

87

moniaci præparandi methodus, verum methodo a Wieglesio proposita flores copiosiores bene colorati acquiruntur, quam ideo adponimus.

REC. Lapidis hæmatitæ subtilissime triti uncias duas,

adfunde bene miscendo

Spiritus Salis uncias duas,

Superadde & bene invicem misce

Salis Armoniaci depurati & pulverisati libram unam.

Fiat fortiore igne sublimatio, quæ vel in retorta, vel & in cucurbita epistomio papyraceo munienda peragi potest.

Loco lapidis hæmatitæ potest quoque Crocus ex Vitriolo martis opere cinerum clavellatorum præcipitatus, bene edulcoratus & siccatus substitui, cujus uncia dimidia pro integra Salis Armoniaci libra sufficit. Simplicissima methodus est, si uncia una Salis Armoniaci cum drachma dimidia limaturæ martis sublimationi subjicitur, qua florum bonorum bene coloratum drachmæ septem plerumque acquiruntur.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

Vid. infr. Sal. Armon. Depuratum.

FLORES SULPHURIS.

REC. Sulphuris communis, in frusta diffracti, quantum lubet.

Injice in cucurbitam terream, vitreatam, & imposito alembico amplo, vitreo, ex arena sublima igne non nimium intenso, ne flores sublimati fluant, qui, mutatis sæpe alembicis sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

Ad pectoris morbos, scabiem retropulsam, ulcera fætida, interne assumti valent.

Dosis a granis duodecim ad scrupulum unum.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

REC. Florum Sulphuris simplicium uncias duas,

Y 2

Aloës

Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci scrupulum unum.

Subtilissime trita misceantur.

Loco digestivi purgantibus, præsertim salinis, præmitti possunt; adscribitur etiam vis alexipharmaca.

Dosis scrupulus unus.

FLORES ZINCI.

REC. Zinci in frustula redacti, quantum lubet.

Injice in crucibulum, quod oblique positum esse debet, operculo probe tegatur, & in furno fusorio tam diu carbonibus circumdetur, usque dum Zincum fusum fuerit. Si tunc operculum de crucibulo elevatur, accessu aëris Zincum cum fumo inflammatur, qui fumus ad latera crucibuli adhæret instar levium & alborum flocculorum: hi flocculi & cuticula in superficie fusi Zinci expansa ope cochlearis ferrei recipiuntur, atque labor crucibulum operculo tegendi, & intra quinque vel sex minuta iterum elevandi, tam diu continuatur, usque dum flocculi non amplius apparent, & omne Zincum hac ratione calcinatum est.

Curandum est, ut particulæ Zinci integri i. e. non sub operatione calcinati floribus forsitan admixtæ sollicitè separentur.

In inflammationibus oculorum, lippitudine, si cum aqua rosarum pro collyrio adstringente miscentur, item in intertrigine conducunt. Interne quoque recentius in variis morbis convulsivis, epilepsia, maxime infantum a saburra acida oriunda, a grano uno usque ad decem laudati, quin pro arcano, teste Gaubio, venditi fuerunt. Zincum ex India orientali allatum merito nonnulli præferunt; albidiores saltim flores dat.

GELATINA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rasuræ cornu Cervi purissimæ uncias sex.

Lavetur aqua tepida aliquoties, coquatur in

Aquæ fontanæ libris sex, ut restet libra una, sæpius coletur, ut cla-

GEL. GLOB.

rificetur gelatina, cui, adhuc calenti; adde

Syrupi ex toto Citro unciam unam.

Reponantur in locum frigidum.

Restaurat & humectat, in febribus malignis, ut & colligativis, tabe &c. præscribitur.

GELATINA RIBIUM.

REC. Baccarum Ribium maturarum rubrarum libras quindecim,
Sacchari confusi libras duodecim.

Mixta coquantur in patina plana, leni igne, sæpius invicem agitando, donec quarta circiter humiditatis pars evaporetur, & succus in frigore consistentiam gelatinæ acquirat; fervidus coletur per linteum, & refrigeratus servetur vase conveniente.

Gratum est analepticum, temperans, fauces humectans; in febribus acutis, siti & æstu conducens.

GILLA THEOPHRASTI, sive SAL VOMITORIUM VITRIOLI.

REC. Vitrioli albi uncias sex,
solvantur in

Aquæ fontanæ calentis libra una semis.
Solutio per chartam bibulam filtretur, atque rursus, leni igne, ad ficcitatem evaporetur & fervetur.

Utpurimum saltem vomitus excitat, rarissime per inferiora purgat. Ob magnam dosin nauseosum est remedium; datur enim a scrupulo dimidio ad drachmam in aqua calida. A nonnullis usus hujus Gillæ summe dissuadetur; sunt vero etiam, qui in apoplexia serosa, catarrho suffocativo, febribus, in peste, & ubi suspicio philti est, magnopere commendant.

GLOBULI CARMINATIVI.

REC. Saponis Veneti uncias duas,
Fellis Tauri,
Seminis Cymini,
Sacchari albi ana unciam unam,
Nitri crudi unciam semis.

Fiant globuli diversæ magnitudinis.

Ad alvum aperiendam & flatus educendos, tamquam suppositoria adhibentur.

GLOBULI.

GLOBULI BEZOARDICI.

REC. Extremitatum pedum Cancrorum mariorum uncias quatuor,
Lapidum Cancrorum fluviatiliū,
Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum ana unciam unam,
Succini albi præparati,
Radicum Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ, ana drachmas sex,
Bezoar Orientalis drachmas tres,
Ossium e cordibus cervorum scrupulos quatuor,
Crocii optimi scrupulos duos,
Trochiscorum de viperis unciam unam.

Fiat pulvis, qui cum gelatina cornu cervi misceatur; unde formentur globuli, drachmam unam vel duas pendentes, post siccationem deaurandi.

Vires cardiacæ, alexiteriæ, & sudoriferæ credebantur; commendabantur in variolis & morbilis, febribusque malignis omnibus sine ratione sufficiente, quæ certe varia ingredientia non pro efficacibus habere potest.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

GLOBULI MARTIALES, (Gallis *BOULES D'ACIER* dicti.)

REC. Limaturæ Martis in alcohol tritæ libram semis,

Tartari albi pulverisati libram unam,

Misce, inde cucurbitæ, vel alii vasi vitreo, affunde

Spiritus Vini libram semis vel uncias octo;

Massam vel folis, vel fornacis, vel balnei calori expone, ut digeratur & leniter exsicceatur. Cui deinde denuo tritæ

Spiritus Vini eandem quantitatem affunde;

Digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

Usus horum globulorum inprimis est externus ad vulnera, Hæmorrhagias, luxationes,

Pars II.

GUM. GUT.

89

Jugillationes &c. Dissolvuntur in aqua & spiritu Vini, usque dum liquor bene saturatus sit, quo tum imbuuntur linteamina & applicantur.

GLOBULI MOSCHATI ALBI.

REC. Sacchari Canariensis uncias duodecim,
Amyli albi unciam semis,
Radicis Ireos Florentinæ drachmas duas,
Moschi optimi grana quatuor;
Zibethi granum unum.

Cum Mucilagine gummi Tragacanthæ fiant globuli, diversæ magnitudinis.

Nonnulli Massam laccæ pictoriæ uncia dimidia tingere solent, atque

GLOBULOS MOSCHATOS RUBROS

exinde conficiunt.

Usus in suppositoriis notissimus, sed nunc fere obsoletus est.

GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

REC. Gummi guttæ in pulverem triti uncias tres.

Solvantur in aceti vini albi unciis novem, post sufficientem digestionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, atque leni calore in vase vitreo, ad extracti consistentiam, acetum evaporatur.

Per hanc præparationem acrimoniam & vim emeticam, Gummi guttæ perdere, atque in securum purgans abire perhibent.

Hydropicis ad scrupulum dimidium exhibetur; serum enim potenter educit.

GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

REC. Spiritus volatilis Serici crudi, ab oleo empyrevmatico liberati, uncias quatuor,

Olei destillati Lavendulæ, in spiritus Vini rectificati uncia una soluti, drachmam unam.

Misceantur & digerantur, postea ex retorta destillantur.

Effectus e nomine patet; non solum vero sunt cephalicæ, sed & uterinæ & nervinæ. Sine detrimento loco Spiritus volatilis Serici, qui in officinis

officinis non proflare solet, Spiritus Salis Ammoniacus substitui potest, si forte hæ guttæ desiderantur.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

HEPAR ANTIMONII, vid. CROCUS METALLORUM.

HEPAR CANIS RABIDI PRÆPARATUM.

Vino ablutum in clibano exsiccatur.

Ad Hydrophobiam a nonnullis olim commendari solebat, ab agyrtis forsitan hinc inde adhuc dum fraudulenter divenditur, ut ideo medici in falso celebratum arcanum inquisitio legalis requiri possit. Absit ut nostris temporibus ab ullo medico usurpetur! Nullo alio scopo præscriptionem absurdi medicamenti reliquimus, nisi ut intelligatur, qua ratione olim tam hoc hepar, quam hepar Anguillæ in retentione secundinarum, & hepar Lupi in morbis hepatis, mirabile dictu, laudatum, fuerit præparatum; expunximus merito præparationem hepatis anguillæ & lupi, cum unicum specimen sufficiat.

Dosis drachma dimidia ad integram.

HEPAR SULPHURIS.

REC. Florum, vel Sulphuris purissimi flavi, uncias quatuor.

Fluant in vase figulino vitreato, & successive admisceantur

Salis Tartari siccissimi unciae duæ, optime spatula agita; & ab igne remota, ferva.

Inservit tinduræ & syrupo, nec non lacti Sulphuris parandis.

HYDROMEL SIMPLEX.

REC. Mellis despumati uncias duas, Aquæ fontanæ libras duas.

Coquantur & despumentur simul ad libræ unius semis remanentiam, colentur.

Ad diversas in Dispensatorio obvias compositiones requiritur.

INFUSUM LAXATIVUM MANNAGETTÆ.

REC. Foliorum Sennæ electorum drachmas tres,

Cremoris Tartari drachmam unam; Passularum minorum drachmas tres, Zinziberis albi scrupulum unum.

Infunde in

Aquæ Fontanæ ferventis uncias quatuor;

Post digestionem per viginti quatuor horas, exprime, in colatura dissolve

Mannæ Calabrinæ unciam unam, albumine ovi clarifica.

Datur pro una dosi, eo effectû, quem inscriptio docet. Non præparatur, nisi quando desideratur.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

REC. Foliorum Sennæ electorum uncias tres,

Passularum minorum unciam unam semis,

Radicum Polypodii querni drachmas tres,

Seminis Coriandri drachmas duas, Cremoris Tartari unciam semis.

Misceantur & infundantur in

Aquæ fontanæ bullientis libris duabus semis,

post digestionem per aliquot horas exprimentur, in expressio dissolvantur

Mannæ electæ unciae octo, clarificentur & ferventur.

Alvum leniter laxat, & ab uncis duabus, ad tres præscribitur.

Præstat vero recens paratum, quam asservatum diu, facile acescens.

JULAPIUM E CAMPHORA ACETOSUM.

REC. Camphoræ drachmam unam, additis aliquot guttis spiritus Vini probe tritam.

Misce exacte cum Gummi arabici drachmis duabus, antea cum aquæ drachmis duabus in mucilaginem soluti.

Sub perpetua agitatione adde successive aceti Vini, in quo sacchari finissimi uncia semis antea soluta est, uncias sedecim.

Quibus

JULAP. KERMES.

*Quibus volupe est, camphorâ in febris ma-
lignis uti, habent hic methodum, illam cum
menstruo temperante combinandi.*

JULAPIUM ROSATUM

five

JULEPUS ROSARUM.

REC. Sacchari albiſſimi libras duas & se-
mis;

ſolve in

Aquæ Roſarum unciis viginti.

Post unicam ebullitionem cola per pannum,
& ſerva.

*Utimur hoc & aliis julapiis ad edulcorandas
emulſiones, & plerumque ſcrupuli duo vel
tres adduntur uncia aquæ, vel emulſionis.*

JULAPIUM SAMBUCINUM.

Paratur eodem modo, quo julapium ro-
ſatum.

JULAPIUM VIOLARUM.

Ex aqua Violarum optima & Saccharo,
uti præcedens, conficitur.

KERMES MINERALE, SULPHUR ANTIMONII RUBRUM, five PULVIS CARTHUSIANORUM.

REC. Nitri fixi libras duas ſemis,

ſolve in

Aquæ fontanæ libris quindecim,
ſolutionem filtra & ſeorſim ſerva.

REC. Antimonii crudi Hungarici, ſubtili-
ter pulveriſati, libras tres.

Superaffunde

Liquoris alcalini, modo præſcripti,
libras ſeptem.

Coque in figulino vaſe, igne per unam vel
alteram horam leniter continuato, poſt-
ea liquorem effunde & filtra;

Eidem Antimonio liquoris iterum affunde
libras quinque, & ut antea coque; li-
quorem effunde & adhuc ferventem
filtra.

Tandem reliquam liquoris portionem An-
timonio affunde, coque & filtra, uti
dictum.

KERMES.

91

Liquor, per filtrum ita colatus, requieſcat
per viginti quatuor vel plures horas, ſic
pulvis rubicundus fundum petet, qui
poſtea, affuſa aqua calida, ſæpius edul-
coretur; & uſui aſſervetur. Nonnulli
ſpiritum Vini rectificatum ſuper incen-
dunt, id quod certe nullius uſus eſt.

Notandum autem eſt, quod Kermes mine-
rale præſcripto modo, quo Nitrum fixum
in anatica fere portione cum Antimonio
ſumitur, præparatum, ob multas Regu-
li partes unitas, valde adhuc ſit emeti-
cum. Siquidem Antimonium cum ma-
gna ſalis alcalini quantitate, aqua ſolu-
ti, coctum, quoad regulinam quocque
partem ita reſolvi poteſt, ut tandem fe-
re totum per filtrum tranſeat. Ad ob-
tinendum autem Kermes minerale mi-
tius, præfertur merito a recentioribus
illa methodus, qua Antimonii in tenuem
pulverem comminuti libra una cum ſub-
quadrupla ſaltem portione ſalis alcalini
fixi, in aquæ libris tribus ſoluti, per
horam coquitur (eandem ſemper aquæ
quantitatem ſervando). Poſtea Lixi-
vium hoc Hepatis Antimonii fervidum
filtratur, in locum frigidum ponitur, ut
pulvis ruber ſponte fundum petat, ſub-
decuplam circiter Antimonii aſſumpti pon-
dus æquans, aqua edulcorandus. Li-
quor ſuperſtans Antimonio reſiduo reaf-
funditur, addita per evaporationem amiſ-
ſa aquæ portione, denuo coquitur, ſic-
que labor aliquoties dicto modo iteratur,
quo ſucceſſive ſponte ſubſidens Kermes
ſufficiente quantitate acquiritur, ſuper
filtrum, adfuſa aqua pura abluendum,
poſtea ab humiditate liberandum & ſic-
candum. Ex liquore ſuperſtante poteſt
ope acidi ſulphur Antimonii præcipitari.

*Convenit revera Kermes minerale cum Sulphu-
re antimonii aurato & adhibetur quoque in
iisdem morbis, ſed doſi paullulum magis
reſracta.*

LAC SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini puriſſimi pulveriſa-
ti libram unam,

Lixivii cauſtici libras tres.

Z 2

Coque

Coque in lebetes ferreo sub perpetua agitatione donec solutio facta est, filtra per linteum, repone in quiete, a sedimento liquorem decanta, ope acidi cujuscunque, (excepto acido vitrioli, quippe quod cum calce in lixivio caustico contenta selenitem non amplius solubilem; & cum sulphure in filtro remanentem facit,) præcipita & omnem pulverem successive præcipitatum super filtrum expande, aqua calida aliquoties ablue, tandemque sicca.

Acquiritur sic ope lixivii caustici, quod cum calce viva paratur, omnino satis magna quantitas Lactis Sulphuris; potest autem hoc idem, si forsitan calx viva non ad manus sit, parari, si ex duabus partibus Cinerum clavellatorum, & una parte Sulphuris hepar paratur, idque sufficiente quantitate aquæ ferventis solvitur, & postea ope acidi cujuscunque præcipitatur.

Vix a floribus sulphuris quoad virtutem differt. Exhibetur in nonnullis morbis pectoris, in molestis hæmorrhoidalibus, alvum leniter subducit, flatusque pellit.

LAC VIRGINIS.

REC. Lithargyrii subtilissime triti libram semis;

Coque in
Aceti Vini destillati libra una semis,
ad consumptionem tertiæ acetis partis, tunc filtra. Colaturæ affunde

Aluminis crudi, in aquæ communis libris duabus soluti, uncias quatuor;

& albescet liquor, qui Lac Virginis vulgo dicitur.

Pro cosmetico habetur, quod tenerioribus, a solis calore quasi ambustis, promte succurrit, si faciem eo illinant. Etiam lentiginis & serpigines delet. Quotidianum aut frequentem usum autem minime suademus.

Lac Virginis vulgo quoque vocatur aqua quæcunque cosmetica, in cujus unciam unam instillantur guttæ circiter decem Tincturæ Benzoës.

LAPIS.

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

REC. Lapidis Calaminaris libram unam,
Candefiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in Aqua Plantaginis vel Rosarum extingatur; postea siccatus in subtilissimum pollinem teratur, atque super marmore lævigetur.

Usus est externus in collyriis, unguentis & emplastris; siccatur & adstringit.

LAPIS CAUSTICUS CHIRURGICORUM.

Vide CAUTERIUM POTENTIALE.

LAPIS DIVINUS, five OPTHALMICUS.

REC. Vitrioli de Cypro,
Nitri purissimi,
Aluminis crudi ana uncias tres.

Optime contusa & pulverisata liquefiant in vitreo vase, calore arenæ, quibus liquefactis adde

Camphoræ tritæ drachmam unam semis.

Mixta & refrigerata massa servetur.

Adhibetur in collyriis, ad oculorum affectus.

LAPIS DE GOA.

REC. Coralliorum alborum,
rubrorum,

Bezoar Orientalis ana unciam unam,

Margaritarum Orientalium,

Lapidis Hyacinthi præparati,

Topasii,

Sapphiri,

Rubini ana unciam semis,

Smaragdi,

Moschi Orientalis,

Ambraë griseæ ana drachmas duas,

Foliorum Auri Nro. quadraginta.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui mucilage Tragacanthæ, vel gelatina cornu cervi in pastam redigatur, ex qua formentur globuli ovali forma, qui, post siccationem in umbra, vel concha, vel dente lupino, ut eleganter niteant, poliantur.

Rari

Rari vel nullius usus est apud nos medicamentum hoc pretiosum; apponere tamen illud, curiositatis gratia, ex Pharmacopœa Bateana volumus; vocatur alias Pedra cordial & Bezoar de Goa, unde apportatur, & a Patribus Soc. Jes. CASPARO ANTONIO & NICOLAO MOMTIO componebatur, atque pro arcano habebatur. Vires bezoardicæ, antispasmodicæ & antepilepticæ potius Moscho, Ambræ & Bezoar adscribendæ sunt, quam lapidibus pretiosis. Unde præferendi his globulis merito globuli illi bezoardici, quorum descriptionem suo loco exhibuimus. Dosis est a scrupulo semis, ad scrupulum unum vel drachmam semis.

LAPIS INFERNALIS.

REC. Argenti purissimi uncias duas;
solvantur in

Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis unciis sex.

Evaporetur solutio ad quartæ partis consumptionem, atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli colligantur, liquor denuo evaporetur, & labor repetatur, donec omnis liquor in crystallos vel sale abierit. Has crystallos crucibulo fatis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde subsidebit, tandem ignis gradu aucto olei instar fluet, quam effunde in modiolum, seu canalem ferreum cylindricum, prius calefactum & sevo illitum. Massa nigra & compacta esse debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit, in vitro probe clauso servanda.

Inservit loco cauterii potentialis, ad absumendas carnosas excrescentias.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

REC. Vitrioli albi uncias quatuor,
Salis Armoniaci unciam semis,
Cerussæ,
Boli Armenæ ana unciam unam,
Aceti Vini libram unam.

Coquantur in vase figulino ad siccitatem.

Commendatur ad ulcera omnis generis inveterata, scabiem, tineam, gangrænam, fistulas. Desiccat, mundat, & partes re-

Pars II.

laxatas roborat. Modus utendi est, ut uncia una in aquæ pluvie libra solvatur; solutione filtrata laventur partes, atque linthea illa imbuta imponantur, vel ipse liquor, syringæ ope, injiciatur.

LAPIS PRUNELLÆ,

sive

NITRUM TABULATUM.

REC. Nitri crudi libram unam semis;

fundatur in crucibulo, dum fluit, injiciatur sensim

Sulphuris citrini uncia semis.

Parum una vice inspergendo & expectando, donec deflagarit; hoc facto in rotulas parvas effundatur.

Propter hanc cum sulphure deflagrationem, multum ad arcani duplicati naturam accedit, ingratius etiam & minus refrigerans, quam Nitrum crudum deprehenditur. Magis album evadit, si loco sulphuris sal Ammoniacum adhibetur.

Admiscetur pulveribus temperantibus, & gargarismatibus.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

LAUDANUM DIURETICUM,

sive

URINARIUM, MICHAELIS.

REC. Succu Liquiritiæ inspissati unciam unam semis,

Extracti Opii, aqua fontana parati,
drachmas duas,

Trochiscorum Alkekengi,

Terebinthinæ Venetæ, ana unciam semis,

Camphoræ drachmam unam,

Croci scrupulos quatuor,

Tragacanthæ,

Mastichis ana drachmam semis.

Misce; fiat Massa.

Laudatur in stranguria, colica nephritica & difficultate urinæ. Grana XIII. granum unum opii continent.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

LAUDANUM HYSTERICUM.

REC. Extracti Opii unciam dimidiam,

A a

Extracti

LAUDANUM.

Extracti Castorei drachmam,
Crocī scrupulum,
Olei destillati Macis,
Menthæ,
Rutæ ana guttas sex.

Misce, fiat massa pilularis.

*In colica hysterica, ubi opiata locum inveniunt,
ad spasticos dolores mitigandos datur.*

Dosis granum unum ad duo.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDEN-
HAMII.

REC. Opii optimi uncias duas,
Crocī Austriaci unciam unam,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana
drachmam unam.

Omnia in pulverem trita infundantur in
Vini Hispanici libra una.

Digerantur per aliquot dies, colentur &
serventur.

*Præfert celeberrimus Auctor liquidum hoc
Laudanum solido, ob formam commodio-
rem, & maiorem dosis certitudinem, cum
scilicet vino, aquæ destillatæ, aut alii li-
quori cuicunque instillari possit.*

*Viribus cum aliis tincturis & essentiis Opii
sic dictis anodynīs convenit, & a guttis
sex, octo, ad quindecim dari potest.*

*Quælibet uncia habet Opii scrupulos quatuor,
& drachma una, grana decem; Croci vero
quælibet drachma continet grana quinque.*

LAUDANUM OPIATUM.

REC. Extracti Opii, aqua fontana succo
citri acidulata parati, uncias
duas,
Crocī,
Opobalsami veri ana drachmam fe-
mis.

Misce.

*Easdem, quas Extractum Opii, vires habet,
nisi, quod narcoticum Opii principium per
Opobalsamum aliquantum correctum cre-
datur.*

Dosis a grano dimidio ad tria.

LIMATURA.

LAUDANUM OPIATUM CYDO-
NIATUM.

Videatur EXTRACTUM OPII CYDO-
NIATUM.

LIMATURA MARTIS NON RUBIGI-
NOSA, five CHALYBIS PRÆ-
PARATIO.

Ferrum bonum integrum ope limæ in sco-
bem tenuiorem redigitur, quæ in mor-
tario ferreo in pollinem subtilissimum
contunditur, per linteum tenue trajici-
tur, & in vitro angustioris colli & epi-
stomio bene claudendi asservatur, sic
majore quidem cum labore, sed certius
limatura martis non rubiginosa pro usu
interno acquiritur, quam si a variis fa-
bris quævis scobs variis quisquiliis sæ-
pius inquinata adhibetur, & tunc vel
ope irrorationis cum aceto, (uti phar-
macopœa Edinburgensis suadet) vel &
cum aqua super porphyrite in pollinem
teritur, quippe sub qua præparatione,
præsertim per aliquot dies protracta,
ferrum rubiginem contrahit, adeoque
ab acido non amplius solvitur. Potest
tamen rubiginosa limatura iterum emen-
dari, si illi phlogiston denuo insinuat-
ur, dum in crucibulo intra prunas ardentes
posito, admixto phlogisto v. g. oleo oli-
varum, ad ignitionem bene deducitur,
& post refrigerium in pollinem teritur,
quippe qui pollen sic iterum a magnete
trahetur & ab acido solvetur. Si quis
Limaturam rubiginosam desideret, fa-
cile ex his ipsis præparationem intelli-
get vel & crocum martis eliget.

*Acidum in primis viis debellat, adstringit,
ad tonum viscerum roborandum facit, par-
tem sanguinis rubram auget. Datur igi-
tur ad ventriculi imbecillitatem, cachexi-
am & mensum vitia, non tamen sine cir-
cumspectione præscribenda est; præstat par-
vas doses, a granis quinque vel sex, præ-
cipue si continuandus est usus, exhibere,
quam largiores præbere. Signum felicitis
successus habetur, si feces alvi nigre se-
cedant.*

LIMA-

LIMATURA MARTIS SULPHURATA,
five
CHALYBS SULPHURE PRÆ-
PARATUS.

REC. Limaturæ Martis uncias quatuor,
Sulphuris Citrini uncias duodecim,
optime misceantur atque in patina terrea
sub perpetua agitatione leni igne calci-
nentur, usque dum chalybs per defla-
grationem sulphuris in pulverem ferru-
gineum calcinatus fuerit.

*Manifesto hac præparatione ferrum quoad
maximam partem suo phlogisto privatur,
& in crocum mutatur, qui vires adstrin-
gentes, roborantes, habet.*

Dosis grana quinque ad duodecim.

LINIMENTUM VOLATILE.

REC. Olei Olivarum unciam unam,
Spiritus Salis ammoniaci cum calce
viva parati five caustici drach-
mas duas,

vel quantum sufficit ad linimentum debi-
tæ consistentiæ.

*Penetrans resolvens est, quod præcipue ad tu-
mores mammarum resolvendos, & ad alias
diversas inflammationes discutiendas inser-
vit. Addunt alii adhuc camphoræ scru-
pulum unum.*

*Butyrum recens cum sale volatili Cornu Cer-
vi mixtum eosdem prosperos edit effectus,
& in angina inflammatoria D. Pringle si-
mile linimentum tenuius, ex partibus ana-
sticis olei Cornu Cervi & spiritus C. C. ex-
terne impense laudavit.*

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS,
ÆTHER, NAPHTHA VITRIOLI,
OLEUM VITRIOLI DULCE.

REC. Olei Vitrioli, per rectificationem ab
omni phlegmate liberati, libram
unam,

Spiritus Vini rectificatissimi, qui ne
vestigium aquæ continet, libras
sex.

Oleum Vitrioli instillatur successive, & per
vices, spiritui vini, quod cum strepitu,

non secus, ac si ferrum candens in aquam
frigidam injiceretur, fit, mixtura inca-
lescit, colorem acquirit rubrum, odo-
rem gratum, stent, vel digerantur, in
vitro probe clauso, per aliquot dies;
postea instituatur destillatio igne arenæ
lenissimo, e cucurbita satis alta; primo
prodit spiritus vini vix mutatus, sepa-
ratim, remoto excipulo, servandus,
quem sequitur fragrantior, eo usque le-
nissimo igne destillandus, donec phleg-
maticus, sulphuris odorem eructans
(cum tantilla quantitate olei) insequa-
tur, cujus mixtio cum priori fragrante
provide cavenda. Sistatur destillatio,
quando mixtura tandem in fundo cucur-
bitæ in offam nigram abire incipit, si
enim destillatio phlegmatis sulphurei igne
auctiori continuatur, facile fit, ut omnis
massa illa nigra subito & ex improvviso
alembicum transcendat.

Residuo in cucurbita affundatur

Spiritus Vini rectificatissimi nova
libra una semis,

addito simul spiritu, qui primum prodiit
vix mutatus, antea separatim servatus.
Facta post digestionem destillatione de-
nuo spiritus fragrans obtinetur cum prio-
ri miscendus, & vitro probe obturato
servandus.

Quodsi spiritum primum a secundo separa-
re non placuerit, sed confusi invicem
manferint, tum æque bonus obtinetur
liquor, si omne destillatum spirituosum
residuo oleo vitrioli reaffunditur, & le-
ni igne cohobatur.

*Liquor hic odore & sapore suo grato, nec
non virtute anodyna; antispasmodica se
commendat; atque sudoriferum, alexiphar-
macum & diureticum simul præbet medi-
camentum egregium.*

*Dosis guttæ triginta ad sexaginta. Diu ve-
ro, vel improvide asservatus, acidum vi-
triolicum sistit evolutum, & quasi reviviscens.*

Pro diversa ratione Olei vitrioli & alcoh-
olis diversa obtinentur producta: si enim
olei vitrioli & alcoholis, præcipue tar-
tarifati,

tarifati, partes æquales, singulorum unciae sex, recipiuntur, de alcohole non mutato nihil, de secundo spiritu fragrante unciae circiter duæ, & olei vitrioli dulcis largior quantitas obtinetur. Sunt, qui ad nobiliorem unionem spiritus vini cum oleo vitrioli, & majorem quantitatem olei vitrioli dulcis obtinendam, destillatum hoc reaffundunt, & iterum destillant, similemque laborem cum novo spiritu vini repetunt, optimo cum successu.

Si Alcoholis libris duabus Olei vitrioli fortissimi libra una admiscetur, spiritus, citra mutationem primum destillans, nonam in circa partem, liquor secundus ultra quintam, Oleum vitrioli dulce, fragrantissimum, pellucidum, secundo liquori supernatans, ab omni acido adhærente privatum, decimam octavam partem ponderis liquorum assumptorum æquare observatum est, remanente subtriplo olei vitrioli, quod erat receptum. Quoniam post suavissimum, secundum liquorem, igne continuato & auctiore liquor stillaret fortissimum sulphuris odorem eructans, spiritus vitrioli volatilis, ideo ille & ab hoc, & ab eo, qui primus destillavit, mutato subinde excipulo, provide separandus & asservandus est. Quamvis enim continuata destillatione cum spiritu vitrioli volatili, & phlegmate acido sulphureo oleum ulterius expelli possit, at gravius, magis tinctum, & fortissimo odore sulphureo inquinatum, hoc tamen (quemadmodum etiam liquor anodynus acido sulphureo inquinatus,) non nisi additione aquæ & salis alcali, & iterata destillatione depuratum pro oleo vitrioli dulci venditari potest.

Præstat obtento spiritu secundo ab ulteriori destillatione desistere, & sic facilem materiæ transcensum cavere.

Materies a destillatione reliqua, nigerri-
ma, tenax, sulphurea, in usum convertitur, dum colligitur & ad similes repetendas destillationes adhibetur. Docuit enim experientia, quod massæ hujus residuæ libræ circiter quatuor cum

Alcoholis mensuris duabus sub lenta destillatione liquorem bonum anodynum, quem naphtha subsequitur, præbeant, & quod eadem massa, (cui nonnulli novam aliquam portionem olei vitrioli addunt,) sæpius & diu ad eundem scopum inservire queat.

Patet ex indicatis fundamentum & encheiresis, acidum vitriolicum dulce sub varia forma & quantitate obtinendi.

Spiritus supra dictus secundus, ex anatica vel dupla portione Alcoholis, cum Oleo vitrioli mixti, obtentus, alcohole ipso levior, tardius cum aqua coiens, hinc super eam, si accendatur, ardens, vocari solet *Æther*. *Oleum* descriptum *Vitrioli dulce*, æthere adhuc levius, *Naphthæ* nomen accepit, cum aqua plane non miscetur, flammam, in viciniam vasis, quo continetur, collocatam, per vapores, quos emittit, arripit & quasi attrahit. Solutioni auri si admisceatur, concutiendo, ex aqua regis eripit metallum, quamvis in aggregato ponderosissimum, ut supernatet.

Æther, five *Naphtha*, cum portione resinæ sub destillatione remanentis, elotæ, digestionem coloratus, *Liquorem Manchini* constituit.

Vires Ætheris & Naphthæ sunt adhuc validiores quam Liquoris anodynii.

Frigoris sensum cuti, si instillantur, imprimunt. Summa volatilitate egregios, in moderando fluidi nervei motu, effectus præstant.

LIQUOR BELLOSTII,

vide AQUA GRISEA.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

REC. Spiritus Cornu Cervi, aliquoties, ut ab oleo empyrevmatico liberetur, rectificati, uncias sex.

Salis volatilis Succini unciam unam semis, vel quantum sufficit ad saturationis punctum.

Misceantur

Misceantur & digerantur, per aliquot dies, in vase probe clauso, postea per chartam emporeticam filtrata, ferventur.

*Virtutes ejus sunt diureticæ, diaphoreticæ, antispasmodicæ; adversus motus convulsivos epilepticos puerorum valet, & hysteri-
cis, hemicrania vexatis, convenit.*

Dosis pro pueris guttæ tres, quinque, octo; adultis a guttis viginti ad quadraginta.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS ALBUS.

REC. Salis volatilis Cornu Cervi & Succini, depuratorum, portionem anaticam, scil. ana unciam unam; vel quantum unius ad saturationem alterius sufficit. Solve in Aquæ Ceraforum nigrorum unciis octo; filtrata serva.

Colore albicat, odore est non adeo empyreumatico, viribus iisdem.

LIQUOR AD GANGRÆNAM.

REC. Aceti optimi,
Vini generosi ana libram unam,
Aquæ, libram unam semis,
Salis ammoniaci, uncias duas.

Misceantur.

Liquor hic parti gangrænosæ, incisæ, calide sæpius infusus vires fædæ putredini adversantes egregie exserit.

LIQUOR NITRI FIXI.

REC. Nitri depurati quantum libet.

In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & successive particula carbonum injiciatur, usque dum flammam amplius non concipiat; tunc massa in mortarium calefactum effundatur, atque in cella per deliquium soluta ac filtrata, usui servetur.

Viribus antacidis, diureticis, cum Oleo Tartari per deliquium convenit.

LIQUOR PROBATORIUS.

REC. Auripigmenti unciam unam,
Calcis vivæ recentis uncias duas.

Pars II.

Pulverisata coquantur cum Aquæ quantitate sufficiente, in vase figulino, dimidio quadrante horæ, ut uncix duæ liquidi, filtrandi, possint decantari.

Usus est ad detegendum mangonium vini lithargyrio, nefando & in mortalium perniciem cedente consilio dulcificati. Quemadmodum enim in vino sincero liquor iste probatorius, guttatim admixtus, sedimentum citrinum deponit, ita Lithargyrii, vel Sacchari Saturni admixtio proditur, si liquor iste, recens paratus, quamprimum vino instillatur, nigrescit, & nigrum sedimentum ponit.

LIQUOR SALINUS LAXATIVUS.

REC. Salis cathartici amari uncias tres,
Tartari solubilis tartarifati unciam unam,
vitriolati unciam semis.

Misce, solve in

Aquæ fontanæ unciis quindecim.

Filtra per chartam.

Aperit, urinam cit, laxat album.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

LIQUOR STYPTICUS WEBERI.

REC. Vitrioli Hungarici,
Aluminis crudi ana libram dimidiam,
Phlegmatis Vitrioli, vel, in ejus defectu, Aquæ Plantaginis libras quatuor.

Coquantur, donec vitriolum & alumen soluta sunt. Reponantur in locum frigidum, liquor frigefactus & a crystallis, subinde enatis, separatus filtretur, & singulæ libræ filtrati liquoris, addatur

Olei Vitrioli uncia una.

Misceantur & ferventur.

Externe ad vulnerum hæmorrhagiam compescendam adhibetur.

LIQUOR TARTARI, alias OLEUM TARTARI PER DELIQUIMUM.

REC. Salis Tartari, quantum placet.

Immittatur manicæ Hippocratis, reponatur per aliquot dies in cellam humidam,

Bb

LIQUOR.

midam, ut sal lique scat; decantetur liquor, & si opus fuerit, filtretur.

Usus internus rarus est, externe interdum ad cosmetica adhibetur; in chymicis frequentissime.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

REC. Tartari albi crudi puri,
Nitri crystallifati ana libram unam.

Detonentur, postquam exacte mixta fuerint, in crucibulo.

Massa salina in
Aquæ calidæ libris tribus
solvatur, coletur.

Lixivium hoc superfundatur
Tartari albi crudi pulverisati libræ uni.

Digerantur per octiduum, postea clarum a spisso per filtrum separetur & servetur.

Liquor est salinus; & cum tartaro solubili convenit, nonnihil tamen de Oleo tartari empyreumatico participat. Commendatur in morbis ex obstructione viscerum ortis.

Dosis drachma una ad duas usque.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ
TARTARI.

REC. Arcani, five terræ foliatæ Tartari
siccissimæ uncias duas;

superaffunde

Spiritus Vini optimi & rectificatissimi uncias octo.

Digerantur per aliquot dies, spiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus, per chartam filtratus, servetur.

Egregium est antihypochondriacum, antarthriticum, atque in febre quartana & omnibus morbis, ab obstructionibus ortis, feliciter adhibetur.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.

Si, loco Spiritus Vini, aquæ fontanæ adhibentur uncie sex, vel potius, si Terra foliata Tartari per se deliquescit, liquor inde emergens salinus, in iisdem affectibus a drachma una ad duas dari potest. Al-

vum promte laxat & urinam expedit.

LIQUOR.

LIQUOR VISCERALIS.

REC. Extracti Chamædryos,
Cichorii,
Trifolii fibrini,
Martis pomati ana drachmas tres,

Spiritus Nitri dulcificati,
Essentiæ corticum Aurantiorum ana uncias duas,

Aquæ corticum Citri uncias sex.

Digerantur mixta, per aliquot dies, & filtrata ferventur.

Commendatur in Cachexia, hypochondriaco malo & flatulentia.

Dosis drachma una ad drachmas duas, in vino.

LIQUOR VULNERARIUS MINERALIS,
five
BALSAMUM VULNERARIUM MINERALE
DIPPELII.

REC. Lapidis Hæmatitæ, in pulverem triti,
libram dimidiam,
Tartari crudi libram unam.

Mixtis affundantur

Aceti Vini destillati libræ tres;

Digerantur in loco calido, postea acetum per alembicum abstrahatur, bis vel ter cohobetur, atque ultima destillatione ad ficitatem evocetur. Residuo superaffundantur

Spiritus Vini rectificati uncie viginti:

Digerantur per octiduum. Clarum a spisso separetur & servetur.

Est Tinctura Martialis adstringens, & tam interne, quam externe, in nimis hæmorrhagiis & vulneribus, adhiberi potest.

Dosis interne guttæ quadraginta ad sexaginta.

LIQUOR VULNERARIUS BILGUERI,
seu potius THEDENII.

REC. Aceti boni,

Spiritus Vini ana libram unam semis,

Spiritus Vitrioli uncias quinque,
Sacchari albi libram semis.

Misce, digere per octo dies, leni calore, tandem filtra.

Vires.

Vires. In vulneribus consolidandis, hæmorrhagiis eorum sistendis, contusionibus, ambustis, quam maxime commendatur ab experientissimo Chirurgo Bilguer sub titulo: Schußwasser.

LIQUOR VULNERARIUS VEGETABILIS,

five

BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

REC. Herbarum Nummulariæ,
Betonicæ,
Chærefolii,
Plantaginis,
Aristolochiæ clematitidis
ana uncias duas,
Saniculæ,
Verbasci,
Sedi majoris,
Crassulæ, five Telephii
minoris,
Vincæ - per - vincæ,
Pimpinellæ albæ ana uncias tres,
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii ana uncias duas.

Contundantur & exprimantur fortiter; succum expressum cum
Aceti Vini æquali parte, &
Salis Gemmæ pulverisati unciiis quatuor,

destilla, ex cucurbita vitrea, ad siccitatem, liquorem prolectum serva.

Ad vulnera recentia partium carnosarum, contusiones, sugillationes, externe adhibendus, commendatur. Neque frustraneus est ejus usus internus, ad guttas quadraginta vel plures iterato datus in hæmorrhagiis internis, & sudoribus nimis hæcticorum.

Qui, loco aceti, spiritum vini adhibent, eundem effectum etiam in vulneribus partium tendinosarum sibi promittere, & ad hæmorrhagias sistendas adhibere possunt.

LOCH AD ASTHMA, five DE SCILLA.

REC. Scillæ præparatæ unciam semis,

Marrubii,

Hyssopi ana drachmam unam,

Iridis Florentinæ drachmas duas,

Myrrhæ,

Croci ana drachmam semis.

In pulverem trita excipiantur

Mellis despumati unciiis sex.

Fiat Loch, five Eclegma.

Pituitam viscosam resolvit, indeque natam tussim & respirationem difficilem levat.

Uncia una hujus eclegmatis continet Scillæ grana triginta sex.

Dosis drachma semis ad drachmam unam semis.

Majori quantitate sumtum vomitum excitat.

LOCH DE FARFARA.

REC. Radicum Farfaræ recentium, quantum lubet;

Coquantur ad mollitiem, contundantur in mortario lapideo, & per cribrum trajiciantur.

Hujus pulpæ libræ uni adde

Mellis despumati libras duas;

Coquantur ad humiditatis superflue consumptionem, postea servantur.

Acrimoniam humorum obtundit, simulque abstergit & mundificat, atque phthysicis & tussientibus confert.

Dosis uncia dimidia ad integram.

LOCH DE PULMONE VULPIS.

REC. Pulmonis vulpis præparati,

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana unciam unam,

Sacchari clarificati uncias quindecim.

Omnia tenuissime trita saccharo excipiantur; & ad debitam formam redigantur.

Pectori dicatum est, commendabatur phthysicis & tussientibus; licet certe a pulmonibus vulpis nullum levamen pro phthysicorum pulmonibus expectare deceat.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

Bb 2

LOCH

LOCH SANUM ET EXPERTUM.

REC. Aquæ Loch fani destillati libram unam,
Pinearum mundatarum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis Papaveris albi ana unciam semis.

Fiat emulsio; in qua dissolve
Sacchari albi uncias viginti,

insperge

Pulveris Liquiritiæ,

Tragacanthæ albæ,

Gummi Arabici,

Amyli ana drachmas tres,

Iridis Florentinæ drachmas duas.

Misceantur, agitentur diu & celeriter, quo albescant; postea reponantur. Cave, ne rancidum sit.

Tussi siccæ, ab acri materia ortæ, subvenit, expectorationem adjuvat.

Dosis est drachmæ duæ ad unciam semis.

LOCH SAPONATUM PHARM. EDINB.

REC. Saponis medicati, vel Veneti drachmam unam,
Olei Amygdalarum unciam unam,
Syrupi capillorum Veneris vel Balsamici unciam unam semis.

Misceantur exacte.

Resolvit, & non solum in asthmate, sed etiam in affectibus renum, calculo & nephritide cum fructu dari potest.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

LUMBRICORUM TERRESTRIVM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres vivi in fictili patina factis magna reponantur, ut terram eruant; quo facto aqua pura abluantur, & iterum reponantur, donec omnes fordes deposuerint. Deinde Vinum superfundatur album, & Lumbrici, per quatuor horas macerati, in clibano, ne putrescant, cito exsiccentur.

Vires sunt aperientes, diureticæ, diaphoreticæ & anodynæ; hinc in affectibus arthriti-

cis, convulsivis & epilepticis, bono cum successu adhibentur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

MAGISTERIVM CORALLIORVM.

REC. Coralliorum in pulverem tritorum quantum vis;

his affundatur

Acetum destillatum forte, ad supereminentiam aliquot digitorum, & in

locum calidum reponantur, ut solvantur. Solutio filtretur, & oleum Tartari per deliquium instilletur, atque pulvis inde præcipitatus, aqua fontana probe edulcoratus, siccetur.

Olim valde commendata fuerunt magisteria, & huic coralliorum roborantes, cordiales virtutes attributæ sunt. Hodie a plurimis & experientissimis Medicis simpliciter præparata illis merito præferuntur.

Præscripta methodo etiam reliqua

MAGISTERIA MARGARITARVM,
MATRIS PERLARVM,
&
OCULORVM CANCRO-
RVM

præparari possunt.

MAGISTERIVM GUMMI GUTTÆ.

videatur

GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

MAGISTERIVM MARCASITÆ.

REC. Aquæ fortis libram semis,
Bismuthi, vel Marcasitæ uncias tres.

Marcasitæ grosso modo contusæ affunde primo Aquæ fortis uncias duas; si inde nata effervescentia & solutio cessaverit, alias Aquæ fortis uncias duas affunde, & hoc continua, donec omnem Aquam fortem affuderis, qua methodo Marcasita omnis solvitur; solutionem aqua fontana, magna copia affusa, & sale Tartari parum alcalifata, præcipita, præcipitatum edulcora & serva.

Ufus est cosmeticus, & admiscetur drachma una Aquæ liliorum alborum, vel Nymphææ unciis quatuor;

MAGIST. MAGNESIA.

quatuor; vel si placet Unguentum sumitur rosatum, & unciae uni drachma hujus magisterii additur.

Prostant exempla, quod nimis diuturno & frequenti usu faciem misere defœdarit.

MAGISTERIUM SATURNI.

REC. Aceti Lithargyrii quantum lubet, instilletur solutio Cinerum clavellatorum aqua fontana parata, præcipitabitur pulvis albus, qui, affusa aqua tepida copiosa, edulcorandus & servandus.

Usus est ad cosmetica & collyria.

MAGNES ARSENICALIS.

REC. Arsenici crySTALLINI,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi ana uncias duas.

iat omnium pulvis subtilis, quem in vitrea retorta arenæ impone, ac in igne, sensim aucto, tam diu detine, a fumo exhalante sollicite tibi cavendo, donec omne liquecat, quod stilo ferreo mundo explorari potest; tum refrigescat retorta, quæ fracta, materiam, lapidis instar induratum, fusci coloris, exime ac ferva.

Ita ingrediens emplastri magnetici, & ita vocatur, quia credebant, illud malignitatem bubonis extrahere, non secus, ac magnes ferrum trahit.

sulphure Arsenicum ita mitigatum est, ut vis caustica ejus timenda non sit.

MAGNESIA ALBA.

REC. Residui lixivii, a crySTALLIFICATIONE Nitri, quod omnem crySTALLIFICATIONEM respuit, & a nitrariis Mater Nitri vocatur, quantum libet.

vaporetur in vase figulino, vel ferreo, calore successive ad ebullitionem usque aucto, donec, vaporibus acidis tam Nitri quam salis ex parte expulsis, in pulvis formam inspissetur. Tunc crucibulo capaciore immittitur, igne majori adhibito insigniter spumat, multum adhuc spiritus acidi eruat; si subsederit massa, fervida injicitur aquæ; in ea aliqua tantum albi pulveris portio fundum sponte

MAGNESIA.

101

petit, seorsim servanda. Decantato liquori, in quo terra, cum acido Nitri firmiter adhuc ligata, tanquam sal in aqua solutum, continetur, additur lixivium salis tartari vel cinerum clavellatorum, usque dum ulterius nihil præcipitatur. Omnis qui secessit pulvis affusa aqua probe edulcoratur, & siccatus servari solet titulo Magnesiae Nitri.

NB. Cum autem accurato examine appareat, quod prior, qui in aqua sponte subsedit, pulvis vitrioli acido solubilis non sit, concludendum est, quod a calce in lixivio Nitri contenta oriatur, & sic ab affuso acido vitriolico in feleniticam, gypseam naturam mutetur, hinc merito rejiciendus est; posterior autem pulvis, sale alcalino præcipitatus, teneior quidem, levior, albidior est, attamen plerumque calcareæ naturæ, hinc hæc Magnesia Nitri merito ex officinis exulat, præsertim si ad calcinandum adhibetur.

Melior igitur & certior est modus præparandi Magnesiam ex *Sale Ebshamensi*, si solutio hujus diluta per lixivium cinerum clavellatorum dilutum præcipitatur, terra subsidens probe edulcoratur, & efficcatur. Ita enim obtinetur terra, quæ alius indolis est, non calcareæ, per spiritum vitrioli solubilis, & cum illo non in felenitem, sed in sal laxans amarum denuo abiens. Bona Magnesia ex aliis quoque fontibus salinis præter Ebshamensem acquiritur. In ipsa nostra patria ex scaturigine salina Sulzensi & suis qualitatibus & suo pretio commendanda obtinetur.

Libra una salis Ebshamensis uncias ad minimum quatuor, & residuum inspissatum tartarum vitriolatum largitur.

Magnesia tanquam polychrestum & universale ad omnes morbos, sub specioso titulo Panaceæ quondam ad nos pervenit, & pro arcano habita est. Virtute gaudet absorbente, & minori dosi exhibita, nonnunquam diuretica & diaphoretica; si vero largiori dosi, ad drachmam unam vel duas

Cc

datur,

datur, & humores acidus in primis viis invenit, alvum laxat & evacuat.

Modus exhibendi est, vel drachmas duas cum emulsione amygdalarum mane propinare, vel salis Anglici cathartici drachmis quatuor vel sex, in aqua solutis, unam drachmam Magnesiæ addere, & simul exhibere. Qua posteriori methodo effectum satis laudabilem purgantem, absque ulla molestia, edit, & præcipue illis convenit; qui ardore ventriculi, quem Sodam vocant, vexantur.

Prodest etiam teneris infantibus, ad lactis & pulmentorum acrimoniæ, in ventriculo subortam, contemperandam. Datur his a granis quinque ad scrupulum semis & ultra, pro ratione ætatis.

MAGNESIA CALCINATA, sive USTA, quæ, dum ordinaria bona, nequaquam calcarea, in crucibulo ita igne torquetur, ut suam humiditatem & aërem fixum dimittat, (sub qua operatione plerumque ponderis sui tres quartas partes amittit,) obtinetur, à multis recentius desideratur. Parca dosi multum acidum absorbet, alvum blande sine torminibus movet, & sic multis aliis absorbentibus in officinis prostantibus palmam præripit, neque sub hac operatione caustica fit, si vera magnesia adhibita fuit, attamen facile iterum humiditatem & aërem fixum attrahit, nisi sollicitè asservetur.

*MANDIBULÆ LUCII PISCIS
PRÆPARATÆ.*

A sordibus mundatæ, in subtilissimum pollinem tritæ, & per linteum trajectæ servantur.

Vulgo, sed absurde, specificum antipleuriticum habentur.

A drachma semis ad scrupulos dari possunt duos.

MARGARITÆ ORIENTALES ET OCCIDENTALES PRÆPARATÆ.

Antea in pollinem tritæ, super marmore, sicut corallia lævigantur.

Cordiales illis virtutes adscribebantur, nunc pro nimis pretioso & inutili medicamento merito habentur,

MASSA. MATERIA.

tur, quod sua præparatione nec juvat nec amplius ornat.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

MASSA LIQUIRITIÆ ALBA.

Vide PASTA ALTHÆÆ.

*MASSA LIQUIRITIÆ FUSCA
Pharmacop. Parisiens.*

REC. Extracti vel succi Liquiritiæ Hispanici uncias octo,

*Gummi Arabici libras duas,
Sacchari albi libram unam.*

Solvantur in aquæ communis S. Q. coquantur leni igne ad extracti solidi consistentiam, massam calentem, supra tabulam marmoream oleo amygdalarum inunctam effunde, & in bacillos, leni calore ficcandos, atque calido loco asservandos, redige.

Humores acres temperat; atque in tussi sicca & catarrhis commendatur.

MASSA PRO FORNACE ODORIFERA.

*REC. Benzoës uncias sex,
Storacis calamitæ uncias quinque,
Ladani drachmas sex,
Terebinthinæ unciam semis.*

Pulverisata immittantur sartagini, atque in vas aquæ bullientis demittantur, quo liquecant; liquatis adde

*Olei destill. Ligni Rhodii,
Caryophyllorum,
Lavendulæ ana scrupulum unum,*

Balsami Indici nigri drachmam unam semis,

Spodii nigri præparati drachmas duas.

Optime misceantur, & formentur ex massa cylindri, ceræ sic dictæ Hispanicæ instar.

Ad suffimenta inservit, & fornaci calidæ affricta, totum conclave grato odore replet.

MATERIA PERLATA, sive MAGISTERIUM ANTIMONII DIAPHORETICI.

REC. Antimonii diaphoretici, recens detonati nondum edulcorati, libram unam.

Coquatur in vase figulino; additis

Aquæ fontanæ purissimæ libris octo,
ad quartæ partis consumptionem.

Aqua, Nitro antimoniato imbuta, calide per
filtrum trajiciatur, & aceto instillato præci-
pitetur; pulvis albus præcipitatus edulco-
retur; residuum vero Antimonium diapho-
reticum ulterius aqua tepida ablui & servari
potest.

*Eædem sunt vires, quæ Antimonii diaphoretici.
Commodissime additur emulsionibus, quibus se ob
subtilissimas particulas intine commiscet.*

Dosis est a granis decem ad scrupulum unum.

MEL ANTHOSATUM.

REC. Florum Rorismarini recentium, vel,
si deficient, herbæ uncias octo,

Aquæ fontanæ uncias quatuor,

Mellis despumati calentis libras duas.

Infundantur in vitro, & post digestionem
per decem vel duodecim dies, in loco
calido institutam, in Mariæ balneo ebul-
liant, atque mel expressum & colatum
fervetur.

*Cerebro & ventriculo roborando, flatibus dis-
cutiendis, colicis & uterinis doloribus le-
niendis medetur. Clysmatibus etiam addi
potest.*

MEL DESPUMATUM SIMPLEX.

REC. Mellis libras quatuor,

Aquæ fontanæ uncias octo.

Ebulliant, despumentur & per pannum
colatum mel fervetur.

Inservit ad incorporanda electuaria.

MEL MERCURIALE.

REC. Succus herbæ Mercurialis libras tres,

Mellis optimi libras duas.

Misceantur, & leni igne ad justam consisten-
tiam coquantur, colentur & ferventur.

*Additur enematis, ad alvum emolliendam & sol-
licitandam, ab uncia una ad duas.*

MEL ROSATUM SIMPLEX.

REC. Foliorum Rosarum recentium ru-
brarum libras sex, affunde

Aquæ fontanæ ferventis libras toti-
dem.

Macerentur per viginti horas in vase figu-
lino, exprimantur & colentur. Cola-
turæ adde

Mellis optimi & purissimi tantundem.

Despumentur & coquantur ad consisten-
tiam melle paulo liquidiores.

*Usus est ad oris ulcera, gargarismata, col-
lutiones, injectiones mundificantes & deter-
gentes. Additur etiam digestivis, & quan-
do ulcera, a vesicatoriorum applicatione
inducta, purganda & detergenda sunt.*

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

REC. Succus Rosarum pallidarum libras
tres,

Mellis optimi libras duas.

Mixta dissolvantur, despumentur, & ad
justam consistentiam, lento igne, eva-
porentur.

*Rarus ejus usus est internus, plerumque addi-
tur clysteribus, ab uncia una semis ad un-
cias duas.*

MEL SAMBUCI.

REC. Florum Sambuci recentium decerp-
torum libram unam;

Macerentur in

Mellis despumati libris duabus,
in vase vitreo, additis

Aquæ florum Sambuci unciis sex,
per aliquot dies.

Ebulliant postea lento igne, & expriman-
tur; expressum coletur, & ad justam
consistentiam evaporetur.

*Usus est ad gargarismata resolutiva, ubi
emolliendo dolores, ex inflammatione ortos,
mitigat.*

MEL VIOLARUM.

Paratur, sicut Mel Rosarum simplex, pro infu-
sione florum Rosarum, infusionem violarum
sumendo.

*Virtute & usu cum antecedente Rosarum solutivo
convenit.*

Dosis eadem.

Cc 2

MER-

MERCURIUS ALCALISATUS.

REC. Mercurii vivi depurati drachmas tres,

Lapidum cancrorum præparatorum drachmas quinque.

Misceantur diuturna trituratione in mortario lapideo, donec omnes globuli mercuriales evanuerunt.

Laudatur in malis venereis, obstructione viscerum, lentore humorum, salivationem excitat.

Dosis a scrupulo dimidio ad integram.

MERCURIUS DULCIS.

REC. Mercurii sublimati corrosivi, vivi, optime purgati, ana libram semis.

Terantur in mortario vitreo, & sub tritura aqua fontana parum humectentur, atque solcite permisceantur, donec Mercurii vivi nil quidquam appareat, tum rursus exsiccata e cucurbita vitrea, igne convenienti arenæ, in cupella ferrea sublima; fæces in fundo relictas, ut & materiam nigricantem, in collo altius sublimatam, aufer. Mercurium sic sublimatum, in pulverem tritum, demuo sublima, sublimatumque serva, & ut nil Mercurii sublimati corrosivi immutati inesse certus esse possis, præstabit; illum aqua fontana calida, in cujus qualibet libra salis armoniaci drachma soluta est; superaffusa edulcorare atque sic ab omni corrosivo liberare, quam, sæpius sublimando, vi sua laxativa privare.

ALIA METHODUS PER VIAM HUMIDAM Mercurium dulcem præparandi ab egregio chemico SCHEELÉ propo-
posita fuit, quæ cum vario respectu prærogativam habeat, adponi meretur:

REC. Mercurii depurati,

Aquæ fortis ana libram dimidiam.

Inmittantur in cucurbitam colli longioris, quæ epistomio chartaceo tegatur & in balneum arenæ ponatur. Post aliquot horas augeatur ignis, ut solutio ad coctionem quam proxime accedat, & sic sub cucurbitæ subinde instituenda agita-

tione per tres quatuorve horas continuetur, donec Mercurius solutus sit. & tandem solutio ad ipsam ebullitionem, igne aucto, perducatur. Hæc fervens limpida solutio mercurialis in aliud vas, in quo muria pariter fervens, ex uncis quatuor & dimidia salis communis depurati & aquæ fontanæ libris octo conficienda, parata habetur, sub continua agitatione successive infunditur. Præcipitabitur sic pulvis albus, a quo post sufficientem quietem liquor superflans limpidus decantetur. Pulveri præcipitato toties aqua pura fervida adfundatur, donec ea plane insipida redeat, & sic pulvis pro edulcorato haberi queat, qui tunc super charta bibula exsiccandus Mercurium dulcem, octo cum dimidia uncias ponderantem & omni nota bonum exhibet, ut ad intimiorem acidis salis cum Mercurio combinationem sublimatio, quam unica vice superaddendam nuper GOETTLING suavit, vix necessaria sit, cum experimenta a SCHEELÉ capta demonstrent, Mercurium dulcem *via humida* solcite paratum omnes requisitos bonitatis characteres habere.

NB. Potest ex liquore, qui, postquam Mercurius dulcis præcipitatus subsedit, superstat, *Mercurius albus* adhuc obtineri, si solutio salis ammoniaci ope aquæ facta admiscetur & oleum tartari successive instillatur.

Mercurius dulcis est egregium & ex optimis, quæ in Medicina habemus, remedium; accuratam vero & diligentem exposcit tam præparationem, quam rationem adhibendi circumspectam & providam.

Acidum Salis, in Mercurio corrosivo contentum, ut omni, quem recipere potest, Mercurio sit saturatum, necesse est; & quamquam novem uncie Mercurii vivi uncis duodecim Mercurii corrosivi saturandis præsumque sufficiant, præstat tamen, præscriptam anaticam portionem sumere, quia Mercurius superfluous in sublimatione sub forma materice nigricantis, altius sublimatæ, separari potest.

Signum rite præparati Mercurii est, si insipidus & omnis metallici saporis expers est. Ex quo, si aqua fervida coquatur, nihil solvitur, quod Oleo Tartari per deliquium præcipitari potest. Si cum Alkali caustico vel aqua calcis tritus nigrum induit colorem.

Cautelæ e præficorum libris petendæ sunt; nimis longum enim foret, si omnes virtutes, adhibendi modos, & cautelas hic inferere deberemus.

Paucis dicimus: Mercurium dulcem non solum vires laxandi, vermes fugandi, sed sanguinem etiam depurandi, & minutissimos obstructos tubulos ac meatus referandi possidere.

In morbis igitur, ab obstructione glandularum & visciditate lymphæ ortis, venerea lue, scabie pertinaci ac ulceribus inveteratis remedium est, quod par sibi non habet.

Datur vero vel in pulvere, vel cum extracto quodam laxante, in forma pilulari, vel cum conserva rosarum, aut alia, in boli forma.

Dosis grana quinque, decem, ad duodecim.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS sive COSMETICUS.

REC. Mercurii vivi uncias quatuor.

Dissolve in Aquæ fortis quantitate sufficiente, unciis quatuor vel octo, prout magis vel minus concentrata fuerit, adhibito calore initio leni, tandem fervido. Postea Salis communis circiter uncia quatuor solvantur in minima quantitate aquæ fontanæ. Solutioni huic saturatissimæ, frigidæ, infundatur solutio Mercurii fervida. Sic, illico præcipitatur Mercurius in pulverem album, a quo, ut primum subsederit, liquor superflans decantetur, ne denuo partem Mercurii præcipitati solvat. Affunde præcipitato aquam frigidam, ut omnis fædus & acrimonia eluatur. Decantanda autem est & hæc aqua sine mora, postquam a subsidente pulvere albo clara fuerit. Pulvis lenissimo calore, ne flavescat, in umbra exsicceetur. Decantatus primus

Pars II.

liquor multum adhuc Mercurii retinuit, per alcali volatile, e. g. spiritum urinæ præcipitatio illius secundaria fieri potest, vel addito sale ammoniaco, ad unciam usque unam, & postea solutione salis tartari successive, quam diu pulvis albus præcipitatur, instillata. Ita obtinentur Mercurii præcipitati albi uncia circiter sex.

Adhibetur a nonnullis interne ad salivationem excitandam; sed securius externe ad lichen, scabiem & tophos venereos eo utimur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER sive CALCINATUS.

REC. Mercurii vivi purificati libram semis.

Dissolve digerendo in Aquæ fortis ex optimo Nitro destillatæ sufficiente quantitate, quæ circiter libram unam & dimidiam æquabit, destilla ex retorta capaciore in arena ad siccitatem, igne fortissimo in fine administrato, sic ut retorta ubique carbonibus obruatur. Post refrigerationem in fundo hærebit pulvis ruber, qui, si non colore rubro pulchre splendet, leniter in patina ulterius calcinetur.

Uso interno, cum corrosivus sit, nunquam adhiberi debet. Externe ad auferendas excrescentias carnosas, carnem luxuriantem, & mundificanda ulcera maligna celebratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS.

REC. Mercurii vivi purissimi uncias quatuor, Cupri unciam semis.

Solvantur singula seorsim in sufficiente quantitate Aquæ fortis, misceantur soluta, & Aqua fortis in vase vitreo, igne arenæ, evaporetur ad siccitatem.

Massæ salinæ Aceti destillati libram unam affunde, digere & solve, atque acetum abstrahere, residuam massam viridem in pulverem tere atque serva.

Laudatur quidem specificum medicamentum in Gonorrhœa. & aliis morbis venereis, interne exhibitum; nos vero ejus usum internum disuademus, ob vim emeticam & drasticam. Externe ad ulcera mundanda locum habet.

Dd

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

REC. Mercurii vivi libras duas.

Solve in sufficiente quantitate
Aquæ fortis; solutionem ad siccita-
tem evapora.

Massæ albæ admisce

Vitrioli, ad albedinem calcinati, li-
bras tres,

Salis marini decrepitati tantundem.

Imple ea cucurbitæ vitreæ tertiam partem, impone arenæ, ut cucurbita fundum cupellæ attingat. Orificium vasis sublimatorii apertum relinquitur, usque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur charta convoluta, ignem primo adhibe lenem, quem per gradus auge, donec omnis Mercurius sublimatus sit, quod circiter post sex vel septem horas continget; refrigeratum sublimatorium frange, & Mercurium sublimatum exemptum serva.

Alia eaque facilior methodus est, *Mercurium sublimatum corrosivum* bonæ notæ præparandi, si Mercurius cum Oleo Vitrioli in massam albam salinam (sicut in præparatione Turpethi mineralis) redactus cum Salis communis æquali pondere sublimatur. Rarius in officinis pharmaceuticis paratur.

Præparatum hoc mercuriale, acido salis concentrato dives, fortissimum & terribile est venenum corrosivum. Operationibus chymicis inservit. In Chirurgia usus ejus salutaris notus est in aquis phagedænicis. Ab usu interno fere semper abstinere Medici: Postquam vero Barhaavius misturæ ex Mercurii sublimati grano uno, aquæ uncia una soluto, drachmam, syrupo violaceo mitificatam, bis terve in diē potatam, mira præstare in multis morbis incurabilibus edixerat: (at prudenter a prudente Medico!) van Swieten grana sex in spiritus frumenti unciis duodecim solvere, & de die unum, duo, tria etiam cochlearia dare docuit, superpotando Decoctum hordei, bardanæ &c. maxima copia; mire prodesse ad curandam luem veneream, ulcera cacoë-

thea, corneæ opacitatem &c. plurimis hucusque observationibus felicissimis comprobatum est.

MERCURIUS VIVUS DEPURATUS.

REC. Mercurii vivi quantum placet.

Immittatur retortæ terreæ in balneo arenæ positæ, & apponatur excipulum aqua replendum. Igne successive aucto Mercurius in excipulum transcendit, unde colligendus & pro usu asservandus.

Mercurius hac ratione sufficienter depuratur, ut pretiosiore Mercurio e cinnabari fuscitato non opus sit. Ista contra depuratio, qua trans corium tantummodo premitur, nequaquam sufficit, cum fraudulenta arte plumbum & bismuthum ita admisceri queant, ut simul per corium transeant & sic Mercurium usui interno destinatum noxium reddant.

MERCURIUS VITÆ.

REC. Butyri Antimonii libram semis,
Aquæ fontanæ purissimæ libras sex.

Misceantur, albescent & præcipitabitur pulvis subtilissimus albus ad fundum, qui sæpius, aqua tepida affusa, edulcorandus, & leni calore exsiccandus est.

Minime est productum mercuriale, sed antimoniale.

Rarus est ejus in medicina usus. Vires sunt vomitorie, ita, ut grana duo vehementes excitare soleant vomitus; nonnullis placuit, vini unciis duobus grana sex vel octo infundere, & vinum per filtrum trajectum offerre.

Cum triplo Nitri detonatum exhibet **BEZOARDICUM MINERALE.**

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Ab omni immunditie separati imprægnentur vino albo, & leni calore exsiccati ferventur.

Egregie resolvunt & aperiunt. Usus eorum est in febre quartana, ictero, asthmate, hydrope, affectibus spasmodicis, urina pellenda.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

MIXTURA.

MIXTURA SIMPLEX ALBA.

REC. Spiritus Tartari, e Tartaro purificato destillati, uncias duodecim,
Spiritus Vitrioli rectificati uncias tres.

Misce & destilla per retortam ad ficcitatem; spiritus, qui prodiit volatilis, sulphureus & anodynus, commisceri debet cum spiritus theriacalis camphorati unciis viginti, ac in vitro probe clauso fervari.

NB. Spiritum Tartari cum spiritu Vitrioli separatim destillandum suademus, ut empyreumaticum spiritus Tartari principium ab acido vitriolico absorbeatur, & spiritus limpidior atque gratior, nec non principio vitriolico anodyno imbutus obtineatur.

Vires sunt alexipharmacæ, diaphoreticæ, carminativæ, anodynæ; datur in febribus continuis, rheumaticis, variolis, ubi leniter transpirationem auget.

Dosis a guttis triginta ad quinquaginta, vel sexaginta, vel sola, vel in potionibus, cum pulveribus bezoardicis.

MIXTURA SIMPLEX LUDOVICI.

REC. Tincturæ Bezoardicæ L. uncias quinque,
Spiritus Tartari volat. rectificati uncias quatuor,
Vitrioli rectificati unciam unam,
Camphoræ scrupulos duos.

Misceantur & digerantur.

Intercedit differentia inter mixturam simplicem ordinariam & hanc Ludovici. Prior cum Spiritu theriacali, hæc vero cum Tinctura bezoardica paratur, cujus singula uncia granum opii continet.

Vires sunt eadem ac mixturæ simplicis ordinariæ; magis tamen hæc anodyna & sudorifera est, propter opium, quod Tincturæ bezoardicæ ingrediens est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

MIXTURA SIMPLEX ORDINARIA.

REC. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,

MIXTURA.

107

Spiritus Tartari rectificati uncias tres,

Vitrioli boni unciam unam.

Misceantur & digerantur aliquandiu in vitro bene clauso.

Viribus cum præcedente convenit, atque eadem dosi exhibetur.

MIXTURA TONICO - NERVINA STAHLII.

REC. Spiritus cornu cervi rectificati unciam unam,
Tincturæ Antimonii acris uncias duas.

Misceantur & ferventur in vitro probe obturato.

Optimi usus esse hanc mixturam ad viscera roboranda, horumque tonum debilitatum restituendum, Clarissimus Auctor & alii perhibent; unde imprimis in morborum chronicorum declinatione, post graviores quascunque excretiones & viscerum oppressiones, infarctum &c. ea utuntur.

Dosis, bis in die, ad guttas viginti usque quinquaginta.

MIXTURA TOPICA, five SAPO CHYMICUS DIPPELII.

REC. Cinerum clavellatorum depuratorum libram unam,
Antimonii crudi libram semis,
Lamellarum Cupri concisarum uncias tres.

Mixta fundantur ad scorias, quas nondum refrigeratas, contusas, imbibe olei Juniperi vel Terebinthinæ unciis novem, vel quantum sufficit ad consistentiam pulmenti; tum affunde spiritum vini rectificatissimum ad eminentiam aliquot digitorum, digere per aliquot dies, spiritum tinctum decanta, repete bis terve infusionem cum novo spiritu, & digestionem, denique aliquam spiritus partem abstrahere, ut bene saturata & spissa tinctura obtineatur; cui etiam saponem venetum, & tantillum Balsami Peruviani quandoque addere solebat Autor.

Ufus est externus, resolvens & anodynus, in arthritide, etiam nodosa, & tumoribus inflammatoriis, e. g. mammarum, præcipue quoque in pernionibus probatus.

**MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI,
vel SODAM.**

REC. Cretæ præparatæ,
Cornu Cervi usti præparati,
Oculorum cancrorum præparatorum ana
drachmas tres,
Boli Armenæ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana
drachmas duas,
Nucis moschatæ drachmam unam.

Pulverifata, fiant cum sacchari, in Aqua cera-
forum soluti, & ad consistentiam tabulati co-
cti, unciis duodecim, morsuli.

*Ufus ex titulo cognoscitur; sumuntur quovis tem-
pore ad unciam dimidiam, imo integram.*

MORSULI IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas duas,
Specierum Imperatoris pro morsulis,
grosso modo incisarum, drach-
mas sex,
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum,
Carnis Citri conditæ ana unciam
unam,
Amygdalarum dulcium unciam unam
femis.

Condita & Amygdalæ mundatæ minutim
incidantur, & postea cum
Sacchari, in Aqua rosarum soluti,
& ad consistentiam tabulati co-
cti, unciis sedecim mixta,

Fiant morsuli.

*Est medicamentum stomachicum ori gratum;
datur inprimis aquas minerales bibentibus.*

MORSULI PURGANTES.

REC. Magisterii, five refinæ Jalappæ drach-
mam unam,

Optime teratur cum
Amygdalarum dulcium drachmis tribus,
His adde
Cardamomi minoris scrupulum unum,

Cinnamomi acuti scrupulos duos,
Sacchari, in Aqua rosarum soluti & ad
consistentiam tabulati cocti, uncias
septem semis.

Fiant morsuli.

*Uncia morsulorum horum grana circiter octo conti-
nent magisterii.*

Datur pueris, qui alia medicamenta respuunt.

*Dosis, pro ratione ætatis, drachma una, duæ,
ad sex.*

**MORSULI ANTIMONIALES
KUNCKELII.**

REC. Amygdalarum dulcium minutim
incisarum unciam unam,
Cinnamomi acuti, minutim incisi,
drachmas duas,
Cardamomi minoris drachmam se-
mis,
Antimonii crudi purissimi, subtilissi-
me pulverifati, unciam semis,
Sacchari albi, in Aqua rosarum so-
luti & ad consistentiam tabulati
cocti, uncias septem.

Fiant morsuli.

*Magnæ tribuuntur vires his morsulis ad sca-
biem ulcerosam, reliquias a variolis, go-
norrhæam male tractatam, affectus convul-
sivo- & spastico-arthriticos & rheumaticos
rebelles.*

*Uncia una continet Antimonii drachmam
semis.*

*Dantur a drachmis duabus, ad unciam dimi-
diam, singulis diebus mane & vesperi an-
te somnum.*

MORSULI CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynæ,
Musci corallini ana unciam semis,
Æthiopis mineralis,
Jalappæ resinose ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas.

Omnia pulverifata commisceantur cum
Sacchari albi, in Aqua rosarum soluti &
ad consistentiam tabulati cocti, un-
ciis septem,

Fiant morsuli.

Dantur

Dantur infantibus, medicamenta alia anthelmintica reformidantibus.

Quolibet uncia habet Æthiopis mineralis scrupulum unum & totidem Jalappæ.

Dosis igitur infanti a drachma una ad duas.

MUCILAGO MERCURIALIS PLENKII.

REC. Mercurii vivi purissimi drachmam unam,

Gummi arabici unciam dimidiam.

Misce, tere in mortario lapideo, affunde parum aquæ destillatæ, continua agitationem, donec globuli mercuriales omnes in mucilagine disparuerint. Hujus enim ope Mercurius simplex cum Aquis destillatis, Syrupis, Extractis & Unguentis commode misceri potest, & novam methodum constituit, morbos venereos, aliosque, quibus mercurialia opponuntur, bono cum successu, non tamen sine omni salivationis, quam laxantia plerumque avertunt, metu, tractandi.

Dosis Mercurii, grana tria, ad sex, bis de die. Ex. gr. Mixture ex drachma una Mercurii in mucilaginem redacti, cum aquæ destillatæ unciis octo, & syrupi unc. semis compositæ, bis quotidie duo cochlearia sumere licet. Præparanda ejusmodi mixtura tunc demum est quando desideratur; sub diuturna enim asservatione globuli mercuriales iterum confluunt.

Decocta sanguinem purificantia pro more conjunguntur.

MUCHARUM ROSARUM.

REC. Florum Rosarum Damascenarum recentium libras octodecim.

Infundantur & macerentur, horis viginti quatuor, in

Aquæ claræ ferventissimæ totidem libris;

Postea exprimantur, & in vasis angustioribus, oblongis collis præditis, superaffuso Olei olivarum modico, ferventur.

Inservit conficiendis, etiam extra florendi tempus, syrupis & melli rosato.

Pars II.

NITRI NAPHTHA.

REC. Spiritus Vini rectificatissimi, in majori vitro contenti, libram unam;

Affunde per vices

Spiritus Nitri concentrati libram semis;

Liquores tranquille coeunt. Elapsis aliquot horis drachmam incirca unam spiritus nitri affunde denuo, idque post sex vel octo horas similiter repete, usque dum in liquoribus mixtis intestinum motum, qui tandem satis vehemens fit, videas oriri. Post quaslibet autem affusiones vitrum exactissime debet claudi, & in loco frigido, vel aqua frigidissima detineri. Sub motu isto intestino videbis oleum viridescens superficiem liquoris petere, & sensim sensimque augeri. Separatur hoc Oleum, & liquori residuo denuo aliquot drachmæ acidi affunduntur, & quod inde secedit oleum, viridi colore conspicuum, separatur. Continuatur ita commixtio acidi, usque dum nullum a superaddito acido ulterius oleum secedit.

Oleum collectum affusa aqua & addito alcali urinoso, (quod purpureo hinc tingitur colore) ab acido adhærente edulcoratum iterumque separatum, usui servatur in loco frigido, & vitro bene munito, sub titulo *Naphthæ nitri*; quæ ita rectificata pondus subtripulum alcoholis ad laborem recepti solet æquare.

Residuum Liquoris, ex quo Naphtha fuit ablata, inservire potest præparationi Spiritus Nitri dulcis, infra descripti.

Vires cum Naphtha Vitrioli conveniunt.

NITRUM ALKALISATUM vel FIXUM.

Videatur LIQUOR NITRI FIXI.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Fit, aquam, qua edulcoratio Antimonii diaphoretici, post detonationem, fuit peracta, evaporando ad siccitatem, & sal siccum asservando.

Ee

Ad

NITRUM.

Ad naturam salium mediorum accedit, ex portione Nitri ad laborem adhibiti, & sale polychresto constans, simul autem & calcis antimonii, quæ alias materia perlata dicitur, particeps est. Datur ad humorum orgasmum contemperandum, & pulveribus absorbentibus additur.

Dosis ad drachmam semis & ultra.

NITRUM CRYSTALLISATUM
ET DEPURATUM.

Solvatur Nitrum in aquæ fontanæ sufficiente quantitate, leni calore; liquor, per pannum colatus, ad crystallisationem reponatur. Crystalli longæ pyramidales colligantur & servantur.

Viribus præcellit hoc nitrum crystallisatum vulgare, & divinum est remedium in exæstuatione sanguinis, febribus ardentibus, fere omnis generis, in variolis etiam, purpura, ubi sedativa & antispasmodica virtute eminet.

Dosis a granis sex ad triginta, in vehiculo aquoso.

NITRUM PERLATUM.

REC. Nitri crystallisati puri uncias quatuor, Matris Perlarum præparatæ unciam semis.

Misce.

Commendatur in febribus continuis & malignis, ac haud inferior est illo, quod cum Margaritis paratur.

Dosis a granis quinque ad scrupulum unum.

NITRUM ROSATUM.

REC. Infusionis Rosarum rubrarum saturatæ libram unam.

In hac dissolve

Nitri crudi crystallini libram semis; Evaporet solutio lento igne, ad dimidias. postea ad crystallisandum repone, crystallos ficcatas serva.

Additur gargarismatibus in faucium & tonsillarum inflammatione, cum absorbentibus in dysenteria etiam maligna secure adhibetur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

NITRUM SATURNINUM.

REC. Nitri crudi crystallisati uncias tres, Sacchari Saturni uncias duas.

OCULI. OLEUM.

Solvantur in aquæ Rosarum sufficiente quantitate, & in vase vitreo, ad pultis crassioris consistentiam evaporentur, postea leni calore penitus siccentur.

Usus est externus, & in magna faucium inflammatione ac uvulæ laxitate, gargarismatibus, & in oculorum inflammatione, collyriis additur. Illos autem, quibus usus internus, ad sanguinis mittum & gonorrhœam, a laxitate partium ortam, suppressendum arridet, ut a tali suspecto remedio abstineant, monemus.

NITRUM TABULATUM.

Videatur LAPIS PRUNELLÆ.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur, ut conchæ citratæ, atque Effectu diaphoretico, bezoardico & diuretico præcellunt præparatis.

OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapilli Cancrorum crudi aliquoties aqua fontana abluuntur, & rursus ficcati, in pollinem subtilem teruntur, atque per linteum trajecti, servantur.

Absorbentes sunt, diuretici, & in variis morbis locum habent.

Commendari a scrupulo uno ad scrupulos duos solent.

OLEUM ABSINTHII PER INFUSIONEM.

REC. Olei Olivarum libras tres, Comarum Absinthii recentis contusarum uncias viginti tres, Rosarum rubrarum unciam unam.

Macerentur per triduum, in loco calido, deinde leni igne coquantur, ad humiditatis consumptionem, exprimantur, & oleum colatum fervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhœa, & ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodest.

OLEUM AMYGDALARUM.

Amygdalæ non rancidæ, contusæ, & sacco inclusæ, prelo calido exprimuntur succ-

ſucceſſive, donec omne oleum fuerit expreſſum.

Datur interne in pleuritide, nephritide calculoſa, colica ſpasmotica, ad ſtriſturas dolorificas relaxandas; conducit etiam recens natis, ad educendum meconium, cum manna; prodeſt in raucedine & tuffi &c.

Dofis a drachma una ad unciam dimidiam; clyſteribus ad unciam unam ſemis, vel duas additur.

OLEUM ANAGALLIDIS.

REC. Herbæ recentis Anagallidis conquaſſatæ,
Olei Olivarum ana partes æquales

Coquantur lento igne, ad conſumptionem humiditatis, exprimantur & colentur.

Pro præſentaneo habetur remedio ad puerorum morbos, colicos inprimis dolores, a flatulentia ortos.

Exterius applicatur illinendo abdomen, vel in clyſteribus.

OLEUM ANETHI.

Eodem modo paratur, ut modo deſcriptum Oleum Anagallidis.

Vires ſunt carminativæ & anodynæ; ad clyſteres præſcribitur, nec non ad tormina infantum, cum unguentis & aliis carminativis.

OLEUM BEZOARDICUM WEDELII.

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias duas,
Camphoræ drachmas duas.

Solvatur camphora in oleo per digeſtionem, oleum tingatur radicibus Alkanæ, atque cum
Olei de Cedro drachma ſemis permisceatur.

Commendatur ab auctore in febris malignis & inflammatoriis, & a nonnullis pro ſacra ancora habetur. Unde nomen: Dr. Wedels letzte Tropfen.

Dofis guttæ quinque ad decem.

OLEUM CAPPARUM.

REC. Corticis radicis Capparum unciam unam,
Tamarifci,
Cyperi ana drachmas duas,

Ceterach,

Rutæ ana drachmam unam.

Seminis Agni caſti drachmas duas.

Trita &

Vini libra ſemis infuſa, poſt biduum, cum
Olei Olivarum libra una
coquantur, ad humiditatis conſumptionem, colentur & exprimantur.

Vires ſunt attenuantes & reſolventes; in affectibus lienis potiſſimum commendatur.

OLEUM CARMINATIVUM.

REC. Herbarum recent. Anethi,
Menthæ,
Abſinthii,
Pulegii,

Florum Chamomillæ vulgaris ana
uncias quatuor.

Incifa & contuſa coquantur in
Olei Olivarum libris duabus,
ad humiditatis conſumptionem, exprimantur & colentur. Oleo adde
Olei laurini expreſſi uncias tres.

Serventur.

Virtutes nomen indicat, egregium enim eſt carminativum, quo puerorum tenellorum abdomen inungitur, tormina flatulenta mitigat.

OLEUM CASTOREI.

REC. Caſtorei drachmas duas,

Cyperi,

Pyrethri,

Sabinæ,

Schœnanthi ana drachmas duas ſemis,

Spicæ Indicæ,

Caſſiæ ligneæ veræ,

Coſti,

Cubearum,

Croci ana drachmas duas,

Piperis longi,

nigri ana drachmas duas ſemis,

Vini albi generoſi libram ſemis,

Olei Olivarum puriſſimi libram unam ſemis.

Omnia in pulverem redaſta & vino irrigata,
oleo ſuperfuſo digerantur, in vaſe bene clauſo,
E e 2

fo, igne arenæ, per plures dies, ad omnis humiditatis consumptionem; exprimantur & reponantur.

Commendatur ad nervorum affectus, prodest membris paralyticis & tabidis, nec non ad uteri affectus.

OLEUM CHAMOMILLÆ.

Paratur ex floribus eodem modo, quo Oleum Anagallidis.

Carminativum est & anodynum, ventris torminibus succurrit, nec non in febris intermittentibus spina dorsi illo inungitur; ad colicos dolores clysteribus additur.

OLEUM CHEIRI.

REC. Florum Cheiri,

Olei olivarum ana libram unam.

Coquantur, post macerationem aliquot dierum, ad consumptionem humiditatis; expressum & colatum oleum fervetur.

Usus, uti reliquorum oleorum per infusionem paratorum, est externus; virtute gaudet anodyna & resolvente, præsertim ad uteri affectus, ubi ad menses & fætum mortuum pellendum, ad lochia retenta & dolores post partum commendatur.

OLEUM COLOCYNTHIDIS.

REC. Olei Abinthii, per infusionem parati,

Rutæ,

Fellis bubuli ana libram semis,

Fructus Colocynthidis,

Radiciis Hellebori nigri ana drachmam unam.

Colocynthis & Helleborus niger cum

Aquæ fontanæ unciis duabus in mortario ad pultis formam contundantur, atque, oleis & felli additis, ad consumptionem humiditatis, leni igne, coquantur, exprimantur, & oleum per linteum colatum fervetur.

Anthelminticum est, & alvum solvit, abdomini illitum.

OLEUM COSTINUM.

REC. Costi amari, sive corticis Winteriani uncias duas,

Majoranæ florecentis uncias octo.

Contusis superfunde

Olei Olivarum clari, albi, recentis libram unam semis,

Vini albi uncias duas.

Digerantur in vase clauso ad humiditatis consumptionem, exprimantur & percolentur.

Nervinum est, & ad paralyticam relaxationem emendandam commendatur.

OLEUM EUPHORBII.

REC. Euphorbii triti unciam semis,

Olei Cheiri uncias quinque.

Coque, additis

Vini unciis duabus,

ad humiditatis consumptionem.

Oleum coletur, ac fervetur.

Commendatur ad affectus nervorum, sic dictos, frigidos; paralyticis & atrophicis membris conducit.

OLEUM FLORUM SLOANI.

REC. Olei Olivarum libras sex,

Catulorum juniorum numero duos,

Ranarum viventium numero duodecim,

Lumbricorum terrestrium viventium uncias quatuor,

Aquæ fontanæ libras tres.

Coquantur lento igne, donec caro catulorum ab ossibus secedat, & fere omnis humiditas consumpta sit. Coletur oleum, & addantur

Axungiae Hominis,

Muris alpini,

Olei Amygdalarum dulcium,

Scorpionum ana unciae sex,

Florum recent. Primulæ veris,

Tussilaginis,

Betonicæ,

Genistæ,

Chamomillæ romanæ,

Violarum,

Liliorum convallium,

Lavendulæ,

Sambuci,

Anethi,

Salviæ,

Cheiri,

Rutæ,

Serpilli,

Florum

Florum recent. Anthos,
 Centaurii minoris,
 Veronicæ,
 Origani,
 Tanaceti,
 Ligustri,
 Agrimonizæ,
 Pulegii,
 Meliloti,
 Verbasci,
 Absinthii vulgaris,
 Rosarum ana uncia semis,
 Hyperici libræ quatuor.

Macerentur & digerantur calore balnei, postea
 oleum exprimatur, coletur & fervetur.

*Habetur pro anodyno, nervino, vulnerario, anti-
 spasmodico & antinephritico.*

Nota: Flores seligi, & a calicibus atque fo-
 liis, quantum licet, separari debent; alias
 oleum, quod rubrum esse debet, virefcit.

OLEUM FORMICARUM.

REC. Formicarum uncias quatuor,
 Olei libram unam.

Macerentur leni calore diebus viginti, postea
 colatum oleum reponatur.

*Laudatur ad partes genitales roborandas, & mem-
 bra paralytica confortanda.*

OLEUM EX FRUCTU CACAO,
 feu
 BUTYRUM CACAO.

REC. Fructuum Cacao libram unam.

Leviter in sartagine torrefactos & a corti-
 ce mundatos, vel super lapidem cale-
 factum tere, vel in mortario calido
 contunde; contusos in

Aquæ communis libris octo,
 bullire permittite, donec oleum superna-
 tet, quod concretum ex aqua refrige-
 rata colliges.

Sebi iusto magis costi colorem & confi-
 stentiam habet, qui autem, ablutione
 sæpius repetita per aquam calidam,
 albicans redditur.

Habetur etiam alius parandi modus, per
 tostionem nucleorum lenem, & dehinc

Pars II.

expressionem; quale vero butyrum co-
 loris est magis fusci, sed virium æqua-
 lium, si non superiorum.

*Recens paratum præbet medicamentum pecto-
 rale, antipleuriticum, antinephriticum, &
 antispasmodicum egregium, gustu gratis-
 simum, & oleo Amygdalarum substitui,
 quin præferri potest.*

*A drachma una ad duas, vel tres, cum potu
 calido lactis, jusculi, Theæ vel Coffee,
 sumitur; externe ad fissuras labiorum &
 mammarum, non sine fructu, abhibetur.*

OLEUM HYOSCYAMI.

REC. Seminum Hyoscyami quantum vis.
 Contundantur, torreantur & expriman-
 tur.

*Est paregoricum, & affluxum nimium cohi-
 bet; ad Emplastrum de Hyoscyamo requi-
 ritur.*

OLEUM HYPERICI.

REC. Florum Hyperici, ad maturitatem
 feminis fere accedentium, con-
 tusorum libras tres,
 Vini albi libram semis,
 Croci scrupulos quatuor,
 Olei clari libras duas.

Post factam trium dierum macerationem,
 bulliant ad humiditatis consumptionem,
 postea exprimantur, & expressum com-
 misceatur cum

Terebinthinæ claræ libra una.

*Vulnerarium & paregoricum præbet egre-
 gium, in affectibus nervorum, a convulsio-
 ne & luxatione ortis, nulli cedit.*

OLEUM LAURINUM.

Raro, vel nunquam apud nos paratur, sed
 ex Insulis Fortunatis nobis adfertur; cui
 vero volupe erit, oleum hoc parare,

REC. Baccarum Lauri maturarum recen-
 tium quantum voluerit;

Tritæ in aqua fontana coquantur, & for-
 titer exprimantur; refrigeratum oleum,
 pinguedinis instar, aquæ supernatans
 colligatur.

Ff

Est

Est carminativum, nervinum, & ad affectus uteri, spasmos, colicam flatulentam, tormina & lumbricos infantum, nec non ad roborandos articulos valde proficuum. Laudatur etiam ad aurium dolores & auditus gravitatem, auribus instillatum; ubi tamen oleum amygdalarum amararum, vel aliud minus acre admisceri debet.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

REC. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, libras duas, Olei Olivarum recentis albi libras tres.

Macera & digere per dies octo, postea coque & exprime.

Virtute gaudet emolliente, anodyna & lubricante.

OLEUM LINI EXPRESSUM.

E Semine Lini contuso & parum tosto exprimitur, & per digestionem in sole depuratur.

Contra pleuriticos dolores specificum habetur, tam interne a dimidia ad integram unciam, cum jusculo exhibitum, quam externe, cum lana vel panno, calide regioni dolenti applicatum. Conducit etiam in aliis affectibus pectoris; externe ad ambusta & hæmorrhoidum cæcarum dolores commendatur.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

REC. Lumbricorum terrestrium libram unam. Laventur in vino, deinde immittantur in

Olei libras duas;

Coquantur ad humidi aquosi consumptionem; oleum coletur.

Sunt, qui interne pro vulnerario præscribunt; externe est pæregoricum nervinum & ad dolores spasticos atque contracturas utiliter adhibetur.

OLEUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ Majoranæ,

Olei Olivarum ana libram unam.

Coque, post macerationem per aliquot dies, lenissimo igne, & expressum serva.

Resolvit & roborat, & ad Emplastrum Meliloti requiritur.

OLEUM MASTICHINUM.

REC. Olei Rosati libram unam, in quo, leniter coquendo, dissolve Mastiches uncias tres.

Fiat colatura.

Vomitus & alvi fluxum sedat, partesque laxas roborat.

OLEUM MENTHÆ.

Ex Mentha crispa & oleo olivarum, sicut Anethi oleum, paratur.

Vires sunt stomachicæ & carminativæ.

OLEUM MOMORDICÆ.

REC. Fructuum Momordicæ maturorum, contusorum libram unam, Olei Lini libram unam semis.

In figulino vitreato vase ponantur supra cineres calidos, per viginti quatuor horas, dein leni calore per horam ad humiditatis consumptionem coquantur, colentur & exprimantur;

Oleum expressum, cum

Fructuum Momordicæ æquali quantitate,

secunda vice coquatur, præscripto modo, & servetur.

Ad fissuras mamillarum, hæmorrhoidum dolores, ambustiones & vulnera commendatur.

OLEUM five LIQUOR MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

Ova recentia, ad duritiem cocta, per medium dissecantur, vitellis exemptis, cavitas pulvere Myrrhæ electæ repletur, duo hemisphæria ovi iterum conjunguntur, atque filo leviter ligata, super craticulam locantur, atque in cellam reponuntur. Sic dissolvetur Myrrha in liquorem rubrum.

Medicamentum est balsamicum, ad fissuras mammarum, ulcera oris aliæque summe commendabile.

OLEUM.

OLEUM NICOTIANÆ.

REC. Foliorum recentium Nicotianæ, concisorum & contusorum, libram unam.

Coquantur lento igne, ad humiditatis consumptionem, in

Olei Olivarum unciiis sedecim.

Oleum expressum ferva.

Laudatur ad hypochondriorum inflammationes, membra paralytica fovenda, & tumores discutiendos; scabiosis & ambustis etiam convenit.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur, ut Oleum Amygdalarum.

Easdem vires habet cum Oleo Amygdalarum, modo sit recens & non rancidum. Inveteratum vero a pictoribus expetitur.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Nuces Moschatæ contusæ aquæ calidæ vapore irrigantur, & dum adhuc calent, oleum exprimitur.

Raro apud nos paratur, ex India enim Orientali copiose advehitur.

Vires sunt roborantes & anodynæ. Datur etiam interne tam pueris, torminibus alvi vexatis, quam adultis adversus vomitus & alvi fluxum; externe ad capitis dolores, somnum conciliandum, ventriculum roborandum, flatu discutiendos, &c. adhibetur. Inservit etiam pro Balsamorum corpore.

Dosis interne pueris teneris a grano uno ad duo, adultis ad scrupulum unum & dimidium.

OLEUM OVORUM EXPRESSUM.

REC. Ova recentia coque, ut indurentur, postea vitellos exime, contritos atque in sartagine, donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant, leniter affatos adhuc ferventes, & forti sacco inclusos, exprime. Est oleum blandum, demulcens.

Laudatur ad hernias, fissuras papillarum & labiorum, ad ambusta, hæmorrhoidum

OLEUM.

115

dolores, implendas foveas post variolas, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia.

Cavendum autem est, ne in usum vocetur, quod vetustate acrimoniam rancidam contrahit.

OLEUM PAPAVERIS EXPRESSUM.

Præparatur, ut Oleum feminis Hyosciami.

Ad usus culinarios & mechanicos, præcipue a pictoribus, expetitur; in Medicina habetur anodynum, ad somnum invitandum & dolores leniendos.

OLEUM ROSATUM.

REC. Olei communis libras quinque, Rosarum Damascenarum contusarum libras quatuor.

Macerata & insolata, per dies octo, ad humiditatis consumptionem coque, exprime & cola.

Refrigerat, demulcet & ambustis medetur.

OLEUM RUTÆ.

E foliis Rutæ recentibus & oleo Olivarum, fumendo amborum æquales partes, coctione & expressione paratur.

Anticolicum, anthelminticum & nervinum est; adhibetur externe, & clysmatibus additur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

REC. Scorpionum numero quinquaginta, Olei Olivarum libram unam.

Macerentur in vase vitreo, dies viginti, in loco calido, postea ad usus reponatur oleum.

Ad urinam & calculum pellendos externe, regioni renum & pubis illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.

OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM.

Paratur, si ingredientibus prioris compositionis adduntur:

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Gentianæ,

Cyper,

Corticum

Corticum radicum Capparum, ana drachmæ sex.

Ad eosdem usus olim commendabatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

REC. Florum recent. Violarum,
Sambuci,
Rosarum,
Chamomillæ vulgaris,
Liliorum alborum,
Verbasci,
Malvæ arboreæ ana libram semis.

Colligantur flores suo tempore, & in Olei Olivarum libris sex macerentur, coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem, & expressum oleum fervetur.

Paregoricum est, nimias tensiones relaxat, pleuriticis & tabidis inunctum convenit.

OLEUM SPERMATIS RANARUM.

REC. Spermatidis Ranarum,
Olei communis ana partes æquales.

Coquantur simul igne lento, ad consumptionem partis aquosæ, deinde colentur & ferventur.

*Raro in usum vocatur, sed pro emplastri confectio-
ne paratur; anodynum est, refrigerat, &
ad ambusta inservit.*

OLEUM VERBASCI.

E floribus Verbasci paratur, sicut Oleum Liliorum alborum superius descriptum.

Demulcet, dolores mitigat, ad hæmorrhoides & ambusta laudatur.

OLEUM VIOLARUM.

REC. Florum Violarum, &
Olei Olivarum anaticas partes;
ad humiditatis consumptionem coquantur & oleum expressum fervetur.

Refrigerans & anodynum est, magnopere laudatur ad dolorem hæmorrhoidum, altius sedentem, per syringam tepide injectum.

OLEUM VULPINUM.

REC. Vulpem integram vegetam, detracta pelle & exemptis interaneis,

Aquæ fontanæ libras sex,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciantur Anethi,
Thymi ana libra una.

Coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur; dein coletur oleum.

Ad affectus nervorum frigidos & articulos rigidos commendatur.

OLEUM ABSYNSHII DESTILLATUM.

REC. Summitatum Absinthii, cum semine maturitati proximo, in umbra siccatarum, libras viginti quinque.

Incisæ & conquassatæ macerentur per tri-
dium, in

Aquæ fluviatilis libris septuaginta quinque;

additis

Salis communis libris tribus;

Destillantur postea e vesica, ad tertiam partem repleta, & oleum aquæ innatans separetur.

Eodem modo parantur olea destillata sequentia.

OLEUM ARTEMISIÆ,
CHAMOMILLÆ,
CHÆREFOLII,
HYSOPPI,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
MELISSÆ,
MENTHÆ CRISPÆ,
PIPERITIDIS,
MILLEFOLII,
ORIGANI,
PULEGII,
RORISMARINI,
RUTÆ,
SABINÆ,
SALVIÆ,
SATUREJÆ,
SERPILLI,
TANACETI,
THYMI.

OLEUM.

OLEUM ANETHI.

REC. Seminis Anethi contusi libras quatuor,

Infusum

Aquæ fluviatilis libris sedecim,
ac per triduum, addita
Salis libra una,
maceratum, destilletur e vesica, &
oleum, ut moris, ab aqua separetur.

Eadem encheiresi destillantur reliqua olea ex seminibus:

OLEUM ANGELICÆ,
ANISI,
CARVI,
CORIANDRI,
CUMINI,
FOENICULI,
JUNIPERI E BACCIS,
LAURI E BACCIS,

OLEUM CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum libras duas.

Tritis affunde

Aquæ pluviae libras sedecim,
adde

Salis communis uncias quatuor;

Stent per quinque vel sex dies in loco calido, postea destilla e vesica, sic prodit una cum aqua oleum Caryophyllorum, omnis coloris expers, quod fundum petit.

Pari modo parantur

OLEUM CARDAMOMI,
CINNAMOMI,
MACIDIS,
PIPERIS.

OLEUM LIGNI SASSAFRAS.

REC. Rasuræ ligni Sassafras libras sex,
Aquæ fluviatilis libras triginta sex,
Salis culinaris libram unam.

Macerentur per quatuor vel quinque dies in conclavi calido, postea destillentur per vesicam, sic prodit oleum cum aqua, non more aliorum supernatans, sed fundum petens, in spiritu vini dissolubile.

Pars II.

OLEUM.

117

Ex residuo parari potest extractum, maceratio vero absque salis additione instituenda est.

Eodem modo destillantur

OLEUM LIGNI RHODII,
SANTALI CITRINI,
CALAMI AROMATICI,
ZEDOARIÆ,
ZINZIBERIS.

*Ut genuina habeantur olea hæc; pharmaco-
pœi illa ipsi destillare debent; omnia enim,
quæ ex Batavia, vel aliunde advehuntur,
adulterata deprehenduntur. Caveant au-
tem, ne, addita Terebinthina in destilla-
tione, & ipsi olea, ad augendam eorum
copiam, inficiant.*

*Præstat, ad largiorem olei separationem,
aquam semel destillatam, oleo jam impræ-
gnatam, partitæ vegetabilis, ex quo oleum
desideratur, portioni reaffundere, quam
novam adhibere.*

*Nimis longum esset, de singulorum viribus
hic dicere; æstimandæ videntur e simplici-
bus, unde destillata sunt. Raro interne
sumuntur: sanguinem enim, præsertim in
hominibus, temperamento calido præditis,
& ad ebullitionem sanguinis pronis, nimium
commovent. Guttæ vero aliquot Saccharo
instillatæ, & Elæosaccharum, quod pul-
veribus additur, vel ad gratum sapo-
rem conciliandum, vel ad vires augendas,
nonnunquam præscribuntur. Externe ad-
hibita sunt cephalica, nervina, antispas-
modica, stomachica, carminativa, & vir-
tute sua balsamica roborant.*

OLEUM ANIMALE AD MODUM DIPPELII.

REC. Olei destillati foetidi cornu Cervi,
vel alius animalis, libras qua-
tuor, vel quantum libet,

Affunde

Aquæ tepidæ libras sex.

Conquassa simul, tunc solvatur in hac aqua
sal ille, qui oleo acrimoniam concilia-
vit, & quo separato, mitius evadit.
Oleum ab aqua per separatorium libe-
retur. Immittatur deinde retortæ fatis
capaci,

Gg

capaci, ea observata encheiresi, ut rostrum, immisso in bulbum oleo, accuratissime mundetur, & in excipulum magnum, calore moderato, destilletur, sensim augendo ignem, usque ad supremum gradum, cujus arena capax est, donec nihil amplius ascendat. Rectificatione & destillatione ita, semper ex nova retorta, sæpius, exempli gratia, vices vel trices repetita, acquiritur oleum, spiritus instar, tenue, una cum liquore pellucido, quod fervetur.

Penetrantissimum est, si rite paratum sit, odore & sapore haud ingratum; anodynum, resolvens, febrifugum, nervis amicissimum, antepilepticum.

Dosis guttæ sex, quindecim, ad triginta, e vehiculo largiore.

Ipse Dippelius e sanguine cervino, exsiccato, per retortam destillavit, & oleum hinc eductum quadragesies rectificavit. Breviori via idem Auctor oleum, additione calcis vivæ, destillare docuit.

Modus autem omnium optimus & minime dispendiosus, oleum empyreumaticum clarum & minus foetidum reddendi, secundum *Model in Commercio Nor.* 1741. in eo consistit, ut caute administrato igne destillans primum oleum limpidum ab insequente magis jam flavescente, & ita secundum a tertio, mutato excipulo, separatur. Hoc quippe modo portio olei minus tincta vel una rectificatione, posteriores una alterave cohobatione, lenissimo identidem igne, & mutato solite excipulo, peracta, desideratum largientur limpidum Oleum. Ne color limpidus brevi tempore iterum in flavescentem & successive in nigrum mutetur, opus est, ut in vitris parvis, nonnisi drachmam unam capientibus, plenis, probe munitis, in loco frigido, oleum hoc aservetur. Si nihilominus successu temporis desideratum colorem amisit, unica destillatione restitui potest.

OLEUM ASPHALTI.

REC. Asphalti pulverisati libram unam, Arenæ lotæ libram unam & dimidiam.

OLEUM.

Immittantur retortæ & fiat fortiore igne destillatio. Liqueor aquosus primo prodiens separetur ab oleo subsequente nigro.

Ingratissimi saporis & odoris hoc oleum est; impense recentius a nonnullis laudatur in phthisi, urgente quoque febre hectica & ipsa jam diarrhæa colliquativa affligente, & vel cum saccharo vel alio adæquato vehiculo ad guttas decem vel quindecim datur.

OLEUM BENZOES.

REC. Gummi Benzoës probe triti, quantum placet; e retorta vitrea, igne arenæ moderato, destilla in vas recipiens, cui aquæ fontanæ aliquot unciae sunt immisæ; finita destillatione, flores & oleum ab aqua separa, & seorsim serva.

Additur oleum unguentis & suffimentis, ut odorem illis conciliet.

OLEUM BUXI ET GUAYACI.

E scobe ligni per retortam destillantur; prodit primo phlegma, postea spiritus acidus, & tandem oleum nigrum crassum, quod, ab acido spiritu separatum & rectificatum, reponitur.

Olea empyreumatica septica sunt, & non, nisi ad guttas quatuor vel quinque, interne ad gonorrhæam virulentam &c. adhiberi possunt; externe ad dentium cariem & inde ortos dolores commendantur.

OLEUM CAMPHORÆ LIQUIDUM ET BUTYRACEUM.

REC. Camphoræ libram semis, Boli rubræ, vel terræ argillacæ ficæ libras duas.

Optime permixta e retorta, lenissimo igne destillantur, sic prodit, cum phlegmate acidulo, Oleum Camphoræ liquidum, subtilissimum, & in fine, in collum retortæ sublimatur oleum, butyri instar, quæ singula seorsim servanda.

Penetrantissimum hoc oleum, quod subtilissima pars camphoræ est, ad defluxiones catarrhales, & dolores dentium, a causa frigida ortos, commendatur, atque illos, externe

terne applicatum, quasi in momento sedat. Ad condienda insecta minora etiam adhibetur.

OLEUM CERÆ.

REC. Ceræ flavæ odoratissimæ libram unam.

Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortæ orificio commode possint immitti, eaque repleti ad dimidium. Tum infundatur arenæ purissimæ tantum, quantum capit venter retortæ; calefiat tum lente retorta, donec cera liquefscens arenam sibi permiscuerit, & imbibere sitis; imponatur furno arenæ, instituatur, applicato excipulo, destillatio: Adhibito primo leni ignis gradu prodire solet aqua acidula, foetens, pauca, una cum spiritu; calore deinde aucto, ascendet sensim oleum tenue, dum destillat, in excipulo, instar butyri, concrefscens; hoc, ubi ultra prodire negat, major adhibendus est ignis, & quidem fortis suppressionis, cujus ope ascendet mox tota massa ceræ in excipulum, sub forma butyri. Butyrum hoc ceræ, sine ulla additione, ex retorta, lenissimo ignis gradu, iterum destillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyrosum seorsim excipi.

Sunt, qui hoc tenue ceræ oleum etiam interne adhibent; est enim diureticum, valde penetrans, ad guttas tres vel sex datum; propter nimiam vero acrimoniam, cautius eo utendum esse censemus. Externus vero ejus usus eo frequentior esse solet, & remedium præbet vix ulli alteri comparandum, ad mala papillarum nervosarum, quæ in cute extrema denudata sunt, ad fissuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades; ad tumores atque perniones a frigore inductos, & tendines contractos, quin adstrictæ alvo lubricitatem conciliare, in infantum morbis, abdomini illitum, quidam volunt.

OLEUM CORNU CERVI.

REC. Cornuum Cervi frustillatim concisorum, quantum placet.

Immitte retortæ lutatæ, aut cucurbitæ ferreæ, alembico terreo vitriato munitæ, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem usque retortæ, aut cucurbitæ, administrato, omnes, cum phlegmate, fale volatili ac oleo, spiritus evoca, quæ omnia a se invicem separa, & seorsim ferva.

Raro interne adhiberi solet, sed oleum animale Dippelii inde parari potest.

OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum recentium Aurantium, quantum placet.

Incisi, cum sufficiente aqua fontana, absque maceratione, e vesica destillentur, ac oleum, ut in reliquis, aquæ innatans, lege artis separetur.

OLEUM CORTICUM CITRI.

Eadem methodo paratur, qua præcedens.

OLEUM GALBANI.

REC. Gummi Galbani electi libram unam, Arenæ lotæ libram unam semis.

Destillentur igne arenæ, per retortam vitream, liquor albus, qui cum oleo prodit, separetur, atque oleum rectificetur.

Laudatur præcipue in doloribus colicis, hysteriis & spasmodicis, umbilico illitum.

Eodem modo parantur

OLEUM AMMONIACI,
MASTICHES,
MYRRHÆ,
TACAMAHACÆ.

NB. Myrrha etiam oleum suavissimum, sed exigua quantitate, destillatione cum aqua fontana instituta, reddit.

OLEUM CUM LATERIBUS DESTILLATUM,
PHILOSOPHORUM DICTUM.

Lateres novi in grossum pulverem contundantur, atque bene calefacti oleo olivarum, quantum imbibere possunt, saturantur, retortæ vitreæ immittantur, & igne arenæ per gradus aucto, oleum

proliciat, quod super cineres rectificetur.

Præferenda est præparatio, si loco laterum calx in aëre dilapsa sufficiente olei olivarum vel lini quantitate imprægnatur, inde oriens puls retortæ ferreæ immittitur, destillatur, & oleum ab aqua simul prodeunte ope vitri hypocleptici separatur.

Resolvens ac attenuans est medicamentum; septicam etiam habet virtutem, & ad mundificanda ulcera adhibetur.

OLEUM SAPONIS.

REC. Rasuræ saponis Veneti libram unam, Arenæ mundæ libras tres.

Mixta e retorta, igne arenæ, destillentur, oleum super cineribus rectificetur.

Sugillationes & tophos resolvit, spasmis & dentium doloribus medetur, septicum præbet ad ulcera mundificanda, atque pannos in oculis brutorum extirpandos; interne, ob vim sanguinem commovendi, raro, vel nunquam datur.

OLEUM SUCCINI.

REC. Succini contusi libras tres.

Ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito, destilletur. Vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in eo solvatur; eluatur, quæ per chartam emporeticam, prius aqua madefactam, ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem, sal colligatur; oleum vero, cum duabus partibus cinerum mixtum, e retorta, lento igne, rectificetur, oleum limpidum primo exstillans album; & alterum subsequens rubrum, singula seorsim ferventur.

Oleum Succini multum convenit cum Oleo Petræ, & egregium resolvens, diaphoreticum, diureticum & emmenagogum, calidum tamen & valde acre est; in parva igitur dosi exhibendum; sufficiunt guttæ quinque vel decem. Externe ad cephalalgiam & membra paralytica, nec non ad rheumaticos dolores adhibetur.

OLEUM SULPHURIS.

Est spiritus sulphuris per campanam concentratus.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ pellucidæ, quantum vis,

Aquæ fontanæ sextuplum.

Destillantur lento igne, ex vesica, sicut alia olea destillata; post destillationem oleum ab aqua separetur ac fervetur.

Residuum in vesica præbet TEREBINTHINAM COCTAM, vel, ulteriore coctione absque aqua instituta, in COLLOPHONIUM reducitur.

Laudatur ejus vis diuretica, & in gonorrhœa frequenter dari solet; calidum est, igitur circumspicte adhibendum.

Dosis a guttis sex, ad viginti. Usus externus multiplex est, ad vulnera & puncturas membranarum, tendinum & nervorum, si calidum instilletur, præbet anodynum, antispasticum & consolidans. In hæmorrhagiis, ex arteriarum & venarum vulneribus promptissimum est stypticum, modo calidum applicetur, & splenis appressis ad locum detineatur.

OLEUM VITRIOLI.

Per destillationem spiritus Vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur oleum acerrimum concentratum ponderosum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario Vitrioli Goslariensis decem libræ olei prodeunt, & circiter libræ viginti spiritus & phlegmatis.

Ad usus chymicos & pharmaceuticos varios adhibetur.

OLEUM PETRÆ album,
rubrum,
nigrum, &

TERRÆ.

Videantur in Materiæ Medicæ Regno minerali.

ORVIETANUM.

REC. Radicum Angelicæ,
 Aristolochiæ utriusque,
 Bistortæ;
 Carlinæ,
 Contrayervæ,
 Fraxinellæ,
 Gentianæ,
 Imperatoriæ,
 Pentaphylli,
 Serpentariæ Virgin.
 Tormentillæ,
 Valerianæ,
 Zedoariæ,
Folior. Cardui benedicti,
 Pulegii,
 Rutæ hortensis,
 Sabinæ,
 Scordii,
 Succisæ,
Florum Hyperici,
Corticum Aurantiorum,
 Citri,
 Cinnamomi,
Baccarum Juniperi,
 Lauri, ana unciam unam,
 Viperarum exsiccatarum uncias duas,
 Fiat omnium pulvis, qui excipiat
 Roob Juniperi,
 Mellis despumati ana libris tribus;
 Optime mixtis addantur
 Theriacæ Andromachi,
 Mithridatii, ana uncis duæ,
 Olei Rutæ destillati,
 Olei Succini albi,
 Caryophyllorum,
 Juniperi ana scrupulus unus.

Reponantur in vase figulino probe vitreato.
 Variæ circumferuntur hujus antidoti descriptiones. Hanc Emanuel König nobis suppeditavit, quam, utpote compendiosiore & optimam, paucis tamen immutatis, adponere volumus.

Nomen Orvietanum, ab Inventore circumforaneo, ex urbe Orvieto, cui, tradente B. Schulzio, nomen fuit Hieronymus Ferrantes, & qui fiducia ejus primus ausus fuit, publi-

Pars II.

co foro deglutire ignotum sibi quodlibet toxicum.

Ex simplicibus, alexiteriis virtutibus præditis, paratum est, atque a multis, Theriacæ, si non præfertur, tamen æquiparatur. Viliori etiam pretio constat, & quia Opio caret, secure in morbis contagiosis, dysenteria, febribus malignis &c. Pauperibus, nec non pecudibus, exhiberi potest, si tam multiplex farrago placet.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

OXYMEL COLCHICUM.

REC. Radicis Colchici recentis, in principio æstatis collectæ, succulentæ, in tenues taleolas sectæ, unciam unam.

Aceti vini libram unam.

Hæc lento igne in phiala vitrea invicem digere per quadraginta octo horas, sæpius tamen phialam agitando; dein colaturam leviter exprime. Adde hujus

Aceti Colchici rite parati libræ uni,
 Mellis puri libras duas.

Misce, & supra leni igne, sæpius agitando cochleari ligneo, coque ad mellis consistentiam.

Oxymel hoc colchicum grate acidum, saporis leviter adstringentis tuto interne exhiberi posse asserit Stærckius, nec ullas excitare turbas, nec tenesmos. Efficaciam quandoque summam in morbis maxime desperatis; ubi alia remedia fuerunt inertia, expertus est. Convenire ubique, ubi serum abundans debet per urinæ vias expelli, affirmat; hinc illud maximum diureticum, Hydropicis præprimis proficuum perquam laudat. Idem remedium promovere sputa, inde mitigari tussim, & fieri respirationem liberam, observavit.

Datur in principio bis per diem drachma una hujus oxymellis homini adulto: Diluitur in vasculo Decocti, vel infusi cujusdam congrui. Augetur, dum ægri facile ferunt, & effectus inde debitus non habetur, secundo vel tertio die dosis, ascendendo, si opus, sensim ad unciam unam, vel unciam unam semis per diem.

OXYMEL SCILLITICUM.

E mellis despumati libris quatuor, ac
 Aceti scillitici libris duabus,

Hh

in

OXYMEL. PANIS.

in vase figulino vitreato, ad justam consistentiam coquitur.

Ad pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollendos, nec non asthmaticis commendatur. Humores crassos, viscidos, indeque ortas obstructions resolvit.

Dosis drachmæ tres, ad drachmas sex.

OXYMEL SIMPLEX.

REC. Mellis despumati libram unam,
Aceti Vini albi libram semis.

Coquantur in vase figulino probe vitreato, ad syrupi consistentiam, ferventur in vase vitreo.

Ufus est in gargarismis aliisque variis morbis.

PANACEA MERCURIALIS.

Est mercurius dulcis, septies vel decies sublimatus atque optime tritus.

Repetita sublimatione Mercurius dulcis omnem fere deponit vim laxantem. Datur hæc Panacea delicatioribus in morbis lymphæ, & a visciditate humorum ortis.

Dosis grana octo, ad grana quindecim.

Si

Panacea mercurialis

cum

Sulphuris Antimonii aurati tertiæ præcipitationis, æquali portione diuturno tritu in pulverem subtilem miscetur, PULVIS ALTERANS PLUMERI, in *Actis Edinburgensibus* adeo laudatus, obtinetur.

Præstantissimum est medicamentum resolvens, & impuritates lymphæ corrigens. Dosis septem vel octo granorum mane & vespere, vel continuato usu raro salivationem excitat.

PANIS CYDONIORUM CUM AROMATIBUS.

REC. Pulpæ Cydoniorum coëtorum, per cribrum trajectæ, libras octo,
Sacchari albi libras quatuor.

Evaporent ad justam consistentiam, adde Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,

PASSULÆ. PASTA.

Cinnamomi acuti, minutim incisi,
Flavedinis corticum Citri recentium incisorum, ana drachmas sex.

Misceatur & effundatur pasta in scatulas.

Leniter corroborat; hinc ad ventriculorum & intestinalium relaxata, atque inde ortas diarrhæas delicatulis exhiberi potest.

Dosis uncia semis, ad integram.

Paratur etiam sine aromatibus, & calidis biliosisque ad eosdem usus commendatur.

PASSULÆ ET PRUNA LAXATIVA.

REC. Foliorum Sennæ electorum uncias quatuor,

Zinziberis albi drachmam unam semis,
Cinnamomi drachmas duas.

Infundantur

Aquæ fontanæ ferventis unciis decem.

Digerantur in loco calido per biduum, postea exprimantur, expressio adde.

Sacchari albi libram unam;

Solvatur Saccharum unica ebullitione, & per pannum colatus syrupus superfundatur,

Passularum minorum, vel Prunorum Damascenorum enucleatorum, in aqua fontana ad mollitiem coëtorum, & a superflua humiditate, modica exsiccatione, liberatorum, libræ uni.

Alvum leniter subducunt, & pueris atque aliis medicamenta laxantia reformulantibus exhiberi solent.

Dosis uncia dimidia ad duas.

PASTA ALTHÆÆ, (Gallis PATE DE GUIMAUVE.)

REC. Radicis Althææ recentis, in taleolos dissectæ, uncias quatuor.

Bulliant in

Aquæ fontanæ libris octo, ad dimidiæ partis consumptionem; in colatura dissolvantur

Gummi Arabici albissimi & purissimi libræ duæ semis,

Sacchari albissimi totidem.

Colentur, & igne lento, ad spissitudinem extracti, continuo spatula movendo, humor exhalet. Ab igne remota agitentur

tentur multum & celeriter, quo albe-
scant, & subinde inspergendo.

Albuminum, e fex ovis recentibus,
in spumam conquassatorum,
Aquæ Naphæ odoratissimæ unciam
semis.

lento calore, sub perpetua agitatione, in-
spissetur, usque dum manibus non ad-
hæreat.

Formentur pastæ oblongæ quadratæ, quæ
pulvere Sacchari vel Amyli, ne char-
tæ adhæreant, conspergantur.

Pari modo etiam ex

Liquiritiæ Radicibus

paratur pasta, quæ a Gallis

PATE DE REGLISSE

vocatur.

*Humores acres, faucibus inprimis & pectori
noxios, demulcent; hinc in tussi sicca, asth-
mate, quin ipsa phthisi commode adhiberi
possunt.*

PHILONIUM ROMANUM.

Videatur ELECTUARIUM.

PHOSPHORUS URINÆ.

REC. Salis nativi Urinæ, qui ex urina
ad mellaginem inspissata per crys-
tallificationem obtinetur, partes
octo,

Pulveris carbonum, sive Fuliginis
tædæ partem unam.

Misce optime, committe retortæ vitreæ
loricatæ, cui limi vulgaris ope opponi-
tur recipiens, ea aquæ quantitate re-
pletus, ut inter hujus superficiem & su-
percilium rostri retortæ non majus in-
tercedat intervallum, quam quod, ne
aqua calore distenta in retortam pene-
tret, caveat; igni nudo committitur re-
torta, augetur calor ad summum usque,
& jucundissimo spectaculo coruscantes
ignes in aquam ejaculari videbuntur,
tales si nulli ulterius distillant, a distil-
latione est desistendum; globuli, qui ce-
ræ similes sunt, immittuntur aquæ fer-
vidæ, in modulo vitreo hærenti, &
ebullientis aquæ ope in unam massam
funduntur. Uncia una salis nativi se-

cundum Marggrafii experimenta Phos-
phori drachmam unam largitur. Recen-
tiores chemici ex ossibus phosphorum lu-
crari docuerunt, verum cum rarius in
medicina adhibeatur, methodum appo-
nere nimis longum esset, hinc sciendi
cupidos ad chemicorum scripta, ma-
xime Crellii, ablegamus.

*Non curiosis saltem inservit phænomenis, sed
in usum quoque medicum a quibusdam vo-
catur tanquam roborans & diapnoicum
summum in febribus acutis, item in epi-
lepsia, apoplexia, paralyti, soporibus,
melancholia, mania.*

*Dosis grani unius, duorum vel trium, ter
quaterve in die, cum Conserva quadam.*

PILULAE ÆTHIOPICAE.

REC. Æthiopis mineralis unciam unam,
Reguli Antimonii medicinalis,
Gummi Guajaci ana unciam semis,
Extracti Sarsaparillæ unciam unam.

Fiat massa pilularum.

*In scabie maligna, hydrope, febre quarta-
na, ulceribus fætidis &c. non sine fructu
commendari solent.*

*Dosis est a granis duodecim, ad grana vigin-
ti quatuor, ad drachmam semis usque.
Tertiam partem Æthiops mineralis, &
sextam Regulus Antimonii constituit.*

PILULAE ALOEPHANGINÆ.

REC. Specierum aromaticarum caryophyllata-
rum unciam unam,

Myrrhæ electæ,

Mastiches ana drachmas tres,

Crocī drachmam unam semis,

Extracti Aloës uncias duas.

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ.

*Sunt aromaticæ, ventriculum roborantes, appeti-
tum excitantes, atque concoctionem promoventes.*

*Dosis est scrupulus unus. Dimidia pars est Extra-
ctum Aloës, hinc, præter supra laudatas virtu-
tes, etiam alvum stimulandi vim habent.*

PILULAE ALTERANTES PLUMERI.

REC. Pulveris alterantis, (sub Panacea
Hh 2 mer-

mercuriali præscripti,) unciam
femis,
Gummi Guajaci drachmas tres,
Resinæ Guajaci drachmam unam,
Balsami de Copaiva quantum sufficit,
ut fiat massa pilularum, ex cujus singulis
drachmis formantur pilulæ duodecim.

*Valent alterante & diaphoretica potius quam
salivatoria intentione, in morbis venereis ali-
isque rebellibus, a pituita & lymphæ impu-
ritatibus oriundis, per tempus mane & ve-
spera adsumtæ, tres numero, conjunctis
Decoctis lignorum vel aliis congruis.*

PILULÆ DE AMMONIACO.

REC. Extracti Aloës, aqua fontana præ-
parati, uncias duas,
Gummi Ammoniacy purissimi, ace-
to scillitico soluti & ad consisten-
tiam extracti inspissati, unciam
unam semis,
Myrrhæ electæ,
Mastiches,
Benzoës electæ,
Rhabarbari ana drachmas duas,
Crocī scrupulos duos,
Salis Absinthii drachmam unam.
Misce, fiat massa pilularis.

*Incidunt lympham viscidam, & educunt;
profunt hypochondriacis, in affectibus ute-
rinis, asthmate, tussi, cachexia, febribus
inveteratis, præcipue quartana.*

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

*Drachma una habet fere scrupulum gum-
mi Ammoniacy.*

PILULÆ ANGELICÆ.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam, quam
dissolve in

Succorum depurator. Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ,
Rosarum Dam-
scenarum ana li-
bra una.

Solutio clarificetur, postea, lento igne, ad
justam consistentiam percoquatur, & cum
sequentium pulvere,

Rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiscati uncia semis,
Cinnamomi electi drachmis duabus.

Fiat massa pilularis.

Leniter subducunt alvum.

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

PILULÆ APERIENTES STAHLII.

REC. Aloës rosatæ unciam unam,
Extracti Panchymagogi unciam se-
mis,
Limaturæ Martis, subtilissime pul-
verisatæ drachmas duas.

Fiant pilulæ.

*Alvum liberam servant, & parva dosi, an-
te somnum, deglutitæ, obstructam ape-
riunt.*

Dosis grana quinque ad decem.

PILULÆ AUREÆ.

REC. Aloës Succotrinæ.

Diacrydii sulphurati ana drachmas de-
cem,

Florum Rosarum,

Seminum Apii,

Fœniculi,

Anisi ana drachmas tres,

Mastiches electæ,

Crocī Orientalis,

Trochiscorum Albandal ana drachmas
duas.

Cum sufficiente quantitate spiritus vini, fiat
massa.

*Virtutes prædicantur cephalicæ, purgant, & hu-
mores a capite derivant; hinc etiam oculorum
aciem juvare laudantur.*

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTO-
NIANÆ.

REC. Millepedum drachmas tres,
Gummi Ammoniacy electi drach-
mas duas semis,
Florum Benzoës drachmam unam,
Crocī Orientalis,
Balsami Peruviani ana grana quin-
decim.

Misce,

Misce, cum sufficiente quantitate Balsami Sulphuris anisati, fiat massa. Fiat massa.

Ad tussim chronicam, scrophulosam & phthisicam, pulmonibus phlegmate viscoso infarctis, scirrhis, atque cum tuberculorum generandorum suspicio est, commendantur.

Dosis scrupulus semis, bis vel ter in die, superbibendo haustum decocti appropriati.

PILULÆ CACHECTICÆ.

REC. Gummi Ammoniaci purissimi drachmas sex,

Extracti Aloës gummosi unciam semis,

Chalybis, in alcohol redacti, drachmas quinque,

Olei destill. Caryophyllorum, Anisi ana scrupulum semis.

Misce cum sufficiente quantitate spiritus vini, fiat massa.

Obstructiones resolvunt, fibris laxatis tonum conciliant, habitum corporis emendant; cachecticis, ictericis, mensium vitio laborantibus atque hypochondriacis prosunt, alvum leniter stimulant.

Dosis grana quindecim ad drachmam semis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

REC. Massæ pilularum de Succino, Cochiarum ana unciam unam,

Specierum Dianibræ drachmam unam.

Fiat Massa cum essentia Succini.

Sunt leniter purgantes, & conveniunt dolore dentium & aurium tinnitu laborantibus; prosunt etiam in faucium pituitosis tumoribus.

Dosis grana quindecim ad drachmam semis.

PILULÆ COCHLÆ RHASIS.

REC. Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas decem,

Trochiscorum Alhandal drachmas tres, scrupulum unum,

Diacrydii drachmas duas semis,

Stœchadis Arabicæ,

Turbith ana drachmas quinque,

Syrupi de Stœchade, quantum fatis.

Pars II.

In affectibus capitis, ad pituitam evacuandam uti illis solent.

Dosis grana quindecim ad viginti. Scrupulus continet Diacrydii grana duo, de Trochiscis Alhandal grana tria.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

REC. Radicum siccarum Cynoglossi, Seminis Hyoscyami albi, Extracti Opii ana unciam semis, Myrrhæ drachmas sex, Thuris drachmas quinque, Styracis calamitæ, Caryophyllorum, Cinnamomi ana drachmas duas.

Succi de Cynoglossi & Syrupi Violarum ana quantum sufficit, fiat pilularum massa.

Catarrhos tenues sistunt, tussim mitigant, hæmoptoicis & stranguria laborantibus prosunt, dolores sedant.

Drachma una hujus massæ grana octo opii complectitur.

Dosis grana tria ad quinque.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Adde speciebus modo dictis, Croci,

Castorei ana drachmas duas.

Vires sunt, uti præcedentium, ac eadem vel paulo majori dosi possunt dari.

PILULÆ EMANUELIS.

REC. Aloës Succotrinæ unciam unam, Myrrhæ electæ drachmas duas, Croci Orientalis drachmam unam.

Cum Mithridatio Damocratis fiat massa.

Cum Pilulis Russi conveniunt.

Alvum solvunt, ventriculū & intestina a flatibus & vitiosis humoribus liberant.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum.

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES.

REC. Hermodaetylorum,

li

Esulæ

PILULÆ.

Efulæ Aceto antea maceratæ, ana drachmas duas,

Turbith drachmas quatuor,
Zinziberis drachmam unam semis,
Spicæ Indicæ drachmam unam,
Epithymi,

Colocynthis,
Seminis Rutæ hortensis,

Sagapeni,
Ammoniaci,

Opopanacis,
Bdellii,

Aloës ana drachmas quinque,

Euphorbii scrupulos duos.

Scammonii præparati drachmas tres,

Cinnamomi,

Croci,

Castorei ana drachmam unam.

Succi Porri depurati quantum fatis.

Fiat massa; gummi in porri succo solvantur, quibus deinde Euphorbium per se tritum, una cum ceteris, addatur, pinstantur, ut in pastam abeant.

Ad uteri & mensium vitia, nec non arthriticos affectus & febrem quartanam laudantur; pituitam viscidam resolvunt & educunt.

Dosis a scrupulo semis ad integrum.

PILULÆ HIERÆ, CUM AGARICO.

REC. Specierum Hieræ picræ Galeni,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloës unciam unam,
Spiritus vini quantum fatis.

Fiat massa.

Ad Asthma humorosum, anorexiam, aliosque thoracis & ventriculi affectus commendantur.

Dimidiam partem facit Aloë; dari igitur potest a scrupulo semis ad integrum.

PILULÆ HYDROPICÆ BONTII.

REC. Aloës optimæ drachmas duas semis,
Gummi Guttæ, subtiliter triti & vino dissoluti, drachmam unam semis,
Diacrydii; eodem modo parati drachmam unam,

Gummi Ammoniaci drachmam unam semis,

PILULÆ.

Tartari vitriolati drachmam semis.

Fiat massa.

Serum potenter educunt, & obstructions resolvunt.

Dari hydropicis possunt a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ HYSTERICÆ.

REC. Radicum Angelicæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Levistici,
Ostrutii,
Valerianæ,
Zedoariæ ana unciam semis,
Herbarum Menthæ,
Pulegii,
Rutæ,

Florum Chamomillæ Rom.

Baccarum Lauri,

Corticum Aurantiorum ana drachmas sex.

Incisa & contusa infundantur in Spiritus vini libris quatuor. Stent in digestionem ad sufficientem extractionem, exprimantur; Expressio per chartam filtrato adde aquæ fontanæ uncias octo, atque spiritus calore balnei abstrahatur. Residuo ad extracti mollioris consistentiam evaporato addantur.

Myrrhæ electæ,
Succini præparati,
Castorei Orientalis,
Croci ana drachmæ duæ,
Olei Rutæ,

Succini ana guttæ duodecim.

Fiat massa, & pro lubitu pilulæ.

Vires ex titulo patent, nimirum uterinæ, anticolicæ & nervinæ. Massa hæc pilularis, pro intentione Medici, vel Laudano opiato, vel limatura Martis, vel laxantibus commisceri, vel sola exhiberi potest.

Dosis grana decem ad quindecim.

PILULÆ LUCIS MAJORES, sive OPTICÆ.

REC. Valerianæ radicis,
Euphrasiæ ana drachmas duas,

Semi-

Seminum Fœniculi,
Seseleos,
Ligni Aloës,
Sandali citrini.
Cubebærum,
Cardamomi,
Agarici,
Corticum ligni Sassafras ana drachmam
unam,
Succini præparati drachmas tres,
Trochiscorum Alhandal drachmam
unam,
Extracti Aloës uncias duas.

Misce, fiat massa.

*Attribuuntur vires, excrementa pituitosa e cere-
bro & oculis evacuandi, visum conservandi &
obfirmandi.*

*Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum, ante
cubitum.*

PILULÆ MAJORES HOFMANNI SI-
VE EX SUBLIMATO CORROSIVO.

REC. Mercurii sublimati corrosivi grana
quindécim

Solve in Aquæ destillatæ drachmis sex
Decantato liquori adde
Micæ panis albissimæ drachmas duas
& dimidiam.

Misceantur bene subigendo & fiant lege ar-
tis pilulæ æquales CXX postea exsic-
candæ.

Proposuit C. L. Hofmann hanc methodum
mercurium sublimatum corrosivum ex-
hibendi atque ejusmodi pilulas sub præ-
fixo titulo in officinas introduxit. In
hac formula unaquæque pilula unam
octavam partem mercurii sublimati cor-
rosivi continet. Possunt & pro iis, qui
pilulas minus deglutire valent, in pulve-
rem teri & sic commode exhiberi.

*Dantur plerumque mane & vesperi duæ hu-
jusmodi pilulæ pro quavis dosi superbibendo
decoctum demulcens.*

PILULÆ MASTICHINÆ.

REC. Mastiches electæ drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,

Aloës electæ drachmas decem.

Fiat omnium subtilissimus pulvis, & ex hoc,
sufficiente quantitate Aquæ Menthæ, massa
pilularis.

*Ad ventriculi affectus præcipue commendantur,
oculorum aciem, humores subducendo, confor-
tant.*

Dosis grana decem ad viginti.

PILULÆ MERCURIALES.

REC. Extracti Panchymagogi,
Catholici,

Refinæ Jalappæ,
Mercurii dulcificati,
Diacrydii ana drachmam unam,
Essentiæ ligni Sassafras quantum
fatis,

Fiat massa.

*Non solum in morbis venereis, sed etiam
aliis a lymphæ vitiis ortis, & ad lum-
bricos expellendos dari possunt.*

Dosis grana duodecim vel quindecim.

PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMICÆ.

REC. Extracti Aloës succo citri parati
unciam unam semis,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Cochleariæ,

Myrrhæ electæ ana drachmas tres,
Gummi Hederæ,
Refinæ Juniperi, sive Gummi San-
daracæ,
Mastiches electæ,
Benzoës ana drachmam unam semis.

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilu-
læ foliis lunæ obducendæ.

*Pilulæ hæc, nisi easdem, tamen haud multo
inferiores cum illis celeberrimi Stahlî, vi-
res habent; sunt autem multo magis aloe-
ticæ. Alvum exstimulant, aperiunt, in-
cidunt, & ventriculum, cum reliquis vi-
sceribus, roborant.*

Dosis scrupulus semis ad grana viginti.

PILULÆ POLYCHRESTÆ STARCKET.

REC. Extracti Opii Thebaici, aqua fontana parati,

Pulveris radicum Liquiritiæ,
Ellebori nigri,
Ellebori albi ana un-
ciam unam,
Saponis tartarei, vel correctoris, un-
cias tres.

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ.

Prædicantur polychrestæ, diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, quæ felici cum successu in febribus, præcipue tertiana & quartana, catarrhis, doloribus, tussi, diarrhæis, ulceribus & apostematibus dari possint.

Dosis grana duo, tria, ad scrupulum semis.

PILULÆ SCILLITICÆ, PHARM.
EDINBURG.

REC. Scillæ recentis,
Gummi ammoniaci electi,
Millepedum ana unciam semis,
Saponis purissimi unciam unam.
Balsami de Copaiva drachmam.

Fiat massa pilularis.

Resolvunt, atque ictericis, hydropicis, febre quartana &c. laborantibus conducunt.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

PILULÆ SOLARES WILDEGANSII.

REC. Opii Thebaici optimæ notæ, aqua simplici aut pluvia soluti, colati, ac ad justam consistentiam rursus inspissati & ficcati, unciam unam,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ rubræ,
Crocii optimi,
Antimonii diaphoretici,
Salis cornu cervi volatilis,
Trochiscorum de viperis,
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei Cariophyllorum guttas quinquaginta.

Misce, fiant pilulæ minores & foliis lunæ obducantur.

Sunt anodynæ & sudoriferæ. Ultra dimidiam

partem Opium constituit. Tota compositio minus laudabilis est, egregieque ea caremus.

Dosis granum unum ad duo, vel tria.

PILULÆ SPLENETICÆ.

REC. Gummi Ammoniaci electi,
Extracti Aloës gummosi ana unciam unam semis,
Myrrhæ electæ,
Radici Bryoniæ ana drachmas duas.

Misce, fiat massa pilularis.

In affectibus hypochondriacis, mensstruis retentis, commendabiles sunt.

Dosis grana duodecim ad viginti duo.

PILULÆ DE STYRACE SINE
AMBRA.

REC. Styrcis calamitæ unciam semis,
Succi Liquiritiæ inspissati drachmas tres,
Olibani electi,
Benzoës,
Mastiches,
Extracti Opii ana drachmas duas,
Crocii Orientalis drachmam unam,

Misce, fiat, addita Essentia Succini, massa,

Vires sunt anticatarrhales, tussim aliasque molestias, sicut Pilulæ de Cynoglossa, mitigantes.

Grana sedecim hujus massæ grana duo Opii continent; pro dosi itaque grana quatuor, sex, vel ad duodecim usque, dari possunt. Dantur autem ante somnum, & commode atque utiliter cum massæ pilularum de Succino anatica portione.

PILULÆ DE SUCCINO AUCTÆ.

REC. Massæ pilularum de Succino Cratonis drachmas novem,
Magisterii, vel resinæ Jalappæ drachmas tres.

Misceantur, & ex drachma una formentur pilulæ sexaginta.

A longo tempore, sub titulo: Verstärkte Agstein-Pillen, in officinis nostris in usu sunt. Eisdem habent effectus, quos sequentes, propter

PILULÆ.

propter resinam vero Jalappæ magis sunt purgantes.

Jalappæ magisterium constituit quartam massæ partem.

Raro ultra quindecim grana exhibentur.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

REC. Succini præparati unciam unam semis,

Mastiches unciam unam,

Agarici trochiscati drachmas sex,

Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,

Aloes Succotrinæ uncias duas semis.

Misce, & addita Essentia Succini, sufficiente quantitate, fiat massa.

Ad catarrhales affectus, oculorum, aurium & dentium dolores, pituitam a capite revellendam commendantur.

Dosis grana duodecim ad viginti.

PILULÆ TARTARÆ BONTII.

REC. Aloës Succotrinæ electæ unciam unam semis,

Gummi Ammoniaci electi drachmas sex,

Tartari vitriolati drachmas quatuor,

Aceti scilliciti, quantum sufficit.

Viscidos humores resolvunt. Conveniunt hypochondriacis, viscerum obstructions tollunt, alvum leniter subducunt.

Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum.

PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

REC. Aloës Succotrinæ, succo fragorum nutritæ, unciam unam,

Gummi Ammoniaci in granis drachmas tres,

Vitrioli Martis,

Extracti Croci ana drachmam unam,

Terræ foliatæ tartari drachmas duas,

Extracti Gentianæ drachmam unam semis,

Tincturæ tartari Q. S.

Est purgans, quod secure ad biliosos humores, Pars II.

PILULÆ. PULPA.

129

& febrium intermittentium fomitem expurgandum exhiberi potest.

Dimidiam partem facit Aloë.

Dosis grana viginti ad drachmam semis.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

REC. Terebinthinæ coctæ unciam unam semis,

Succini præparati,

Mastiches,

Olibani,

Succi Liquiritiæ,

Rhabarbari veri;

Offis Sepiæ,

Boli Armenæ ana drachmas duas.

Fiat massa.

Virtutes sunt balsamicæ, consolidant, urinam ciunt, in gonorrhœa & fluore albo utiliter adhibentur.

PLUMBUM USTUM.

Liquetur plumbum in patina terrea plana, atque spatula ferrea agitetur, & sine alterius rei additione, in calcem griseum abibit, quæ pulverisata servanda est.

Siccatur, & ad Emplastrum Saturninum requiritur.

PULMONES VULPIS PRÆPARATI.

Coquantur parum in vino, cum Absinthii portione, postea exsiccantur.

Paratur ex his Looch, quod æque absurde habetur specificum antasthmaticum, quæ in congrue in tussi & phthisi laudatur.

PULPA CASSIÆ.

REC. Fistularum Cassiæ ponderosarum, quantum libet.

Aperiantur, & pulpa seu medulla, cum feminibus, diligenter eximatur, in aquæ calidæ sufficiente quantitate dissolvatur, & per cribrum trajiciatur; lento igne ad mellis consistentiam redactæ libræ uni tantundem sacchari albi addatur, & ad justam consistentiam coquantur.

Bilem & pituitam blande educit, & calculosis convenit; pueris recens natis ad educendum

dum meconium datur a drachma semis, ad scrupulos duos, adultioribus autem ab uncia una, ad unciam unam semis.

PULPA TAMARINDORUM.

Eodem modo, quo Cassiæ pulpa, paratur. Humectat, sanguinem depurat, bilem temperat, & blande educit.

Dosis drachmæ sex ad unciam unam.

Pari modo etiam e passulis & prunis, in aqua fontana ad mollitiem coctis, paratur:

PULPA PASSULARUM ET PRUNORUM.

PULVIS CONTRA ABORTUM CUM SACCHARO.

REC. Granorum Chermes unciam semis,
Ligni Sandali rubri,
Florum Rosarum rubrarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Rasuræ Eboris ana drachmas tres,
Mastiches,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam,
Sacchari albissimi ad pondus omnium.

Gravidis abortum timentibus, inter trageas, vel solus commendabatur. Ad drachmam pro dosi. Quod per hunc pulverem abortus non præcaveatur, facile nobis non monentibus intelligitur, potest itaque facile hoc compositum ex pharmacopolio exulare, reliquimus ejus & similium descriptionem mere, ut sciatur, quid sub hoc illo nomine nonnulli interdum exhibuerint.

PULVIS ABSORBENS WEDELII.

REC. Vitrioli Martis drachmas sex,
Concharum præparatorum,
Lapidum Cancrorum præparatorum,
Coralliorum,
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris nativæ ana drachmas decem,
Laudani opiatum drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas sexaginta.

Misce, fiat pulvis.

Est absorbens, sudoriferus & anodymus; subvenit hypochondriacis & hysteriis, palpitatione cordis & aliis molestis symptomatibus correptis.

Drachma una hujus pulveris granum unum habet Laudani opiatum, & grana sex Vitrioli martis.

Dosis a granis octo ad duodecim.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

REC. Nitri crudi crystallini unciam unam semis,

Oculorum Cancrorum, acido Citri saturatorum, unciam unam,

Boli Armenæ unciam semis,

Camphoræ drachmam unam.

Misce, fiat pulvis in vitro servandus.

Vires e titulo patent.

Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CAME- RARII.

REC. Boli Armenæ,

Terræ figillatæ,

Radicum Dictamni albi,

Tormentillæ ana unciam semis,

Angelicæ,

Gentianæ,

Petasitidis,

Zedoariæ ana drachmas duas,

Cornu cervi usti præparati,

Rasuræ Eboris,

Coralliorum rubrorum,

Corticum citri ana scrupulos duos.

Misce, fiat pulvis.

Virtutes prædicantur, uti ex titulo cognoscitur, alexipharmacæ, & præsertim in dysenteria epidemica adhibetur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS ALEXIPHARMACUS five

BEZOARDICUS ROLLWAGII.

REC. Reguli Antimonii medicinalis,

Radicis Contrayervæ ana drachmas sex,

Boli Armenæ,

Terræ figillatæ rubræ,

Cornu Alcis sine igne præparati ana unciam semis,

Cry-

PULVIS.

Cryſtalli montanæ præparatæ,
Coralliorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ,
Oculorum cancrorum ana drachmam
unam,
Sacchari tabulati citrati unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis

*Male laudatur hic pulvis, terreis abſorbentibus
abundans, in diverſi generis febris continuis,
morbillis, variolis & aliis exanthematibus.*

*Drachma una continet Reguli Antimonii medi-
nalis grana duodecim.*

Dofis ad ſcrupulum unum vel drachmam ſemis.

PULVIS ALTERANS PLUMERI.

Vid. ſupra PANACEA MERCURIALIS.

PULVIS ANODINUS CAMERARII.

REC. Extracti Opii,
Sandali rubri ana ſcrupulum unum,
Coralliorum rubrorum præparatorum
ſcrupulos quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

*Effeſtus e titulo cognoscitur. Sextam partem
Opium conſtituit.*

Dofis grana ſex ad decem.

PULVIS ANODINUS LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana para-
ti, drachmam unam,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum drachmas duas.

Miſce.

*Easdem vires, quas Laudanum opiatum, ha-
bet, & commode pulveribus aliis, ubi
anodynum deſideramus, additur.*

*Dofis grana tria ad ſex. Tertiam partem
facit opium.*

PULVIS ANONYMUS.

REC. Seminum Papaveris albi, drachmas
duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis ana drachmam
unam ſemis,

PULVIS.

131

Seminum Cicerum rubrorum drachmam ſe-
mis;

Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana drachmas duas,
Succi Hypociftidis,
Boli Armenæ,
Cornu cervi uſti,
Raſuræ eboris ana drachmam ſemis,
Sacchari penidii unciam unam ſemis,
albi candi uncias ſex.

Miſce, fiat pulvis.

*Tabidis & plithificis præſcribitur; tenues & ſal-
ſos catarrhos ſiſtit, ac deſfluxiones acres, fau-
ciumque aſperitates & ardorem urinæ mitigat.*

Sumitur a drachma una ad drachmas duas.

*Ob ſemina oleoſa facile ranceſcit, ideo nunquam,
niſi a Medico præſcribatur, parandus.*

PULVIS ANTARTHRITICUS WEPFERI.

REC. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum
unciam unam ſemis,
Cornu cervi philoſophice præparati,
Raſuræ eboris,
Oculorum cancrorum,
Cinnabaris ana drachmas duas,
Antimonii diaphoretici ſimplicis un-
ciam ſemis,
Nitri cryſtalliſati drachmas ſex,
Sacchari albi unciam unam ſemis,
Olei nucifæ ſcrupulum ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

*Ad arthriticorum dolores, ſpaſmos, quin motus
convulſivos leniendos adhibetur.*

*Dofis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos, & drach-
mam unam.*

PULVIS ANTILYSSUS LOND.

REC. Lichenis cinerei terreſtris uncias
duas,
Piperis nigri unciam unam.

Fiat pulvis.

*Commendatur in Tranſactionibus philoſo-
phicis Anglicis ad canis rabioſi morſus,
nunc de ejus efficacia multum dubitatur.*

Dofis ſcrupuli duo ad quatuor.

Kk 2

PUL-

PULVIS ANTISPASMODICUS
NITROSUS.

REC. Nitri purissimi crySTALLIFATI,
Tartari vitriolati ana uncias duas,
Cinnabaris purissimæ drachmas tres,
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Commendatur ad motus spasmodicos & convulsivos præcavendos & sedandos, nec non æstum nimium sanguinis temperandum.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis, vel scrupulos duos.

PULVIS CONTRA ACREDINEM.

REC. Antimonii diaphoretici simplicis uncias duas,
Lapidum cancerorum,
Concharum præparatarum ana unciam unam.

Misce fiat pulvis.

Acidum absorbet; commendatur ad ardorem stomachi, & acrimoniam in primis viis hærentem.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS
LUDOVICI.

REC. Cornu cervi, sine igne præparati, uncias tres,
Terræ figillatæ albæ,
Unicornu fossilis ana unciam unam semis.

Misce, subtilissime trita.

Præfertur ab Auctore aliis pretiosis pulveribus in variolis, morbillis, convulsionibus ab acido, in primis viis infantum, in diarrhæa aliisque ejusmodi morbis, sed simplex Magnesia adhuc magis præferenda.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum, vel drachmam semis.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS
COMPLETUS sive KENTIANUS.

REC. Apicum nigrorum chelarum cancerorum, subtilissime pulverisatorum,
Radice Contrayervæ ana uncias duas,
Margaritarum præparatarum,

Coralliorum rubrorum præparatorum, alborum,

Lapidum cancerorum,

Cornu cervi usti ana unciam unam,

Bezoar Orientalis,

Terræ Lemniæ ana unciam semis,

Antimonii diaphoretici uncias duas.

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

NB. Cornu cervi ustum & oculi cancerorum, corallia & margaritæ antea succo citri faturanda & exsiccanda sunt.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS
INCOMPLETUS.

REC. Apicum nigrorum chelarum cancerorum, subtilissime pulverisatorum,
Radice Contrayervæ ana uncias duas,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum, alborum,

Lapidum cancerorum,

Cornu cervi usti ana drachmas novem,

Terræ Lemniæ unciam semis,

Antimonii diaphoretici simplicis uncias duas,

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

NB. Mater Perlarum, corallia, lapides cancerorum, & cornu cervi ustum, antea succo citri sunt imbibenda & exsiccanda.

Commendatur uterque in febribus malignis, epidemicis, petechizantibus, variolis, morbillis ex isto vulgari errore, quo olim absorbentia immensis laudibus extulerunt.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS BEZOARDICUS HALENSIS.

REC. Antimonii diaphoretici,
Nitri depurati,
Concharum præparatarum,
Tartari vitriolati, ana unciam unam,
Cinnabaris factitiæ præparatæ drachmam unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Compescendo sanguinem rarefactum, solvendo humores lentos, vias excretorias stimulando, diaphnoen movere valet.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

PUL-

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

REC. Cornu Cervi philosophice calcinati drachmas sex,

Coralliorum rubrorum præparatorum,

Lapidis Bezoar Orientalis,

Margaritarum præparatorum,

Oculorum cancrorum præparatorum,

Succini præparati,

Terræ figillatæ albæ ana scrupulos quatuor,

Offium de cordibus cervorum,

Hyacinthi præparati,

Sapphiri præparati,

Rubini præparati,

Smaragdi præparati ana scrupulos duos,

Foliorum auri numero duodecim

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus, qui etiam sine Bezoar præparandus, & sub titulo:

PULVERIS BEZOARDICI INCOMPLETI reponendus.

In febribus malignis epidemicis, variolis & morbillis olim dabatur. Nunc exulet!

Rationalis theoria tantum non omnes ejusmodi pulveres compositos, bezoardicorum & alexipharmacorum titulo superbientes, hodie ex præxi medica proscribit.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI INCOMPLETUS.

REC. Limaturæ chalybis sulphure præparatæ unciam unam,

Radicum Ari præparatorum,

Coralliorum præparatorum,

Matris perlarum præparatæ ana drachmas duas,

Cornu cervi philosophice præparati,

Succini præparati,

Cinnamomi ana scrupulos quatuor,

Sacchari ad pondus omnium, sive uncias duas, drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

In Cachexia, leucophlegmatia, febre alba virginum, ictero & reliquis morbis, ex atonia viscerum ortis, dabatur.

Pars II.

Dosis scrupulus unus, vel scrupuli duo.

Grana triginta sex continent grana octo limaturæ chalybis.

Si COMPLETUS expetatur, addatur Ambræ griseæ drachma una semis, & loco Matris perlarum fumantur Margaritæ præparatæ.

PULVIS AD CALCULUM.

REC. Radicum Pareiræ bravæ unciam unam,

Altheæ,

Liquiritiæ,

Seminis Lycopodii,

Lapidum cancrorum, acido citri saturatorum,

Percarum,

Operculorum cochlearum,

Succini præparati,

Millepedum præparatorum ana drachmas duas,

Florum cardui stellati unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

In calculo renum, nephritico dolore, tam curative quam præservative commendabatur.

Dosis in junioribus a scrupulo semis ad grana quindecim, adultioribus secure drachma semis, vel scrupuli duo propinari possunt.

PULVIS CONTRA CASUM.

REC. Terræ figillatæ,

Sanguinis Draconis,

Mumiæ ana unciam unam,

Rhabbarbari drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Spermatis ceti uncia semis ordinario hanc compositionem quoque ingreditur; cum vero brevi rancescat, præstat, illud tum demum addere, cum actu pulvis in usum vocatur.

Commendabatur inepta hæc compositio lapsis, contusis & ubicunque sanguis resolvendus est. An merito? Revera absurdissime!

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

REC. Succini præparati,

Matris Perlarum præparatæ,

Smaragdi præparati ana unciam semis,

Ligni

PULVIS.

Ligni Aloës,
 Radicis Pæoniæ ana drachmas duas,
 Unicornu marini,
 Visci querni ana drachmam unam se-
 mis,
 Sacchari perlati uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Commendabatur ad morbos capitis; sed nonnisi ab illis, qui eum nervos confortare, & epilepticis ac convulsivis motibus resistere credunt.
Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

**PULVIS CEPHALICUS CAMERARII,
 CUM SACCHARO.**

REC. Cornu Alcis, sine igne præparati,
 Cervi, sine igne præparati, ana
 drachmas tres,
 Cranii humani præparati drachmas sex,
 CrySTALLI montanæ,
 Succini præparati,
 Ungulæ Alcis ana drachmam unam,
 Cinnabaris nativæ drachmam semis,
 Sacchari albi unciam unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Ad spasmodicos dolores capitis, hemicraniam & epilepsiam, tam adultis, quam pueris, ab Autore dubatur hæc inconcinna farrago, quam nunc merito rejicimus.

Dosis scrupulus semis ad scrupulos tres.

PULVIS CEPHALICUS WINTERI.

REC. Radicis Pæoniæ drachmas sex,
 Seminis ejusdem excorticati drachmam unam semis,
 Visci querni drachmas duas,
 Ungulæ Alcis scrupulos duos,
 Cornu cervi philosophice præparati drachmam unam semis,
 Unicornu fossilis,
 Dentium Hippopotami ana drachmam semis,
 Cranii humani drachmam unam,
 Cinnabaris nativæ,
 Succini albi ana drachmam semis,
 Coralliorum rubrorum scrupulos duos,
 Chrysolithi,
 Smaragdi,

PULVIS.

Margaritarum præparatarum ana scrupulos duos,
 Foliorum auri numero duo.

Fiat pulvis.

Cum pulvere epileptico rubro convenit, & easdem habet virtutes, i. e. non magni faciendas. Omitteremus revera, si modo ad utilitatem respiceremus, hos & multos alios ejusmodi pulveres, ast apud auctores varios occurrunt, hinc pro iis, qui scire & evolvere cupiunt, reliquimus, nequaquam approbamus.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS CERVINUS CAMERARII.

REC. Ossium cervi uncias quinque drachmas tres,
 Cornu cervi, philosophice præparati uncias duas drachmam unam,
 Cornu cervi uesti unciam unam drachmas duas semis.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires Autori, id quod dolemus, videbantur bezoardicæ & cordiales, atque in febribus malignis & dysenteria commendabatur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS MINUS PRETIOSUS.

REC. Matris Perlarum præparatæ,
 Oculorum Cancrorum,
 Coralliorum rubrorum,
 Succini albißimi,
 Cornu cervi, philosophice præparati, ana unciam semis,
 Chelarum cancrorum uncias duas semis.

Misce, fiat pulvis.

Locum habet, ubi absorbentia conducunt.

Dosis drachma semis.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM PRETIOSUS.

REC. Lapidis Bezoar Orientalis,
 Margaritarum Orientalium,
 Coralliorum rubrorum,
 Succini albi,
 Cornu cervi, sine igne præparati,
 Lapidum cancrorum ana unciam semis,
 Chelarum cancrorum uncias tres.

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Laudabatur absurde in morbis acutis, febribus malignis, variolis & morbillis, sed a priori parum differt.

Dosis scrupulus ad drachmam dimidiam.

PULVIS ANTI - COLICUS CAMERARII.

REC. Rasuræ eboris uncias duas,
Cornu cervi usti præparati drachmas
sex,
Crytalli montanæ præparatæ unciam
semis,
Salis Chamomillæ,
Absinthii ana drachmas tres.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

In colica, ab acrimonia biliosa, & acido in primis viis, orta, nec non ad infantum diarrhæam biliosam, commendabatur ab Autore.

Dosis in adultis a scrupulo uno ad duos; infantibus scrupulus semis.

PULVIS CONFORTANS CAMERARII.

REC. Boli Armenæ præparatæ drachmam
unam,

Terræ figillatæ Silesiacæ,
Turcicæ rubræ ana
drachmam semis,

Lapidum Carneoli præparati,
Granati,

Hyacinthi,

Sapphiri,

Smaragdi ana scrupulos duos,
grana quinque,

Succini præparati,

Coralliorum alborum,
rubrorum,

Margaritarum Orientalium,

Lapidis Bezoar Occidentalis,

Orientalis ana drachmam
unam,

Cornu cervi philosophice calcinati
drachmas quatuor semis,

Ungularum Alcis,

Dentium apri,

Cornu cervi aurati,

Pulveris Solaris ana drachmam semis,

Cinnabaris nativæ drachmam unam.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires præsumtivæ e titulo patent, ex natura ingredientium eas nequaquam colliges quin totam compositionem jure rejicies.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

REC. Cornu cervi usti præparati;
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Lapidum cancerorum,
Succini albi ana drachmas duas,
Crocii drachmam semis,
Cochinellæ drachmam unam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam
unam semis,
Chelarum cancerorum drachmas tres,
Radic. Contrayervæ unciam dimidiam.

Misce, fiat pulvis.

Viribus cum Pulvere bezoardico Anglico convenit, viliori tamen pretio constat.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

REC. Sacchari candi albi uncias duas.
Cinnabaris nativæ Hungaricæ
drachmas sex,
Olei Cinnamomi scrupulos duos.

Fiat pulvis.

Possidet virtutes analepticas, cordiales & stomachicas.

Adhibetur cuspidatim.

PULVIS CORNACHINUS,

sive

COMITIS DE WARWICK.

REC. Diacrydii sulphurati uncias duas,
Antimonii diaphoretici unciam unam
semis,
Cremoris Tartari crytallini unciam semis.

Fiat pulvis.

Est purgans, quod in febribus, aliisque morbis, ad primas vias a vitiosis humoribus purgandas, exhiberi potest.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

PULVIS COSMETICUS AD MANUS.

REC. Amygdalarum dulcium excorticatarum
libras duas,

Oryzæ,
Iridis Florentinæ ana uncias quatuor,
Benzoës,
Salis Tartari,
Spermatis ceti ana unciam unam,
Olei destill. ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Caryophyllorum ana gut-
tas triginta.

Fiat omnium pulvis.

Ufus patet ex nomine.

PULVIS DENTIFRICIUS.

REC. Laccæ pictoriæ in globulis,
Offium Sepiæ,
Radici Iridis Florentinæ ana un-
ciam unam,
Cremoris Tartari drachmas sex,
Caryophyllorum aromaticorum,
Myrrhæ,
Mastiches ana drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Mundat & firmat dentes, quotidie fricandos.

PULVIS DIGESTIVUS.

REC. Concharum præparatarum unciam
unam,
Tartari vitriolati uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Corrigit cruditates acidas, & incidit viscidas
in primis viis. Commode laxantibus præ-
mittitur.

Dosis scrupulus unus, ad duos.

PULVIS DOWERI.

REC. Tartari vitriolati uncias quatuor,
Opii depurati,
Radici Ipecacuanhæ ana unciam
dimidiam.

Misceantur & curate terantur in pulve-
rem.

Ab Anglis multum laudatur & ad diaphore-

sin producendam commendatur, hinc &
simpliciter sudorificus vocatur.

Dosis scrupulus dimidius usque ad integrum.

PULVIS DYSENTERICUS.

REC. Radicum Contrayervæ unciam semis,
Tomentillæ,
Cornu cervi usti præparati,
Terræ Lemniæ ana drachmas tres,
Gummi Arabici,
Mastiches ana drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Adstringens quidem est hic pulvis, in dysenteria
tamen epidemica circumspectus ejus usus non
infelicem edere potest effectum. Dari etiam
potest in diarrhæis, & ubi adstrictione opus est.

Dosis drachma semis.

PULVIS AD DYSURIAM,

sive

MITIGANS WEPFERI.

REC. Radicum Althææ unciam unam,
Liquiritiæ unciam semis,
Seminum Bombacis,
Papaveris albi,
Portulacæ ana drachmas duas,
Hordei,
Boli Armenæ præparatæ ana unciam
semis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ albæ ana drach-
mam unam,
Sacchari albi unciam dimidiam.

Misce, fiat pulvis.

Demulcet, & non solum dysuriæ vexatis, sed &
tussi sicca, a matéria acri, laborantibus prodest.

Dosis drachma dimidia ad integrum.

PULVIS EPILEPTICUS CELLARII CUM
CASTOREO.

REC. Radici Pæoniæ,
Seminis ejusdem ana unciam semis,
Unicornu marini,
Margaritarum ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretiosorum ana gra-
na quadraginta quinque,
Castorei,

Visci

PULVIS.

Visci querni,
Ungulæ Alcis,
Coralliorum rubrorum ana drachmas
duas,
Cranii humani præparati drachmam
unam semis,
Pulveris Viperarum drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

*Commendabatur inepta compositio ad epilepsiam,
aliosque motus convulsivos, præcipue hystericos.*

Datur a scrupulo semis ad drachmam semis.

PULVIS EPILEPTICUS AD GUTTETAM RIVERII.

REC. Radicum Pæoniæ,
 Dictamni albi,
Visci querni ana unciam semis,
Seminum Atriplicis drachmas duas,
 Pæoniæ,
Ungulæ alcis unciam semis,
Cranii humani præparati unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Hyacinthi ana drachmam unam semis;
Omnibus optime tritis adde
Foliorum auri numero quinquaginta.

*Ad convulsiones & epilepticos motus puerorum
multum laudatur. Nos nequaquam in his lau-
des consentimus, palam potius profiteamur hunc
& alios pulveres epilepticos dictos multa ineffi-
cacia, incongrua quin absurda continere. Cum
auctores varii, quin & femellæ medicatrices ad
hos pulveres, tanquam ad arcanum, provocent,
retinuimus & in hac nova editione descriptio-
nem, ut medici, quorum forsitan interest, com-
positionem sciant, non ut utantur.*

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

PULVIS EPILEPTICUS HOLSATICUS.

REC. Radicum Pæoniæ,
 Gentianæ ana uncias duas,
Herbæ Betonicæ,
 Chamædryos,
 Pentaphylli,
Florum Pæoniæ,
 Liliorum convallium,
 Violarum,
 Tiliæ, ana unciam unam,

Pars II.

PULVIS.

137

Seminum Coriandri,
 Pæoniæ excorticatorum,
Visci querni ana unciam semis,
Rasuræ ungulæ Alcis uncias duas,
 Afini drachmas quinque,
Cornu cervi,
Cornu cervi, sine igne præparati, ana
unciam unam,
Cranii humani præparati drachmas sex,
Coralliorum rubror. præpar.
 albor.
Margaritar. Oriental. præpar. ana unciam
semis,
Foliorum auri Nro. viginti quatuor.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

*Cum antecedente convenit, & eandem cum præ-
cedente & subsequenter censuram meretur.*

Dosis scrupulus semis ad drachmam dimidiam.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

REC. Radicum Pæoniæ uncias tres,
Visci querni,
Rasuræ eboris,
 Ungulæ alcis,
 Cornu cervi,
Spodii,
Coralliorum rubrorum,
 alborum,
Margaritarum præparatarum ana drach-
mas sex,
Foliorum auri puri numero viginti.
Fiat pulvis subtilissimus.

*Pulvis hic longo usu receptus non solum pueris,
ab epileptis, convulsivis motibus & pavoribus
divexatis, datur, sed etiam adultis porrigitur.*

Dosis grana decem ad drachmam semis.

PULVIS EPILEPTICUS MIRABILIS MTNSICHTI.

REC. Cranii humani, sine igne præparati, un-
ciam semis,
Visci querni,
Cinnabaris factitiæ,
Ungulæ alcis ana drachmas duas.
Fiat pulvis.

*Pulvis ob efficaciam, uti putabat, mirabilem an-
tepilepticam ab Autore ita dicitur.*

M m

Pueris

Pueris statim post paroxysmum scrupulus semis, adultis scrupulus unus, ad drachmam semis exhibetur.

**PULVIS EPILEPTICUS NIGER
VIENNENSIS.**

REC. Radicum Pæoniæ drachmas decem,
Dictamni albi,
Visci querni ana drachmas quinque,
Ligni Aloës,
Seminis Pæoniæ ana drachmas tres,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris perlarum ana unciam semis,
Ungulæ alcis drachmas tres,
Succini albi præparati,
Unicornu marini ana drachmas duas,
Carbonum Tiliæ unciam unam semis.

Fiat omnium pulvis subtilissimus; addantur
Foliorum auri numero viginti.

Virtutes ex nomine cognoscuntur; adhiberi vero etiam solet ad tormina infantum convulsiva, in terrore repentino &c.

Dosis in tenellis grana quinque, ad scrupulum semis, in adultioribus drachma semis.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

REC. Radicum Pæoniæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum
ana uncias duas,
Unicornu marini,
Cinnabarisativæ,
Succini præparati ana unciam unam.

Fiat pulvis subtilissimus.

Ad epilepsiam, motus convulsivos & spasticos commendatur.

Drachma semis hujus pulveris fere grana quatuor Cinnabaris habet.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

**PULVIS ERYSIPELATODES
MYNSICHTI.**

REC. Farinæ volatilis e molendinis uncias sex,
Plumbi usti,
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastiches electæ,
Olibani,
Cerussæ ana unciam unam.
Misce, fiat pulvis omnium subtilissimus.

Ufus est externus, inspergitur, & cum charta cærulea imponitur; quod tamen, propter adstringentia & repellentia, cum cautione fieri debet.

PULVIS AD FLATUS.

REC. Seminum Coriandri,
Carvi,
Anisi,
Foeniculi ana unciam unam,
Corticum aurantiorum,
Zinziberis ana drachmas sex,
Lapidum cancrorum præparatorum unciam semis,
Macis drachmam unam,
Sacchari albi uncias sex.

Misce, fiat pulvis.

Vires ex nomine patent.

Dosis scrupulus unus ad drachmam usque.

PULVIS FUMALIS ODORATUS.

REC. Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam,
Benzoës uncias duas,
Styracis uncias quatuor,
Succini uncias sex,
Olibani, five Thuris uncias octo,
Mastiches uncias viginti.

Misce, fiat pulvis grossus.

Ad suffimenta inservit, & odore suavi grato se commendat.

PULVIS FUMALIS HAUGII.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ,
Herbæ Rorismarini ana uncias quatuor,
Florum Rosarum rubrarum uncias sex,
Lavendulæ uncias duas,
Seminis Coriandri drachmas sex,
Baccarum Juniperi libras duas,
Ligni Aloës unciam unam semis,
Sandali citrini uncias quatuor,
Juniperi libras duas,
Corticis Thymiamatis uncias quatuor,
Nucis

Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi ana unciam unam,
 Benzoës,
 Styracis ana uncias quatuor,
 Olibani libram dimidiam,
 Mastiches libram unam,
 Rafuræ Succini libras duas,
 Elemi,
 Sandaracæ,
 Ladani ana uncias tres.

Misce, & grosso modo incisa ferventur.

*A longo tempore usus est apud nos, & in affe-
 ctibus catarrhalibus & rheumaticis, humida tem-
 pestate contractis, hoc pulvere suffumigata lin-
 tea parti dolenti imponunt.*

PULVIS GALACTOPOEUS.

REC. Semen Anisi,
 Fœniculi ana unciam unam,
 Nigellæ,
 Lactis Lunæ,
 Oculorum cancrorum præparatorum,
 Matris perlarum præparatæ ana drach-
 mas tres,
 Lumbricorum terrestrium præparatorum
 drachmas duas,
 Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

*Datur lactantibus, ad augendum lac, id quod
 certe non præstat, acidum absorbet in primis
 viis, ac discutit flatu.*

Dosis ad drachmam unam, quotidie bis sumendus.

PULVIS HALT, CONTRA PHTHISIN.

REC. Semen Papaveris albi drachmas duas,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Malvæ,
 Bombacis ana drachmam unam
 femis,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Amyli ana drachmas duas,

Cornu cervi usti,

Rafuræ eboris,

Cicerum rubrorum ana drachmam femis,

Liquiritiæ drachmas duas,
 Sacchari penidii uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

*Cum pulvere anonymo convenit, & eadem dosi
 exhibetur.*

PULVIS HEPATICUS RUBER.

REC. Cremoris Tartari uncias quatuor,
 Sandali rubri,
 Rosarum rubrarum ana unciam femis,
 Spiritus Vitrioli drachmas duas.

*Flores rosarum, subtilissime triti, irrorantur
 spiritu vitrioli; probe mixtis additur Pulvis
 Sandali & Cremoris Tartari; pulvis ruber
 in vitro asservatur.*

*Fervorem nimium sanguinis temperat, & appeti-
 tum excitat.*

Dosis scrupuli duo ad drachmam unam.

PULVIS HYSTERICUS.

REC. Radicum Fraxinellæ,
 Pæoniæ ana unciam femis,
 Radicum Zedoariæ,
 Corticum citri,
 Succini,
 Matris perlarum ana drachmas duas,
 Castorei drachmam unam,
 Anthophyllorum,
 Croci ana scrupulum unum femis.

Misce, fiat omnium pulvis.

*Ad hystericam passionem, menses & secundinas
 pellendas, atque dolores demulcendos inservit.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam femis.

PULVIS INCIDENS STAHLII.

REC. Lapidum cancrorum, acido citri
 saturatorum, uncias quatuor,
 Radicum Ari præparatarum uncias
 duas.

Misce, fiat pulvis.

*Resolvit pituitosos & mucosos humores, at-
 que digestionem promovet; præmitti po-
 test, loco digestivi, laxantibus.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam femis.

PULVIS.

PULVIS LENITIVUS
TARTARISATUS.

REC. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennæ electorum ana un-
cias duas,
Cinnamomi acuti,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drachmas
quinque.

Misce, fiat pulvis, qui pro lubitu saccha-
ro edulcorari potest.

*Leniter alvum siccam & tardiolem solvit,
flatus pellit; hypochondriacis & alvi ob-
structione laborantibus commendatur.*

*Ante prandium, vel cœnam, ad drachmam
unam sumendus.*

PULVIS MANTUANUS.

REC. Radicum Contrayervæ,
Scorzonæræ ana drachmas duas,
Terræ figillatæ griseæ,
Boli Armenæ,
Lapidum quinque pretiosorum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatorum,
Cornu Rhinocerotis ana drachmam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana drach-
mas duas.

Misce, fiat pulvis.

*Cum Pulvere bezoardico Sennerti multum conve-
nit, & ejusdem est usus.*

PULVIS MARTIALIS ANGLICUS.

REC. Limaturæ Martis in alcohol reda-
ctæ drachmas sex,
Cassie lignæ,
Nucum moschatarum, ana unciam
semis,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

*Cum Pulvere cachectico Quercetani multum
convenit, atque in cachexia & febris alba,
ex obstructione mensium, laudatur.*

*Dosis drachma una, quæ circiter sextam
partem martis habet.*

PULVIS.

PULVIS AD MORSUM CANIS
RABIDI.

REC. Foliorum Rutæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Absinthii vulgaris,
Menthæ,
Melissophylli,
Betonicæ,
Hyperici,
Centaurii minoris ana unciam
semis.

Legantur singula eo tempore, quo viribus
pollent maximis, papyro seorsim inclusa,
in umbra siccantur, & in pulverem te-
rantur.

*Autor est Julius Palmarius, Medicus Parisiensis,
atque de illo perhibet, quod insigni virtute, &
nulli secunda, rabiem arceat, vulnera a cane
rabioso inflata sanat, & terrificum illud sym-
ptoma, quo miselli reformidant aquis, impe-
diat.*

Dosis drachma semis ad drachmas duas.

PULVIS NEPHRITICUS PRETIOSUS.

REC. Lapidum cancrorum, acido citri fatu-
ratorum,
Lapidis Judaici præparati ana unciam
unam,
Lyncis præparati,
Margaritarum Orientalium præparatorum,
Operculorum cochlearum ana drach-
mam unam.

Misceantur, fiat pulvis subtilissimus.

*Commendabatur nephritide & calculo vesicæ labo-
rantibus, ast præter virtutem absorbentem nil
ab eo expectes!*

Dosis scrupulus unus.

PULVIS PANNONICUS, MINUS
PRETIOSUS.

REC. Boli Armenæ præparatæ,
Terræ Lemniæ ana unciam unam,
Corallii utriusque,
Spodii,
Cornu cervi, philosophice præparati,
Rasuræ

PULVIS.

Rasuræ eboris ana drachmas sex,
Matris perlarum, acido citri saturatæ,
uncias duas,
Radicis Contrayervæ unciam unam,
Croci Orientalis drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.
Vires, quæ sequentis.

PULVIS PANNONICUS RUBER ORDINARIUS.

REC. Boli Armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ Lemniæ uncias duas,
Coralliorum alborum præparatorum
drachmas sex,
rubrorum præparatorum
drachmas quatuor,

Margaritarum præparatarum drachmas
quinque,

Lapidum Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Sapphiri,

Cornu cervi, philosophice præparati,
ana unciam semis,

Rasuræ eboris drachmas tres,

Spodii drachmas quinque,

Cinnamomi drachmas duas,

Caryophyllorum,

Croci ana drachmam unam,

Seminis Acetosæ,

Sandali rubri ana drachmas duas,
albi,

Corticum citri ana drachmam unam semis,
Folia auri numero viginti quatuor.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

*A longo tempore pulveris huius usus receptus est.
Videtur autem Autor incognitus eum præcipue
febris castrensis, quæ in Hungaria frequen-
ter, cum dysenteria, grassantur, accommodare
voluisse.*

*Sunt adhuc qui illum præscribunt in variolis
& morbillis, febris continuis & dysente-
riis malignis. Pueris ac infantibus mulierculæ
vulgo contra convulsiones & in febris, e dentiti-
one ortis, propinare solent, non distinguentes vo-
cabulum germanicum Gift a Gicht, quo priori
venenum, posteriori autem convulsionem & epi-
lepsiâ significamus.*

Pars II.

PULVIS.

141

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

Prostat in officinis nostris etiam INCOMPLE-
TUS, demptis scilicet *Margaritis, Lapidibus
pretiosis atque Foliis auri nihilominus in utili
abundantia laborans.*

PULVIS AD PARTUM.

REC. Boracis unciam semis,
Castorei veri,
Croci ana drachmam unam semis,
Olei Cinnamomi guttas octo,
Succini guttas sex.

Misce, fiat pulvis.

*Ad partum facilitandum, foetum vivum & mortu-
um expellendum, datur.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS PECTORALIS BALSAMICUS WEDELII.

REC. Radicis Liquiritiæ unciam unam,
Iridis Florentinæ drachmas
duas,

Florum Sulphuris unciam semis,

Benzoës scrupulum unum,

Sacchari canti albi uncias duas,

Olei Anisi,

Fœniculi ana guttas decem.

Misce, fiat pulvis.

Demulcet & resolvit.

Dosis scrupulus unus ad duos.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS WEDELII.

REC. Radicis Ari,

Iridis Florentinæ,

Antimonii diaphoretici,

Florum sulphuris,

Cinnabaris nativæ,

Oculorum Cancrorum ana unciam semis.

Misce, fiat pulvis.

*Lentos, pulmonibus impactos, humores resolvit &
excutit.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS PLEVRITICUS.

REC. Mandibularum lucii piscis,
Dentium apri, sine igne præparatorum,
Lapidum percarum,
Talorum leporum ana unciam semis,

Na

Ocu-

PULVIS.

Oculorum cancerorum præparatorum unciam unam,
Seminis Cardui benedicti drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS PLEURITICUS ALIUS, SECUNDUM MÛNSICHTUM.

REC. Florum Sulphuris unciam semis,
Dentium Apri,
Mandibularum Lucii piscis ana unciam unam.

Florum papaveris unciam semis.
Misce, fiat pulvis.

Pleuriticis offeruntur hi pleuritici dicti pulveres ex aqua Cardui benedicti vel alia diapnoica, & ad miraculum posteriorem nonnunquam, brevi tempore, dolores mitigasse, dicunt; vix & ne vix quidem a terreis talia miracula deducere licet.

Dosis utriusque scrupulus unus vel drachma semis.

PULVIS PRÆCIPITANS STAHLII.

REC. Concharum marinarum præparatarum,
Matris perlarum præparatæ,
Cornu cervi usti præparati,
Oculorum cancerorum præparatorum ana unciam semis,
Antimonii diaphoretici drachmam unam.
Cinnabaris nativæ præparatæ drachmam semis.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Est absorbens, & conducit illis, quibus ventriculus acido oneratus est; loco temperantis pulveris etiam præscribitur illis, qui salia & nitrum ferre nequeunt.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS PURPUREUS ANGLICUS.

REC. Cornu cervi sine igne præparati,
Succini albi,
Coralliorum rubrorum,
Matris perlarum ana unciam unam,
Oculorum cancerorum,
Chelarum cancerorum ana uncias duas,
Crocī scrupulum semis,
Coccionellæ scrupulos duos.

Coccionella & crocus, aceto vel succo citri

PULVIS.

trita, reliquis præparatis, vel in pulverem subtilissimum tritis, admisceantur.
Laudatur in variolis & morbillis.
Dosis scrupulus unus vel drachma semis.

PULVIS RESOLVENS STAHLII.

REC. Concharum sine igne præparatarum,
Antimonii diaphoretici,
Nitri crudi purissimi ana uncias duas.
Misce, fiat pulvis.

Conducit ad humores lentescentes resolvendos, in ipsis febribus, quin multis pulveribus sic dictis bezoardicis, imprimis ex lapidibus pretiosis compositis, præstat.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS.

REC. Pulveris præcedentis resolventis uncias tres,
Extracti Chacarillæ unciam unam.

Misce.

In morbis pectoris, peripneumonia, pleuritide, egregias resolvendi vires possidet; sic etiam in diarrhæis febrium acutarum, & dysenteria omnibus aliis palmam præripit.
Dosis scrupulus unus ad drachmam semis & ultra.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITVS STAHLII.

REC. Radicis Scillæ recentis libram unam,
Vincetoxici, five Hirundinariæ pulverisatæ uncias quatuor.

Scilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pulvem contundenda, cui additur Vincetoxici radix ficcata & recens pulverisata, impastentur; postea leni calore exsiccata rursus pulveriscentur.

Est hic pulvis resolvens præstantissimus in asthmate humido, catarrho suffocativo, œdematibus & cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum quinque. Potest pilulis laxantibus

PULVIS.

bus commode misceri, celeberrimum Stahlianum clysteribus etiam indidisse, clarissimus Schulzius perhibet.

PULVIS STERNUTATORIUS.

REC. Radicis Liquiritiæ drachmas tres,
Ellebori albi drachmas duas,
Herbarum Majoranæ,
Basilici,
Foliorum Nicotianæ,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium ana unciam semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Styracis drachmas duas.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde
Olei destill. Lavendulæ,
Ligni Rhodii ana guttas duodecim,
Caryophyllorum guttas octo,
Sacchari albi unciam unam,
Coloris coerulei Indici drachmam semis,
Moschi, in aqua Rosarum soluti, grana quinque.

Ufus omnibus notissimus.

PULVIS STERNUTATORIUS.

ALBUS,

sive

ELÆOSACCHARUM CEPHALICUM CAMERARII.

REC. Olei destill. Majoranæ,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii ana guttas tres,
Cinnamomi,
Citri,
Fœniculi,
Lavendulæ ana guttas duas,
Moschi grana tria,
Sacchari albissimi uncias tres semis.

Misceantur exactissime, & in vitro ferventur.

Ufus est sequentis.

PULVIS.

143

PULVIS STERNUTATORIUS

ALBUS,

vel

ELÆOSACCHARUM CEPHALICUM GMELINI.

REC. Sacchari albissimi uncias duodecim,
Ambra griseæ,
Moschi ana scrupulum semis,
Olei destill. Cinnamomi,
Caryophyllorum ana guttas quindecim,
Anisi,
Anthos,
Lavendulæ,
Majoranæ ana drachmam semis,
Ligni Rhodii,
Succini ana scrupulum novum.

Ambra dissolvitur in oleis; Moschus vero in parva quantitate aquæ rosarum, quæ postea saccharo commiscetur.

Non solum naribus, loco pulveris sternutatorii, attrahi potest, sed etiam in affectibus spasmodicis ac paralyticis linguae adhiberi.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS STERNUTATORIUS NOPSII.

REC. Radicum Caryophyllatæ,
Iridis Florentinæ ana scrupulos duos,
Ellebori nigri scrupulum unum,
Herbæ Basilici scrupulos octo,
Betonicæ,
Rorismarini ana drachmam unam,
Salviæ hortensis drachmas duas,
Florum Anthos,
Betonicæ,
Salviæ ana scrupulum unum,
Lavendulæ scrupulos quatuor,
Liliorum convallium drachmas tres,

Florum Rosarum rubrarum scrupulos septem,

Seminis Anisi,

Erucæ ana scrupulos quinque,

Pæoniæ scrupulos duos,

Caryophyllorum aromaticorum drachmas sex,

Cubebæ drachmas tres,

Cardamomi minoris drachmam unam.

Misceantur, & fiat omnium pulvis tenerrimus, addantur

Succini albi præparati scrupuli quatuor,

Olei destill. Caryophyllorum,

Majoranæ,

Anisi ana guttæ decem,

Moschi grana sedecim.

A longo tempore in officinis in usu est. Vires ex nomine patent.

PULVIS STERNUTATORIUS VARIEGATUS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,

Iridis Florentinæ ana drachmas tres,

Foliorum Nicotianæ drachmas sex,

Herbæ Majoranæ,

Florum Calendulæ,

Cyani ana drachmas duas,

Liliorum convallium,

Rosarum rubrarum ana drachmas tres.

Minutissime incisus adde

Olei Caryophyllorum,

Lavendulæ,

Ligni Rhodii ana guttas triginta.

Misce, atque pro lubitu addantur

Moschi in aqua rosarum soluti grana tria.

Tam oculis ob colorem varium, quam naribus ob odoris suavitatem, gratus est.

PULVIS STOMACHICUS BIRCK- MANNI.

REC. Radicum Ari præparatarum uncias duas,

Acori vulgaris,

Pimpinellæ ana unciam unam,

Oculorum cancri unciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Salis Absinthii,

Juniperi ana drachmam unam,

Sacchari rosati ad pondus omnium.

Misceantur, & in pulverem redigantur.

Magnis encomiis pulverem hunc laudat Quercetanus: Exhibetur, inquit, non tantum ad ventriculum roborandum, cui pro- prie convenit, sed etiam ad capitis affectus, ad hemicranias acutissimas, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam & similes affectus; ad calculum etiam & febrem quartanam porrigitur, habet enim facultatem deoppilandi, hepar, lienem & mesenterium, & dissolvendi & liquefaciendi tartarum glutinosum, qui plurimorum morborum causa, existit.

Dosis drachma una ad drachmas duas, & ultra.

PULVIS AD STRUMAS.

REC. Spongiarum combustarum uncias novem,

Arcani duplicati uncias duas,

Radici Vincetoxici unciam unam,

Cinnamomi drachmas duas.

Pulverisata misceantur.

Ad strumas & scrophulas abigendas probata est virtutis, et ob securitatem palmam præripit aliis ejusmodi pulveribus, quos aromata acriora ingredi solent.

Dosis scrupulus unus vel duo. Pro lubitu misceri potest cum saccharo, vel cum syrupo in Electuarium redigi.

Sumitur matutino tempore & ante somnum, luna decrescente.

PULVIS TEMPERANS.

REC. Lapidum cancrorum, subtilissime pulverisatorum,

Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias duas,

Matris Perlarum præparatæ,

Tartari vitriolati ana uncias quatuor,

Nitri purissimi crystallisati uncias octo,

Cinna-

Cinnabaris factitiæ purissimæ, in alcohol redactæ, unciam unam & drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Variae circumferuntur descriptiones hujus pulveris; omnes vero, vel plurimæ, cum hac nostra conveniunt, tam respectu quantitatis nitri, quam absorbentium & cinnabaris. Nonnullæ tamen loco Tartari vitriolati, Arcanum duplicatum præscribunt; atque coralliis & matri perlarum, antimonium diaphoreticum & conchas substituunt. Cinnabaris in his facit partem decimam quartam, in aliis decimam quintam.

Vix tamen notabilis intercedit, intuitu virium, differentia; igitur hanc, quam in priori editione hujus libri dedimus descriptionem, utpote in plurimis nostris officinis jam usitatam, servare maluimus, quam præter necessitatem immutare.

Ad sanguinis æstum temperandum & vitiosos humores, in primis viis, corrigendos, utiliter datur.

Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

REC. Pulveris epileptici Marchionis,
Radicum Iridis Florentinæ,
Liquiritiæ ana drachmas sex,
Seminum Anisi,
Lycopodii,
Fœniculi ana drachmas duas,

Croci Austriaci scrupulum unum.
In pulverem trita servantur.

Ad infantum morbos ab acido in primis viis, flatibus, torminibus, & urinae retentione atque ardore commendatur.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum.

PULVIS TUNCHINENSIS.

REC. Moschi optimi grana sedecim,
Cinnabaris Antimonii nativæ,
præparatæ ana grana duodecim.

Misce pro una dosi ordinaria.

Primaria ejus virtus laudatur adversus effectus morsus rabidi canis, manias et melancholias, febres malignas & exanthematicas varias; sudorem copiosum excitando. vid. Prof. Gmelini Dissert. Tübingæ A. 1750. edita.

Circa usum autem hujus pulveris scrupulum maxime movere potest infida Moschi pretiosi, mangonio obnoxii, qualitas.

PULVIS CONTRA VERMES.

REC. Radicum Filicis foeminæ ramosæ,
Rhabarbari veri,

Seminis cynæ,

Musci corallini ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Lumbricos expellit.

Dosis est scrupulus unus ad drachmam semis; repetitis vicibus dari debet, & pro libitu, atque necessitate, vel Mercurio dulci, vel Æthiope minerali, nec non Diacrydio acui potest.

PULVIS VIENNENSIS ALBUS VIRGINEUS, DIAPHORETICUS.

REC. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas.

A sordibus optime purgata in crucibulo calcinentur, postea super porphyritem terantur, denique, affusa copiosa aqua, pars subtilior, per inclinationem, separetur, quæ siccata usui servetur.

Pulvis hic falso a nonnullis pro terra alcalina, acidum absorbente, habetur, cum potius sit gypsea. Sunt tamen qui utilem credunt esse in nimio æstu febrili, ad bilem infringendam, calorem minuendum, & sitim levandam.

Dosis scrupulus unus.

PULVIS VITÆ IMPERATORIS.

REC. Radicum Zedoariæ,
Enulæ,
Calami aromatici,
Pimpinellæ,
Galangæ,

Caryophyllatæ,
 Liquiritiæ ana drachmas duas,
 Herbarum Scolopendrii,
 Veronicæ,
 Cardui benedicti,
 Florum Centaurii minoris ana drachmam
 unam.
 Foliorum Sennæ electorum unciam
 unam semis,
 Seminum Anisi,
 Foeniculi,
 Carvi,
 Petroselini ana drachmam unam
 semis,

Baccarum Juniperi drachmas tres,
 Cinnamomi ana drachmam unam,
 Cubearum,
 Cardamomi ana scrupulos quatuor,
 Macis,
 Cornu cervi usti ana drachmas duas,
 Rhapontici veri unciam semis,
 Rhabarbari electi drachmam unam semis,
 Cremoris Tartari drachmas tres,
 Sacchari candi albi uncias quatuor semis.

Misce, fiat pulvis.

*Ad ventriculū roborandum, flatūs pellendos, nec
 non ad tussim senum, ab indigestione ortam, com-
 mode adhibetur.*

Datur a drachma una ad drachmas duas.

RADICIS ARI PRÆPARATIO.

Colligenda est radix primo vere, dum ger-
 minare incipit, mundata, & cultello
 eburneo in orbiculos dissecta, infunda-
 tur vino albo, & maceretur in loco fri-
 gido, per viginti quatuor horas; quibus
 elapsis, vinum per inclinationem sepa-
 retur, & radix, in furno vel clibano
 siccata, in pulverem teratur, & usui
 asservetur.

*Incidit & resolvit; ad Pulverem stomachi-
 cum Birckmanni requiritur, & faculis
 longe præferenda est.*

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

REC. Clavorum ferreorum purgatorum uncias
 octo,

Candefactis in crucibulo injice successive
 Antimonii Hungarici uncias sedecim,
 optime fufis adde
 Nitri uncias tres.

Hæc probe, per horæ quadrantem & ultra, ig-
 ne sat forti, ad instar aquæ, fusa, fluentia
 cono fusorio, sevo illito, infundantur, co-
 num in ipsa fusione continuo percutiendo,
 & promovendo reguli subsiditiam & sepa-
 rationem. Refrigeratis omnibus, eximatur
 tota massa, cui in fundo adhærebit regulus,
 superiore sui parte jamdum stellam obscure
 ferens, qui, a scoriis separatus, denuo se-
 cunda & tertia vice, additis semper

Nitri duabus, vel tribus unciis, fundi, &
 calici fusorio immitti potest; post singulas ad-
 ministraciones, scorias separando; sic mox,
 secunda aut tertia fusione peracta, in parte
 superiore reguli, stella accurate conformata,
 & quasi ad normam exacta, deprehendetur.

*Usibus chymicis potius, quam medicis, inservit, &
 ad scyphos vomitorios, addito duplo stanni ponde-
 re, in quibus vinum infusum emeticum evadit.*

REGULUS ANTIMONII MEDICI- NALIS.

REC. Antimonii crudi optimi uncias quin-
 que,

Salis communis uncias quatuor,
 Tartari unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exacte misce,
 ac in crucibulo candenti institue fusio-
 nem, ut fluant per horæ quadrantem,
 instar aquæ; exemptum postea igne
 crucibulum quiescat & refrigeretur.
 Fracto crucibulo ea portio, quæ sub hoc
 labore præ altera copiosiore sale referta
 est, & superiora occupat, scoriarum no-
 mine separetur; inferior portio picei co-
 loris, splendens, quæ (licet improprie)
Regulus dicitur, subtilissime supra Por-
 phyritem teratur, atque pulvis, colo-
 rem puniceum jam referens, vase opti-
 me clauso in loco sicco servetur.

*Laudatur ad febres intermittentes, & Febri-
 fugum Cranii vocatur. Ingreditur porro
 Pulverem alexipharmacum Rollwagii
 dictum. In lymphæ vitiis, scabie, arthri-
 tide,*

tide, hydrope, præsertim anasarca, cum Mercurio dulci administratus, optime evenisse visus est.

Notandum autem venit, regulum hunc semper in loco calido sicco asservandum esse, alias facile vomitum in sensibilibus, illius usu, excitari, deprehensum est.

Dosis grana decem, quindecim, ad grana viginti quinque.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

REC. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea, igne vehementiore adhibito, fundantur, fusa in conum fusorium, calefactum & sebo illitum, effundantur, conum, ut in fundum abeat regulus, concutiendo; tandem scorix ab eo separentur, & regulus aqua abluitur.

E scorix, aqua solutis, per præcipitationem, SULPHUR AURATUM parari potest.

Variis laboribus chemicis inservit hic regulus.

RESINA GIALAPPÆ.

REC. Radicum Gialappæ, quantum libet.

Crassiuscule contusis affundatur Spiritus vini optime rectificatus, ut tres vel quatuor digitos superemineat. Stent infusæ in loco calido, per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, qua ad fundum præcipitatur resina, *Magisterii* nomen inde nata, & spiritus vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappæ, in fundo cucurbitæ hærens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso, ad piceam consistentiam redigatur, at-

que in cylindros contortos efformata, fervetur.

Est purgans universale & præcipue pilulis laxantibus pro stimulo additur. Nunquam sola dari debet, intestinis enim adhæret, & non solum tormina & hypercatharses, verum etiam funestas inflammationes excitare potest. Optima methodus exhibendi est in pilulis, ubi extractis jungitur, & particula resinosa disgregantur. Amygdalis vel Pineis trita, ab oleosa earum substantia quidem dissolvitur, verum ita vehiculo frigido assumi debet, ne resina rursus coaguletur. Pessimus modus est, illam exhibendi, si in spiritu soluta, absque syrupi additione, datur; mox enim, e spiritu præcipitata, pristinam piceam substantiam induit.

Dosis in pilulis grana quatuor, sex, vel septem; in forma pulveris, cum Amygdalis triti, usque ad scrupulum semis, in robustioribus, ad grana duodecim ascendere licet.

RESINA SCAMMONII.

Pari opera & methodo, qua Gialappæ resina sive magisterium, conficitur.

Eadem habet vires, & eadem exhibetur dosi & modo.

ROOB BERBERUM.

REC. Succus berberum depurati libras quatuor,

Sacchari albi libram unam.

Coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam.

Additur julapiis & electuariis. Refrigerat, sitim sedat, & bilem refrænat.

ROOB CERASORUM,
MORORUM,
RIBIUM,
RUBI IDÆI.

Pari modo parantur, atque eadem habent virtutes.

ROOB.

ROOB CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum depurati libras
sex,

Sacchari albi libram unam.

Coque ad mellis spissitudinem.

*Leniter adstringit, ventriculum roborat, si-
tim sedat, atque præprimis biliosis con-
venit.*

Dosis uncia semis ad drachmas sex.

ROOB CYNOSBATI.

REC. Pulpæ fructuum Cynosbati maturo-
rum libras tres.

Sacchari albi libras duas.

Evaporentur, ad justam consistentiam,
igne lento.

*Leniter adstringit, & ad nephritidem calcu-
losam commendatur.*

ROOB EBULI.

Fit, Succi granorum Ebuli depurati libram
unam, cum

Sacchari unciis duabus,

ad mellis consistentiam, igne moderato,
inspissando.

*Est alexipharmacum atque diureticum; datur
hydropicis, ubi per alvum & urinam vires
exferit.*

Dosis uncia semis ad integram.

ROOB JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi maturarum, re-
centium, conquassatarum, li-
bras octo.

Coquantur in aqua communi, decoctum
per setaceum coletur, & ad consistenti-
am mellis, cum

Sacchari libra una,
lento igne redigatur.

*In ventriculi morbis, flatibus pellendis, ad
urinam & sudorem movendum, commen-
datur; hydropicis etiam conducit, & a
nonnullis rusticorum panacea & theriaca
vocatur.*

ROOB. ROT.

ROOB NUCUM.

REC. Succi, e nucibus viridibus, circa
festum Baptistæ extracti,
Mellis despumati ana libram unam.
Coquantur ad justam consistentiam.

*Commendatur ad ulcera oris & lingue, item
in angina & tonsillis tumefactis, gargaris-
mis additur.*

ROOB SAMBUCL.

REC. Succi baccarum Sambuci matura-
rum partes sex,

Sacchari albi partem unam.

Coque igne moderato, cavendo empyrev-
ma, ad consuetam consistentiam.

*Gratius est, virtute vero cum ebulino conve-
nit.*

ROTULÆ BERBERUM.

REC. Sacchari albissimi libram unam.
In pulverem redactum, leni admodum
igne, incalescat, cui tum adde
Succi berberum, per subfidentiam
optime depurati, uncias duas.

Sicque, absque omni coctione, in confi-
stentiam tabulati reduc, ac in rotulas,
ut artis est, effunde.

*Cum syrupo conveniunt, ad sitim & siccita-
tem oris, in febribus imprimis, commen-
dantur.*

ROTULÆ DIAIREOS.

REC. Specierum Diaireos simplicium un-
ciam unam,

Sacchari albissimi, in sufficienti quan-
titate Aquæ Violarum soluti,
& ad consistentiam tabulati coc-
ti, uncias duodecim.

Misce, fiant lege artis rotulæ.

*Sunt pectorales; materiam acrem tenuem
incrassant, & expectorationem adjuvant.*

ROTULÆ MANUS CHRISTI,
sive

SACCHARUM PERLATUM.

REC. Sacchari albissimi libram unam,

Aquæ

Aquæ rosarum, quantum satis, pro sacchari solutione.

Coquantur ad tabulati consistentiam, & addatur

Matris perlarum præparatæ uncia semis.

Effundatur in rotulas.

Pulveribus analepticiis & emulsionibus addi solet.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynæ,

Corallini musci,

Cinnamomi,

Æthiopis mineralis ana scrupulos duos,

Sacchari albi, in aqua rosarum soluti & ad consistentiam tabulati cocti, uncias quatuor.

Fiant lege artis rotulæ.

Uncia continet Æthiopis mineralis scrupulum semis.

Dari possunt a drachmis duabus ad drachmas sex.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Fit, libras duas sacchari albi in libra una aquæ puræ fontanæ solvendo, atque percolando.

Adhibetur electuariis, conditis, &c.

SACCHARUM LACTIS.

REC. Lactis recentis vaccini libras decem.

Reponantur per viginti quatuor horas, auferatur cremor, & residuum lac lento igni exponatur, ut caseosum præcipitetur. Serum, per colatorium separatum, & per chartam bibulam filtratum, in vase figulino vitreato, lento igne, ad sextæ partis remanentiam, evaporetur, atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli collectæ aqua frigida abluantur, & in loco tepido, inter chartas, ficcantur, atque loco ficco, temperato, in vitro asservantur.

Antispasmodicum, demulcens, anodynum & antarthriticum est; scorbuticis, hecticis &

Part II.

nephriticis convenit. Cavendum vero est, ne sit rancidum, sed recens paratum.

Dosis drachma una ad drachmas duas, & ultra.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

REC. Pulveris florum Rosarum rubrarum drachmas duas,

Sacchari albi, in aqua Rosarum dissoluti, & ad consistentiam tabulati cocti, uncias quatuor.

Fiat confectio in tabulis.

Pulveribus, saporis gratia, additur.

SACCHARUM SATURNI CRYSTALLISATUM.

REC. Minii, aut Lithargyrii, quantum vis.

Affunde, in vase vitreo, aceti destillati acerrimi, quantum sufficit, ad eminentiam quatuor ad minimum digitorum, digere in loco moderate calido, sæpius, ab initio præsertim, bacillo aut spatula lignea, ne nimium in fundo concreascit, per unum alterumve diem, agitando, donec acetum a Saturno saturatum, flavescat, & sapore dulcescat. Deinde solutionem decanta, ac novum acetum destillatum affunde, ut denuo aliquot digitos superemineat, idque toties reitera, novum acetum destillatum affundendo, donec dulcescat. Extractions omnes conjunge, atque in vase figulino, leni igne, evapora ad cuticulam, & ad crystallisandum repone. Crystallinos leni calore exsicca.

Lithargyrium semper cupro inquinatum est; hinc præstat saccharum saturni, vel ex plumbo puro crudo, vel minio præparare; breviori etiam manu, ac citius, leni decoctione, quam digestionem, sal extrahitur, & plumbum solvitur; decoctio vero, uti supra diximus, in vase figulino, vitreato, instituenda. Residuum, quod in crystallos abire

Pp

recu-

- recusat, leni igne evaporatur, atque siccatum, in pulverem tritum, servatur.

Externi tantum usus est; refrigerat, mundificat, adstringit & siccatur; in collyriis, ad oculorum inflammationem, adhibetur. Sunt, qui interne, ad epilepsiam, gonorrhœam quoque veneream extinguendam, dant, id quod omnino periculosum & noxium.

SAL ABSINTHII, SAL HERBARUM.

REC. Absinthii ficci, vel Herbæ cujuslibet, quantum vis.

In sartagine ferrea super carbones justo calore calefacta, redigatur lente & successively. novam semper Herbæ portionem addendo, in carbonem. Violentia autem ignis & flamma arcentur, imposito sartagini operculo. In fine combustionis virga ferrea movendi sunt cineres, ut æqualiter calcinentur, atque omnes carbones in cineres albos abeant; qui aqua frigida elixiventur, novam adjiciendo aquam, usque dum ultima a cineribus redeat insipida. Lixivium leni calore evaporando, sal alcalinum fixum, ulteriori in aqua solutione, filtratione & evaporatione album, & methodo hac Tacheniana per lentam incinerationem non adeo acre remanet, fusione autem, qua quicquid carbonacei sali adhæsit comburitur, fortius reddendum.

Not. Caveant Pharmacopæi cineres, vel sal ipsum cum sulphure, pro more, calcinare, vel acidum quoddam addere, eo fine, ut sal in crystallos evaporando concreascet; siquidem tali modo non sal alcalinum incineratione Herbarum obtinent, sed neutrum, tartaro vitriolato simile. Hæc salia alcalina, cum non prius ex vegetabilibus obtineantur, quam ubi ignis omnem eorum resolvit mixtionem, specificas plantæ virtutes nequaquam retinent. Neque consultum esse censemus, variorum in posterum salium nomina, in pharmacopoliis venditari, & imposturæ fraudulentæ pretii aug-

mento locum relinqui. Ex quocunque fuerint vegetabili parata, imprimis si ab oleo empyreumatico fuerint depurata, vix differrent inter se scopo medico, licet levissimæ quædam diversitates subesse possint. Omnia acidum infringunt, humores crassos resolvunt, attenuant, incidunt, urinam & alvum cient. Raro per se solum herbarum sal, sed plerumque cum aliis mixtum, præscribitur. Illustris Bærhavæ ad drachmam unam & ultra, in copiosa aqua dissoluta, ad febres intermittentes pertinaces expugnandas, adhibere jussit.

Salva igitur conscientia exulare possent ex Taxa & syllabo Medicamentorum salia numerosa ex singulis vegetabilibus per incinerationem paranda; quibus omnibus vel sal Absinthii unicum, vel ex pluribus plantis, prout lubet, multo principio salino factis, mixtim sumtis, per incinerationem Sal Herbarum vel & sic dicti cineres clavellati bene depurati viliori pretio sal genuinum alcalinum exhibentes substitui possunt.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

REC. Salis Armoniaci, quantum vis; solvatur in aqua calida, solutio filtretur; postea in locum frigidum reponatur, & sal in liquore subsidens exsicceatur; liquor vero remanens, pro ulteriori salis collectione, per exhalationem concentretur.

Depuratio quoque fieri potest per novam sublimationem, & tum FLORUM SALIS ARMONIACI nomine venit.

Dantur, scopo resolvendi, in viscerum obstructionibus, præcipue ad febres intermittentes, a scrupulo uno ad drachmam dimidiam, imo integram.

SAL ALCALI VOLATILE EX SALE ARMONIACO.

REC. Salis Armoniaci albissimi, optime exsiccati uncias quatuor,

Cretæ

Cretæ purissimæ, pulverisatæ, leni calore pariter optime ficcatae uncias quinque.

Mixtis invicem & retortæ prius immixtis, quam humidum ex aëre iterum attraxerint, adaptato recipiente, & juncturis clausis, instituatur ex arena sublimatio, igne ab initio lento, sub finem fortiori. Ita sublimatur in collum retortæ, (quod breve & amplum esto) & vas recipiens sal alcali album, purum; alias non nisi iterata sublimatione obtinendum. Sal hoc urinofum omnis olei empyrevmatici, quod alias ex destillatione, salibus urinosis, Cornu Cervi, Lumbricorum &c. adhæret, & diversitatem eorum aliqualem constituit, expers est, & tanquam purissimum reliquis, ob oleum empyrevmaticum magis calefacientibus præferendum, minori identidem pretio parandum.

SAL VOLATILE ANGLICUM SICCUM.

REC. Salis Tartari uncias duas,
Ammoniacy uncias sex.
Terantur seorsim, atque immittantur cucurbitæ vitreæ, addantur
Olei destillati Lavendulæ drachmæ tres,
Spiritus vini rectificatissimi uncia una.

Superimponatur statim alembicus, atque lenissimo igne sublimetur sal, quod vitris parvis inclusum, atque operculis vitreis obturatis, fervetur.

Ex tempore parari potest, si
Salis Ammoniacy partes duæ,
Tartari pars una, additis,
Olei Lavendulæ, vel alius odorati, guttis aliquot, misceantur.

Ad olfaciendum offertur hyssericis, & a cephalalgia vexatis.

SAL CORALLIORUM.

Solutio Coralliorum, aceto destillato facta; in vase figulino evaporatur, materiæ residuæ

salinæ, ut odore aceti privetur, aquæ fontanæ portio superfunditur, atque denuo, leni coctione, ad ficcitatem perducitur.

Pari modo etiam parantur

SAL MARGARITARUM.

MATRIS PERLARUM,

OCULORUM CANCRORUM.

Salia hæc sunt solutiones, & virtute omnia gaudent resolvente, diuretica & sudorifera.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

E cervi cornibus, in segmenta mediocria dissectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato, & juncturis optime clausis, una cum spiritu & oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori segregatur, rectificatione postmodum, e cucurbita vitrea, arenæ igne admodum leni, a spiritu quoque ac phlegmate separatur, & ossium calcinatorum, vel cretæ albæ quadruplo mixtum, sublimatur, itaque ad puritatem desideratam & candorem gratum deducitur.

Verum cum hæc desiderata puritas rarius & difficilius hac methodo obtineatur, aliam addere lubet.

REC. Salis Ammoniacy depurati ficci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum exsiccatum uncias octo,
Olei e Cornu Cervi vel aliis ossibus parati drachma una.

Misceantur et immittantur retortæ vitreæ in balneum arenæ reponendæ, ex qua in vas recipiens, juncturis bene clausis, adaptandum, sal volatile sufficiente ignis gradu expellatur.

Salia volatilia animalia sunt alcalinæ naturæ, insigni gaudent penetrabilitate, resolvunt, tonum excitant, sicque secretionis omnis generis promovent, atque opem adferre possunt, ubi motus excitandi sunt; e contra

ab usu eorum abstinendum, ubi jam per se nimis intensi.

Dantur a granis tribus ad grana duodecim; largiori vero dosi dari possunt, si ab oleo empyreumatico liberata sunt; facilius etiam senes, quam juvenes, phlegmaticos, quam sanguineos & plethoricos perferre, exper- tum est.

SAL ESSENTIALE ACETOSÆ ET ACETOSELLÆ.

Herbarum Acetosæ, vel Acetosellæ copi- am ingentem concisam, & in mortario lapideo contusam, inter lintea pura, prelo fortiter exprime. Succum expres- sum sæpius per manicam Hippocratis cola, donec limpidus, purus & tenuis transeat. Liquorem ita depuratum e vitreis vasis, vel figulinis probe vitrea- tis, leni ebullitione inspissa, ad confi- stentiam fere Cremoris lactis recentissi- mi; inspissatum hoc liquidum infunde vitro cylindrico, vel, quod præstat, uri- nali, ut usque intra collum plenum sit; superaffunde parum Olei olivarum, & in cellam, per septem, octo, vel plures menses repone. Ita sub oleo, quod fer- mentationem & mucilaginis generatio- nem prohibet, concrescet sal, speciem Tartari referens, qui, per inclinationem, a liquore separatus, & subita aquæ fri- gidæ affusione, paulum ablutus quam ocyssime a sæce, leniterque exsiccatus, verum exhibet sal plantarum nativum.

Citius etiam hoc sal parari potest, succum acetosellæ, vel per subsidentiam, vel addito albumine ovi, per ebullitionem clarificando, in vitro vel olla vitreata; ad tertiæ vel quartæ partis remanenti- am, lenissimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: sic ple- rumque spatio viginti quatuor horarum, sal concrescit, & ad fundum vasis descendit, quod vel ficcari, vel in aqua fontana rursus dissolvi, coagulari, & ta- li modo depurari potest. Paratur in no- stra patria larga quantitate Tuttlingæ, ubi acetosella abundantissime provenit.

Acidum gratum est; hinc julapiis refrige- rantibus additur, maxime vero apud nos in usu ad maculas atramentosas lin- teorum delendas.

Adulteratur interdum per cremorem Tar- tari, cujus admixtio difficiliore in aqua solutione detegitur. Sunt etiam qui aci- ditatem spiritu Vitrioli vel Nitri augment.

SAL ESSENTIALE TARTARI five

ACIDUM TARTARI CRYSTALLI- SATUM.

REC. Cretæ puræ pulverisatæ libram unam.

Coquatur cum aquæ fontanæ libris octo in lebetæ stanneo per integram horam ut omne, quod fortissimè inesse possit, sali- num extrahatur. A subsidente pulvere cretaceo liquor supernatans decantetur atque denuo aquæ fontanæ libræ octo affundantur, quibus ad ebullitionem de- ductis successive crystalli tartari pulveri- satæ, sub sæpius repetita totius massæ agitatione, eo usque injiciuntur, donec tartarus non amplius cum creta effe- vescit, neque amplius, factò tentamine, violarum syrupus exinde colorem mutat. Removeatur nunc lebes ab igne, & ex- spectetur pulveris subsidentia, liquoris- que supernatantis limpiditas. Coit sic super abundans in Tartaro acidum cum creta, constituitque *seleniten tartari*. Li- quor superflans, qui tartarum tartarita- tum continet adeoque non huc pertinet, decantetur & selenites tartari in fundo va- sis aliquoties aqua frigida abluatur, poste- aque in vas vitreum immittatur, atque ei spiritus vitrioli, qui ex una parte olei vitri- oli & aquæ octo partibus componitur, di- luti libræ octo cum quadrante superaffun- dantur. Mixture sæpius cochleari ligneo agitanda relinquatur super arenam cali- dam posita per nychthemera, liquor su- perflans decantetur, residuum terreum filtro imponendum toties aqua abluatur, donec transiens liquor insipidus sit.

Hi liquores post adfusum spiritum vitrioli obtenti continent acidum tartari, & per filtrum trajecti inspissantur ad consistentiam Syrupi, sub qua inspissatione gypsea materies adparet, ut ideo inspissatus liquor denuo per filtrum trahendus & postea demum in loco frigido ad crystallisationem reponendus sit. Reliquus post crystallisationem liquor denuo similem in modum inspissatur, & sic successive crystalli salis essentialis tartari reperito labore acquiruntur quæ postea super chartam expansæ desiccandæ sunt et acidum vegetabile concentratum constituunt, quod cum sale essentiali acetosellæ quidem convenit sed multo meracius est.

NB. Ut certus esse queas, acidum vitriolicum non majori, quam par erat, quantitate adhibitum fuisse, hoc experimentum cum liquoris, qui acidum tartari continere dictus est, parca quantitate instituitur, ut huic aceti saturnini aliquot guttæ instillantur, unde mox pulvis albus præcipitatur, qui si spiritu nitri iterum solvitur, tunc acidum tartari non est acidum vitrioli contaminatum. Si non solvitur, indicium est, continere acidum vitrioli admixtum, quod vitium corrigitur additione aliquot unciarum selenitæ tartari, ut acidum vitrioli sic adhæreat terræ calcareæ, gypsum constituat, et acidum tartari relinquat!

SAL DIGESTIVUM

five

FEBRIFUGUM SYLVII.

REC. Residuum a destillatione spiritus salis Ammoniaci, qui cum sale alcalino præparatus est, solvitur in aquæ communis puræ ferventis sufficiente quantitate. Solutio filtratur per chartam, & evaporatur in olla terrea vitreata, ad siccitatem usque, agitando spatula, donec sal relictum fuerit siccum & albissimum.

Pars II.

Vires sunt attenuantes, incidentes & resolventes. Prodest in febribus quartanis, nec non tertianis, diaphoresin & urinam movet, refrigerat, & ad scrupulum unum dari potest.

SAL HERBARUM, vide SAL ABSINTHII.

SAL MIRABILE GLAUBERI,

Ipsa natura hoc sal in fontibus salinis producit, potest varia ratione v. g. sub præparatione salis Armoniaci ex acido vitriolico, sale communi et alcali volatili obtenti acquiri, sed in pharmacopoliis plerumque paratur ex isto residuo sale, quod post destillationem spiritus Salis Glauberiani, in fundo retortæ vel cucurbitæ reperitur, dum aqua fontana fervida dissolvitur, solutio filtratur atque evaporatur, donec pelliculam formare incipit. Tum quietum in loco frigido reponitur, ubi in massam glaciam coire solet. In fundo manebit liquor corrosivus, a crystallis separandus. Si vero sal ille, ex alcali Salis communis et acido Vitrioli constans, in aquæ fervidæ sextuplo solvitur, solutio parum inspissatur, & in vitro magno reponitur, tum concrevit in pulcherrimas crystallos, singularis formæ, fatis magnas, in aëre non deliquescentes, & calore in pulverem album fatiscentes. Facta in aqua solutione salis, si purum fuerit, addito lixivio alcalino, nihil terræ alcalinæ præcipitatur; si impurum, ope lixivii alcalini depurari potest, denuo crystallizando.

Sal rite paratus & in pollinem reductus, triplo aceti, cerevisiæ, vini, vel aquæ mixtus & repositus, crystallisatione sua congelationem refert. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fusus, sine sulphuris additione, massam exhibet, Hepar sulphuris dictam, ex qua verum sulphur minerale præcipitari potest. Interne leniter incidendo, detergendo, stimulando, urinam pellendo, alvum movendo, resolvendo, laudem meretur.

Qq

SAL

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Ad normam Salis cornu cervi paratur.

Viribus etiam cum illo convenit.

Datur & eadem dosi.

Sunt, qui vim magis antispasmodicam adscribunt, quam cæteris salibus volatilibus.

SAL POLYCHRESTUM E NITRO ET SULPHURE.

REC. Nitri puri, ficcissimi,

Sulphuris ana partes æquales.

Terantur invicem, mixtum per exiguas portiones ingeratur crucibulo candenti, ea lege, ut nova portio non ingeratur, antequam prior penitus cessaverit detonare. Omnis massa salina adhuc per dimidiam circiter horam detineatur in crucibulo candente, et crebro agitetur, ut, si quid sulphuris ignis actionem non esset expertum, adhuc deflagretur. Post refrigerationem sal aqua fervida solvitur, filtratur, et evaporatione debita in crystallos redigitur.

Ex alcali nitri & acido sulphuris sic formatur sal medium, Arcano duplicato analogum, licet facilius in aqua solubile.

Earundem cum illo virium.

SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE.

REC. Sodæ Hispanicæ, quæ est sal e planta Kali paratum, libram unam,

Dissolvatur in

Aquæ fontanæ ferventis libris tribus.

Solutio per chartam filtretur, & in vase figulino ebulliat, inter bulliendum inspargatur

Crystallorum Tartari, in pulverem tritarum, quantum lixivium Sodæ capere potest; sufficiunt plerumque uncia sex, vel septem.

Mox, post additionem crystallorum Tartari, oritur effervescencia, quæ per intervalla cessat & renascitur. Tandem præcipitatur pulvis levis, cineritii coloris. Liquor supernatans, per chartam filtra-

tus, ad tertias lento igne evaporatur, atque ad crystallifactionem reponitur.

Vix determinari potest pondus certum crystallorum tartari. Soda enim non eadem semper est, & vel majorem, vel minorem quantitatem Salis Alkali continet. Crystallorum Tartari igitur tantum addere necesse est, usque dum effervescentia omnis cesset, quod signum est saturationis.

Cum tartaro solubili, vel tartarificato convenit, & easdem vires habet. Loco Salis Anglici cathartici, a drachmis duabus ad sex, in aqua solutus, dari potest. Urinam ciet, & alvum movet, absque ulla molestia.

SAL SEDATIVUM HOMBERGII.

REC. Boracis pulverisatæ uncias quatuor; Solve in sufficiente aquæ fervidæ quantitate, affunde

Olei Vitrioli concentrati drachmas decem,

vel eam quantitatem, quæ sufficit, ut mixtum syrupi violarum colorem cæruleum non mutet.

Leni igne, usque dum spicula salina conspiciuntur, evaporatur liquor, qui refrigeratus largietur crystallos splendentes tenues, leves quas sal sedativum vocant. Remansens liquor denuo, ad abigendam humiditatem, igni admoveatur, & frigori exponitur, donec omnes ejusmodi crystalli secefferint, quæ aqua abluendæ sunt, ut perfecte ab adhærente sale Glauberi depurentur. Subquadruplum ponderis Boracis ad laborem recepti æquare solet sal desideratum, *Crystallifactionis* ope hoc modo obtentum. Reliquus post excussum sal sedativum liquor continet sal mirabile Glauberi facile sub frigore in crystallos concrevens.

Obtinetur quoque sal ejusmodi sedativum tenerrimum, minori autem quantitate, & majori pretio per *sublimationem*; si mixtum supra dictum Retortæ ingeritur, & ex arena lento primum calore abstrahitur, tum igne per gradus aucto sal siccum evehitur.

Utra-

Utraque ratione paratum difficulter in aqua est solubile, alcohol subit, & ut viridi flamma ardeat, efficit. Si cum sale Soda unitur, denuo borax surgit, quippe quæ ex alcali minerali & sale sedativo constat.

Sali sedativo, quod etiam SAL VITRIOLI NARCOTICUM dicitur, adscribuntur vires narcoticæ & temperantes, in febribus acutis, cephalalgia, spasimis dolorificis. An certo effectu? dubitatur merito.

Dosis grana tria, ad decem.

SAL SUCCINI VOLATILE.

REC. Rasuræ Succini quantum lubet; Immittatur Retortæ, cui ea est amplitudo, ut ejus non nisi trientem succinum repleat, jungitur ipsi ope vesicæ bubulæ excipulum; instituitur destillatio ex balneo arenæ primolento & successive aucto ignis gradu. Primo prodit phlegma acidulum, quod sequitur oleum flavum, deinde rubrum, & cum illo & subsequente oleo nigro, sal volatile. Excipulum crebro evacuetur. Sal, quod cum oleo flavo sublimatur, & faciliori negotio colligi potest, a parietibus vitri auferatur; quod vero cum oleo rubro & nigro prodit, phlegmate prægresso solvatur, per chartam emporeticam antea madefactam ab oleo separetur, & leni evaporatione in crystallos cogatur, quæ ab adhærente oleo badio colore tinctæ esse solent. Salis sexagesima circiter pars ex succino obtinetur. Ob caritatem pretii quandoque vel sale ammoniaco, vel cremore tartari, vel aliis salibus mediis & oleo succini adulteratum deprehenditur. In priori casu terendo cum sapone madefacto aut alcali fixo, urinosum spirat; in posteriori super ignem detentum non totum volatile avolat. Depurari potest sal suspectum solutione in aqua calida, filtratione, evaporatione & tandem crystallificatione. Magis album evadit si addita una quarta argillæ parte per sublimationem depuratur.

Non solum ad Liquoris cornu cervi succinati

præparationem inservit; sed & per se in affectibus hystericis, catarrhalibus & nervinis utiliter adhibetur; egregium etiam est diureticum, & penetrans aperitivum; ob oleum vero, quod illi adhæret, motus excitat.

Datur a granis tribus ad scrupulum semis, & si probe ab oleo depuratum, ad scrupulum integrum ascendere licet.

SAL TARTARI FIXUM.

Tartarus in vase terreo non vitreato reverberatur, ad albedinem usque; tum, aqua communi solutus, filtratur, & in sal coagulatur, quod repetita solutione & coagulatione, purius redditur.

Est salium alcalinorum omnium optimum ac purissimum. In Medicina non minus quam ad chymicos labores inservit.

Purgantium debiliorum, utpote rhabarbari, & foliorum sennæ, vires excitat.

SAL TARTARI VOLATILE.

Fæces vini in umbra, super asseres effusæ, ficcantur, ex retorta vitrea per gradus, sicut spiritus Tartari, destillantur; sic prodit, una cum oleo & spiritu, sal volatile, quod aqua fontana calida dissolvitur, atque ab oleo extrahitur & separatur, e cucurbita sublimatur & depuratur.

Est sal alcali cum oleo empyreumatico intime mixtum.

Vires diaphoreticæ & diureticæ partim oleo huic empyreumatico sunt adscribendæ; igitur cum eadem cautela adhibendum, qua salia volatilia animalium propinare jussimus.

SAL TARTARI VOLATILE TACKENII.

REC. Salis volatilis urinæ uncias duas, Aceti destillati fortissimi uncias octo. Digerantur leni calore, per aliquot dies; postea leni igne acetum, per destillationem, evocetur, atque

Aceti nova quantitas superfundatur, & post digestionem abstrahatur. Sali relicto

SAPO TARTAREUS,

five

CORRECTOR STARCHKEY.

REC. Salis Tartari purissimi, vel potius falis, ex lixivio Magistra prioris processus per evaporationem obtinendi, libram semis.

Fluat in crucibulo, forti igne, per horam unam aut alteram, sicut pro paranda tinctura tartari fieri solet, ut igneus quasi ac acerrimus fiat. Hunc salem effunde in mortarium ferreum, probe calefactum, & pistillo pari modo calente in pulverem tenuem tere, quem, ab igne adhuc ferventem & tantum non candentem, immitte in purum, siccum, calidissimum vitrum, urinale vulgo dictum, in loco calido & sicco, die sereno; ipso momento, quo sal servidus in vitri fundo collectus hæret, instillatur oleum Terebinthinæ destillatum, purissimum ac æthereum, nullo modo adulteratum, pariter calefactum, guttatim, ita, ut gutta guttam trudet, in mediam partem falis ferventis, tum, ingenti cum fumo & sibilo strepente, trahetur illapsum oleum illico in salem siticulosum, ad intima usque, & diffundet se per totam massam salinam. Instillatio continuatur ocyssime, donec tantum olei in salem attractum sit, ut purum supernatet, sicque omnem accessum aëris a superficie falis arceat, impediatque. Reponitur vitrum in locum subterraneum, charta tectum, brevi oleum disparebit, unitum sali alcalino; affunditur tum iterum aliquid olei calidi ejusdem, & baculo ligneo miscetur priori massæ. Reponitur, ut prius, sicque pergitur, donec triplum fere olei sali sic adunatum sit; eritque massa saponacea, æquabilis, mire penetrabilis. Quæ, quo magis conteritur & movetur, eo citius & felicius perficietur.

Cognoscimus bene absolutum esse opus, quando hic sapo aquæ miscetur, sine olei nota.

SCILLA SOL.

Corrector vocatur, quod si opio, vel alii vegetabili, ob vehementiam alias nocuo, exempli gratia Elleboro, additur, id corrigere credebatur.

Additur hic sapo pilulis polychrestis Starcheyanis, suo loco descriptis.

Abstergit, aperit, diureticus & balsamicus est, atque in gonorrhœa & hydrope feliciter adhibetur.

Dosis grana octo, ad undecim, in vehiculo aquoso.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla integra pastæ e farina & aqua, ex qua panis pinisi solet, involvitur, postea in clibano cocta, eburneo vel ligneo cultello squamæ a se invicem separantur, & filo trajectæ, in umbra siccantur.

Attenuat, incidit, & resolvit potenter, in affectibus pectoris, a viscida, crassa, materia ortis, hydrope & cachexia commendatur.

Dosis in infuso scrupulus, vel drachma semis; in substantia vel pulvere grana tria, vel quinque.

SERICUM TOSTUM.

Eadem methodo, qua Spongiæ, torretur.

Species cordiales ingreditur, & pro antepileptico habetur.

Dosis scrupulus unus.

SIEF ALBUM.

REC. Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana unciam semis,
Cerussæ drachmas sex,
Sarcocollæ drachmas tres.

Misce, fiat pulvis, fervetur.

Additur collyriis, adversus ophthalmiam, a sero acri ortam.

Si SIEF CUM OPIO expetitur, addatur scrupulo granum dimidium Opii.

SOLUTIO CORALLIORUM.

Coralliorum rubrorum pulveri subtilissimo aceti destillati quantitatem sufficientem affunde, eoque

eoque soluto, acetum per chartam emporeticam colatum, leni igne, evapora, & ficitam solutionem ferva.

Eodem recidit cum sale coralliorum prætenfio.

**SOLUTIO MATRIS PERLARUM,
OCULORVM CANCRO-
RVM,**

eodem parantur modo, quo Coralliorum.

Sunt quasi sal medius, ex alcali terreorum & acido aceti. Aperiant, urinam movent, & cum aqua commode dilui possunt; in febribus, vulnerariis præsertim, feliciter adhibentur.

**SPARA DRAP five TELA
GUALTH.**

REC. Emplastri Diapalmæ,
Diachyl. f. ana libram
unam,
Albi cocti libram dimidi-
am.

Liquatis admisce

Pulveris radic. Iridis Flor. unciam
unam semis.

Immitte lintea, five telas vetustate detritas. F. Sparadrap.

Commendatur ad ulcera inveterata, excoriationes a longo decubitu ortas, nec non ad fonticulos.

SPECIES DIAMBRÆ.

REC. Doronici,
Galangæ ana drachmas tres,
Zinziberis drachmam unam semis,
Spicæ Indicæ drachmam unam,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis ana drachmas tres,
Cardamomi majoris,
minoris ana drachmam unam,
Cinnamomi drachmas tres.

Fiat pulvis, quem completum reddimus addendo

Ambra drachmam unam,

Moschi drachmam semis.

Calefaciunt, caput & ventriculum roborant, coctionem adjuvant, & in affectibus a causa frigida ortis inserviunt.

Dantur in trageis & morfulis.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES DIANISI.

REC. Pyrethri drachmas duas,
Zinziberis,
Galangæ ana drachmas quinque,
Spicæ Indicæ drachmam unam semis,
Glycyrrhizæ rasæ unciam unam,
Calaminthæ drachmas duas,
Seminum Anisi uncias duas semis,
Carvi,
Fœniculi ana drachmas
quinque,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cubearum ana drachmam unam
semis,
Piperum trium ana drachmas duas,
Cinnamomi drachmas quinque,
Cassie lignæ veræ drachmas duas,
Macis drachmas quinque,
Crocī drachmam unam semis,
Mastiches unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Roborant ventriculum, flatus dissipant, atque tussi stomachicæ subveniunt.

Dantur in trageis, a scrupulis duobus ad drachmam unam.

SPECIES DIANTHOS.

REC. Radicum Liquiritiæ drachmas sex,
Zinziberis,
Zedoariæ,
Galangæ,

Ligni Aloës,

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Cardamomi minoris,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Spicæ Indicæ ana scrupulos quatuor,

Florum Rorismarini unciam unam,

Florum Rosarum,

Violarum ana drachmas sex,

Seminum Anethi,

Fæniculi ana scrupulos quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Sunt cephalicæ, stomachicæ, carminativæ; dantur melancholicis & animo languentibus.

Dosis drachma semis ad scrupulos tres.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

REC. Succini præparati,

Cornu cervi sine igne præparati,

Ligni Aloës,

Radici Pæoniæ ana unciam semis,

Corticum citri drachmam unam,

Sacchari perlati uncias tres,

Olei destillati Cinnamomi guttas fedecim.

Redigantur in pulverem, in vitro asservandum.

Completus efficitur, si

Ambraë scrupulus semis,

Moschi grana quinque adduntur.

Ad dolores capitis etiam chronicos laudantur; Vertigini, atque apoplecticis & epilepticis insultibus præcavendis destinantur. Ita olim credebatur.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

SPECIES AROMATICÆ CARTOPHYLLATÆ.

REC. Glycyrrhizæ drachmas duas,

Zedoariæ,

Galangæ,

Ligni Aloës,

Sandali citrini,

Cinnamomi,

Macis,

Piperis longi,

Cardamomi ana drachmam unam,

Cubearum scrupulos duos,

Florum rosarum unciam semis,

Caryophyllorum aromaticorum unciam unam.

Fiat pulvis.

Completæ redduntur, si unciaë harum specierum adduntur

Ambraë griseæ grana octo,

Moschi granum semis.

Vires sunt ventriculum roborandi, flatu discutiendi; phlegmaticis præcipue conveniunt, quibus etiam in cephalalgia & affectibus catarrhalibus, a copioso sero, conducunt.

Dantur in trageis, a scrupulo uno ad duos.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

REC. Glycyrrhizæ drachmas septem,

Galangæ drachmam unam,

Ligni Aloës,

Sandali citrini ana drachmas duas,

Cinnamomi acuti drachmas sex,

Caryophyllorum aromaticorum,

Macis ana drachmas duas semis,

Nucis moschataë,

Cardamomi minoris ana drachmam unam,

Florum Rosarum uncias duas.

Fiat pulvis.

Completæ redduntur, si unciaë duabus adduntur

Ambraë griseæ grana octo,

Moschi grana tria.

Sunt roborantes, leniter adstringentes, cephalicæ & carminativæ. In trageis vel confectioibus exhibentur.

Dosis scrupulus unus ad duos.

SPECIES DIABORACIS.

REC. Boracis Venetæ unciam semis,

Cassiaë ligneæ,

Croci Orientalis ana drachmam unam,

Rasuræ ligni Sabinæ,

Succini albi præparati ana drachmam semis,

Offium de cordibus cervi,

Visci querni,

Florum Cheiri ana scrupulum unum.

Misceantur, fiat pulvis.

Ab auctore Mynsichto ad partum difficilem, factum mortuum & secundinas pellendas laudantur, sed laudes inanes sunt.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

SPECIES DIACINNAMOMI.

REC. Radicum Enulæ unciam semis,

Galangæ unciam unam,

Zinziberis,

Caryo-

SPECIES.

Caryophyllorum,
Cardamomi utriusque,
Piperis longi,
Macis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Crocī drachmam unam,
Cassīæ lignæ unciam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Digestionem promouet, & cum Saccharo, instar trageæ, sumitur ab iis, qui aromatis delectantur.

Dosis drachma semis.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

REC. Serici crudi tosti,
Spodii ex ebore,
Coralliorum alborum,
 rubrorum ana unciam semis,
Margaritarum præparatarum unciam unam semis,
Radicum Doronici,
Radicum Been albi &
 rubri ana drachmas tres,
Ligni Aloës unciam semis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Offium e cordibus cervi ana drachmas tres,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri ana drachmam unam,
Crocī scrupulos duos.

Fiat omnium pulvis tenerrimus, cui addantur
Foliorum Auri &
 Argenti pro lubitu.

Dolemus ad febres malignas, ad palpitationem cordis, lipothymias, a terrore excitatas, has species absurdissime compositas unquam commendatas esse.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SPECIES DIACRETÆ MYNSICHTI.

REC. Cretæ albæ, aqua Rosarum præparatæ,
 unciam unam semis,

Pars II.

SPECIES.

159

Nucum moschatarum drachmas sex,
Glycyrrhizæ,
Seminis cydoniorum ana unciam semis,
Boli rubræ Orientalis præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Lapidum carpionum,
Macis,
Mastiches electæ,
Crocī Orientalis ana scrupulos quatuor,
Sacchari albissimi libram unam.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Acidum in primis viis absorbent, ad ardorem stomachi, quem Sodom vocant, fluxiones & diarrhæam commendantur.

Dosis drachma una ad duas.

SPECIES DIACRETÆ CAMERARII.

REC. Cretæ præparatæ Anglicæ,
Nucum moschatarum,
Lapidum cancerorum ana unciam unam semis,
Liquiritiæ,
Seminis cydoniorum ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana unciam semis,
Lapidum carpionum,
Macis,
Mastiches electæ ana scrupulos octo,
Sacchari albi uncias viginti quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Cum præcedentibus conveniunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

REC. Eboris spagyricæ præparati unciam unam,
Margaritarum Occidentalium præparatarum drachmas sex,
Corallii utriusque ana unciam semis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardæ,
Granati,
Sandali albi,
 citrini,

Ss

Sandali

SPECIES.

Sandali rubri ana drachmas tres,
 Florum Borraginis,
 Buglossæ,
 Nymphææ ana drachmas duas,
 Rosarum drachmas tres.

Misce, fiat pulvis, addantur
 Foliorum Auri nro. viginti.

*Acerbam hæc compositio, uti aliæ multæ sic dictæ
 species, censuram meretur, nostris temporibus
 speramus, neminem fore qui a lapidibus pretiosis
 levamen expectat, & lugemus olim fuisse, qui
 has species scopo analeptico tabe consumtis & su-
 doribus nocturnis vexatis dabant.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

REC. Radicum Afari,
 Spicæ Indicæ,
 Cinnamomi,
 Cubebæ,
 Mastichis,
 Croci ana drachmas sex,
 Aloës Succotrinæ libram unam.

Fiat pulvis.

*Sunt alvum laxantes, & ob addita aromata, ven-
 triculum roborant.*

*Paratur ex his speciebus, addito mellis triplo, elec-
 tuarium, quod clysteribus admiscetur. Raro in-
 terne in forma pulveris, sed in pilulari exhiben-
 tur.*

Dosis grana quindecim ad scrupulum unum.

SPECIES DE HYACINTHO.

REC. Hyacinthi præparati,
 Boli Armenæ,
 Terræ Lemniæ veræ, aut Strigenfis fi-
 gillatæ,
 Coralliorum rubrorum præparatorum ana
 drachmam unam semis,
 Margaritarum occidentalium præparata-
 rum,
 Smaragdi præparati ana drachmam unam,
 Cornu cervi præparati,
 Eboris rasuræ præparatæ,
 Offium de cordibus cervorum præparato-
 rum,
 Radicum Dictamni albi,

SPECIES.

Radicum Tormentillæ,
 Sandalorum omnium,
 Rosarum rubrarum,
 Granorum Kermès.
 Seminum Acetosæ,
 Citri decorticati,
 Portulacæ,

Croci optimi,

Myrrhæ electæ ana scrupulos quatuor,

Misce, fiat pulvis.

*Leniter adstringunt, ad fluxiones & hæmorrhagias
 nimias moderandas, pulveribus temperantibus,
 nitrosis incongrue admiscebantur.*

Ex illis, cum syrupo citri, paratur confectio.

Dosis a scrupulo semis ad unum.

SPECIES DIAJALAPPÆ MYNSICHTI.

REC. Radicis Jalappæ resinosæ uncias
 duas semis,
 Cremoris Tartari scrupulos unde-
 cim,
 Olei Cinnamomi scrupulum unum.

Misce.

Sine molestia per inferiora purgant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIES IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi optimi drachmas de-
 cem,
 Zinziberis,
 Caryophyllorum ana unciam se-
 mis,
 Galangæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ ana drachmas
 duas.

Misce.

*Ventriculum roborant, & morsulis ac trageis
 stomachicis adduntur; pro morsulis confi-
 ciendis incidendæ, pro trageis pulverisan-
 dæ sunt.*

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES.

REC. Ireos Florentinæ,
 Sacchari candi albi,
 Specierum Diatragacanthæ frigida-
 rum ana drachmas sex.

Misce

SPECIES.

Misce, fiat pulvis.

Serum acre ad fauces destillans demulcent, atque in tussi sicca commendantur.

Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS.

REC. Radicum Been albi,
rubri,

Zedoariæ,

Doronici,

Herbæ Melissæ,

Seminum Ocymi caryophyllati,

Pæoniæ,

Croci,

Caryophyllorum aromaticorum,

Cardamomi minoris,

Cinnamomi,

Corticum citri,

Mastiches ana unciam semis.

Misce, fiat pulvis, qui completus redditur additione

Galliæ moschatæ unciam semis,

Moschi scrupuli unius.

Attribuuntur vires cordiales, cephalicæ, stomachicæ & lætificantes.

Dantur incompletæ a drachma semis ad unam; completæ a scrupulo uno ad drachmam semis.

SPECIES DIAMARGARITÆ CALIDÆ.

REC. Zinziberis unciam semis,

Doronici,

Zedoariæ,

Been utriusque ana drachmas tres,

Pyrethri drachmam unam,

Seminis Apii,

Cardamomi utriusque,

Nucum moschatarum,

Macis,

Piperis longi,

nigri ana drachmas tres,

Cinnamomi drachmas quinque,

Mastiches,

Margaritarum Orientalium ana unciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Ad ventriculi inflationes, morbos nervorum, a cau-

SPECIES.

161

sa frigida ortos, in trageis hæc compositio præter necessitatem pretiosa dabatur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES DIAMARGARITÆ FRIGIDÆ.

REC. Margaritarum Orientalium drachmas sex,

Corallii albi,

rubri,

Florum Borriginis,

Nymphææ albæ,

Rosarum rubrarum,

Granorum Kermes,

Ligni Aloës,

Sandali albi,

citrini ana drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Tanquam analepticæ, tabidis & a morbis malignis reconvalescentibus commendabantur.

Dosis scrupulus unus ad duos.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

REC. Florum Rosarum rubrarum uncias duas,

Radicis Liquiritiæ drachmas duas,

Spicæ Indicæ,

Rhabarbari ana drachmam unam,

Sandali albi,

rubri ana unciam semis,

Seminum Anili drachmas duas,

Basilici,

Cinnamomi,

Croci Austriaci,

Mastiches,

Matris Perlarum præparatæ,

Rasuræ eboris,

Cornu cervi philosophice præparati ana drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Roborantes sunt, concoctionem & chylicationem adjuvant; in ictero, cardialgia, & cæliaca passione profunt.

Dantur a drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES TABACI, PRO FUMO, CAMERARII.

REC. Styracis,

Mastiches,

Benzoës,

S s 2

Succini

Succini ana unciam femis,
 Olibani,
 Seminis Foeniculi,
 Anisi ana drachmas duas,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cubearum ana drachmas tres,
 Foliorum Tabaci uncias octo,
 Majoranæ unciam unam,
 Florum Calendulæ,
 Cyani,
 Rofarum rubrarum
 Damascenarum,
 Lavendulæ ana unciam femis,
 Liliorum convallium drachmas
 duas.

Incidentur grosso modo.

*Commendantur ad dentium dolores & defluxiones
 rheumaticas.*

Hauritur fumus fistula.

*SPECIES TABACI, PRO FUMO,
 OFFICINALES.*

REC. Foliorum Tabaci uncias sedecim,
 Majoranæ,
 Basilici ana unciam femis,
 Florum Rofarum,
 Lavendulæ,
 Liliorum convallium ana drach-
 mas duas,
 Seminis Anisi uncias quatuor,
 Foeniculi unciam unam,
 Styracis,
 Asæ dulcis ana drachmas quinque,
 Ligni Rhodii,
 Sandali citrini,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cubearum ana drachmas tres.

Incidentur & contundantur grosso modo.

*Commendantur, cum præcedentibus, ad eosdem
 affectus.*

SPECIES DIATRION SANDALON.

REC. Trium Sandalorum ana drachmas duas
 & scrupulos duos,
 Florum Rofarum uncias tres, drachmas
 tres,
 Violarum unciam femis,
 Rhabbari,

Seminis Portulacæ,
 Spodii ex ebores,
 Succi Glycyrrhizæ ana drachmas duas,
 Amyli,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana scrupulos qua-
 tuor.

Misce. Cui camphora arridet, illius scrupulum
 unum admiscere poterit.

*Veteres persuasi. sandata calorem hepatis præternat-
 uralem corrigere, exhibuerunt has species, feбри-
 bus lentis, ictero & hydrope laborantibus, a
 drachma dimidia ad integram.*

*SPECIES DIATRAGACANTHÆ
 FRIGIDÆ.*

REC. Gummi Tragacanthæ albæ uncias
 duas,
 Arabici drachmas decem,
 Amyli unciam femis,
 Glycyrrhizæ drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

*Serum acre demulcent; salutariter exhibentur
 tussientibus, cum calore lento exsiccativo,
 & in diarrhæa, a sero acri orta, bonum
 effectum præstant.*

Dosis drachma semis & ultra.

NB. Semina frigida sunt omissa, quoniam
 brevi tempore rancore inficiunt spe-
 cies. Hinc consultius est, si opus sit
 feminibus hisce, illa demum sub quo-
 libet usu addere.

*SPECIES DIATURBITH, CUM
 RHABBARO.*

REC. Rhabbari,
 Turbith ana unciam unam,
 Hermodactylorum unciam femis,
 Diacrydii,
 Cremoris Tartari,
 Seminis Violarum ana drachmas duas
 Olei Cinnamomi guttas quinque.

Misce, fiat pulvis.

*Serum & bilem educunt, arthriticis & hydropicis
 conveniunt, humbricos expellunt.*

Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

SPECIES DECOCTI ANTI-
NEPHRITICI,

five

NEPHROCATHARTICUM
FORESTI.

REC. Radicum Liquiritiæ unciam unam
femis,
Petroselini,
Fœniculi ana uncias du-
as,
Ireos Florentinæ unciam
unam semis,
Florum Malvæ,
Althææ ana drachmas sex,
Seminum Fœniculi,
Saxifragiæ ana drachmas
sex,
Cicerum rubrorum con-
fractorum uncias sex,
Jujubarum,
Caricarum ana numero triginta,
Hordei mundati & prius loti uncias
tres.

Incisa & contusa crassiuscule ferventur ad
usum.

*In nephritide, ad urinæ ardorem mitigandum
& calculum pellendum, utiliter decoctum
adhibetur.*

*Ad libram unam aquæ, specierum uncia una
semis requiritur.*

SPECIES DECOCTI ANTIPODAGRICI
VIENNENSIS.

REC. Radicis Polypodii querni,
Chinæ ponderosæ,
Sarsaparillæ,
Hermodytylorum ana un-
cias quatuor,
Ligni Guajaci uncias sex.

Concisa coquantur cum aquæ libris trigin-
ta duabus & vini libris octo, lento igne,
ad quartæ partis consumptionem. (Alii
decoctum quoque secundarium cum aqua
& vino ex iisdem speciebus parant) De-
cocti hujus, quod statim ab initio insul-
tus podagrici inchoandum est; usus tam

Pars II.

larga quantitate commendatur, ut intra
triduum libræ viginti quatuor consuman-
tur, singulis per diem horis octo circi-
ter uncias bibendo. Diætam simul ibri-
ctam observando.

*Serum vitiosum hoc modo per diaphoresin &
diuresin evacuando dolores primo statim die
mitigari, & curam triduo vel quatrinduo
absolvi, experientia docuit; lassitudine ta-
men artuum insigni plerumque remanente.
Consultum ducitur, laxante congruo cu-
ræ finem imponere.*

*Alii scopo præservativo verno æque ac autum-
nali tempore per quatuordecim dies Decoc-
tum suadent, dosi duarum quotidie trium-
ve librarum, conjunctis lenibus laxantibus.*

SPECIES PRO DECOCTO

AVENÆ,

five

BROMIO.

REC. Avenæ albæ electæ, sæpius lotæ
& iterum siccatae, uncias sex,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Radicum Cichorii sylvestris unciam
semis.

Misce.

Paratur ex his speciebus celeberrimum il-
lud Decoctum Lowerianum: præscrip-
tam quantitatem in

Aquæ fontanæ libris duodecim,
ad tertiæ partis consumptionem coquendo,
& post repetitam colaturam,
Nitri antimoniati unciam dimidiam,
Sacchari uncias duas
addendo.

*Commendatur ad defluxiones acres, salinas,
scorbutum, arthritidem, hypochondriacum
malum, nephritidem, hæticam; humorum
acrimoniam demulcet, humectat, & par-
tes nimium constrictas relaxat.*

*Dosis uncia sex, vel octo, quotidie, frigide
vel calide, mane & vesperi hausta, usu
per aliquot septimanas continuato.*

T t

SPECIES

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI.

REC. Seminum Anisi,
 Dauci,
 Cumini,
 Carvi,
 Foeniculi ana uncias duas,
 Glycyrrhizæ,
 Florum Chamæmeli vulgaris ana drachmas sex,
 Passularum uncias sex.

Incisa misceantur.

Decocti usus est in clysteribus, tormina a flatibus orta mitigat, alvum aperit, & flatus educit; prodest etiam, cum decocto specierum emollientium, nephriticis.

Pro adulto specierum uncie duæ, in aquæ unciis quindecim coquuntur, ad libræ remanentiam, pro clysmate.

SPECIES CEPHALICÆ, PRO CUCUPHIS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
 Iridis Florentinæ ana unciam semis,
 Florum Lavendulæ,
 Rorismarini,
 Rosarum ana drachmas sex,
 Ligni Rhodii,
 Sandali citrini,
 Aloës ana unciam semis,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ,
 Succini citrini,
 Styracis ana drachmas tres.

Misce.

Incisa & contusa grosso modo ferventur, quibus pro lubitu addi potest una aut altera gutta

Olei ligni Rhodii,
 Lavendulæ,
 Majoranæ.

Usus docet titulus. Vires sunt cephalicæ, nervinæ, roborantes.

SPECIES CEPHALICÆ, PRO EPITHEMATE.

REC. Herbar. & summitat. Betonicæ,
 Hyssopi,
 Lavendulæ,
 Majoranæ,
 Origani,
 Rorismarini,
 Rutæ,
 Salvie,
 Serpilli,

Florum Chamomillæ,
 Meliloti,
 Rosarum,
 Sambuci,

Foliorum Lauri ana unciam unam,
 Salis Ammoniaci unciam semis.

Incisa reponuntur.

A Chirurgis pro fomentatione, in capitis & aliarum partium contusione, expituntur.

Applicantur in sacculis vel epithematibus, cum vino calido.

SPECIES EMOLLIENTES.

REC. Radicum Althææ uncias quatuor,
 Herbarum quinque emollientium ana uncias duas,
 Florum Chamomillæ vulgaris uncias tres.

Incisa & contusa misceantur.

Inserviunt pro clysteribus, emolliunt alvum, & leniunt dolores, a materia acri in intestinis hærente profectos.

Coquitur uncia una & dimidia in aquæ libra una semis, ut restet libra una, pro clysmate, adulto una vice injiciendo.

In pulverem tritæ, etiam cataplasmati conficiendo aptæ sunt.

SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS ET PULSUUM.

REC. Herbarum Rorismarini,
 Majoranæ,
 Melissæ,

Florum Cheiri,
 Tunicæ ana unciam semis,
 Lavendulæ,

Florum

Florum Rosarum ana drachmas sex,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Ligni Aloës,
 Rhodii ana drachmas sex,
 Cinnamomi drachmas sex,
 Corticum Citri,
 Aurantiorum ana drachmas
 tres.

Incisa & contusa grosso modo misce.

*Ufus ex nomine patet; applicantur in sacculis, aqua
 carbunculi vel aceto madefactæ.*

SPECIES DECOCTI FLORUM ET FRUCTUUM.

REC. Radicum Liquiritiæ uncias duas,
 Herbarum Capillorum Veneris,
 Endiviæ ana drachmas
 duas,
 Florum Borraginis,
 Buglossi,
 Violarum,
 Rosarum ana drachmam u-
 nam,
 Lupuli drachmas duas,
 Jujubarum,
 Siliquarum dulcium,
 Prunorum Damascenorum ana un-
 cias duas,
 Tamarindorum unciam unam.

Incidentur grosso modo & misceantur.

*Sunt pectorales, & pro decocto ordinario in-
 servire possunt.*

*Sumitur specierum uncia una, pro decocti li-
 bra una. Pro decocto dilutione vero requi-
 runtur ad libras quatuor aquæ, specierum
 uncie duæ, ad consumptionem quartæ par-
 tis.*

SPECIES PRO DECOCTO AD GAN- GRÆNAM.

REC. Herbæ Millefolii,
 Absinthii ana drachmas sex,
 Scordii,
 Salviæ,
 Hyssopi,

Herbæ Rutæ,
 Florum Sambuci,
 Hyperici ana unciam semis,
 Rosarum unciam unam,
 Myrrhæ drachmas sex,
 Aloës,
 Asæ foetidæ ana unciam semis,
 Lithargyrii uncias sex.

Incisa & contusa ferventur.

*Non solum in gangrænâ & sphacelo nondum
 confirmato, sed etiam in inflammationibus,
 a contusionibus vel alia violenta causa or-
 tis, & gangrænâ minantibus, bono cum
 successu adhibetur decoctum harum specie-
 rum, cum*

*Aquæ calcis vivæ libris quinque, &
 Aceti vini libris duabus*

*paratum, atque linteis quadruplicatis, sin-
 gulis duabus vel tribus horis, calide appli-
 catum. Addi possunt, ante applicatio-
 nem,*

*Spiritus vini camphorati uncie qua-
 tuor, vel sex.*

SPECIES DECOCTI PRO GARGA- RISMATE ADSTRINGENTE.

REC. Herbarum Plantaginis,
 Prunellæ ana uncias
 quatuor,
 Salviæ nobilis uncias
 duas,

Florum Rosarum rubrarum,
 Ligustri,
 Balauitiorum ana unciam
 unam.

Incisa misceantur.

Virtutes ex nomine patent.

SPECIES DECOCTI PRO GARGA- RISMATE EMOLLIENTE.

REC. Radicum Althææ,
 Herbæ Malvæ,
 Florum Papaveris erratici,
 Malvæ arboreæ,
 Sambuci ana unciam unam
 semis,
 Seminis Psyllii unciam semis,

Tt 2

Cari-

Caricarum pinguium uncias duas.
Incisa & contusa grosso modo ferventur.
Usum titulus docet.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

REC. Ligni Guajaci libram unam femis,
Sassafras uncias sex,
Juniperini, uncias quatuor,
Radicum Sarsaparillæ,
Chinæ ana uncias duas,
Liquiritiæ unciam unam
femis,
Semen Anisi,
Fœniculi ana unciam fe-
mis.

Incisa & contusa ferventur.

*Ad luen veneream, scabiem, aliosque lym-
phæ morbos conducit.*

Dosis est diversa, pro diversitate morborum.

SPECIES DECOCTI NIGRI.

REC. Radicum Tormentillæ unciam unam
femis,
Herbarum Sabinæ,
Rutæ hortensis,
Scordii,
Salviæ,
Absinthii,
Foliorum Quercus ana drachmas
sex,
Corticum Granatorum,
Gallarum Turcicarum ana uncias
duas femis,
Aluminis crudi uncias quatuor,
Vitrioli viridis uncias duas,
Viridis æris,
Tartari rubri crudi ana unciam u-
nam.

Misce, incisa & contusa ferventur.

*Sumuntur harum specierum, ad libram unam
aquæ fontanæ & libram vini, uncia sex;
decocto, pro intentione Chirurgi & circum-
stantia morbi, spiritus vini additur.*

*Usum externus ad ulcera desiccanda invetera-
ta, ut plurimum autem ad profundas in-
flammationes, & gangrænam.*

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

REC. Passularum minorum mundatarum
unciam unam,
Siliquæ dulcis,
Jujubarum ana drachmas sex,
Dactylorum uncias duas,
Caricarum pinguium,
Hordei mundi ana unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris ana unciam fe-
mis,
Hyssopi drachmas duas.

Incidentur & misceantur.

*Decoctum pectorale, lenta, molli, blandaque
dulcedine dotatum, partim serum increas-
sando, acre, corrigendo, partim phlegma
pulmonibus impactum maturando, bronchia
& tracheam demulcendo, humedando, &
lubricando, egregie tussientibus convenit;
sic etiam in pleuritide, nephritide & vario-
lis, cum fructu adhibetur.*

*Ad libras duas aquæ fontanæ, specierum un-
cia una femis additur, & ad quartæ par-
tis consumptionem coquitur.*

SPECIES DECOCTI PRO POTU
INFANTUM.

REC. Rasuræ Cornu cervi libras duas,
Eboris,
Radicum Liquiritiæ,
Polypodii ana libram fe-
mis,
Caricarum pinguium,
Siliquæ dulcis ana libram unam,
Semen Fœniculi,
Anisi ana libram femis,
Florum Tilix uncias quatuor,
Cornu cervi usti libram unam.

Misce, incidentur.

*Usum cognoscitur e titulo. Inservit scilicet
decoctum harum specierum pro potu ordi-
nario infantum.*

*Sumitur uncia una ad libras quatuor vel quin-
que aquæ fontanæ, & post unam aut alte-
ram ebullitionem, colatur.*

SPECIES.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO.

REC. Radicum Enulæ,
Symphyti majoris,
Tormentillæ,
Hirundinariæ ana unciam
femis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Herbarum Alchimillæ,
Saniculæ,
Plantaginis,
Auriculæ muris,
Hyperici,
Agrimonix,
Pimpinellæ,
Bugulæ,
Virgæ aureæ,

Florum Bellidis ana unciam femis,
Seminis Foeniculi drachmas sex.

Incisa ferventur.

*Sumuntur loco infusi Theæ, in vulneribus tam
internis, quam externis.*

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO PARACELSI CORRECTÆ.

REC. Radicum Pimpinellæ albæ,
Ari, ana unciam unam,
Herbarum Saniculæ,
Pyrolæ,
Hederæ terrestris,
Veronicæ,
Semmitatum Centaurii minoris ana
unciam femis.

Concisa misceantur.

*Herbæ hæc vulnerariæ ulcera, secundum Pa-
racelsum, ab intra purgant. Quarum ef-
fectum adhuc securiorem & notabiliorem
experti sunt Medici prædici additis radici-
bus dictis solventibus, iisdem virtutem ad-
stringentem corrigendo.*

*Drachmæ tres vel uncia femis Specierum leni-
ter decoquuntur cum Aquæ libra una, pro
usu interno.*

SPECIFICUM ANTATROPHUM WEPFERI.

REC. Sacchari candi albi uncias quatuor,
Pars II.

SPECIFICUM.

167

Fuliginis e camino splendentis unciam
unam,

Radicum Ireos Florentinæ unciam femis,
Ari præparatarum,

Diaphoretici Jovialis,
Martialis,

Lapidum cancerorum præparatorum ana
drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

*Commendatur ad atrophiam & rhachitidem, tam
puerorum, quam adultorum; acidum inprimis
absorbet, obstructions referat, atque alvum aper-
tam servat.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII.

REC. Testarum concharum oblongarum
acuminatarum, quæ in stagnis
aut lacubus reperiuntur, quan-
tum placet.

Macerentur in aceto forti, ut ab impuri-
tatibus mundari queant, quas, aqua
fontana lotas & rursus exsiccatas, in
pulverem subtilissimum redige.

Crollius conchas calcinare & ita in veram
calcem redigere jubet.

*Acidum in primis viis potenter absorbet, su-
dorem & urinam movet; calcinatas vero
conchas, in majori dosi exhibitas, cardial-
giam nonnunquam excitasse compertum est.*

*Datur a scrupulo uno ad drachmam dimidi-
am, ante febrium intermittentium paroxys-
mum.*

SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

REC. Cinnabaris nativæ sublimatæ uncias tres,
Radice Pæoniæ unciam unam femis,
Cranii humani,
Ungularum Alcis,
Cornu Cervi sine igne præparati,
Smaragdi præparati,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana
drachmas duas,

Margaritarum Occidentalium præparata-
rum,

U u

Unicornu

Unicornu marini,
Succini præparati ana drachmam semis.
Misce, fiat longa trituratione pulvis subtilissimus.

Est medicamentum longo usu receptum, & quod mireris tanquam antispasmodicum & antepilepticum, quamvis absurda & in efficacia contineat laudatum. Commendatur in cephalalgia, hemi-crania, epilepsia, aliisque nervorum affectibus.

Dosis a granis decem ad viginti quatuor. Dimidiam partem cinnabaris constituit.

SPECIFICUM FEBRIFUGUM CRAANII.

Videatur REGULUS ANTIMONII
MEDICINALIS.

SPECIFICUM JALAPPINUM.

REC. Magisterii Jalappæ,
Scammonii ana drachmas tres,
Pulveris Jalappæ unciam unam semis,
Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati ana unciam unam,
Olei Cinnamomi scrupulum unum.

Magisteria optime cum

Amygdalarum dulcium drachmis duabus,
terantur, quibus additur pulvis Jalappæ,
salia, & tandem oleum Cinnamomi.

Purgat satis commode.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum, usque ad drachmam semis. Drachma una continet grana quinque Magisterii Jalappæ & totidem Scammonii.

SPECIFICUM TARTARI PHARYN- GICUM ZOBELII.

REC. Acidi sive crystallorum Tartari un-
cias quatuor,
Aluminis crudi,
Nitri crystallisati ana uncias tres,
Aceti vini destillati libras quatuor.
Solvantur & rursus coagulentur.

Magnis laudibus ab Auctore pro more suo evehitur, præsertim vero ad affectus pharyngis, anginam, uvulæ & gingivarum laxitatem commendatur.

Præscribit unciam semis, in Aquæ Plantaginis vel Prunellæ unciis octo solutam, pro gargarizatione, & collutione faucium & oris.

SPERNIOLA CROLLII.

REC. Myrrhæ electæ,
Olibani electi ana uncias duas,
Crocii optimi unciam semis.

Misceantur, fiat omnium pulvis subtilissimus, qui in patina vitrea aqua spermatist ranarum vel & alia quacunque, per saccum destillata, vicies & tricies irroretur & exsiccetur, tandem addantur

Camphoræ drachmæ tres,
& exacte mixta asserventur.

Ufus est externus, ad hæmorrhagias & inflammationes compescendas.

Commendatur etiam ad vulnera a morsu canis rabidi.

SPIRITUS ÆRUGINIS

five

VIRIDIS ÆRIS ET VENERIS.

REC. Æruginis, five viridis æris libram unam.

In pulverem trita immittatur retortæ vitreæ, instituatur destillatio ex arena, per gradus, in fine ad incandescentiam retortæ usque ignem augendo. Prodit liquor acidus, haud ingrati saporis; rectificetur per retortam, & fervetur.

A venere nihil participat, sed est acetum destillatum concentratum; interne ad excitandum appetitum & bilem frænandam; sitimque mitigandam, a guttis octo ad quindecim, in vehiculo aquoso datur.

Ufibus autem plurimum chemicis inservit, & idoneum præbet menstruum; ad solvenda corpora terrea, & extrahendas tincturas.

Nota: Majorem quantitatem purioris spiritus, Ærugo in aceto destillato soluta, & rursus leni igne coagulata largitur.

SPIRITUS ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ uncias quatuor,
Spiritus vini rectificati libras duas,
Aquæ fontanæ libram unam.
Destillentur.

Alexipharmacus est, & carminativus habetur, & ad drachmam unam, quin duas commendatur.

SPIRITUS ANISI.

REC. Seminis Anisi contusi libram semis,
Spiritus vini libras quatuor & semis.
Macerentur per octiduum, & lege artis spiritus eliciatur.

Est pectoralis & carminativus; aqua & saccharo temperatus bibitur.

SPIRITUS ANTHOS.

REC. Florum Rorismarini recens collectorum uncias sex.

Macerentur & destillentur cum Spiritus vini rectificati libris duabus.

Est cephalicus & nervinus; interne raro, externe sæpius ad odoratum exhibetur.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS
DRAWIZII,

five

MIXTURA SIMPLEX ANTI-
SCORBUTICA.

REC. Vitrioli calcinati libras duas,
Tartari crudi libras tres,
Misceantur & immittantur retortæ terreæ & lege artis destillentur igne gradatim adhibito & sensim aucto usque dum nulli amplius vapores apparent. Deinde

REC. Hujus Spiritus libram unam,
Spiritus cochleariæ uncias quatuor.

Misceantur.

Eximii usus est in scorbuto, scabie, rheumatismo, arthritide, podagra, per urinam & sudores materiam expellendo. Laudatur quoque Werlhofio, qui paululum di-

versam compositionem tradidit in affectibus apoplecticis & paralyticis.

Datur aliquoties per diem ad guttas triginta & ultra cum syrupo aliquo mixtus vel & in aqua simplici.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

REC. Vitrioli Hungarici, ad albedinem calcinati, libras quatuor,
Tartari albi, solutione & crySTALLIFICATIONE depurati, libram unam semis.

Pulverifata & mixta cellæ humidæ exponantur, ut paululum deliquescant, tum igne arenæ e retorta destillentur, & spiritus servetur.

Est Spiritus Tartari vitriolatus; laudatur ad obstructions hepatis, lienis, & mesenterii rescendendas. Sudoriferum & diureticum præbet.

Dosis est scrupulus unus ad drachmam semis, in vehiculo aquoso.

SPIRITUS BALSAMICUS

vel

BALSAMUM VITÆ
ALBUM.

REC. Olibani,
Myrrhæ,
Galbani ana uncias tres,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucum moschatarum,
Galangæ,
Zedoariæ,
Zinziberis ana unciam unam,
Baccarum lauri uncias quatuor,
Terebinthinæ Venetæ uncias duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duodecim.

M. destillentur post sufficientem digestionem ex Balneo.

Æquiparatur balsamo illi celebri Augustanorum. Vires sunt stomachicæ, diureticæ, carminativæ, nervinæ. Tam externe, quam interne adhibetur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balsami Peruviani nigri uncias tres,
 Salis Tartari siccissimi unciam unam.
 Terantur simul, & probe mixtis super-
 affundantur
 Spiritus vini rectificatissimi unciae
 quindecim;
 Post digestionem per triduum, destillentur
 lento igne, e balneo, & spiritus prolec-
 tus fragrantissimus fervetur.

*Virtute gaudet analeptica & roborante; su-
 dorem & urinam movet.*

*Transit, cum Juleporosato mixtus, in syru-
 pum balsamicum, si nimirum scrupulus unus
 spiritus hujus addatur unciae uni Julepi.*

SPIRITUS BEZOARDICUS BUSSII.

REC. Spiritus cornu cervi volatilis, vel
 eboris uncias duas,
 Salis Ammoniaci uncias quatuor,
 Cinerum clavellatorum uncias duo-
 decim,
 Succini flavi pulverisati uncias sex,
 Olei de Cedro drachmas duas.

Misceatur Sal Ammoniacum cum succino
 & oleo, quibus adde Cineres clavella-
 tos, in libra una aquae fontanae solutos;
 Spiritus vini rectificati libras tres,
 his adjunge Spiritum cornu cervi, &
 per ignem arenae, e cucurbita luto pro-
 be munita, destilla.

*Potenter sudorem atque urinam movet, an-
 tispasmodica virtute pollet, & sicut reliqua
 alcalina, acidum infringit.*

Dosis guttae triginta ad quinquaginta.

SPIRITUS CARMINATIVUS STLVII.

REC. Radicum Angelicae drachmam unam,
 Imperatoriae,
 Galangae ana drachmam unam
 femis,
 Foliorum Rorismarini,
 Majoranae,
 Rutae hortensis,
 Basilici,
 Summitatum Centaurii minoris ana drach-
 mas duas,

SPIRITUS.

Baccarum Lauri drachmas tres,
 Seminum Angelicae,
 Levistici,
 Anisi ana unciam semis,
 Zinziberis,
 Nucum moschatarum,
 Macis ana drachmam unam femis,
 Cinnamomi drachmas sex,
 Caryophyllorum,
 Corticum Aurantiorum ana drachmam
 unam.

Concisis & contusis affunde

Vini albi generosi libras quatuor,

Spiritus vini rectificati libram unam.

Digerantur per biduum in Mariae balneo, hinc
 destillentur ad dimidias, & spiritus egressus
 fervetur.

*Commendatur ab auctore ad nauseam, vomitus &
 ruinationes, cum Aqua Menthae, vel Foeniculi &
 Saccharo mixtus, cachecticis adhibetur.*

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

REC. Nitri crudi crystallini,

Tartari albi puri ana libras duas.

Misce, & per retortam tabulatam in adaptatum
 magnum recipientem, cui spiritus vini recti-
 ficati librae duae antea infusae fuerunt, destil-
 la; hac tamen cautione: ut nunquam ultra
 drachmae duae, vel tres, una vice injiciantur
 per tubulum, hocque non nisi finita de-tona-
 tione, repetatur. Peracta destillatione, spi-
 ritum in recipiente collectum, & ex cucur-
 bita vitrea humili rectificatum, serva.

Sunt, qui spiritum residuo in retorta affundere
 & rursus abstrahere jubent; cum vero hoc
 modo nihil praeter spiritum vini, oleo tarta-
 ri impraegnatum, producant, praestat sine
 ulla additione ex cucurbita humili rectifica-
 tionem instithere.

*Vires titulus indicat. Sunt vero non solum carmi-
 nativae, sed & antispasmodicae, diaphoreticae & diu-
 reticae, atque hypochondriacis & hystericis com-
 mendatur.*

Dosis guttae triginta ad sexaginta usque.

SPIRITUS CASTOREI COMPOSITUS
LONDIN.

REC. Castorei unciam unam,

Florum

SPIRITUS.

Florum Lavendulæ drachmas sex,
Salviæ,
Rorismarini ana drachmas
tres,

Cinnamomi drachmas duas,
Macis,
Caryophyllorum ana drachmam unam,

Spiritus vini rectificati libram unam
semis,

Aquæ Lavendulæ libram semis,
Salis Ammoniaci uncias duas,
Tartari, vel Cinerum clavel-
latorum uncias tres.

Misce, & post digestionem per triduum,
destillentur, & spiritus uncia quindecim
proliciantur, quibus adde

Camphoræ drachmas duas,
Olei destillati Rutæ,
Succini ana guttas vi-
ginti.

*Usus est tam internus, quam externus; nari-
bus admovetur in affectibus hysteriis.*

*Datur interne in motibus convulsivis, colica
hysterica & torminibus, a scrupulo uno ad
drachmam semis, ex aqua Melissa, vel
alio vehiculo.*

SPIRITUS CERASORUM NIGRO- RUM.

REC. Cerasorum nigrorum, maturorum,
quantum vis.

Contundantur una cum nucleis, & dolio-
lo querno, ad id accommodato, satis-
que capaci, indita, loco tepido, pauxil-
lo fæcum cerevisiæ addito, stent, donec
fermentando acidiusculum, aut vinosum
spirare cœperint odorem; tum è vesica
destillantur, & spiritus inde natus recti-
ficetur.

*A nucleis vim quandam diureticam, de reli-
quo vix alias, quam spiritus vini, virtu-
tes habet.*

Simili modo parantur, etiam per fermenta-
tionem,

SPIRITUS CYDONIORUM, EBULI,

Pars II.

SPIRITUS.

171

SPIRITUS SAMBUCI,
& aliorum fructuum.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

REC. Herbæ Cochleariæ florentis libras
sex,

Contunde, ac vesicæ immissæ, affun-
de

Spiritus vini non rectificati libras
quatuor,

Aquæ fontanæ libram unam.

Juncturis probe clausis ac munitis, destil-
la igne moderato spiritum, quem, re-
centi herbæ rursus affusum, iterum de-
stillata, rectifica, ac in vitro probe obtu-
rato ferva.

*Magnæ efficacis est adversus scorbutum; pol-
let etiam virtute carminativa & diuretica,
atque ad ulcera oris & gingivas exulceratas,
melle rosato mixtus convenit.*

*Datur interne a drachma semis ad unam,
aqua dilutus.*

Per fermentationem quoque paratur, mi-
noris vero efficacis ac gratiæ.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Uno eodemque labore, quo Sal volatile
cornu cervi, obtinetur, & ab oleo em-
pyreumatico separari & rectificari de-
bet.

Inter merces nundinales pharmaceuticas
genuinus vix haberi dicitur spiritus C.
C. quum partim non ex C. C. sed ex
Ossibus quibuscunque, huic scopo om-
nino satisficientibus, vilioris pretii cau-
sa, destillatus sit; partim rectificatione
super calcem vivam acrimoniam, quam
præ se fert, acquisiverit, ut majorem
salis urinosi quantitatem mentiatur.

*Est antispasmodicum longo usu probatum,
aperitivum, diaphoreticum ac diureticum.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis us-
que.*

Xx

SPIRITUS

SPIRITUS.

SPIRITUS CORNU CERVI AD USUS
EXTERNOS.

REC. Olei cornu cervi foetidi unciam unam,

Cinerum clavellatorum uncias duas.

Misceantur & affundantur

Spiritus vini non rectificati libræ octo,

destilletur spiritus ex cucurbita vitrea ad dimidias, & servetur in vase probe clauso.

Usus, uti ex titulo patet, est externus ad membra paralytica. Interne sumtus, sudorem & urinam movet; verum, ob oleum empyreumaticum sanguinem exæstuat: hinc pariori dosi, i. e. ad guttas viginti vel triginta, exhibendus.

Qui ex sale volatili C. C. mediante spiritu vini rectificato, oleum extrahunt, ut saltem puriorem habeant, eodem labore spiritum, oleo cornu cervi imprægnatum, nanciscuntur, qui addita salis alcali portione rectificari potest.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantium recentium libram unam semis,

Spiritus vini rectificati libras octo,
Aquæ fontanæ libras duas.

Destillantur e vesica, lento igne, & spiritus vini libræ octo proliciantur, qui, aqua fontana dilutus & saccharo edulcoratus, servetur.

Ad ventriculum confortandum, & flatus pellendos, sumitur. Non dilutus nec edulcoratus inservit pro menstruo Tincturæ corticum aurantium.

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Ad normam spiritus corticum Aurantium, superius modo descripti, conficitur.

Easdem virtutes habet, & menstruum præbet, pro essentia carminativa.

SPIRITUS.

SPIRITUS CROCI.

REC. Croci Orientalis uncias duas,
Spiritus vini rectificati libras duas,
Aquæ fontanæ libram semis.

Misceantur & stent per aliquot dies in digestionem, postea destillantur, leni igne, e cucurbita vitrea, atque spiritus unciae viginti eliciantur. Ex residuo Extractum Croci parari potest.

Raro in usum venit, nisi ad Elixir croci anticolicum parandum. Externe, cum aliis spirituosiss applicatus, virtute paregorica se commendat.

SPIRITUS FORMICARUM.

REC. Formicarum, mensibus Junio vel Julio captarum, libram unam,
Spiritus vini rectificati libras duas.

Misce. Destillantur ex Mariæ balneo ad siccitatem.

Adscribuntur virtutes aphrodisiacæ, antapoplecticæ, analepticæ, & diureticæ. Interne ad drachmam unam, usque ad duas exhibetur. Externe commendatur ad rheumaticos & arthriticos dolores; paralyticis membris conducit.

Sunt, qui ex formicis, sine additione spiritus vini, per retortam spiritum destillant volatilem, qui tamen, præ aliis ejusmodi spiritibus empyreumaticis, ex animalibus destillatis, vix ullam prærogativam habet. Ad externos usus ejusmodi spiritus cum spiritu vini maritatur, uti de spiritu C. C. suo loco diximus.

SPIRITUS FULIGINIS.

REC. Fuliginis nigerrimæ, compactæ & splendentis, quantum vis.

Destilletur e retorta, juncturis optime clausis, igne arenæ, initio leni, postea gradatim aucto, spiritum prolectum ab oleo separa ac rectifica.

Egre-

SPIRITUS.

Egregium est sudoriferum & diureticum. Laudatur etiam ab Hartmanno ad epilepsiam, morbos soporosos & hystericos.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

SPIRITUS JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi conquassatarum libras quatuor,
Spiritus vini non dephlegmati libras octo.

Destillantur ad dimidias.

Remedium est carminativum, diureticum & sudoriferum; usus est tam internus, quam externus, in affectibus colicis & rheumaticis.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

REC. Florum Lavendulæ libram unam,
Spiritus vini non rectificati libras quatuor.

Digestione per triduum facta, destillantur ad dimidias.

Raro interne eo utimur; externe ad membra paralytica confortanda, sugillationes resolvendas, & ad odoratum adhibetur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Impleatur retorta scobe ligni sancti vel Guajaci, & igne arenæ destilletur, sic prodit primo phlegma, quod sequitur spiritus, & tandem oleum nigrum empyrevmaticum.

Viribus cum spiritu fuliginis convenit, & eadem dosi dari possit.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIIUM.

REC. Florum Liliorum convallium libram unam,
affunde

Vini generosi albi libras decem,

Spiritus vini rectificati libram unam semis.

Ad dimidias e cucurbita destilla, proleccam aquam spirituofam novis affunde floribus, & destilla iterum ad dimidias atque spiritum ferva.

Aquarum antapoplecticarum & epilepticarum ingrediens sunt lilia convallium. Adscri-

SPIRITUS.

173

bitur illis vis specifica, cordialis & nervina, ac memoriam confortans. Raro tamen spiritus interne datur; externe ad convulsiones, luxationes & dolores rheumaticos utiliter adhibetur; naribus attractus, adversus odontalgiam laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VINOSUS.

REC. Lumbricorum terrestrium vivorum libras duas;

Superfunde

Spiritus vini phlegmatici libras quinque semis.

Post digestionem per biduum, destillantur, leni igne, ad dimidias, e vesica.

Usus est externus, & ad rheumaticos & arthriticos dolores laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

REC. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum libras tres, vel quantum placet.

Committantur retortæ vitreæ, & ex arena, per successivos ignis gradus, destillantur; sic prodeunt spiritus, sal volatile & oleum empyrevmaticum foetidum, quæ refrigerata separantur, & sal, ut ab oleo foetido liberetur, ossium calcinatorum triplo vel quadruplo miscetur, & sublimetur; quæ sublimatio bis vel ter repetenda, donec satis albus & ab oleo liberatus existat; spiritus vero, ab oleo empyrevmatico, ope chartæ bibulæ madefactæ, separatus, rectificetur.

Vires habet sal volatilis & spiritus, cum spiritu & sale volatili cornu cervi communes; a nonnullis magis diuretici & antarthritici deprædicantur. Spiritus adhiberi etiam solet externe in rheumatismis, contusionibus, luxationibus & paralyfi.

Rectificatus datur interne ad guttas triginta, & sal volatile ad grana sex vel octo.

SPIRITUS MASTICHINUS.

REC. Mastiches uncias quatuor,
Cinnamomi unciam semis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ ana drachmas tres,

X x 2

Zinzi-

SPIRITUS.

Zinziberis,
Galangæ,
Cardamomi minoris,
Corticis Winterani ana drachmas
duas.

Pulverisata infundantur in
Spiritus Vini rectificati libris de-
cem.

Stent per aliquot dies in digestionem, po-
stea, additis

Aquæ fontanæ libris duabus, e ve-
fica destillentur.

Quod si

Spiritus hujus prolecti libris dua-
bus,

Aquæ fontanæ, in qua Sacchari
unciæ decem solutæ sunt, libra
una

additur, nominatur

ELIXIR MASTICHINUM,

quod loco aquæ vitæ haurire solent.

*In morbis ventriculi, a causa frigida ortis,
colica flatulenta & ructibus, cum insigni
fructu datur.*

*Dosis aqua diluti & edulcorati, est uncia se-
mis ad integram.*

SPIRITUS MATRICALIS.

REC. Mastiches,

Myrrhæ,

Thuris,

Succini ana unciam unam semis,

Spiritus vini rectificati libras qua-
tuor.

Destillantur e balneo, ad ficcitatem.

*Ad luxationes, sugillationes, & ubi parego-
rica, spirituosæ locum inveniunt, adhiberi
potest.*

SPIRITUS MELISSÆ.

Paratur, ut spiritus Lavendulæ.

*Nervinus, carminativus, stomachicus & ute-
rinus est, & pro menstruo, ad Tincturam
Castorei extrahendam, inservit.*

SPIRITUS.

SPIRITUS MELLIS.

REC. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libras tres.

Misceantur, & e retorta, arenæ igne, per
gradus fiat destillatio. Liquor prolectus
ab oleo separetur, atque rectificetur,
phlegmate prius prodeunte; & dein spi-
ritu subsequente.

Est acidus, & empyreuma olet.

*Specificæ huic spiritui attribuitur vis diureti-
ca; aperitivus, & diaphoreticus etiam est,
quod oleo, quo imbutus, empyreumatico
tribuendum.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPIRITUS MENTHÆ.

Cum spiritu vini, ad normam Lavendulæ
spiritus, conficitur.

*Vires sunt stomachicæ, nervinæ & carmina-
tivæ.*

SPIRITUS MINDERERI.

REC. Aceti destillati fortissimi, quantum
lubet;

adde, per vices,

Salis alcali volatilis, ex fale ammo-
niaco parati, quamdiu efferves-
centia exinde oritur, ut tandem
saturatio obtineatur.

*Liquor est salinus, penetrantissimus, aperiens,
attenuans, diaphoreticus. Extrinsecus fo-
menti instar appositus summum est discutiens
& resolvens in morbis oculariis, ubi in cor-
nea aut humore aqueo opaci quid hæret.*

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

REC. Nitri purissimi libram unam,
Terræ argillaceæ, vel Boli rubræ
libras sex.

Pulverisata misceantur exacte, humecten-
tur sufficiente quantitate aquæ fontanæ,
atque e massa formentur globuli parvi,
qui rursus exsiccati immittantur retor-
tæ lapideæ, aut vitreæ, probe lorica-
tæ, & igne gradatim administrato, in
recep-

SPIRITUS.

receptaculum valde capax, cui libra semis aquæ simplicis antea immissa sit, destillentur, donec rubri vapores cessent. Spiritus prolectus rectificetur, atque a phlegmate separetur.

Spiritus Nitri plurimum expetitur ad chemicos usus; externe ad verrucas aliasque excrescentias præternaturales auferendas Chirurgi eo utuntur.

SPIRITUS NITRI ANTICOLICUS.

REC. Spiritus Nitri acidi ordinarii libram semis,
Carminativi Sylvii libram unam,
Essentiæ carminativæ Wedelii uncias duas.

Misceantur, & post digestionem per triduum filtrentur.

In colica, a flatibus orta, bonam præstat opem; vim habet carminativam & diureticam.

Dosis scrupulus unus vel drachma semis.

SPIRITUS NITRI CONCENTRATUS, five FUMANS.

REC. Nitri crystallini ficcissimi, libras duas,

Olei Vitrioli libram unam.

Immittatur Nitrum pulverisatum, & optime exsiccatum retortæ satis capaci, ficcæ, antea calefactæ; superfunde Oleum vitrioli, & adaptato amplo recipiente ex arena destillationem institue, vasorum juncturis probe clausis, leni igne: ita spiritus sub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro, epistomio vitreo clauso, servandus. Si nitrum & oleum vitrioli in quantitate anatica sumuntur, superflua quantitas acidi vitriolici in retorta remanebit, vel adhibito igne fortiori spiritus cum nitroso simul valde vitriolicus propelletur.

Obtinetur ita acidum concentratum purissimum nitri, & ad spiritus nitri dulcis præparationem inservit.

Pars II.

SPIRITUS.

175

Curiosum est experimentum, quod cum oleo caryophyllorum genuino, terebinthinæ, aliisve instituitur: quando scilicet spiritui huic fumanti nitroso instillantur guttæ aliquot prædictorum oleorum, flamma erumpit, citra accessum ignis elementaris, luculentissima.

Si vasi recipienti ante destillationem aqua fontana in ratione subquadrupla respectu ingredientium immittitur, spiritus nitri pro scopis docimasticis satis adhuc generosus obtinetur. Exploratur sinceritas spiritus, addendo tantillum solutionis lunæ, utpote per quam acidum vitrioli vel salis communis, quod spiritui nitri admixtum esset, cum luna ad fundum præcipitatur, sicque depuratur spiritus Nitri.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

REC. Spiritus Nitri fumantis unciam unam semis,
Vini rectificatissimi libram unam.

Spiritus Nitri successive instilletur spiritui vini, & post digestionem aliquot dierum, in loco frigido, lento igne e cucurbita vel retorta destillentur.

Criterionum dulcificationis est, si spiritus cum instillato oleo Tartari per deliquium nullam excitet effervescentiam.

Cum vehiculo aquoso in colica flatulenta egregium effectum anodynum & carminativum exserit.

Scopo diuretico etiam a guttis quadraginta ad sexaginta, sufficienti aqua dilutus, dari potest.

SPIRITUS PANIS.

REC. Panis triticei bis cocti, optime siccati, quantum placet.

Immittatur in frusta confractus retortæ vitreæ, atque ex arena, leni igne per gradus aucto, destilletur. Spiritus, post destillationem ab oleo separatus, rectificetur.

Y y

Ad-

SPIRITUS.

Adscribuntur vires stomachicæ, & appetitum confortantes.

Inprimis vero ad Coralliorum Tincturam extrahendam adhibetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

SPIRITUS ROSARUM.

Pari ratione, ut Spiritus Liliorum convallium, destillatio peragitur.

SPIRITUS ROSARUM, PER FERMENTATIONEM.

REC. Florum Rosarum, in mortario contusorum, libras duodecim,

Sacchari libras duas,

Fermenti panis libram semis,

Aquæ fontanæ tepidæ libras triginta.

Stent in vase ligneo, donec fermentata odorem vinosum spirent; destillantur postea e vesica, & spiritus rectificetur.

Laudantur eadem virtutes, quæ Spiritus Liliorum convallium.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram semis,

Cinerum clavellatorum libram unam.

Seminis Anisi uncias tres,

Spiritus vini non dephlegmati libras quatuor.

Misceantur & destillantur ex cucurbita vitrea, atque proliciantur liquoris oleosi volatilis libræ duæ semis.

Serventur in vitro probe clauso.

In Pectoris infarctu pituitoso resolvendo, tono pulmonum roborando, decubitu humorum prohibendo, & flatibus discutiendis, egregium est remedium.

Dosis guttæ decem ad quadraginta.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS, PHARMACOP. EDINBURG.

REC. Radicum Angelicæ,
Galangæ,

SPIRITUS.

Summitatum Majoranæ,
Rorismarini,

Corticum Aurantiorum,
Citri,

Cinnamomi ana drachmas sex,

Caryophyllorum,

Nucum moschatarum,

Macis ana drachmas tres;

Incisis & contusis affunde

Spiritus vini non dephlegmati libras tres.

Digerantur per triduum, postea addantur cinerum clavellatorum,

Salis Ammoniaci ana uncizæ quatuor.

Destillantur leni igne ex cucurbita vitrea ad dimidias.

Vires celebrantur cephalicæ, stomachicæ, carminativæ, nervinæ. Externe etiam odorati inservit, & spiritibus nervinis, pro frictione membrorum paralyticorum, additur.

Dosis a guttis quindecim ad quadraginta in vehiculo aquoso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

REC. Salis ammoniaci partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas
& dimidiam.

Immittantur cucurbitæ vitreæ, atque affundatur quintuplum ponderis aquæ fontanæ. Alembico superimposito, & juncturis probe lutatis, leni igne instituatur destillatio, ut proliciat spiritus, quo usque fortis & sale probe imprægnatus fuerit, qui seorsim servetur. Si mutato recipiente destillatio continuetur, quam diu aliquid salis volatilis odore sese manifestat, posterior hic spiritus debilio novis ejusmodi præparationibus reservari potest.

Vires sunt, salis volatili alcalino purissime ab omni eo empyreumatico depurati competentes.

SPIRITU

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
LACTEUS, VULGO EAU
DE LUCE GALLORUM.**

REC. Salis tartari drachmas tres,
Olei succini rectificati drachma una
semis.

Terantur in mortario vitreo, guttatim suc-
cessive instillando

Spiritus vini rectificati uncias quatuor.
Infundantur in lagenam vitream leviter ob-
turatam. Digerantur per quadrantem
horæ super cineribus calidis. Postea li-
quor supernatans provide decantetur &
fervetur.

REC. Spiritus salis ammoniaci cum calce
viva parati uncia una semis

Instillantur

Liquoris antea parati guttæ sexaginta.

*Est remedium egregium penetrans, nervinum,
quod & recentius in hydrophobia laudaba-
tur.*

Dosis guttæ quindecim & ultra intra aquam.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI VO-
LATILIS VINOSUS.**

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti
libram semis,
Cinerum clavellatorum libram unam
& dimidiam.

Immittantur cucurbitæ vitreæ atque affun-
datur

Aquæ fontanæ libra semis,

Spiritus vini rectificati libra una.

Alembico superimposito, & juncturis pro-
be lutatis, destillentur lento igne; ex
arena, & spiritus volatilis prodeuntis
circiter uncia decem vel undecim colli-
gantur.

*Est sal volatile liquidum, urinosum, purissi-
mum, & in morbis partium solidarum, ab
atonis ortis, scopo tonico, bonam præstat
opem, egregium est diureticum & resolvens.*

*Datur interne a guttis viginti ad triginta;
externe ad resolvendum, cum aliis nervinis
spiritibus mixtus, dolentibus partibus illini-
tur.*

Additis oleis destillatis, varia salia volati-
lia, sic dicta oleosa, ex tempore parari
possunt.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VOLATILIS CAUSTICUS.**

REC. Calcis vivæ recens calcinatæ unci-
as duodecim,

Salis ammoniaci uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras duas.

Calci vivæ & salis ammoniaci, singulis fe-
orsim in pulverem redactis, & cucurbi-
tæ vitreæ inmissis, superfundatur aqua
fontana, & juncturis, imposito alembi-
co, probe lutatis, statim leni igne insti-
tuatur destillatio, & spiritus uncia octo
proliciantur, qui in vase optime clauso
servandus.

Debilior, qui in destillatione sequitur, fe-
orsim potest servari, & novæ destillatio-
ni, loco aquæ, addi.

*Penetrantior est illo, cum cineribus clavellatis
destillatq, & conservari vix potest. Galli
vocant l'alcali volatil fluor, quia sal vola-
tile nunquam forma solida sive crystallina
sed tantummodo fluida ope calcis acquiritur,
neque hic spiritus causticus, uti simplex,
cum acidis effervescebat.*

*Usus ut plurimum est externus, ad excitandos
sopore profundo sepultos; naribus epilepti-
corum etiam admoveatur, sub ipso paroxys-
mo; additur spiritibus nervinis, ad mem-
bra paralytica fricanda & oleis ad linimen-
ta volatilia paranda.*

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

REC. Salis Absinthii uncias duas,
Spiritus Salis unciam unam, vel quan-
tum ad saturationem sufficit.

Evaporentur mixta in vitro, ad ficitatem.

*Ad Salis febrifugi Sylvii naturam accedit, & vir-
tutes habet diureticas, resolventes.*

**SPIRITUS SALIS COMMUNIS
ACIDUS.**

REC. Salis communis decrepitati libras
duas,

Terræ figulinæ libras sex.

Misceantur, addita aquæ sufficiente quantitate, ut globuli exinde formari possint, qui exsiccati retortæ loricatæ indantur, & igne gradatim adhibito in vas recipiens amplum destillatio instituatur, quousque nulli amplius spiritus, sub nebularum forma comparentes, egrediantur. Liquor destillatus rectificetur.

Quæ de concentrato mox dicentur, hic etiam locum habent.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCENTRATUS,

five

GLAUBERIANUS.

REC. Salis communis libram unam;
humectetur

Aquæ fontanæ unciis tribus vel sex.

Immittatur cucurbitæ vitreæ, atque successively superaffundantur

Olei vitrioli uncia sex vel septem.

Superimposito alembico & juncturis optime clausis, leni igne arenæ instituatur destillatio. Spiritus proleptus fumans, volatilis, e cucurbita rectificari potest, & in vitro, epistomio vitreo clauso, asservari.

Genuinus hic spiritus salis est, & brevi compendio paratur, acidissimi saporis est, & subtilissimus, cum ex vitro aperto omnis exhalet, & conclave vapore albo repleat.

Virtute gaudet refrigerante & diuretica; additur julapiis, appetitum excitat, cruditates biliosas præcipitat, alvum & urinam movet. Pectori inimicus est, nec etiam, ubi suspicio ulceris renum adest, adhiberi debet.

Dari potest a guttis tribus ad octo, in vehiculo aquoso copioso.

Externe putredini, potenter resistit, in pustulis oris gangrænosus, aqua dilutus, specificus est, penicillo applicandus. Cum spiritu vini rectificatissimo mixtus in ulceribus cancris multum valet.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

REC. Spiritus Salis concentrati unciam unam & semis,
Vini rectificatissimi uncias duodecim.

Digerantur, postquam spiritus salis vini spiritui successive instillatus est, per aliquot dies, in vase probe clauso, & postea destillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Alia Methodus recentius proposita hæc est.

REC. Magnesii vitriariorum (Braunstein) pulverisati uncias duas,
Salis culinaris depurati & exsiccati uncias quatuor.

Immittantur retortæ & superaffundatur mixtum caute faciendum ex

Olei Vitrioli unciis tribus, &
Alcoholis vini unciis duodecim.

Repone retortam in balneum arenæ, excipulum luto muniendum appone & leni igni prolice uncias quatuor, quæ denuo in retortam refunduntur & nova destillatione proliciuntur.

Apéritivus, stomachicus & diureticus est.

Datur a guttis triginta ad quadraginta.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Ad normam Spiritus Lavendulæ destillatur.

Est bezoardica & anodynæ virtutis.

Datur a drachma una ad unciam semis.

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur ad modum Spiritus Melissæ, Menthæ &c.

Si ter, quaterve super novas herbas cohobatur, virtute gaudet egregia roborante, discutiente, anodyna, & ut plurimum externe in affectibus rheumaticis & arthriticis, item in cephalalgia commendatur.

SPIRITUS.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

Funditur sulphur citrinum, vel, si haberi potest, griseum in olla figulina, tres pollices alta & quatuor lata; vasculum hoc, sulphure fuso, ponatur sub camino, qui fumum perfecte sursum dirigit, emittit. Incendatur sulphur, atque statim superponatur campana magna vitrea, quæ antea supra vaporem aquæ calidæ fuit detenta, ut superficies ejus interna subhumida sit; campana vitrea formam habeat alembici, ut per ejus rostrum spiritus in vas recipiens adpositum destillare possit, ita etiam disponatur, ut lateribus in triangulum positus innitatur, & aëris tantum admittat, ut flamma non extinguatur. Tali modo, multiplicatis campanis, & novi sulphuris repetita accensione, colligitur liquor acidus flavescens. Melius succedit operatio noctu & diebus frigidis, pluviosis, quam sereno tempore.

Nulla quidem inter spiritum sulphuris & spiritum vitrioli est differentia, & plerumque spiritus vitrioli a destillatoribus pro sulphuris spiritu venditur; destillatio per campanam etiam non solum tædiosa, sed & pretiosa est, & magno cum sulphuris dispendio fit, libra integra enim vix ultra drachmas duas acidi concentrati exhibet; attamen, quia nonnulli vim quandam specificam in spiritu sulphuris quærent, in eorum gratiam celeberrimus Stahlus aliam methodum faciliorem, & quæ copiosiore spiritus quantitatem elargitur, tradit: jubet, eum in finem, lintea solutione saturata salis alcali madefieri, atque sulphure incenso, in vase ad hunc laborem adaptato, perfumare; sic alcali acidum sulphuris avidè attrahit, & cum illo in sal abit neutrum. Cui, mediante aqua fontana, e linteis extracto, & ad siccitatem fere inspissato, superfunditur oleum vitrioli, & per retortam, leni igne, spiritus volatilis sulphuris expellitur; e residuo vero Tartarus vitriolatus parari potest. Alii, ut spiritum spiritui sulphuris per campanam perfecte similem acquiramus suadent, ut unus alterve carbo ardens in

Pars II.

SPIRITUS.

179

spiritu vitrioli aqua bene diluto extinguitur. Revera pharmacopolia hoc præparato carere possunt.

Inservit spiritus sulphuris usibus chemicis; additur gulapiis & potionibus, ut acido imbuantur sapore, ad sitim & calorem nimium temperandum.

Dosis guttæ tres vel plures, pro aciditate spiritus.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

REC. Tartari depurati, quantum vis.

Imple illo duas tertias retortæ, ac ex arena in recipientem satis capacem, probe adaptatum ac lutatum, primo moderato, postea gradatim aucto igne, spiritus omnes, una cum oleo foetido, destilla; spiritum ab oleo, mediante charta emporetica duplicata, humectata, separa, ac utrumque per se, e cucurbita, rectificata.

Sal Tartari in residuo calcinato quære, & ut artis est, solvendo elue, coagula & depura.

Multi rectificationem spiritus Tartari dissuadent; quod vi sua ex parte privetur: si vero oleum charta emporetica ab illo separatur, & spiritus e retorta ad siccitatem abstrahitur; foetorem non solum deponit, absque ulla virium suarum jactura, sed & penetrantior evadit.

Incidit, attenuat, resolvit, sudorem atque urinam movet, in colica, mensibus retentis, paralyti, ictero, & hydrope conducit.

Dosis a scrupulo uno ad duos.

OLEUM TARTARI FOETIDUM, quod simul acquiritur, raro, ob foetorem, in usum vocatur; potens tamen est resolvens, unguentis ad scabiem addi potest, mulieribus hysteriis pro odoratu convenit.

SPIRITUS TARTARI VOLATILIS.

Videatur SAL VOLATILE TARTARI.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ claræ libras duodecim.

Z z

Affusis,

Affusis, in vesica cuprea,
Aquæ fontanæ libris quadraginta
octo,
destillantur; sic prodit, una cum aqua,
oleum æthereum Terebinthinæ clarum,
quod ab aqua separandum, & propter
subtilitatem, Spiritus Terebinthinæ vo-
catur.

Residuum in vesicam exhibet
TEREBINTHINAM COCTAM:

Vel ulteriori coctione, absque aqua,
lento igne instituta, brunnum colorem
induit, & tunc

COLOPHONIUM

nuncupari solet.

*Interne in gonorrhœa & scopo diuretico, ad
paucas guttas, quinque vel duodecim, da-
tur; externe ad puncturas nervorum, ten-
dinum, vulnera, & hæmorrhagias sisten-
das, calide applicatur.*

SPIRITUS THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Zedoariæ ana unciam
unam,

Herbæ Scordii uncias duas,
Corticum Citri,
Baccarum Juniperi,
Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Croci Orientalis unciam semis,
Theriacæ Andromachi libram se-
mis,
Spiritus vini simplicis libras sep-
tem.

Radices, herba & reliqua, pulverifata spi-
ritu vini infusa, digerantur Theriaca,
& lento igne libræ quatuor spiritus ab-
strahantur.

Cui, pro lubitu, ad unciam unam, cam-
phoræ scrupulus unus additur, & tunc
vocatur

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

Est alexipharmacus, sudorifer & anodinus.

*Datur a guttis triginta ad septuaginta quin-
que.*

*Ingreditur mixturam simplicem. Externe,
ob pretium, raro adhibetur, cum spiritus
vini camphoratus eadem præstet.*

SPIRITUS TRIFOLII FIBRINI.

Eodem modo parari potest, quo spiritus
cochleariæ evocatus fuit.

*Est antiscorbuticus, & pro conficienda essen-
tia servatur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati li-
bram unam,
Camphoræ drachmas sex.

Stent in digestionem, paucarum horarum
spatio, atque sic a soluta camphora spi-
ritum vini imprægnatum habebis.

*Ufus est externus, roborat, inflammationes,
congestionem dolorificas dissipat, & in affec-
tibus spasticis bonum edit effectum. Qui-
bus cautionibus vero in ambustione, erysi-
pelate & lymphæ congestionibus adhiberi de-
beat, nimis longum foret, hic commemora-
re; igitur lectorem ad practicos ablegamus.*

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

E vesica cuprea, per alembicum stanne-
um, destillatur, & a phlegmate foetido
separatur; & si delicatior, atque ab om-
ni foetore liber expetitur, denuo bis vel
ter, addita tertia parte aquæ fontanæ,
destillatio repetenda. Cui nihil phleg-
matis aquosi adest, *Spiritus rectificatissi-
mus, Alcohol Vini*, vocatur.

*Spiritus vini rectificatus ad ambusta, sugilla-
tiones, luxationes, & ad hæmorrhagias
externe adhibetur; inprimis inservit ad ef-
sentias & tincturas parandas.*

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati li-
bras duas,
Salis Tartari probe depurati & fic-
cati uncias quatuor.

Misce,

SPIRITUS.

Misce, & e cucurbita vitrea, juncturis exacte munitis, igne arenæ moderato destilla.

Inservit extrahendis resinosis, Succini & Ambræ essentiis, nec non aliis usibus chemicis & pharmaceuticis.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Eadem methodo, qua spiritus salis coagulatus, paratur; loco spiritus salis, spiritum Vitrioli fumendo.

Cum tartaro vitriolato convenit, & virtutes habet aperientes, resolventes, incidentes atque diureticas.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Videatur LIQUOR ANODYNUS.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

REC. Aquam a præcipitatione & edulcoratione Mercurii vitæ, bibula colatam; infunde retortæ vitreæ, ac calore lenissimo, primum phlegma omne superfluum evapora, donec gustu perceperis spiritum satis acrem, linguam tentantem; tunc admoto ac adaptato recipiente, & lutatis juncturis, igne pedetentim aucto, omnem spiritum, ad ficcitatem usque, evoca.

Nil minus, quam vitrioli spiritus est; potius spiritus salis communis vocandus esset: omnes enim ejus qualitates habet, & a sale communi, quod in Mercurii sublimati præparatione adhibitum fuit, ortum habet.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

Destillatur e vitriolo, ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam, recipiente capacissimo munitam, cui aquæ quarta pars, respectu ponderis vitrioli, ad hoc opus assumti, insit, igne aperto primum leni, tum aucto gradatim ac successive igne ad candescentiam usque retortæ, donec omnes nebulæ simulque spiritus cessant. Tum recipientem caute separa, ocysime obtura; spi-

SPIRITUS.

181

ritus prolectos, e retorta vitrea, arenæ igne rectifica.

Cum spiritu sulphuris convenit, & iisdem usibus destinatur.

SPIRITUS URINÆ.

Videatur SAL VOLATILE URINÆ, ubi simul modus, spiritum destillandi, docetur.

Usibus nonnullis chemicis inservit; in medicina easdem virtutes, quas Spiritus cornu cervi, habet.

Dosis guttæ viginti quinque ad quinquaginta.

SPONGIARUM TOSTIO.

Fragmenta spongiarum in figulino vase, operculo tecto, igne aperto torrentur, atque tosta in pulverem teruntur.

Expetuntur imprimis ad pulveres strumales, quorum præcipuum sunt ingrediens.

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum in subtilissimum teratur pulverem, atque, addita aqua fontana, super marmore, sicut reliqua præparata, lævigetur.

Leniter adstringit & calefacit; ad capitis & uteri affectus, catarrhos, & mensium vitia commendatur.

Dosis scrupulus unus ad duos.

SUCCUS ACETOSELLÆ,
BERBERUM,
CITRI,
CYDONIORUM,
MORORUM,
RUBI IDÆI, &

alii defæcati, in vitro, collo angustiori prædito, superaffuso oleo, in loco frigido asservantur.

Pro syrupis parandis asservari solent.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Scoriæ Reguli Antimonii simplicis, vel residuum a tinctura Antimonii, affusa aquæ simplicis fontanæ aut pluvizæ ea quantitate, quæ sufficere videtur, solvantur, & solutio per chartam emporeticam percoletur. Filtratæ huic solutioni seu lixivio, ex quo, sub refrigeratione & mora aliquot dierum, sulphur majori portione reguli fœtum sponte jam subsedit, post cautam decantationem in vitro, aut olla munda debite vitreata, inspergatur acetum vini, unde præcipitabitur ingens sulphuris quantitas, quæ, ope chartæ bibulæ, a lixivio separetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inspergatur, & demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem, a lixivio separatum, seorsim ferva. Denique eidem lixivio iterum novum & multum acetum adde, & præcipitabitur pulvis levissimus, aurantio-pallidi coloris, qui edulcorandus, & sub inscriptione SULPHURIS ANTIMONII TERTIÆ PRÆCIPITATIONIS, fervendus.

Primæ præcipitationis sulphur vim plerumque habet emeticam, & hinc rarus ejus usus est.

Secundæ præcipitationis autem adultioribus;

Tertiæ vero etiam teneræ ætati præberi potest.

Alia Methodus eaque melior sulphur Antimonii auratum per excoctionem parandi hæc est:

Paretur autem omnia lixivium causticum ex
Calcis vivæ Unciis viginti,
Cinerum Clavellatorum unciis quindecim,

quibus successive superaffundatur sufficiens quantitas aquæ i. e. mensuræ circiter sex septemve, postquam hoc mixtum per sex decemve horas asservatum & sæpius spatula lignea agitatum fuit, filtretur. Jam

REC. Antimonii crudi subtiliter pulverisati partes duas,

Florum sulphuris partes tres.

Coque in sufficiente quantitate lixivii cau-

stici intra vas terreum vel lebetem ferreum, donec lixivium colore saturate flavo appareat, tunc hoc lixivium adhuc calidum filtra, pulveri forte residuo denuo lixivium causticum adfunde & sic excoquendo & filtrando perge, donec omnis, quantum fieri potest, pulvis solutus sit sive donec lixivium non amplius flavum colorem induat. Ex his lixiviis per chartam bibulam trancolatis & inter se junctis ope vitriolici vel alius acidi aqua bene diluti omne sulphur contentum præcipitatur, aquaque fontana calida aliquoties abluitur, atque siccatum loco alias usitati sulphuris aurati tertiæ præcipitationis inservire potest.

Insignes sunt vires hujus sulphuris aurati, bene præparati, ad contumaces & chronicas affectiones, præsertim quæ ex stagnatione & corruptione lymphæ proveniunt; ad pertinaces nimirum glandularum rebelles tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interposito decocto diluente & sanguinem depurante; ad asthma porro convulsivum, tussim ferinam infantum, peripneumoniam, affectus spasmodicos, catarrhos suffocativos, hemicraniam, febres intermittentes pertinaces, scabiem malignam, quin & prava ex lue venerea incommoda hoc pharmaco profligata esse, celeberrimus Hoffmannus perhibet.

Augentur vires, si cum Mercurio dulci administratur; requiritur vero continuatus usus, etiam si primis diebus nauseam excitasse observatum sit, tamen diebus subsequis nullam amplius stomacho molestiam facessit.

Dosis in tenera ætate, sulphuris tertiæ præcipitationis, granum unum, duo, ad tria; in adultioribus ad grana sex, vel scrupulum semis evehi potest.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII LIQUIDUM.

REC. Solutionem scoriarum Reguli Antimonii;

Dimidiam ejus partem evaporationi subijce, donec ovum illi innatare possit; tur-

ver

SULPHUR.

vero statim admisce æqualem quantita-
tem

Olei expressi Papaveris vel Amyg-
dalarum,

& leniter coque, donec oleum non am-
plius conspiciatur, & massa digito facil-
lime obediens prodeat; postea alteram
lixivii sulphurati partem successive affun-
de, coctionem continua, usque dum al-
calini saporis nihil deprehendatur, nec
oleum amplius sibi relictum appareat.
Puls hæc saponacea probe desiccetur,
& in mortario lapideo cum Tinctura An-
timonii acri per abstractionem spiritus
ad dimidium redacta, ad eminentiam
trium digitorum affusa, per horas aliquot
probe tere, postea cucurbitæ indita per
viginti quatuor horas digere. Ita pro-
dibit peramœna Tinctura, acredinis ex-
pers, quæ totum saponem una cum sul-
phure Antimonii solutum sistit, nullo in
cucurbita residuo relicto.

Est hæc methodus, quam Jacobi proposuit:
En aliam paululum diversam!

REC. Antimonii crudi pulverisati uncias
duas,

Florum sulphuris unciam unam.

Misceantur & coquantur ope sufficientis
quantitatis lixivii caustici, donec om-
nia soluta sint. Filtrato huic decocto ad-
dantur

Olei Amygdalarum recentis Un-
ciæ sex.

Coquantur in vase figulino & evaporentur
ad consistentiam spissiore, quod mag-
na nunc sapo antimonialis vocari potest
& ope Unciarum triginta & duarum
Tincturæ antimonii acris sub leni calore
extrahitur & sub nomine sulphuris anti-
monii liquidi asservatur; quod ut gratius
sit, nonnulli pro quavis uncia guttam
unam olei ligni sassafras addunt.

*Virtus ejus resolvens & sanguinem purifi-
cans insignis ex indole saponis medicati &
sulphuris Antimonii facile elucescit, eaque
in forma soluta magis penetrans.*

Pars II.

SUPPOSITORIUM. 183

*Dosis guttæ quadraginta cum Decocto conve-
niente.*

SUPPOSITORIUM COMPOSITUM.

REC. Specierum Hieræ picræ unciam semis,
Salis Gemmæ scrupulum unum,
Mellis ad spissitudinem cocti uncias duas.
Misce, & fiant suppositoria, variæ magnitudi-
nis.

SYRUPUS DE ABSINTHIO COMPOSITUS.

REC. Absinthii pontici sicci libram semis,
Florum Rosarum rubrarum uncias
duas,
Nardi Indicæ drachmas tres.

Infundantur incisa in

Vini albi &

Succi cydoniorum ana unciis octo;

Digerantur in loco calido per biduum,
postea exprimantur;

Colaturæ unciis decem

adde

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus, per pannum colandus.

*Ventriculi & aliorum viscerum, a causa fri-
gida ortis vitiis auxiliatur; cachecticis pro-
dest, appetitum restaurat, flatu discutit,
ictericis convenit.*

Datur in potionibus & electuariis.

SYRUPUS ACACIARUM FLORUM.

REC. Florum Acaciarum recentium li-
bras duas.

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis libris du-
abus;

Stent in digestionem per noctem, in vase fi-
gulino vitreato, probe tecto, mane le-
viter exprimantur & colentur.

Colaturæ unciis novendecim adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat unica ebullitione syrupus, qui per lin-
teum colatus fervetur.

Aaa

Vires

Vires habent alvum laxandi; laudatur anthelminticus & antinephriticus; datur etiam in epilepsia & tussi.

Teneris a drachma una ad drachmas tres; adultioribus ad drachmas sex, vel unciam unam exhibetur.

SYRUPUS ACETOSELLÆ ET ACETOSÆ.

E succi depurati unciis decem, & sacchari unciis sedecim, semel ebulliendō, fiat syrupus.

Commendatur biliosis, atque ad sitim caloremque restinguendos.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

REC. Succi Citri uncias decem, Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat unica ebullitione syrupus, in vase vitreo fervandus.

Julapiis & potionibus additur, sitim & æstum mitigat.

STRUPUS DE AGRESTA.

REC. Agrestæ, five succi uvarum, paulo antequam maturuerint, expressi, libram unam semis, Sacchari albi libras duas.

Coquantur, in vase figulino vitreato, ad justam syrupi consistentiam.

Ufus est in febribus malignis, & virtute cum syrupo citri convenit. Additur mixturis & julapiis.

SYRUPUS DE ALTHEA FERNELII.

REC. Radicum Althææ, Graminis, Asparagi, Glycyrrhizæ,

Herbar. Althææ, Parietarizæ, Pimpinellæ, Plantaginis, Adianthi albi & nigri ana drachmas tres,

Uvarum passarum mundatarum ana unciam semis,

Cicerum rubrorum unciam unam.

Incisa coquantur ex

Aquæ libris quatuor,

usque dum unciæ viginti octo superfint, deinde cum

Sacchari albi libris quatuor fiat ex arte syrupus.

Commendatur ad urinæ ardorem in nephritide & tussi, a materia acri & salsa orta.

Additur vel decoctis, vel cochleatim sumitur; ad unciam unam & ultra.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

REC. Gummi ammoniaci electi uncias duas;

Solve in

Vini albi unciis decem.

Solutioni admisce

Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, uncias sedecim;

Agitentur, usque dum refrigescant. Syrupus asservetur.

Validissime incidit, detergit & purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a crassa & lenta pituita ortis; in asthmate specificè conferre perhibetur.

Dosis per se uncia semis, drachmæ sex, ad unciam unam.

STRUPUS DE ARTEMISIA.

REC. Radicum Rubiæ tinctorum,

Rusci ana uncias duas,

Herbarum Artemisiæ unciam unam,

Pulegii,

Melissæ,

Dictamni Cretici,

Sabinæ ana drachmas tres,

Florum Hyperici drachmas duas,

Seminis Nigellæ unciam semis,

Cassiæ lignæ unciam unam.

Radices incisas infunde in

Aquæ fontanæ libris tribus;

macerentur per noctem, mane leniter ebulliant, ad colaturæ remanentiam librarum duarum,

SYRUPUS.

duarum, in qua infunde herbas & reliqua ingredientia, minutim incisa; facta digestionem per viginti quatuor horas, exprimantur; in

Colaturæ unciis novem
dissolve

Sacchari albi uncias sedecim,
& per pannum colatus

Syrupus fervetur.

Potionibus additur, ac in mensum suppressione, & lochiorum imminuto vel plane suppresso fluxu utimur.

Dosis drachmæ sex ad unciam unam.

SYRUPUS BALSAMICUS.

REC. Julapii rosati libram unam, vel uncias duodecim,
addantur

Essentiæ Balsami Peruviani drachmæ quatuor.

Mixta ferventur.

Est stomachicus & vere balsamicus; prodest vulneratis, & ubicunque suspicio ulceris interni est, sine notabili tamen calore febrili; tussientibus & asthmaticis conducit.

Dosis drachmæ tres.

SYRUPUS BELLIDIS E SUCCO.

REC. Succus e tota planta Bellidis minoris depuratus, & ad dimidias evaporatus, uncias novem,

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat, saccharum unica ebullitione solvendo, syrupus, qui, per pannum colatus, fervetur.

Prodest tussientibus, vulneratis, ad sanguinem coagulatum resolvendum ab alto lapsis, &c.

SYRUPUS BERBERUM.

REC. Succus Berberum depuratus uncias decem,

Sacchari albissimi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

SYRUPUS.

185

Refrigerans est, sitim & aestum mitigat, & calidis in febris inprimis convenit.

SYRUPUS BETONICÆ.

REC. Herbæ Betonicæ recens ficcatae uncias quatuor.

Incisa macerentur in

Aquæ Betonicæ destillatæ libra una;

Post sufficientem extractionem exprimantur, & in expressi unciis novem, dissolve unica ebullitione

Sacchari albi uncias sedecim.

Syrupus, colatus per pannum, fervetur.

Capiti dicata est betonica, vulneraria est & diuretica; leniter adstringit, in calculo renum & vesicæ commendatur; ob vim adstringentiam & vulnerariam, etiam in lochiorum nimio, post partum, fluxu, adhibetur. Easdem virtutes etiam syrupus habet, & commode potionibus medicis additur.

SYRUPUS BORRAGINIS.

REC. Florum Borriginis recentium libram semis.

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libra una;

Digerantur per noctem, exprimantur, & infusi clarificati unciis novem, adde

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Adscribuntur vires corroborantes, antimelancholicæ & antimanicæ.

Pari modo paratur:

SYRUPUS BUGLOSSI.

Cui tribuuntur vires eadem.

SYRUPUS BRUNELLÆ.

REC. Succus herbæ Brunellæ depuratus, & ad dimidias lento igne evaporatus uncias novem,

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Commendatur ad oris & faucium ulcera & inflammationes, aphthis medetur.

Pari modo paratur:

SYRUPUS PLANTAGINIS MAJORIS.

SYRUPUS BRYONIÆ.

REC. Succı radicum Bryoniæ defæcati libram unam semis,

Sacchari uncias triginta duas.

Fiat, unica ebullitione, post sacchari despumationem, syrupus.

Serum expurgat, potenter resolvit; hinc hydropicis & asthmaticis commendandus; ob insignem amaritiam etiam vermibus & aliis insectis, atque bestiolis, in corpore humano natis, adversatur, menstruum educit, & ad virginum morbos laudatur.

Dosis uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS SIMPLEX, MONSPELIENSIS.

REC. Capillorum Veneris, parum incisorum, uncias tres.

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis libris tribus semis;

Stent in digestionem per noctem, mane leniter coquantur ad septimæ partis consumptionem, colatura albumine ovorum clarificetur, & cum

Sacchari albi libris tribus, fiat syrupus, cui pro lubitu addantur, vel

Aquæ Rosarum, vel
Naphæ uncia una aut duæ.

Humores incidit, attenuat & resolvit; loco sacchari, pro edulcoratione infusi Theæ utuntur, ad tussim & ad pectoris morbos, a materia viscida ortos.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

REC. Capillorum Veneris uncias quinque,

Lingæ Cervinæ unciam semis,

Malvæ drachmas duas,

Radicum Asparagi unciam unam,

Glycyrrhizæ uncias duas.

Macerentur in

Aquæ fontanæ simplicis libris duabus,

& digerantur loco calido per noctem. Mane coquantur ad consumptionem circiter unciarum sex. Residuo expresso, & albumine ovi clarificato, adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat, unica ebullitione, syrupus.

Vires non differunt a præcedentis.

SYRUPUS CARDIACUS.

REC. Vini generosi uncias octo,
Aquæ Rosarum uncias duas semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam unam,
Zinziberis drachmam semis.

Infusa digerantur, ac sufficienti facta extractione exprimantur; in expresso solvantur

Sacchari unciæ sex & decem.

Fiat syrupus.

Est gratus, aromaticus, ventriculum roborans; additur electuariis.

SYRUPUS CARDUI BENEDICTI.

REC. Succı defecati, & ad dimidias evaporati, Cardui Benedicti, uncias octodecim,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Tribuuntur illi vires stomachicæ, alexipharmacæ, antifebriles; potionibus & electuariis additur.

SYRUPUS CENTAURII MINORIS.

REC. Florum Centaurii minoris recentium libram unam.

Incisi infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis libra una;

Stent per noctem, mane exprimantur, & in expresso

Florum recentium libra una infundatur; post macerationem per noctem exprimantur,

Colaturæ, albumine ovi clarificatæ, unciis novem

adde

Sacchari

SYRUPUS.

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Auctor, qui commendat, Quercetanus, ait: hoc syrupo nunquam carere debent officinæ, ob summam ejus necessitatem ac utilitatem; febrium ex bilē ortarum ferociam compescit, biliosum illum succum benigne educit, iſtericis conducit; proprium in se continet Rhabbarbarum Centaurium minus, fel terræ & febrifuga appellatur, electuariis additur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

REC. Succī Cerasorum acidorum, per subsidentiam defecati, uncias viginti,
Sacchari albissimi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Convenit cum reliquis syrupis acidiusculis, imprimis berberum.

SYRUPUS CHAMOMILLÆ.

REC. Florum Chamomillæ vulgaris recentium libram unam,
infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libra una.
Stent in vase probe clauso, per duodecim horas, postea exprimantur; infusio repetatur,

Chamæmeli novam fumendo libram, post extractionem exprimatur & clarificetur infusum, atque ex ejusdem unciis novem,
cum

Sacchari albi unciis sedecim
fiat syrupus.

Multum valet hic syrupus ad colicam, tam flatulentam, quam spasmodicam, in febribus, quartana & tertiana, cum aliis permixtus, bonum edit effectum; adhibetur in potionibus, vel electuariis, additur etiam clysteribus.

Pars II.

SYRUPUS.

187

SYRUPUS CHENOPODII sive ATRIPLICIS MEXICANÆ.

REC. Herbar. Chenopodii sive Atriplicis suaveolentis Mexicanæ, manipulos quatuor,

Erysimi,

Urticæ ana manipulos duos,

Farsaræ manipulum.

Infundantur in aquæ fontanæ bullientis libra una, & succi Raparum albarum libra semis, post sufficientem extractionem exprimantur, expresso addantur

Sacchari albi libræ duæ.

Fiat syrupus.

Pectoralis & diureticus est, atque in asthmate & nephritide laudatur.

Dosis uncia dimidia vel drachmæ sex.

SYRUPUS DE CICHORIO, CUM RHABBARBARO.

REC. Radicum Cichorii uncias duas semis.

Coque in

Aquæ fontanæ libra una semis,
ad remanentiam libræ unius, huic adde Rhabbarbari minutim incisi unciam unam,

Salis Tartari grana viginti.

Ebulliant lento igne, exprimantur, in expresso dissolve

Sacchari albi uncias sedecim;

clarificato & colato syrupo adde

Aquæ Cinnamomi spirituosæ unciam unam.

Servetur.

Bilem leniter subducit; pueris recens natis & infantibus a drachma una, ad drachmam unam semis, usque ad unciam semis, ad educendum meconium, & in torminibus, indeque ortis motibus convulsivis, commode datur.

SYRUPUS CINNAMOMI.

REC. Cinnamomi optimi, crassiuscule contusi, uncias quinque;

Reponantur in cucurbitam vitream,

Bbb

addan-

addanturque

Aquæ Cinnamomi optimæ, cum
vino destillatæ, libræ duæ,

Aquæ rosarum odoratissimæ unciz
duæ.

Stent in loco calido, bene obturato vase,
ne quid exspiret, horis viginti quatuor,
atque, cum

Sacchari albissimi clarificati, ad
consistentiam tabularum cocti,
libris tribus, unciis quatuor.

Fiat syrupus.

*Virtute gaudet analeptica, & ventriculum;
nec non nervos roborante.*

Datur vel per se, vel cum aquis cordialibus.

SYRUPUS CITRI E TOTO.

REC. Corticum Citri exteriorum recen-
tium uncias duas semis,

incisos infunde in

Succi Citri recentis unciis viginti
duabus.

Post digestionem exprimantur, in ex-
presso dissolve

Sacchari albi uncias triginta.

Servetur usui syrupus.

*In febris malignis, exanthematicis, potio-
nibus additur, malignitatem non solum
arcere, sed & vires restaurare compertus
est.*

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

REC. Succi Cochleariæ recenter expres-
si libram unam semis.

Abstrahantur lento igne, in cucurbita vi-
treæ, unciz sex; residuum clarificetur
& evaporetur ad remanentiam uncia-
rum sex, in quo dissolve

Sacchari albi uncias octodecim,
atque per pannum colato fyrupo
adde

Aquam abstractitiam,
& ferva.

*Cochlearia est antiscorbutica planta; hinc sy-
rupus inde confectus scorbuticis conve-
nit.*

SYRUPUS CONTRAYERVÆ.

REC. Radicum Contrayervæ minutim incisa-
rum uncias quatuor.

Infundantur per noctem in

Aquæ fontanæ ferventis libris duabus,
mane leniter ebulliant, ad colaturæ, expres-
sione forti factæ, remanentiam libræ unius,
adde

Succi Citri uncias octo,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat, saccharum unica ebullitione solvendo,
syrupus, in vitreo vase reponendus.

*Laudatur in febris malignis, variolis, morbillis
& aliis exanthematicis, atque, ob vim blandam
alexipharmacam, non adeo calidam, commenda-
ri meretur, potionibus & mixturis admiscendus.*

SYRUPUS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

REC Pomorum Citri integrorum numero sex,
concisis & cucurbitæ vitreæ injectis
adde

Radicum Contrayerva unciam unam se-
mis,

Serpentariæ Virginianæ unci-
am unam,

Seminum Cardui benedicti,

Mariæ ana unciam se-
mis,

Granorum Chermes drachmas duas,

Succi Granatorum dulcium libras duas.

Digerantur per viginti quatuor horas, tum,
facta expressione ac additis

Sacchari albi libris tribus,

fiat, in vase probe vitreato clauso, syrupus,
qui colatus servetur.

*Est alexipharmacus, malignitati & putredini resi-
stit, virtute analeptica vires restaurat, diuretica
& diaphoretica vi materiam noxiam, tam per
sudorem, quam urinam, expellit.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum pulverisatorum
uncias duas,

Succi Berberum, perfectæ maturitatis,
depurati libram unam.

Digerantur, calore moderato, per triduum,
vel

SYRUPUS.

vel quousque corallia bullulas emittere cessant: dein succus affusus, per inclinationem, separetur.

REC. Succus hujus, coralliorum solutione imprægnati, uncias decem, & Sacchari uncias sedecim, lenta ebullitione, redigantur in formam syrupi.

Virtutes sunt refrigerantes, leniter adstringentes, in fluxionibus quibuscunque cohibendis, ad abortum & hæmorrhagias uteri præcavendas mulierculæ utuntur.

Potionibus & electuariis additur, vel solus, ab uncia semis ad integram, sumitur.

SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantium recentium & extimorum uncias quatuor, Vini albi generosi libram unam.

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase; postea vinum decantetur, filtretur, & cum

Sacchari clarificati, atque ad consistentiam tabellarum cocti, unciis octodecim permiscendo.

Fiat syrupus.

Ventriculum roborat, flatus dissipat, & virtute gaudet analeptica & carminativa.

Exhibetur in potionibus.

SYRUPUS CORTICUM CITRI.

REC. Corticum Citri recentium & extimorum uncias quatuor, Granorum Chermes drachmas duas, Vini albi generosi libram unam.

Macerentur loco calido, vase bene testato, per viginti quatuor horas; postea vinum decantetur, filtretur, atque, cum

Sacchari clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti, unciis octodecim.

Fiat syrupus.

Est cordialis, alexipharmacus & carminativus, ad febres epidemicas catarrhales, ma-

SYRUPUS.

189

lignas laudatur. Addi etiam potest potionibus.

SYRUPUS CROCI.

REC. Croci Orientalis drachmas sex, infunde in Aquæ ferventis fontanæ unciis decem.

Stent, vase clauso, in digestionem per tri-duum, postea exprimantur. In colatura dissolve

Sacchari albi uncias sedecim, & post unicam ebullitionem, coletur syrupus per pannum.

Lene & securum præbet anodinum pueris; pectorale & alexipharmacum, in catarrhis utiliter adhibetur.

Uncia una hujus syrupi, Croci fere habet grana quindecim.

Pueris teneris, pro una dosi, ultra drachmam unam non dandus.

SYRUPUS DE CUCURBITA MESUES.

REC. Cucurbitam sativam magnam, pasta pro pane involutam, coque cum pane in clibano; e calente adhuc succum exprime, & ex unciis duodecim, ad novem usque, & sacchari evaporati & clarificati unciis sedecim syrupum confice.

Vires laudantur ad febres biliosas & ardentes, ardorem urinæ, & sitim mitigandam; ad pectoris affectus, pleuritidem & faucium asperitatem.

SYRUPUS CYDONIORUM.

REC. Succus Cydoniorum, ad tertiæ partis consumptionem evaporati, libram unam semis,

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat dissolutione & despumatione, unica ebullitione facta, syrupus.

Gratus est stomacho, leniter adstringit, & in nausea, vomitu & fluxionibus alvi, & ad abortum præcavendum adhiberi potest. Electuariis & potionibus additur.

Dosis ad unciam unam & ultra.

SYRUPUS.

SYRUPUS DIACODION, five
DE CAPITIBUS PAPAVERIS,

feu

DIACODIUM LIQUIDUM
MONTANI.

REC. Caputum Papaveris nondum plane
maturorum, cum feminibus,
uncias duas,

Siliquarum dulcium uncias duas se-
mis;

incisis affunde

Aquæ fontanæ libram unam semis.

Coquantur lento igne, ad colaturæ rema-
nentiam unciarum decem, in fine costi-
onis addendo

Liquiritiæ recentis minutim incisæ
unciam unam semis;

in colatura dissolve

Sacchari candi rubri uncias sedecim.

Despumatus & colatus syrupus fervetur.

*In tussi acri, ad materiam incrassandam, a
veteribus valde laudatur.*

*Dari potest infantibus lingendus, ad drach-
mam unam; adultis, ad unciam unam.*

SYRUPUS, DIACODIUM CRO-
CATUM.

Fit, syrupo antecedenti, five Diacodio
simplici addendo

Croci optimi drachmam unam.

*Vires sunt eadem, propter crocum tamen ma-
gis anodine & resolventes.*

SYRUPUS DOMESTICUS,
five

DE SPINA CERVINA.

REC. Baccarum fruticis, quem Spinam
cervinam vocant, circa finem
Septembris, aut Octobris initio
collectarum, quantitatem suffi-
cientem;

Conquassatæ & calefactæ exprimantur.

Succi hujus colati unciis viginti ad-
dantur

SYRUPUS.

Sacchari albi uncia triginta duæ,
solvantur & colentur, addendo,
in petia ligata,

Anisi,

Mastiches ana drachmas tres,

Zinziberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drachmam
unam semis.

Fiat syrupus.

*Commendatur ad hydropem, cachexiam, ar-
thritidem, nec non luem veneream. Sunt,
qui etiam recens natis, ad expurgandum
meconium, dare solent.*

Datur drachma una ad unciam & ultra.

SYRUPUS EMETICUS.

REC. Vitri Antimonii hyacinthini, sub-
tilissime pulverisati, drachmas
duas,

affunde

Vini albi Rhenani uncias duode-
cim.

Stent per triduum, leni calore in dige-
stione; post per chartam bibulam fil-
tratis, adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Sola dissolutione & unica ebullitione, fiat
syrupus, in vase vitreo reponendus.

Delicatus propinatur, ad vomitum ciendum.

*Dosis est a drachma una ad drachmas quin-
que vel sex.*

*In apoplexia & catarrho suffocativo etiam cly-
steribus, ab uncia una ad unciam unam
semis addi potest.*

SYRUPUS EMETICUS ANGELI SALÆ.

REC. Vitri Antimonii, optime triti unciam
unam,

Cinnamomi electi,

Zedoariæ,

Seminis Angelicæ ana drachmas duas,

Sandali rubri unciam semis,

Croci Orientalis drachmam semis.

Infundantur in

Aceti rosati unciis viginti;

STRUPUS.

Macerentur per viginti quatuor horas, co-
lentur & filtrentur, in filtrato liquore dissol-
vantur

Sacchari albi unciae viginti.

Fiat syrupus.

Vires sunt eadem, quæ præcedentis.

Dosis drachma una ad unciam dimidiam.

SYRUPUS ENULÆ.

REC. Succi radices Enulæ defæcati libram
unam semis,

Sacchari albi libras duas semis.

Solvantur & fiat syrupus, per pannum co-
landus.

Resolvit, & ad pectoris vitia adhibetur.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

REC. Erysimi totius recentis uncias tres,
Radicum Helenii,

Tussilaginis ana uncias
duas,

Herbarum Borraginis,

Cichorii,

Capillorum Veneris ana
unciam semis,

Florum quatuor cordialium,

Anthos,

Stœchadis Arabicæ ana
drachmas duas,

Seminis Anisi drachmas sex,

Passularum mundatarum uncias
duas.

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris duabus & se-
mis,

Succi Erysimi unciis sex,

ad remanentiam unciarum octodecim,
in expresso liquore dissolvantur

Sacchari albi unciae triginta duæ.

Fiat syrupus.

*Ad raucedinem præcipue commendatur, &
multis jam amissam vocem restituisset, ex-
empla prostant.*

*Datur ab uncia dimidia ad integram, ex in-
fusis, decoctis, sero lactis, aliisque vehicu-
lis.*

Pars II.

STRUPUS.

191

SYRUPUS FARFARÆ E FLORIBUS.

REC. Florum Farfaræ, sive Tussilaginis
recentium libram unam semis,

affunde

Aquæ fontanæ ferventis libras duas.

Macerentur per viginti quatuor horas,
exprimantur, & in

Colaturæ unciis novem
dissolve

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

*Ad pectoris vitia inservit, materiam acrem
salsam incrassat, & expectorationem ad-
juvat.*

Datur in decoctis pectoralibus.

SYRUPUS FRAGORUM.

REC. Succu Fragorum depurati uncias de-
cem,

Sacchari uncias sedecim.

Fiat lege artis syrupus, ad normam syru-
pi Berberum.

Est analepticus & diureticus.

SYRUPUS DE FUMARIA.

Paratur e

Succi defæcati, & ad tertiæ partis
consumtionem inspissati, unciis
novem, &

Sacchari unciis sedecim.

*Ad sanguinem & lympham corrigendam, scabi-
em & alia cutis vitia commendatur.*

Addi potest electuariis & decoctis.

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ.

REC. Glycyrrhizæ uncias duas,

Capillorum Veneris unciam unam,

Hyssopi unciam semis,

Aquæ libras duas.

Species prædictæ in aqua, prius fervefacta,
horis viginti quatuor macerentur, dein-
de decoquantur ad dimidias, colaturæ
addendo

Mellis despumati uncias octo,

Sacchari albi uncias sedecim,

Aquæ rosarum uncias quatuor.

Ccc

Fiat

Fiat syrupus, secundum artem.

Cum Syrupo Capillorum Veneris convenit; pectoralis est, & pro edulcoratione decoctionum pectoralium inservire potest.

SYRUPUS GRANATORUM.

REC. Succī Granatorum acido-dulcium depurati uncias decem,

Sacchari albi uncias sedecim.

Solvantur & colentur; syrupus in vase vitreo fervetur.

Est analepticus & leniter adstringens; refrigerat, sitim sedat, bilem refrænât.

Datur in potionibus, mixturis & julepiis.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

REC. Coccinellæ unciam semis.

Optime trita in

Aquæ Rosarum &

Cinnamomi, sine vino, ana
unciis duodecim,

Salis Tartari fixi granis duodecim.

Infundantur per noctem, addantur

Sacchari albi uncie triginta duæ,

Succi granorum Kermes uncie duodecim.

Unica ebullitione fiat syrupus liquidus, qui, per linteum colatus, reponatur.

Analepticus est, diureticus & alexipharmacus; datur in variolis & morbillis, nec non febribus catarrhalibus.

Cum Confectione Alkermes convenit.

SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

Sicut Syrupus Betonicæ ex aqua destillata & herba sicca paratur.

Hedera terrestris vulneraria est, & nephritica; Syrupus ad abscessus, internos, sputum cruentum saniosum phthysicorum commendatur; consolidat & mundificat, urinam & menses promovet, ut & hydropicis utilis est.

In potionibus & electuariis propinari potest.

SYRUPUS HYPERICI.

REC. Florum Hyperici recentium libram unam semis,

Aquæ fontanæ ferventis libram unam.

Macerentur per diem integrum in loco calido; postea exprimantur, & ex

Infusi clarificati unciis novem, cum

Sacchari albi unciis sede im.

Fiat syrupus.

Eandem vires, quas flores, habet, vulneratis, calculosis, ac renum doloribus vexatis auxiliatur.

Docente Quercetano, instar balsami omnibus resistit corruptionibus ventriculi; specificum est contra vermes.

SYRUPUS HYSSOPI.

REC. Hyssopi ficcatae uncias duas,

Capillorum Veneris unciam semis,

Radicum Helenii unciam unam,

Apii unciam semis.

Coque radices & Capillum Veneris in

Aquæ libris duabus semis, ad colaturæ remanentiam unciarum sedecim, in qua infundatur Hyssopus, & post digestionem in loco calido, infuso expresso & clarificato adde

Sacchari albi libras duas, uncias octo.

Fiat syrupus.

Viscidos humores resolvit, pulmones roborat, tussientibus & asthmaticis commendatur, in potionibus & electuariis.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

REC. Jujubarum recentium uncias tres,

Liquiritiæ drachmas sex,

Capillorum Veneris,

Florum Violarum ana drachmas quinque,

Seminum Malvæ,

Cydoniorum,

Papaveris albi ana drachmas tres,

Incisa coquantur, in

Aquæ fontanæ libris duabus semis, ad colaturæ remanentiam unciarum octodecim, in qua dissolve

Traga-

SYRUPUS.

Tragacanthæ albæ electæ drachmam unam,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus, qui, per colatorium trajectus, fervetur.

Commendatur ad tussim siccam, sputum tenue suo lentore maturat, incrassat, glutinat & expectorationem adjuvat, idemque ad urinae vitia confert.

Propter mucilaginosam semina & tragacantham, est consistentiæ spissioris, & potius linctus, quam Syrupus, vocari deberet; præstat etiam, illum per linctus, quam haustus, assumi, aut aquis dilutum hauriri.

SYRUPUS KINÆ KINÆ.

REC. Corticum Kinæ Kinæ pulverisatorum uncias quatuor,

Cinnamomi electi unciam unam,

Vini rubri generosi libras duas.

Macerentur, in vitro probe clauso, sæpius vitrum movendo, per biduum; postea exprimantur ac colentur, in colatura, unica ebullitione, dissolve

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus, qui per pannum colatus, fervetur.

Pueris medicamenta reformidantibus dari potest; præter vim antifebrilem, etiam tonicam & stomachicam habet.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS CASCARILLÆ, E CORTICIBUS LIGNI SASSAFRAS,

eodem modo, quo præcedens, parari possunt, scilicet

Cascarillæ, vel

Corticum ligni Sassafras uncias tres, in

Vini albi unciis viginti duabus, infundendo, & cum

Sacchari unciis triginta duabus, in syrupum redigendo.

Vires habent easdem, quas cortices, ex quibus parati sunt.

SYRUPUS.

193

SYRUPUS DE MANNA LAXATIVUS.

REC. Radicis Polypodii unciam unam semis,

Specierum decocti florum & fructuum,

Passularum minorum ana uncias duas.

Macerentur, per noctem, in

Aquæ fontanæ ferventis libris duabus semis,

mane coquantur ad tertiæ partis consumptionem, colentur, in colatura infunde

Foliorum Sennæ electæ uncias quatuor,

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Galangæ,

Macis,

Zinziberis ana drachmam unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, in loco calido, exprimantur, expressum albumine ovi clarificetur, atque cum clarificato dissolvantur

Mannæ Calabrinæ uncia sex,

Sacchari albi uncia viginti duæ.

Fiat syrupus.

Datur pueris, scopo laxativo, ad humores a pectore derivandos, & recens natis, ad meconium educendum.

Dosis scrupuli duo ad unciam semis.

SYRUPUS MASTICHINUS.

REC. Mastiches electæ, parum contusæ, uncias duas,

infunde in

Aquæ Mastichinæ unciis duodecim.

Stent in vase probe clauso, in digestionem, per triduum; postea colentur; in colatura dissolve

Sacchari albi uncias sedecim.

Syrupus in vase probe munito fervetur.

Ad ventriculi vitia, a causa frigida orta, catarrhos, & ad cerebrum roborandum convenit.

Potionibus & electuariis additur; vel etiam, pro lubitu, ab uncia dimidia ad integram exhibetur.

SYRUPUS MENTHÆ.

REC. Herbæ Menthæ siccæ uncias quatuor,

Aquæ Menthæ libram unam.

Digerantur in vase clauso, per biduum, exprimantur, & in colatura, unica ebullitione, dissolvantur

Sacchari albi unciae fedecim.

Ventriculum roborat, vomitus & nauseam tollit; carminativus & hystericus est.

SYRUPUS MELISSÆ.

Eodem modo paratur.

Adscribuntur vires cordiales, nervinæ & uterinæ.

STRUPUS MERCURIALIS, sive
PROPHYLACTICUS.STROP DE LONGUE VIE
DICTUS.

REC. Succorum Mercurialis libras quatuor,
Borraginis,
Buglossi ana libram unam,
Mellis optimi albi libras sex.

Coquantur & despumentur; postea

REC. Radicum Gentianæ uncias duas,
Iridis nostratis uncias tres,
Vini albi libram unam semis.

Radices incisæ macerentur in vino, per viginti quatuor horas; postea exprimantur; cum succis & melle permisceantur, lenique igne ad syrapi consistentiam coquantur, atque per pannum colatus syrupus fervetur.

Adscribitur huic Syrupo virtus singularis prophylactica, ad vitam prolongandam, podagræ, hydropis, calculi, aliorumque morborum insultus arcendos & mitigandos.

Dosis, jejuno stomacho, quotidie uncia dimidia, vel integra.

SYRUPUS MORORUM.

REC. Succu Mororum maturorum uncias viginti,

Sacchari albissimi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Cum syrupo cerasorum convenit; præcipue autem ad oris & linguæ asperitatem & inflammationem, aphthas & anginam laudatur.

SYRUPUS DE MUSCO
QUERNO,

ad Tussim convulsivam.

REC. Musci querni barbati, Bryon dicti, uncias tres,
Herbæ Botryos, five Atriplicis Mexicanæ suaveolentis,
Passularum minorum ana unciam unam semis,
Radicum Symphyti majoris unciam unam,
Liquiritiæ unciam semis.

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis libra una semis;

digerantur per noctem, coquantur lento igne; ad colaturæ remanentiam unciam decem, in qua clarificata dissolve

Sacchari uncias fedecim.

Fiat syrupus, cui refrigerato adde Balsami Tolutani drachmam unam semis,

cum

Sacchari albi uncia una semis triti.

Misce exacte, & serva.

Celebris in Anglia & efficax est contra tusses clangosas & convulsivas puerorum, si cochlear unum vel duo propinentur, sæpe, in die, ante & post singulos tussendi conatus.

Dari etiam potest in aqua hyssopi, vel decocto pectorali, per aliquot dies.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E succo, sicut Syrupus Mororum, paratur.

Refri-

SYRUPUS.

Refrigerat & leniter adstringit, in fluxionibus alvi & sanguinis commendatur.

SYRUPUS DE NICOTIANA.

REC. Succi Nicotianæ libras duas,
Hydromellis simplicis libram unam
femis,

Oxymellis simplicis uncias quatuor.
Digere in balneo, aut alio loco temperato,
per duos vel tres dies, ut defæcetur;
clarum, per declinationem vasis, a fæ-
cibus separatum, denuo, per viginti
quatuor, horas, digere, donec ab om-
ni fæculentia succus depuratus sit,
adde

Sacchari albi libras tres.

Permisce, & in fyrupi consistentiam re-
dige.

Nota: Ad vehementiam Nicotianæ corri-
gendam, opus est, ut digeratur
& quasi fermentetur succus, quæ
vehementia postea per longiorem
coctionem magis diminuitur; se-
cundum descriptionem igitur præ-
paranda est.

*Ad asthmaticos affectus, ubi pulmones pituita
crassa ac viscosa infarcti, tussim humidam,
ubi expectoratio difficulter succedit, com-
mendatur; cerebrum a catarrhis & fluxio-
nibus serosis & frigidis liberare, imo epi-
lepsiam tollere perhibent; præter quod pec-
tus mirifice per superiora evacuet, per in-
feriora etiam potenter educit.*

*Pectorali scopo, modica quantitate, quæ vo-
mitum excitare nequeat, sed potius resol-
vendo & anodyno effectû juvet, Syrupus
hic exhiberi debet; quodsi vero vomitus vel
nausea excitetur, hausto vino calido aroma-
tizzato mox conquiescet.*

*Dosis drachma una ad duas, tres, vel
quatuor.*

STRUPUS NUCISTÆ.

REC. Nucis moschatæ uncias duas;
Pulverifatis affunde

Vini generosi Burgundiaci libram unam.

Pars II.

SYRUPUS.

195

Digerantur in vase clauso, per tres dies;
postea exprimantur, & in colatura dissol-
vantur

Sacchari albi uncia sedecim.

Servetur syrupus.

*Est carminativus & stomachicus, alvi fluxiones &
vomitus sedat.*

Datur in mixturis & electuariis.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

REC. Caput Papaveris albi, cum semi-
nibus, uncias octo,
Aquæ libras quatuor.

Decoquantur ad dimidium, clarificato
decocto addantur

Sacchari albi libræ tres.

Fiat syrupus.

*Adhiberi solet in tussi acri, a materie tenui,
humores inspissat, demulcet, anodynus est,
& somnum conciliat; datur etiam in ar-
dore urinae; exhibetur in emulsionibus, vel
solus.*

Dosis a drachmis duabus ad sex.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

REC. Florum Papaveris erratici libras
duas,
infundantur in

Aquæ ferventis puræ libris tribus.

Macerentur per viginti quatuor horas,
exprimantur, & cum

Sacchari albissimi libris quinque,
& unciis quatuor,

fiat syrupus.

*Specificum habebatur olim in pleuritide: blan-
dissimum est anodynum & demulcens; ad-
ditur julepis & electuariis, nec non de-
coctis.*

SYRUPUS FLORUM PARA- LYSEOS,

five

PRIMULÆ VERIS.

REC. Florum Paralyseos mundatorum
recentium libram unam,

Ddd

affunde

affunde

Aquæ ferventis fontanæ uncias decem.

Post sufficientem macerationem exprimantur, in colatura, unica ebullitione, dissolve

Sacchari albi uncias sedecim.

Servetur syrupus per pannum-colatus.

Speciales floribus Paralyseos adscribuntur vires nervinæ; datur igitur etiam Syrupus convulsis, tremulis, & paralyticis; ulcera oris persanare & tussientibus auxiliari creditur.

SYRUPUS PERSICORUM FLORUM.

REC. Florum Persicorum recentium libram unam.

Macerentur horis duodecim in

Aquæ calentis libra una;

postea exprimantur, & in

Colaturæ depuratæ unciis novem, solvendo

Sacchari albi uncias sedecim, fiat syrupus.

Infantibus teneris vomitum movet; proventriculi ætatis laxat alvum, bilem & lumbricos educit.

Datur a drachma una ad unciam dimidiam & integram.

SYRUPUS PÆONIÆ FLORUM.

REC. Florum Pæoniæ recentium libras tres semis,

Aquæ fontanæ ferventis libras quatuor.

Fiat infusio per horas viginti quatuor, postea exprimantur.

REC. Expressi hujus uncias octodecim, Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Epilepticis dicatus est, & vi sua anodynus motus restringere valet.

Datur in mixturis infantibus ad drachmas duas vel tres.

SYRUPUS DE RHABARBARO DEODATI.

REC. Rhabarbari veri, Foliorum Sennæ ana unciam unam semis, Cinnamomi drachmam unam semis, Salis Tartari scrupulos duos, Zinziberis drachmam semis.

Infunde incisa in

Aquæ Cichorii unciis decem,

Rosarum unciis quatuor;

stent in digestionem, per triduum, in loco calido, donec, unica ebullitione facta, exprimantur; in

Colaturæ, albumine ovi clarificatæ, unciis novem

dissolve

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Alvum leniter subducit, bilem evacuat, & præcipue recens natis, ad educendum meconium utiliter datur.

Dosis teneris drachma semis, scrupuli duo ad drachmam unam; in adultioribus ad unciam unam ascendere licet.

SYRUPUS RIBIUM.

REC. Succum Ribium depuratum uncias decem,

Sacchari albissimi uncias sedecim.

Acidus est, & mitior syrupo Berberum; sitim & æstum mitigat, & biliosis convenit.

STRUPUS ROSELLÆ.

REC. Herbæ Rosellæ uncias duas,

Erysimi drachmas sex;

Pulmonariæ quercinæ unciam semis,

Florum Farfaræ,

Radicum Curcumæ ana drachmas duas,

Liquiritiæ unciam unam,

Passularum minorum uncias duas,

Croci Orientalis drachmam unam.

Incisa perfundantur

Aquæ fontanæ bullientis libris tribus.

Coquantur

STRUPUS.

Coquantur parum, exprimantur; in expressio dissolvantur

Sacchari albi libræ duæ,
coquantur ad justam syrupi consistentiam.

Commendatur ad varicedinem inveteratam, asthmaticis, & tussim ferinam.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS.

REC. Florum Rosarum pallidarum libras quatuor.

Infundantur in

Aquæ fontanæ calidæ libris octo, stent per viginti quatuor horas in digestionem, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo

Rosarum eadem quantitas infundatur, idque tertium repetatur; tandem, in

Infusi uncias novem,
solvendo

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Alvum blande subducit, & neonatis atque teneris ad drachmam unam datur; adultioribus ab uncia semis ad drachmas sex porrigi potest.

STRUPUS E ROSIS SICCIS.

REC. Florum Rosarum rubrarum fliccorum, finissimorum libram semis,

Aquæ fontanæ ferventis libram unam semis.

Macèrentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & in

Colaturæ uncias novem
dissolvantur

Sacchari albi uncias sedecim,
fiatque syrupus.

Leniter adstringit, atque in alvi fluxionibus utiliter adhibetur.

STRUPUS ROSATUS SIMPLEX.

REC. Muchari Rosarum libram unam semis,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Solvantur unica ebullitione, & per pannum colatus syrupus fervetur.

SYRUPUS.

197

Alvum laxat leniter; Aphthis medetur, ac non sine fructu decoctis pectoralibus additur.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

REC. Succu baccarum rubi idæi depurati uncias viginti,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Sunt, qui baccis rubi idæi acetum vini ad eminentiam digiti latitudinis affundunt, post quietem quinque vel sex dierum succum ex conquassatis & fervefactis baccis exprimunt, & cum saccharo in syrupum redigunt.

Sapore & odore delectat, analepticus & refrigerans est; admiscetur julapiis & mixturis cordialibus, & in febribus tam intermittentibus, quam continuis malignis, non sine effectu exhibetur.

STRUPUS SCÉLOTTRBICUS.

REC. Succu Nasturtii aquatici,

Beccabungæ ana libram semis,

Fumariæ,

Lupuli ana uncias tres.

Misceantur & coquantur cum

Sacchari albi uncias sedecim,

ad syrupi spissioris consistentiam, qui, per pannum colatus,

Aquæ Nasturtii,

vel
Cochleariæ uncia una, vel duabus
diluendus.

Commendatur scorbuticis; & præsertim ejus usus externus, ad oris & gingivarum exulcerationes.

STRUPUS SCORDII.

REC. Herbarum Scordii, in umbra siccatæ, uncias quatuor,

infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libra una.

Digerantur per noctem, postea exprimantur, & in

expressu clarificati uncias novem

dissolve

Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Alexipharmacus & anthelminticus est.

Ddd 2

SYRUPUS

STRUPUS.

SYRUPUS DE SCILLA,

five

OXYSACCHARUM SCILLITICUM
LONDINENS.

REC. Aceti scillitici libram unam semis,
Cinnamomi acuti,
Zinziberis ana unciam unam.

Post digestionem per triduum colentur,
addantur

Sacchari albi unciae triginta,
& fiat unica ebullitione, in vase figu-
lino probe vitreato, syrupus, qui co-
latus, in vitro, vel vase porcellaneo,
servandus.

*Prodest asthmaticis, resolvit atque easdem,
quas oxymel scilliticum, vires habet; gra-
tior tamen est, & pro illis, qui mel tolerare
nequeunt, parandus.*

*Dosis drachmæ duæ, uncia dimidia ad drach-
mas quinque.*

STRUPUS SEDI MAJORIS,

five

SEMPERVIVI.

REC. Succī Sempervivi majoris, ad dimidiæ
partis consumtionem, in vase ter-
reo vitreato, evaporati, uncias de-
cem,

Sacchari albi uncias fedecim.

Misce, fiat solvendo, ebulliando & colando sy-
rupus.

*Februm æstus extinguit, præcipue vero ad linguæ
& faucium ariditatem, aphthas, & inflamma-
tionem valet.*

Datur cum mucilagine cydoniorum.

STRUPUS DE STCECHADE.

REC. Florum Stœchadis Arabicæ uncias duas,
Rorismarini drachmas duas,
Calaminthæ montanæ,
Origani,
Thymi ana drachmas tres,
Betonicæ,
Salviæ ana drachmas duas,

STRUPUS.

Seminum Anisi,

Pæoniæ ana drachmas duas
semis,

Calami aromatici,

Cinnamomi,

Zinziberis ana drachmam unam.

Incisa infundantur in

Aquæ ferventis libra una;

Macerentur per biduum in loco calido, postea
exprimantur, & in

expressi unciis novem,

dissolve, unica ebullitione,

Sacchari albi uncias fedecim.

Per pannum colatus syrupus servetur.

*Cerebri atque nervorum morbis, a causa frigida,
medetur, ventriculum corroborat, & concoctio-
nem adjuvat.*

Additur electuariis & potionibus.

STRUPUS SULPHURIS,

five

ARCANUM BECHICUM

WILLISII.

REC. Epatis sulphuris unciam semis.

Solve in

Aquæ fontanæ &

Fœniculi ana unciis quatuor se-
mis,

adde

Sacchari albi uncias fedecim.

Unica ebullitione coquantur in syrupum, qui,
per pannum colatus, servetur.

*Laudatur a celeberrimo Auctore ad asthma, tussim,
phthisin.*

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS E SYMPHYTO

FERNELII.

REC. Radicum & foliorum Symphyti ma-
joris manipulos sex,
Rosarum rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabiosæ,

Tussila-

SYRUPUS.

Tussilaginis ana manipulos duos.
E contusis omnibus recentibus exprimatür succus, cujus, despumati vel defæcati, unciis novem adde
Sacchari uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Auctor de hoc syrupo promittit, quod tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blande expurget, sine metu hæmorrhagiæ; subadstringens est, & non minus ad omnis generis fluxus, tam alvinos, quam sanguineos, utiliter adhiberi potest. Ad-ditur electuariis, potionibus & decoctis.

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM.

REC. Infusi florum Tunicæ saturati uncias novem,
Sacchari uncias sedecim.

Fiat, lege artis, syrupus.

Analepticus, ventriculo & nervis gratus est, leniterque adstringit.

SYRUPUS VERONICÆ.

REC. Herbæ Veronicæ recentis ficcatae uncias sex.

Macerentur in

Aquæ Veronicæ, cum vino destillatæ, libra una;

post sufficientem extractionem, in loco calido, fortiter exprimantur, in expresso dissolvantur

Sacchari albi uncia sedecim.

Fiat syrupus.

Abstergit & consolidat, pulmonibus & renibus præcipue convenit.

Datur cum decoctis & electuariis; in tussi pulmonali etiam solus, vel per se, ad unciam dimidiam, vel integram, sumi potest.

SYRUPUS VIOLARUM.

REC. Florum Violarum recentium, mundatorum, libram unam.

Contundantur in mortario lapideo, & superaffundantur, in vase figulino, optime vitreato,

Aquæ fontanæ ferventis purissimæ uncia octodecim;

Pars II.

SYRUPUS.

199

post digestionem, per aliquot horas, exprimantur & colentur.

REC. Infusi hujus colati uncias viginti, adde

Sacchari albissimi Canariensis uncias triginta duas.

Leni ac unica ebullitione, in stanneo vel figulino vase facta, fiat syrupus, qui, per pannum colatus, fervetur.

Sunt, qui, ob meliorem conservationem coloris,

Succi Citri unciam unam, quin & Spiritus salis drachmam

addunt. Tum vero syrupus virtutem reagentem erga acidum & alcali minus exerit.

Teneræ ætati potissimum dicatus est, & ad aphthas, tussim, pectoris infarctus, ardorem urinæ, & calorem præter naturam temperandum; commendatur.

Cum aqua cerasorum plerumque adhibetur, vel cum oleo amygdalarum dulcium lingendus propinatur.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

REC. Florum Violarum mundatorum uncias quatuor,

Foliorum Sennæ electæ uncias duas,

infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libra una.

Digerantur per noctem, in loco calido, mane exprimantur; ad expressi uncias novem,

adde

Sacchari albi uncias sedecim.

Colata ferventur.

Leniter alvum subducit, & pueris delicatioribus, qui alia medicamenta reformidant, datur.

Dosis a drachmis duabus ad sex, vel unciam unam.

Eee

TAR-

TARTARI OLEUM PER DELIQUIUM.

Fit, sal Tartari, in manica, aëri humido in cella exponendo, ut sensim in vitrum suppositum destillet; liquor salinus, per chartam filtratus, fervetur.

Citius autem parari potest:

Salis tartari libram unam in

Aquæ calidæ fontanæ uncias quatuor, vel quinque,

solvendo & filtrando.

Usibus pharmaceuticis & chemicis inservit.

TARTARI TERRA FOLIATA.

Videatur ARCANUM TARTARI.

TARTARUS CHALYBEATUS.

REC. Tartari albi crudi, pulverisati, libram unam,

Limaturæ ferri uncias quatuor.

Coque cum

Aquæ fontanæ libris duodecim, ad remanentiam quartæ partis; liquorem colatum per chartam emporeticam filtra, atque ad crystallisandum, in cellam vel locum frigidum repone.

Crysallos a liquore salino, rursus evaporando, & ad crystallisationem reponendo, separa ac sicca.

Ictericis, cachecticis & hypochondriacis, febre quartana laborantibus convenit.

Dosis a granis decem ad quindecim.

In majori quantitate exhibitus, nauseam & vomitus excitare solet.

TARTARUS EMETICUS.

REC. Croci metallorum,

Crysallosum tartari ana uncias sex.

Affundantur

Aquæ fontanæ libræ duæ semis; stent per unum alterumque diem, pro lubitu.

Hinc leni igne, in vase figulino, probe vitreato, coquantur, ad sufficientem so-

lutionem & imprægnationem tartari. Liquor fervens filtretur, filtratus evaporetur lenissimo igne, sub perpetua agitatione, fere ad siccitatem; & postquam leni calore tartarus penitus exsiccatus fuerit, in pulverem teratur, non ita quidem albidum futurum, ac ille crysallosatus, sed efficacior.

Ob varias causas alii alios modos tartarum emeticum, quippe cujus efficaciam sæpius valde variabilem deprehenderunt, parandi proposuerunt; methodus recentius ab Hoepfnero in singulari tractatu (*über die Bereitung des Brechweinsteins 1782*) proposita eaque præferenda huc redit:

REC. Vitri Antimonii subtilissime pulverisati unciam unam,

Crysallosum tartari uncias duas.

Misceantur coquanturque intra figulinum vas in aquæ purissimæ fontanæ libris duabus sub continua agitatione per decem horas, atque, si aqua ad dimidiam partem sub hac coctione evaporata est, subinde iterum nova aqua reaffundatur. Postea per filtrum lixivium calens transcoletur & ad siccitatem pulveris, qui operatione caute suscepta circiter uncias duas scrupulosque duos ponderabit, evaporetur.

Est emeticum universale, & datur tenerioribus a grano dimidio ad unum & semis; robustiores grana duo, tria, perferre possunt. Optimus modus, tartarum hunc exhibendi est, cum grana tria in uncias tribus vel quantitate, pro lubitu, majore aquæ solvuntur, hujusque solutionis hauriat æger dimidiam partem, vel duas tertias; si effectus voto non respondeat, reliqua portio successive per cochleare dari potest. Ita hyperemesis periculosa evitatur.

TARTARUS TARTARISATUS, SAL VEGETABILE dictus.

REC. Salis Tartari libram unam, vel quantum lubet.

Dissolvatur in

Aquæ fontanæ libris tribus, vel quatuor.

Ebul-

TARTARUS.

Ebullienti injiciantur per vices

Cryſtalli Tartari, in pulverem triti, quantum ad ſaturationem ſalis alcali ſufficit, & uſque dum a novis cryſtallis adjectis nulla ulterius excitetur efferveſcentia.

Liquor ſaturatus per chartam bibulam filtratur, atque ad ſiccitatem evaporatur. Experientia docuit, quod una circiter pars ſalis tartari pro ſaturandis tribus partibus cremoris tartari requiratur, hinc fere in momento, quin ſine adju-mento ignis aquam ad ebullitionem perducenſis tartarus tartariſatus in forma fluida acquiritur, ſi v. g. uncia una ſalis tartari cum tribus unciis cremoris tartari miſcetur & in aqua ſufficiente ſolvitur.

Ex hac combinatione acidi & alcalini tartari reſurgit novum ſalis medii genus, propter oleoſas, quas Tartarus continet partes, ſaponaceam indolem habens; Virtute gaudet leniter purgante, reſolvente & diuretica. Maniacis quoque larga doſe & continuato uſu datum, perquam utile obſervatum eſt.

Dari poteſt ſcopo laxandi, a drachmis duabus ad quatuor, in ſufficiente quantitate aquæ dilutus; ſcopo digeſtivo & diuretico ſufficit drachma dimidia vel integra. Externe ulceribus ſordeſcentibus mundificandis prodeſt.

TARTARUS VITRIOLATUS.

REC. Salis Tartari, per deliquium, vel in aqua fontana ſoluti & purificati, uncias quatuor.

Huic ſpiritus Vitrioli guttatim inſtilletur tantum, donec efferveſcentia ceſſet, poſtea humiditate lento calore evocata, exſiccantur.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

REC. Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Hungarici ana libras
duas.

TEREBINTHINA.

201

Utrumque ſeparatim in aqua calida ſolven- dum eſt; deinde ſolutiones ſucceſſive confundantur, & quidem tam diu, donec non amplius efferveſcant, vel ſibi- lent. Præſtat autem, plus ſalis alcali, ut omne vitriolum ſaturetur, addere. Reponantur commixti liquores ad ſubſidentiam, a qua limpidus humor decantetur; maſſæ vero ſubſidenti ſuperfunditur denuo aqua calida, & ſpatula agitur; poſt ſubſidentiam rurfus limpidior humor decantandus, atque hoc modo omnis falſedo extrahenda eſt.

Poſtea in vaſe vitreo humor, ad tertiam partem, evaporandus, & in locum frigidum ad cryſtalliſationem reponendus. Cryſtallis ſupernatans humor, decantatus, rurfus evaporatur, & ad cryſtalliſandum reponatur; cryſtalli collectæ probe exſiccandæ ſunt.

Eſt ſal medium, ex acido vitrioli & alcali enatum, & revera digeſtivum univerſale, ad ſolvendos & emendandos ſpiſſos lentos- que humores. Conducit hypochondriacis, lienofiſis, cachecticis, ictero & hydrope laborantibus; in febris maximi eſt uſus.

Dari poteſt a ſcrupulo uno ad quatuor, imo, ſcopo laxativo & diuretico, ad drachmas duas, in aqua dilutus.

Præmiſſa tam de tartaro vitriolato e ſpiritu vitrioli, & e tartaro parato, quam de Tacheniano, intelligi volumus; qui poſterior, præter dictos effectus, etiam excellit in ulceribus repurgandis, atque in carne gingivarum luxuriante, & quæ in vuln-eribus capitis e meningibus pullulat, inſper-ſus, præſtantiffimam fert opem.

TEREBINTHINA COCTA.

Coquitur Terebinthina Veneta, in ſuffi- cienti quantitate aquæ fontanæ, ad ſpiſ- ſitudinem, quæ cum reſrigeſcit, duri- tiem acquirit.

*Inſervit pro conficiendis pilulis de Terebinthi- na. Oleo æthereo ſuo ex parte orbata, Eee 2
ſecure*

TERRA.

securæ interne datur, in Gonorrhœa, ulceribus internis; &c.

Datur drachma semis ad scrupulos duos.

TERRA FOLIATA TARTARI.

vid. ARCANUM TARTARI.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

vid. VITRIOLI TERRA.

TESTES EQUI PRÆPARATI.

E vivo equo exempti, vino albo abluendi, atque in clibano exsiccati, in pulverem terantur.

In epilepsia, calculo, colica, fœtu mortuo pellendo, partu difficili & lochiis suppressis prodesse nonnulli somniarunt.

Dosis a scrupulo uno ad duos.

THERIACA.

Videantur ELECTUARIA.

TINCTURA ALOES.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificati uncias decem,

Stent in leni digestionem, ad sufficientem extractionem; postea filtrata tinctura fervetur.

Excellens est vulnerarium & mundificans, ac a Chirurgis expetitur. Usus internus rarus.

TINCTURA AMARA LONDINENS.

REC. Radicum Gentianæ uncias duas,
Flavedinis Aurantiorum unciam unam,

Cardamomi minoris unciam dimidiam,

Spiritus Vini libram unam semis.

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur & filtrentur.

Stomachica & tonica est.

Dosis guttæ quinquaginta & ultra.

TINCTURA.

TINCTURA ANODYNA.

Videatur ESSENTIA ANODYNA.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS
HOFFMANNI.

REC. Reguli Antimonii martialis uncias quatuor,

Nitri purissimi uncias viginti, vel plures.

Pulverisata & mixta detonentur in crucibulo, & operculo testâ, fortiter per aliquot horas calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundatur, vitroque digestorio, itidem calefacto, immittatur;

Spiritusque Vini rectificatissimi libra una semis

affundatur, atque, ope caloris, tinctura rubicunda extrahatur.

Est potentissimum resolvens, & in affectibus lymphæ rebellibus, tumoribus hydropicis, suppressione urinæ & venerea lue, non sine insigni fructu, datur.

Dosis, propter acrimoniam, non temere larga nimis sit; in vehiculo etiam aquoso exhibenda; sufficiunt guttæ triginta ad quadraginta quinque.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

REC. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram semis.

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam; postea massa in mortarium calidum effunditur citissime, & ignita adhuc, in pulverem contunditur. Pulveri, in phiala,

Spiritus Vini rectificatissimi libra una

affunditur, & ad digestionem reponitur. Liquor, rubineo colore tinctus, a fæcibus separatur, atque residuo

Spiritus Vini rectificatissimi libra semis

denuo affunditur, qui tinctus, uti prior, decantetur.

E

TINCTURA.

E residuo sulphur Antimonii parari potest. *Resolvit, sanguinem purificat, attenuat, urinam movet, ictericis, hypochondriacis & lienosis dare solent.*

Dosis guttæ quadraginta ad septuaginta.

TINCTURA ANTIPHTHISICA GARMANNI.

REC. Sacchari Saturni unciam semis,
Vitrioli Martis drachmas tres,
Aceti vini boni non destillati,
Spiritus vini rectificati ana uncias duas,
Aquæ Rosarum drachmas sex.

Solvatur Saccharum Saturni aceto, in vase ferreo, leni igne, admisceatur Vitriolum Martis tritum, invicem solutis addatur spiritus vini rectificatus, Aqua Rosarum permixtus; reponantur in locum temperatum.

Aqua Rosarum additur, ut phlegma spiritui vini, alias huc non rectificato expetito, restituatur, præcipitatio evitetur, tinctura saturatior atque ideo gratior obtineatur, simulque fœtor emphreumaticus, qui spiritui vini non rectificato inhæret, evitetur.

Est mixtura saturnino-martialis, valde adstringens; hinc vix in phthisi, sudoribus scilicet & diarrhoeis colliquativis, suadenda est, quamvis recentius denuo a Vogelio hoc scopo laudata fuerit; laudatur etiam ad sistendam gonorrhæam, & pollutiones nocturnas; caute tamen ubique, vel nunquam, adhibendam esse, censemus.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA AROMATICA LONDINENS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas sex,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas duas,
Spiritus Vini libram unam.

Misceantur, atque post digestionem exprimantur & filtrentur.

Datur ad ventriculum roborandum, atque phlegmaticis convenit.

Pars II.

TINCTURA.

203

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta usque.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

REC. Florum Bellidis hortensis, colore rubro, a capitulis suis decertorum & exsiccatorem, unciam semis,

Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Aquæ florum Bellidis uncias quatuor.

Stent in digestionem per diem & noctem; postea exprimantur & filtrentur.

Pari modo parantur:

TINCTURA FLORUM AQUILEGIÆ, PAPAVERIS, ROSARUM.

Ad fervorem & æstum sanguinis temperandum commendatur.

Dosis a dimidia uncia ad integram. Julapiis & potionibus admisceri possunt.

TINCTURA BEZOARDICA LUDOVICI.

REC. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Enulæ,
Fraxinellæ ana unciam unam,
Myrrhæ electæ drachmas sex,
Crocii Orientalis drachmas duas,
Castorei drachmam unam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias quadraginta.

Stent in digestionem ad sufficientem extractionem, exprimantur, & in expresso dissolvatur

Opium thebaicum drachma una semis.

Filtretur tinctura & fervetur.

Vires sunt eadem, ac tincturæ bezoardicæ officinalis; magis tamen propter opium, cujus uncia una ultra duo grana continet; anodyna & sudorifera est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

Fff

NB.

TINCTURA.

NB. Aliam etiam descriptionem hujus tincturæ circumferunt, quæ largiorem opii dosin continet; cum vero hæc, quam dedimus, jam a longo tempore in officina nostra aulica in usu est, illam merito præferre volumus.

TINCTURA BEZOARDICA
MICHAELIS.

REC. Radicum Zedoariæ uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calami aromatici ana unciam unam,
Costi electi,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Baccarum Juniperi ana uncias duas,
Myrrhæ uncias tres,
Herbarum Scordii unciam unam semis,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ ana unciam semis,
Camphoræ unciam unam,
Theriace optimæ libram unam,
Spiritus vini rectificati libras sex.
Post octiduanam digestionem adde
Aquæ fontanæ libras duas;
abstrahatur spiritus, cujus

REC. libras duas,
Spiritus Tartari genuini libram semis,
Spiritus Vitrioli uncias tres.

Misceantur & tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

Propter exteros libuit, tam Tincturam bezoardicam Michaelis, quæ ob longum usum in officiniis plurimis prostat, & nil nisi Mixtura simplex tincta est, quam Wedelii apponere, quibus ambabus officinalem nostram virtute nullo modo cedere, sed palmam simplicitate præripere, censemus.

TINCTURA BEZOARDICA OFFI-
CINALIS ORDINARIA.

REC. Radicum Zedoariæ,
Serpentariæ Virginianæ,

TINCTURA.

Radicum Angelicæ,
Pimpinellæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Corticum citri,
Myrrhæ ana drachmas sex,
Sandali rubri unciam unam.

Incisis & contusis affunde
Spiritus florum Sambuci rectificati
libram unam.

Post sufficientem extractionem expri-
mantur; expresso adde

Spiritus Tartari uncias sex,
Vitrioli uncias duas,

Camphoræ unciam semis.

Misce, post digestionem filtrentur, & ad
usum reponantur.

*Vires sunt alexiteriæ, sudoriferæ; hinc in
erysipelate, febribus, quas vocant, ma-
lignis & continuis, bono cum effectû adhi-
betur: status etiam dissipat, & urinam
mouet.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TINCTURA BEZOARDICA
WEDELII.

REC. Radicum Zedoariæ,
Gentianæ veræ,
Angelicæ,
Anthoræ,
Contrayervæ,
Carlinæ,
Bistortæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Scorzonæ Italicæ montanæ,
Vincetoxici,
Olsnitii ana unciam unam,
Florum Galegæ,
Ulmariæ,
Calendulæ,
Scabiosæ,
Rutæ ana unciam semis,
Seminum Fraxini,
Cardui benedicti,
Aquilegiæ,

Seminum

TINCTURA.

Seminum Rutæ ana drachmas duas,
Baccarum Paridis unciam unam semis,
Cubebarum,
Granorum Chermes,
Opobalsami ana unciam semis,
Corticum citri drachmas sex,
Camphoræ,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci drachmam unam.

Concisis & contusis, grosso modo,
affundantur

Spiritus sambuci citrati rectificati libræ
tres;

Cum per aliquot dies steterint, in leni digestio-
ne, addantur

Spiritus salis volatilis uncizæ duæ,
Sandali rubri uncia una semis.

Tinctura saturata exprimatur, & filtrata serve-
tur.

Vires, quæ ordinariæ officinalis.

Dosis eadem.

TINCTURA CANTHARIDUM.

REC. Tincturæ Cantharidum drachmas
duas,

Spiritus Vini libram dimidiam.

Digere per dies quatuor & per chartam
bibulam cola.

Compositiones variæ tincturæ hujus in va-
riis dispensatoriis habentur, tum quoad
proportionem spiritus vini ad Canthari-
des, tum quoad alia ingredientia, v.
g. Coccinellam, resinam Guajaci, Bal-
samum de Copaiva, Camphoram, oleum
Juniperi, spiritum Nitri, spiritum salis,
quippe quæ subinde recipiebantur; ele-
ginus nos hanc simplicissimam formu-
lam, quæ ad usus externos in membris
v. g. paralyti & rheumatismo affectis
accommodata & minus pretiosa est.
Qui interno usui, qui & olim & recentius
in variis morbis v. g. diabete, urinæ
retentione, affectibus asthmaticis, hy-
drope à nonnullis proponebatur, destina-
re volunt, eam facile aqua diluere, cum
aliis medicamentis miscere & sic pro di-
verso scopo alteratam exhibere possunt,

TINCTURA.

205

si modo memores sint, quod a paucis gut-
tis, sex octove initium faciendum sit, &
quod facile partium genitalium inflam-
mationes excitet, huic in gonorrhœa,
in quâ subinde extollitur, pro infido sæ-
pe periculosissimo, medicamento omni-
no habemus.

TINCTURA CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum, pulverifatorum,
uncias duas,

affunde

Aceti destillati libram unam.

Stent in digestionem, per triduum, ebulliant ali-
quoties, ad coralliorum sufficientem solutio-
nem; refrigerata solutio per chartam bibulam
filtretur, atque in vase sigulino, vel vitreo,
ad siccitatem evaporetur.

REC. Solutionis hujus siccæ unciam unam,
solve in

Aquæ cinnamomi cydoniatæ unciis tri-
bus,

solutioni adde

Spiritus vini rectificati unciam unam se-
mis,

Tincturæ sacchari unciam semis.

Digerantur per aliquot dies; postea, per char-
tam bibulam filtrata tinctura servetur.

*Leniter adstringit, roborat, sudorem & urinam
mouet.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

TINCTURA CROCI.

REC. Croci Austriaci drachmas decem.

In Spiritus vini rectificati libra semis
macerentur, & post digestionem ex-
primantur, atque Tinctura, per char-
tam bibulam filtrata, servetur.

*Anodyna, cordialis & antispasmodicæ est vir-
tutis; menstrua movet, atque ad icterum
laudatur.*

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

Fff 2

TIN-

TINCTURA CROCI VINOSA.

REC. Croci Auftriaci unciam unam,
Micæ panis fimilaginei uncias duas.
Contundantur simul in mortario lapideo,
sensim affundendo vini boni Canariensis
quantitatem sufficientem, ut fiat puls
mollis, omniaque stamina croci sint com-
minuta. Pulti huic porro affunde vi-
ni ejusdem uncias sex, & in vitro pro-
be clauso aliquandiu relinque ac digere.
Tinctura sanguinis instar rubicunda a feci-
bus separetur, & loco frigido fervetur.

*Roborare, excretiones sine violentia stimulare,
animam exhilarare, lithiasin cohibere, &
ad vitam longam ac sanam procurandam,
utilissime adhiberi, B. Schulzius censet.*

*Dosis guttæ decem, viginti, triginta, usque
quingenta.*

NB. Essentiæ & Tincturæ, menstruo vi-
noso paratæ, vel acescunt, vel mox fi-
tu corrumpuntur. Igitur vel parva in
quantitate parandæ, vel parum spiri-
tus vini rectificati addi debet.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

REC. Terræ Japonicæ,
Myrrhæ electæ ana unciam unam.
In pulverem trita irrorentur
Balsami Peruviani drachma una.
Superfundantur
Spiritus Cochleariæ,
Vini rectificati ana uncia
tres.

Digerantur, & per chartam filtrata tinctu-
ra fervetur.

*Commendatur ad stomacacem, seu scorbutum
oris, laxitatem & purulentam affectionem
gingivarum, atque, cum melle rosato mix-
ta, applicari solet.*

TINCTURA EUPHORBII.

REC. Gummi Euphorbii, unciam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias se-
decim.

Digere per triduum & tincturam filtra.
optime cariei ossium limites ponit, si a
prudenti chirurgo applicatur.

TINCTURA HELLEBORI COMPOSITA.

REC. Fibrarum Hellebori nigri unciam unam
semis,
Squinanthi unciam unam,
Galangæ minoris unciam semis,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Croci drachmam unam semis,
Vini Canariensis,
Spiritus vini ana libram unam.

Stent in digestionem, post sufficientem extrac-
tionem, exprimantur atque filtrentur.

*Commendatur in affectibus hypochondriacis, obstru-
ctione mensium. Datur maniacis & melancholicis.*

Dosis drachma una vel una semis.

TINCTURA LACCÆ.

REC. Gummi Laccæ, quod baculis adhæ-
ret, & cui tinctura nondum ex-
tracta, unciam unam,
Aluminis crudi drachmam unam
semis,
Aquæ Salviæ,
Rosarum,
Cochleariæ ana unciam
unam semis.

Lento igne, in vase fictili, ebulliant, &
colata usui asserventur.

*Ad laxitatem & cruentationem, a scorbutica
ulceratione gingivarum adhibetur; locum
etiã invenit in tonsillarum & uvulæ re-
laxatione, quæ sub salivatione, a mercurio
excitata, exoriri solet.*

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ Martis purissimæ uncias
quatuor,
Aceti vini albi uncias novem.

Stent in digestionem, ad sufficientem ex-
tractionem; postea in vase ferreo ace-
tum, ad quartæ partis remanentiam,
sub continua agitatione, spatula fer-
rea, evaporetur, & residuo magmati,
in vitro,

Spiritus

TINCTURA.

Spiritus cydoniorum unciae quatuor affundantur, & per digestionem probe unitis, clarum a spisso, per chartam bibulam colando, separetur.

Omnes quidem tincturae martiales sunt adstringentes, pro ratione vero mensurari, quo extractae sunt, plus aut minus. Haec tinctura, aceto parata, magis adstringit, reliquis, & in fluxionibus quibuscunque inhibendis, & ubi adstrictione opus est, adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, five AROPH PARACELSI.

REC. Florum Salis Ammoniaci Martialis unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias quatuor.

Misce exacte, & lentissimo igne tincturam, aurei coloris, extrahe, quae filtrata reponatur.

Haec tinctura praeter aliis se commendat, quod, sine alteratione pelluciditatis cum aliis essentiis ac tincturis spirituosus commisceri possit. Suavitate odoris, & virtute leniter adstringente ac anodyna alias praecellit, in atonia viscerum, & ex illa natis morbis, cachexia, hypochondriaco malo, ictero, & post febres intermittentes, ea, bono cum successu, uti licet.

Dosis guttae triginta quinque ad quadraginta.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, TARTARISATA LUDOVICI.

REC. Vitrioli Martis unciam unam,
Cremoris Tartari uncias quatuor.

Coque, in vase ferreo, cum

Aquae fontanae libris sex,

sub continua agitatione, fere ad ficcitatem, exponatur per aliquot dies aëri, ut humiditatem attrahat. Massae griseae vel quasi ochreae

adde

Aquae Cinnamomi, sine vino, uncias quatuor, &

Pars II.

TINCTURA.

207

Spiritus Vini rectificati uncias octo.

In phiala alta ebulliant simul, spatio horae unius; post refrigerationem liquorem tinctum decanta, & percolatum serva.

Residuum cum novo spiritu, aqua Cinnamomi diluto, tractari potest.

Tonica est, roborat, & appetitum excitandi gratia, post diuturnos morbos, in refracta dosi exhibetur.

Dosis guttae quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA MARTIS COERULEA ETTNERI.

REC. Limaturae Martis purissimae,

Salis Ammoniaci ana quantum vis.

Probe mixta destillentur, & si flores ascendere incipiunt, desistatur a destillatione.

Massa vero relicta stet adhuc, per tempus, supra fornacem hypocausti calidi, ut hoc fotu magis magisque aperiatur limatura Martis. Tunc adde

Salis Tartari,

vel

Cinerum clavellatorum ana,

&

Aquae fontanae tantundem,

inde destilletur spiritus.

E residuo vero sal elixivietur, & ad ficcitatem iterum evaporetur, cui sali affundatur spiritus proleptus, qui, colore caeruleo inde tinctus, servetur.

Magis curiosa, quam utilis est haec tinctura, & colorem a particulis venereis, marti adherentibus, habet.

Commendatur ab auctore hypochondriacis & melancholicis; quae virtus potius spiritui salis ammoniaci adscribenda videtur.

Dosis guttae viginti ad triginta.

TINCTURA MARTIS CYDONIATA.

REC. Limaturae Martis purissimae libram unam,

affunde

Succi cydoniorum, recens expressi, libras tres.

Stent per aliquot dies in digestionem, postea lento igne, in cacabo ferreo, ad
Ggg dimi-

dimidiæ partis consumptionem coquitur; ab igne remotis
adde

Aquæ cinnamomi spirituosæ uncias tres.

Probe mixta filtrentur & ferventur.

NB. Aquam cinnamomi addimus, ut gratior stomacho existat, & ne situ corrumpatur tinctura.

Vires habet, cum aliis martialibus, adstringentes, tonum viscerum roborat, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis mensium utiliter dari potest.

Dosis est scrupulus unus ad scrupulum unum semis, in conveniente vehiculo.

TINCTURA MARTIS ELLEBORATA.

REC. Tincturæ Martis Ludovici uncias quatuor,

Extracti Ellebori nigri drachmas duas.

Mixta digerantur & filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis & melancholicis, & febre quartana inveterata, expugnandis.

Dosis guttæ quadraginta & sexaginta; majori alvum laxat.

TINCTURA MARTIS POMATA.

Eodem modo paratur, quo Tinctura Martis cydoniata, atque easdem cum illa virtutes habet, eademque dosi exhibetur.

TINCTURA MARTIS, CUM VINO MALVATICO ET POMIS AURANTIIS.

REC. Limaturæ Martis purissimæ uncias quatuor,

Pomorum Aurantium amarorum, succulentorum, numero quatuor.

Excorticentur poma Aurantia, & a fungosa albedine & feminibus liberentur; postea cortices & succulenta caro, in mortario lapideo, cum limatura Martis impastentur; pasta reponatur in vitro

amplioris colli ad digerendum per biduum; donec affundantur

Vini Malvatici unciae decem,
Spiritus corticum Aurantium unciae duæ.

Digesta & expressa filtrentur.

Cum reliquis tincturis martialibus, virtute leniter adstringentia, tonica convenit; præter hanc etiam gaudet viribus balsamicis, stomachicis & carminativis, atque hypochondriacis, flatibus & ructibus vexatis, & post febres diuturnas, exhibetur.

Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

TINCTURA MARTIS, E VITRIOLO, ZWÖELFFERI.

REC. Vitrioli Martis,

Arcani, sive Terræ foliatæ Tartari ana unciam unam.

Vitriolum Martis pulverisatum immittatur patinæ terreæ, calefiat lenissimo igne, spatula agitando, immisceatur Terra foliata Tartari, & ab igne remota reponere in locum temperatum, usque dum florescere cœperint; deinde dissolve in

Aquæ Cinnamomi, sine vino, uncias tribus,

Spiritus Vini rectificati uncias quinque.

Serva ad usum in loco frigido.

Cum reliquis martialibus tincturis, usu & viribus convenit, & ob virtutem blandam solventem conjunctam, prærogativam meretur.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

TINCTURA METALLORUM.

REC. Reguli Antimonii martialis uncias duas, Cupri,

Stanni Anglici ana unciam unam;

fundantur violento igne, fusa effundantur

Reguli hujus, in pulverem redacti, recipe uncias duas,

Nitri optimi crystallisati, ficcissimi, pulverisati, uncias duodecim.

Commisceantur exacte, & paulatim in crucibulum probe candens injiciantur; detonatione peracta, tegatur crucibulum tegula, ignisque adhi-

TINCTURA.

adhibeatur vehemens, in quo detineatur, donec massa in scorias cœruleas, viridescentes redacta sit. Tum in mortarium effundatur calefactum, pulverifetur statim, & vitro immixtæ superaffundatur

Spiritus vini rectificatissimi libra una semis.

Digerantur, donec tinctura sit extracta pulcherrime rubens.

Cum Tinctura Antimonii acri convenit, & ad viscidos & lentos humores resolvendos utilis; adeoque in humorum impuritatibus, obstructionibus, & infarctibus viscerum & glandularum adhibetur.

Dosis, propter acrimoniam, parca sit, & in vehiculo adhibeatur aquoso; sufficiunt guttæ trigintæ ad quadraginta.

TINCTURA ODONTALGICA MAURIT. HOFEMANNI.

REC. Rasuræ ligni sancti uncias duas,
Corticum ligni Sassafras unciam semis,
Seminis Hyoscyami,
Radici Pyrethri ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Piperis longi ana drachmam unam,
Camphoræ,
Opii ana drachmam semis,
Sandali rubri drachmas duas,
Spiritus vini rectificati uncias quindecim.

Digerantur, & post sufficientem extractionem filtrentur.

Efficax remedium contra dolores dentium, vel gossypio denti dolenti superimpositum, vel parum calefactum in ore detentum laudatur.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

REC. Spiritus Anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis Alkermes unciam semis,
Florum Tunicæ rubrorum drachmam unam.

Stent in digestionem, donec perfecte tingantur, postea spiritum tinctum & filtratum ad usum ferva.

Auctor eam laudat, pro more suo, in melancholia, hemicrania, vertigine, paralyti, catarrho, asthma, tussi, cardialgia & cæteris morbis.

TINCTURA.

209

Nobis est stomachicum, carminativum & pectorale remedium non contemnendum.

Dosis drachmā una ad unam semis.

TINCTURA RHABARBARI, five

ANIMA RHABARBARI.

REC. Pulveris Rhabarbari optimi unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Aquæ Cichorii,
Cinnamomi buglossatæ ana uncias sex.

Infusa stent loco calido, per horas viginti quatuor; postea per bibulam colentur.

NB. Situi valde obnoxia est hæc tinctura; parari igitur debet ex tempore, igne leni: si vero Rhabarbarum aqua fervida infunditur, sex vel octo dies conservari potest.

Hypochondriacis & ictericis conducit, resolvit, & majori dosi exhibita, alvum laxat, quo scopo ad unciam integram, imo duas, dari potest; scopo alterante sufficiunt drachmæ duæ.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

REC. Rhabarbari unciam unam,
Gentianæ drachmam unam semis,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vini,
Vini generosi ana libram semis.

Misceantur, & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus biliosis, febribus, & ipsa dysenteria.

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA STOMACHICA AROMATICA.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucum moschatarum,
Croci Orientalis ana unciam semis,
Calami aromatici drachmas sex,

Ggg 2

Macis

TINCTURA.

Macis drachmas duas,
Corticum Citri recentium ex duobus
pomis,
Aurantiorum recent. unius
pomi.

Incisa & contusa infundantur
Spiritus vini rectificati libra una se-
mis.

Post digestionem exprimantur, & per char-
tam filtrentur.

*Ori & stomacho grata est, atque vel sola,
vel cum aliis Essentiis amaris mixta, ad
guttas quinquaginta vel octoginta exhiberi
potest.*

TINCTURA STOMACHICA MAR-
TIALIS EDINBURGENS.

REC. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Corticum Aurantiorum,
Peruvianor. ana unciam
femis,
Herbarum Absinthii,
Centaurei minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ
ana drachmas duas,
Limaturæ ferri unciam unam semis,
Vini albi generosi uncias sedecim,
Spiritus vini rectificati uncias duas.
Digerantur per plures dies, & post extra-
ctionem sufficientem exprimantur, at-
que filtrentur.

*Ad tonum ventriculi & viscerum restauran-
dum post febres diuturnas, imo in feбри-
bus intermittentibus, cachexia, ictero, men-
sium vitiiis, commendabilis est.*

TINCTURA STOMACHICA LIPSIENSIS.

REC. Spiritus Salis armoniaci vinosi uncias duas,
Vini rectificatissimi unciam
unam,

Olei destillati veri Absinthii drachmas
tres,

Caryophyllorum
aromaticorum
drachmam semis.

TINCTURA.

Misceantur & digerantur, addatur
Tincturæ Sandali rubri uncia una.

*In affectibus ventriculi sic distis frigidis, tonum re-
staurat, digestionem promouet, flatus discutit, &
anthelmintica censetur.*

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini unciam unam se-
mis.

Fluat lento igne, in patina terrea,
admisce successively

Salis Tartari,

vel

Cinerum clavellatorum siccorum
uncias tres;

Auge ignem, ut materia fluat, cui, in
mortarium calidum effusæ atque pul-
verisatæ, in vitro,

Spiritus Vini rectificatissimi uncias
decem

affunde, & extrahe tincturam.

*Ad pectoris affectus, scabiem, ulcera scorbu-
tica, commendatur.*

*Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta, in
vehiculo idoneo.*

TINCTURA TARTARI ACRIS.

REC. Salis Tartari uncias sex,
Pulveris carbonum unciam unam
femis.

Misceantur, & calcinentur fortissimo ig-
ne, per horam integram. Massæ fa-
linæ superaffunde

Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur leni calore, & tinctura, per
inclinationem vasis a fecibus separata,
servetur.

*Magis ignea est tinctura ordinaria tartari,
atque cum Tinctura Antimonii acri conve-
nit, & eadem dosi exhibetur.*

TINCTURA TARTARI.

REC. Salis Tartari depurati libram se-
mis.

Fundatur

TRAGEA.

Fundatur in valido crucibulo, igne intenso, atque in fluore tam diu conservetur, donec in colorem e rubro cœruleum transferit; effusum in mortarium calefactum cito pulverifetur, & calens, ne aërem attrahat, in phialam siccam, itidem prius calefactam, immittatur, superfundatur

Spiritus vini rectificatissimi libra una; digerantur, per aliquot dies, in arena, interdum agitando, donec spiritus vini rubicundo colore tingatur, qui decantatus, pro tinctura Tartari, fervetur.

Est tinctura alcalina, ideo, quæ de tinctura antimonii & metallorum diximus, huc referenda. Resolvens est & egregium diureticum, illis etiam utiliter adhibetur, in quibus acidum in primis viis peccat. Dosis guttæ triginta ad septuaginta.

TRAGEA AROMATICA GABEL-KOVERI.

REC. Cinnamomi drachmam unam,
Zinziberis drachmam semis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Galangæ minoris,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucis Moschatæ ana grana quindecim,
Sandali albi,
 rubri ana drachmam semis,
Sacchari albi uncias octo.
Misce, fiat pulvis.

Concoctionem adjuvat, & tam ob gratum saporem, quam ob virtutem roborantem, stomachicam & carminativam ab iis, quibus aromata placent, eligitur.

Sumitur cum pane tosto & vino, vel per se, ad drachmas sex.

TRAGEA AROMATICA OFFICINALIS.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum;
Pars II.

TRAGEA.

211

Nucis moschatæ ana drachmas tres,

Macis drachmas duas,

Zinziberis drachmas tres,

Sandali rubri unciam semis,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Misce, fiat pulvis.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis.

TRAGEA GRANORUM ACTES.

REC. Succı baccarum Sambuci, quantum placet,

Farinæ secalinæ, quantum sufficit.

Misceantur, fiat pasta, ex qua formentur panes parvi, in clibano ad duritiem coquendi. Cocti denuo in pulverem terantur, & succo sambuci imprægnati, rursus exsiccantur, laborque tertia vice repetatur.

Tandem

Massæ hujus, in pulverem tritæ, singulis unciis

addatur

Nucis moschatæ drachma una.

Egregium celebratur antidiysentericum, & a drachma una ad drachmas duas exhibetur. Raro nunc expetitur.

TRAGEA OPHTHALMICA.

REC. Euphrasie drachmas decem,
Millepedum præparatorum unciam semis,
Macis,
Cubebæ ana drachmam unam,
Fœniculi drachmas tres,
Cinnamomi acuti drachmam unam semis,
Sacchari albi uncias tres.
Trita servantur.

Præter usum ad visus debilitatem, etiam confert ad capitis dolores, urinam movet, & chylicationem adjuvat, emendat.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis, bis de die sumenda.

TROCHISCI ALHANDAL.

Fructus Colocynthis, a corticibus exterioribus & feminibus mundatus, cum mucilaginis Tragacanthæ & Gummi arabici

bici sufficiente quantitate, in mortario contunditur; postea massa, leni calore exsiccata, in pulverem teritur, & vel in forma pulveris servatur, vel in trochiscos, ope mucilaginis tragacanthæ, formatur, sic enim melius vires integræ conservari creduntur, quam, si aër omnes pulveris atomos subire & vires auferre, vel alterare potest.

Sunt vehementer purgantes, & pilulis, pro stimulo, adduntur.

Dosis grana duo ad quinque.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

REC. Styrcis calamitæ uncias quatuor,
Ladani,
Benzoës ana unciam unam,
Ligni Aloës, subtilissime pulverisati, drachmas sex,
Sacchari albissimi unciam unam semis,
Moschi Orientalis scrupulum unum,
Ambræ griseæ drachmam unam.

Omnibus subtilissime pulverisatis, fiat, sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthæ, aqua rosarum paratæ, massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochiscorum horum usus plerumque est ad suffitus, vel suffimigia pretiosa, cucuphas, aliasque res odore imbuendas.

Interne commendatur pueris, asthmate & constrictione pectoris laborantibus, & lac revomentibus, quibus pauca grana, unum, duo vel tria sufficiunt.

TROCHISCI ALKEKENGII.

REC. Baccharum Alkekengi,
Seminum Papaveris albi ana unciam unam,
Apii,
Hyoscyami ana drachmas duas,
Gummi Arabici,
Amvli,
Tragacanthæ,
Radici Althææ,
Succi Liquiritiæ inspissati ana unciam unam semis,

Boli Armenæ,

Thuris,

Sanguinis draconis ana drachmas undecim,

Succini præparati,

Terræ figillatæ ana drachmas duas.

Pulverisatæ aqua rosarum, vel alkekengi humectentur, & in massam cogantur, ex qua formentur trochisci.

Si præcedentibus opii drachmæ duæ adduntur, fiunt:

TROCHISCI ALKEKENGII, CUM OPIO.

Commendantur ad renum & vesicæ ulcera, ac natam inde dysuriam; acrimoniam urinx temperant, & ardorem mitigant.

Quælibet drachma habet opii granum unum.

Dosis est a scrupulis duobus ad drachmam unam; sed, cum continuari debeant, præstat sine opio sumere.

Sumuntur autem in Syrupo dialthææ, aqua alkekengi, vel alia diluto, quibus, pro libitu, oleum amygdalarum dulcium addi potest.

TROCHISCI ALKERMES COMPLETI.

REC. Confectionis Alkermes completæ unciam unam semis,
Laccæ Florentinæ drachmas tres,
Ambræ,
Moschi ana scrupulum semis,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, aqua rosarum factæ, quantum satis.
Fiant trochisci minores.

Ad bonum halitum conciliandum, & caput confortandum, sumuntur.

TROCHISCI DE AMBRA.

REC. Ambræ griseæ scrupulum semis,
Olei Cinnamomi destillati guttas sex,
Moschi grana quatuor,
Sacchari albissimi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, quantum satis.

Fiant trochisci minores.

Sunt cephalici, & bonum halitum conciliant.

TROCHISCI.

TROCHISCI ANTHELMINTICI,

five

HERMETICI SCRETÆ.

REC. Mercurii dulcis unciam semis,
Cornu cervi, philosophice præpa-
rati, scrupulos duos,
Cinnamomi acuti scrupulum unum,
Diacrydii sulphurati drachmam
unam,
Sacchari albi unciam unam,
Conservæ Rosarum rubrarum drach-
mas duas.

Cum mucilagine Tragacanthæ, in aqua
rosarum solutæ, fiant trochisci, nume-
ro sexaginta quatuor.

*Adversus vermes, & inde ortos morbos, uti-
liter adhibentur.*

*Pendet trochiscus grana quindecim, & conti-
net mercurii dulcis grana quatuor, diacry-
dii granum unum.*

Dosis, pro ratione ætatis, unus vel duo.

TROCHISCI ANTHELMINTICI MARTIALES.

REC. Seminis fantonici fesqui unciam,
Vitrioli Martis factitii unciam dimi-
diam,
Sacchari albi pulverisati uncias octo.
Misce, fiat pulvis.

REC. Hujus pulveris unciam unam &
drachmas duas,
& fiat cum
Mucilaginis Gummi Tragacanthæ
quantitate sufficiente
Massa, ex qua triginta Trochisci for-
mentur.

Varie in variis pharmacopoliis compositio-
nes trochiscorum anthelminticorum ha-
bentur & subinde pro arcano venditan-
tur.

Cum non Consilii sit quibusvis infantibus,
quippe quibus plerumque destinantur,
mercurialia propinare, præter priorem
formulam & hanc adponere placuit.
Continet quilibet horum trochiscorum

TROCHISCI.

213

martialium falis five vitrioli Martis gra-
num unum, unde dosis determinatur,
quæ v. g. in infante bienni ad grana
duo adscendere potest, ejusque effectus
contra lumbricos & teretes & latos per
subjungenda laxantia adjuvatur.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

REC. Sacchari albissimi libram unam,
uncias octo,
Radicum Ireos Florentinæ unciam
unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ,
aqua rosarum factæ, quantum
fatis.

Fiat massa, ex qua formentur trochisci
parvi.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

REC. Sacchari albi libram unam,
Radice Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana unciam
unam,
Croci scrupulos duos,
Mucilaginis Tragacanthæ, quan-
tum sufficit.
Fiant massa & trochisci.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

REC. Pulveris Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana un-
ciam unam,
Succi Liquiritiæ, in Aqua Hyssopi
soluti, uncias quatuor,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ,
Aqua Rosarum solutæ, quantum
sufficit.
Misce, fiant ex arte trochisci.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

REC. Specierum Diatragacanthæ,
Boli Armenæ ana unciam unam,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, cum mucilagine Tragacanthæ, massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochisci bechici tam albi, quam nigri & reliqui, ad tussim acrem, raucedinem & defluxiones acres, catarrhales inserviunt, & tam resolvendo, quam demulcendo opem ferunt.

TROCHISCI DE CARABE.

REC. Carabe, id est, Succini drachmas sex,
Cornu cervi usti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Mastiches,
Gummi Laccæ,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Balauftiorum,
Seminis Papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris,
Crocii,
Opii ana drachmam unam, grana quindecim,
Mucilaginis Pfyllii quantum satis.
Formentur trochisci.

Sunt adstringentes & opiiati. Commendantur ab auctore Mesua ad hæmorrhagias, & in specie ad sputum cruentum & uteri fluxum; diarrhæas & hæmorrhoides nimium fluentes sistunt.

Drachma continet grana tria opii; hinc in dosi, nisi urgente necessitate, non ultra scrupulum excedendum.

TROCHISCI CATECHU,

sive

MUSCERDÆ.

REC. Terræ Catechu unciam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Ambrae gryseæ,
Moschi Orientalis ana scrupulum semis,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum satis.
Fiant trochisci, instar muscerdarum.

Ad laxitatem gingivarum corrigendam, & bonum halitum conciliandum, in ore detinentur.

TROCHISCI DE TERRA CATECHU, AD SPUTUM-CRUEMENTUM.

REC. Terræ Catechu pulverifatæ unciam unam,
Succi Liquiritiæ uncias tres,
Specierum diatragacanthæ unciam semis.

Misce, fiant trochisci minores; qui, in ore liquefacti, acrimoniam salsam mitigant, & hæmoptoicis commendantur.

TROCHISCI DE CREMORE TARTARI.

REC. Cremoris Tartari unciam unam semis,
Sacchari albissimi uncias sex,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum satis.

Fiat massa, ex qua formentur trochisci.

Ad æstum febrilem temperandum, & sitim mitigandam commendantur.

TROCHISCI ESCHAROTICI.

REC. Mercurii sublimati corrosivi unciam semis,
Amyli albi,
Panis triticei ana unciam unam,
Minii rubri unciam semis,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum sufficit.

Fiant trochisci.

Inserviunt Chirurgis, ad mundificanda ulcera, & carnem luxuriantem extirpandam.

TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ.

REC. Ambrae gryseæ drachmas tres,
Ligni Aloës drachmas quinque,
Moschi drachmam unam,
Sacchari albi unciam unam,
Mucilaginis gummi tragacanthæ, quantum sufficit.

Misce, fiant trochisci.

Adduntur speciebus & pulveribus, atque aliis medicamentis, ut odorem gratum ipsis tribuant.

TROCHISCI.

TROCHISCI DE MYRRHA.

REC. Myrrhæ electæ drachmas tres,
 Afæ foetidæ,
 Sagapeni,
 Opoponacis,
 Rubiæ tinctorum,
 Foliorum Rutæ,
 Menthastrî,
 Seminis Cymini,
 Lupinorum ana drachmas duas.

Myrrha, Afa foetida, Sagapenum & Opoponax
 vino humectantur, quibus reliqua pulverifa-
 ta adjiciuntur, ut fiat massa, ex qua formen-
 tur trochisci.

*Menstrua suppressa, fætum mortuum, & secundi-
 nas retentas promovere credebantur.*

Dantur a drachma semis ad integram.

TROCHISCI TEMPERANTES.

REC. Salis Acetofellæ unciam unam,
 Sacchari albi uncias octo,
 Olei Citri guttas decem.
 Misce, fiat pulvis & cum Mucilagine gum-
 mi Tragacanthæ fiat massa, ex qua
 trochisci formentur.
 Conveniunt cum trochiscis de Cremore
 Tartari & gratiores sunt.

TROCHISCI DE SCILLA.

REC. Scillam albam ponderosam,
 Cortice exteriori detracto, & parte in-
 feriori duriore, cui fibrosæ radices ad-
 hærent, adjecta, massæ panis, e farina
 & aqua, involve, atque in clibano, do-
 nec massa panis in crustam abierit, co-
 que, quam separabis, atque medullo-
 sam vel carnosam scillæ partem, in mor-
 tario marmoreo, pistillo ligneo, quam
 optime in pulvem contunde; ad
 Scillæ libram unam, vel uncias
 duodecim,

adde

Farinæ Orobi, vel lupinorum un-
 cias octo,

atque contundendo in massam redige,
 ex qua formentur trochisci, pondere

Pars II.

TROCHISCI.

215

drachmarum duarum, qui leni calore
 ficcandi.

*Sunt ingrediens Theriacæ; vim habent resol-
 vendi, alexipharmacam, diureticam, &
 in majori dosi exhibiti, emeticam.*

Dosis grana quinque ad octo.

TROCHISCI DE VIPERA.

REC. Viperas, detractis exuviis, capitibus &
 caudis, truncatas, atque exente-
 ratas, quantum voles.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ fonta-
 næ, fale & anetho conditæ, donec caro a
 spinis secedat.

Recipiantur Carnis hujus, aliquantum a nimia
 humiditate ficcata, uncia octo,

Panis triticei albilissimi, bis cocti & in
 pollinem redacti, uncia duæ,
 contundantur in mortario marmoreo, in massam,
 ex qua trochisci formentur tenues, in umbra
 ficcandi, & ne situm contrahant, sæpius ver-
 tendi, postea in vitro, in loco temperato
 sicco servandi.

*Quamvis trochisci de viperis plerumque ex Italia pe-
 tantur, tamen descriptionem præparationis appo-
 nere libuit; nam dubium non est, quin viperæ no-
 stræ indigence eandem fere cum Italicis capite, ve-
 nenum continente, truncatis virtutem habeant, &
 cum ad Theriacæ confectiorem expetantur, præ-
 staret, istos recentes confectos adhibere, quam in-
 veteratos ex Italia conquirere. Raro præscribun-
 tur, sed potius pulvere viperarum ex Italia alla-
 to, vel nostrarum viperarum utimur. Revera
 & pulvis viperarum & hi trochisci inefficax,
 sæpius corruptioni obnoxium, medicamentum con-
 stituunt. Viperas contra integras vivas decoctas
 aliquid boni in variis cutis morbis pertinacioribus
 præstare, & antiquiorum & recentiorum medi-
 corum experientia docuit.*

TURPETHUM MINERALE.

REC. Argenti vivi puri,
 Olei Vitrioli rectificati ana uncias
 quatuor.

Abstrahatur a Mercurio ex retorta Oleum
 Vitrioli, quod sub forma spiritus sul-
 phuris,

phuris transtillat. Continuetur ignis, donec ad siccitatem perveniat, & non amplius fumet materies, sed in massam albam salinam abeat. Huic affundatur aqua fervida, & secedet ad fundum pulvis citrinus, qui satis edulcoratus, & exsiccatus *Turpethi Mineralis* nomine servetur.

Apud veteranos nonnullos Chirurgos in usu est, ad salivationem excitandam; exhibent grana tria ad quinque, pro dosi. Non raro sursum ac deorsum purgat; præstat igitur, ab ejus usu abstinere, cum alia minus violenta & securiora mercurialia prostant. Noviter tanquam specificum contra Hydrophobiam, vel rabiem caninam, ab Anglis commendatur.

Dosis grana tria. Vidcant. Collect. Lipsiens. Tom. IV.

Not. In aqua, cum qua edulcoratio instituta fuit, quædam portio Mercurii, ope acidi, solvitur: qua evaporata, sal obtinetur, qui in cella repositus deliquium patitur, & tum *Oleum Mercuriale* appellatur.

TUTIA PRÆPARATA.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo candefiat, singulis vicibus in aqua extingatur, tum demum trita in marmore lævigetur.

Usus est in collyriis, unguentis & emplastris exsiccantibus.

VENTRICULORUM GALLINARUM PRÆPARATIO.

Mundatæ pelliculæ vino laventur, & leni calore exsiccatae servantur.

Commendabantur olim ob vim leniter adstringentem, ad ventriculum roborandum, alvi fluxum, & vomitus compefcendos.

Dantur in trageis a drachma dimidia ad integram.

VINUM ANTIMONII HUXHAMI.

REC. Vitri Antimonii in pulverem tenuem redacti unciam unam,

Vini Hispanici libras duas. Digerantur per dies duodecim interdum agitando, post subsidentiam pulveris vinum effundatur, coletur per chartam bibulam & in lagena vitrea bene obturata servetur.

Pertinet ad fortiora emetica, sed, præter effectum emeticum, in minore dosi egregiam alterantem & resolventem virtutem habet, ut in variis sanguinis impuritatibus, morbis exanthematicis chronicis, in viscerum obstructionibus, in scabie, tinea, rachitide, atrophia laudem meruerit.

Dosis scopo emetico in adultis a guttis quadraginta ad octoginta, quin, cum vitrum & menstruum non eadem semper qualitate gaudeant, ad unciam dimidiam & ultra ascendit.

VINUM CYDONIORUM. GRANATORUM. RUBI IDÆI.

Adæquata proportio est, ut in libra una succi dissolvantur unciae tres sacchari. Colentur, servantur, superfufo oleo olivarum.

Julapiis & mixturis adduntur.

VITRIOLI GILLA THEOPHRASTI. Videatur GILLA.

VITRIOLI ROS, sive PHLEGMA.

Est phlegma acidulum, primo in destillatione vitrioli destillans.

Adscribitur illi vis roborans ventriculum, & expellendi lumbricos.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Est edulcoratum caput mortuum, ab oleo vitrioli destillatione, in retorta relictum vel Colcothar edulcoratum.

Vires sunt exsiccantes, usus in emplastris.

VITR

VITRIOLUM.

VITRIOLUM MARTIS FACTITIUM feu SAL MARTIS.

REC. Limaturæ Martis purissimæ non rubiginosæ libram unam.

Superfundatur

Spiritus vitrioli, tripla aquæ fontanæ quantitate diluti, libra una; digerantur in loco calido, usque dum effervesce desinant, liquor filtratus ultra dimidium, vel eo usque, dum in summitate pelliculam contrahat, lento igne exhalet, sic in frigido concrecent crytalli viridiusculæ, quæ exsiccentur, remanens vero liquor ulterius, pro vitriolo exincolligendo, debite exhalet.

Ad nonnullas præparationes pharmaceuticas requiritur; datur vero etiam in substantia, aliis pulveribus mixtum, uti in pulvere absorbente Wedelii. Adstringit, roborat, lumbricis, præsertim latis, adversatur; utiliter datur cachecticis, & mensum vitiis laborantibus; specificè laudatur ad vias lymphaticas iterum consolidandas, in hæmorrhagiis nimis, in hydropicis, post aquarum evacuationem, ubi, pro singulis diebus, granum unum vitrioli martis, in pauxillo saccharo, ex vino vel aqua, hora una ante prandium, præbere jubent, & per triginta vel quadraginta dies continuare suadent.

Dosis sit parcior, sufficiunt grana duo, vel tria.

Not. Ut detegatur an ferrum a cupreis & Aurichalci partibus probe depuratum sit, solve hujus vitrioli drachmam unam in aquæ uncia una; si huic solutioni cultrum politura splendentem immittis, neque hic inde colorem rubicundum induit, ferrum ex quo vitriolum paratum fuit, purum fuisse testatur; sin culter rubicundam superficiem acquirit, tunc limaturam adhibitam cupri vel aurichalci partibus inquinatam fuisse indicat.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

REC. Ceræ flavæ drachmam unam, cui in cochleari ferreo fufæ

VITRUM.

217

Vitri Antimonii in pulverem tenuissimum redacti uncia una additur, totum leni igne liquatur, & spatula continuo actum, per semi horam, in pulverem, tabaco hispanico æmulum, redigitur.

In dysenteriis omnibus specificus, & omni ætati utilis venditur a medicis Edimburg. In aliis quoque evacuationibus nimis & hæmorrhagiis varii varie laudant. Ad fortiora & drastica vomitoria pertinet, cautum medicum & sollicitum pharmacopæum præparantem requirit.

Dosis a granis duobus ad decem, duodecim.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

REC. Antimonii crudi pulverisati, quantum lubet.

Calcinetur in patina terrea non vitreata, rutabulo vitreo, vel fistula tabaci Coloniensi, perpetuo, ne in grumos abeat, agitando, lenissimo igne, donec fumare cessat; si forsan in grumos concrecat, denuo pulverisandum est Antimonium, atque iterum, sub agitatione perpetua, in calcem grysei coloris, quæ sulphur non redolet, redigendum.

Calx hæc Antimonii crucibulo inditur, atque igne forti, in furno anemio, liquatur, & ubi colorem pellucidum, hyacinthinum acquisiverit, pauxillum Antimonii crudi, vel Sulphuris, adjicitur, & in pelvim vel laminam cupream effunditur.

Ex vitro antimonii varia medicamenta parantur, quæ jam sub diversis titulis nominavimus; per se non dari solet.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM, sive OXYMEL ÆRUGINIS.

REC. Æruginis uncias tres,
Mellis puri uncias octo,
Aceti Vini acerrimi uncias quatuor.

Ærugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne, ad mellis consistentiam reducitur.

Vim habet desiccandi & mundificandi, septicam; hinc in ulceribus malignis, sinuosis & Sphacelo utiliter Chirurgi adhibent; cum melle rosato mixtum gingivis putridis & ulcerosis conducit.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

REC. Radicum Bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos nostratis ana uncias tres,
Scillæ libram semis.

Tribulorum aquaticorum uncias duas.

Radices omnes recentes, concisæ & contusæ, cum tribulis macerentur, per octiduum, in

Olei olivarum libris sex, postea lento igne coctis & expressis, addatur
Ceræ flavæ libra una.

Colliquata & mixta colentur; fiat unguentum.

Confert lienosis, alvi obstructione & duritie laborantibus, hydropicis & œdematosis, tumoribus duris, scirrhis.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

REC. Flor. & Herbar. Chamæmeli,
Rutæ ana uncias tres,
Rosarum,
Sambuci,
Betonicæ ana unciam
unam semis,

Radicis Althææ uncias duas,

Olei rosati libram unam semis.

Contundantur, & ad humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur, & exprimantur. E colatura, cum

Alabastri puri, optime lævigati, unciis
tribus,

&

Ceræ albæ unciis quinque.

Fiat unguentum.

Temporibus, fronti, spinæ dorfi, & plantis pedum illinitur, & lintea, illo imbuta, imponuntur; refrigerat, dolores mitigat, & somnum conciliat.

UNGUENTUM.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

REC. Axungiae porcinae libram unam,
Cerussæ Venetæ pulverisatæ uncias
octo,
Camphoræ drachmas sex.

Misce.

Desiccant, refrigerant, & levioribus inflammationibus medetur. Cave vero, in erysipellate applices.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

REC. Axungiae porcinae libram unam,
Cerussæ albæ, subtilissime pulverisatæ, uncias octo.

Misceantur exacte, & agitentur pistillo ligneo.

Desiccant atque refrigerant; ad scabiem & reliqua cutis vitia, a sero acri enata, ut & ambusta conducit.

UNGUENTUM ALTHÆÆ.

REC. Mucilaginis Radicum Althææ libram
unam,

Fœni græci;

Lini ana libram semis,

Butyri libras quatuor,

Ceræ libram unam,

Terebinthinæ uncias duas,

Resinæ uncias sex.

Mucilagines coquantur cum butyro, & cum aquosum consumtum fuerit, addatur

Pulveris radicum Curcumæ uncia
una;

denique cera & resina.

His liquatis & colatis, terebinthina admisceatur, unguentum fervetur.

Usitatissimum ac celeberrimum hoc unguentum emollit, calefacit, & resolvit; commendatur in pleuritide, nephritide, retentione urinæ, ad mammarum tumores resolvendos, & membra rigida.

UNGUEN-

UNGUENTUM.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

REC. Corticum mediorum succulentorum
Sambuci,
Tiliæ ana unciam unam
femis,
Succi Plantaginis recens expressi
uncias duas,
Sempervivi majoris unciam
unam,
Olei lini expressi uncias sex,
Sevi cervini unciam unam.
Bulliant leni igne, ad consumptionem hu-
miditatis, oleo colato immisceantur ex-
acte, in mortario plumbeo,
Cerussæ Venetæ, minutissime tritæ,
ac Aqua Rosarum lotæ, uncia
una,
Sacchari drachmæ duæ,
Olei ovorum recens parati uncia
femis.

Fiat, secundum artem, unguentum.

*Ad ambusta, uti titulus docet, adhibetur;
paregoricum & refrigerans est.*

UNGUENTUM ANODYNUM.

REC. Florum recent. Chamomillæ libras duas,
Malvæ,
Meliloti,
Verbasci,
Anethi,
Folior. recent. Hyoscyami ana unciam
unam,
Radicum recent. Altheæ uncias duas,
Seminis Fœni græci,
Lini ana drachmas tres.

Flores, herbæ & radices recentes, cum semi-
nibus probe confusis, macerentur in
Olei Olivarum libris duabus,
per diem & noctem, postea leni igne co-
quantur, ad humiditatis omnis consumptio-
nem, in colatura colliqua

Ceræ flavæ recentis uncias quatuor.

Fiat sic, lege artis, unguentum.

*Dolores a rigida fibrarum tensione mitigat, conve-
nit in cephalalgia, & lumborum doloribus ex ne-
phritide & febre.*

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

REC. Terebinthinæ,
Resinæ,

Pars II.

UNGUENTUM.

219

Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Aristolochiæ longæ,
Thuris,
Bdellii,
Myrrhæ,
Galbani ana unciam femis,
Opopanacis præparati,
Æruginis ana drachmas duas,
Lithargyrii unciam unam,
Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyrio coquatur, lento igne,
inter coctionem

Aceti vini albi uncias duas addendo;

Postea immisceatur cera, cum refina, liquefacta
& colata, atque his, ab igne remotis, &
nonnihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua
in pulverem contrita addantur.

Fiat unguentum.

*Mundificat, detergit, maturat & consolidat; ut-
plurimum ad ulcerum curam adhibetur.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

REC. Succi radicum Cyclaminis, vel, in ejus
defectu, Bryoniæ li-
bras tres,
Cucumeris agrestis,
Butyri recentis ana libram unam,
Olei Olivarum libras duas,
Polypodii querni uncias sex,
Pulpæ Colocynthis uncias quatuor.

Polypodium & Colocynthis, minutim incisa,
contendantur cum succo; & macerentur per
viginti quatuor horas; postea, additis oleo
& butyro, coquantur, ad humiditatis con-
sumptionem, exprimantur & colentur, in co-
latura dissolvantur

Ceræ flavæ uncia quinque, refrigescant,
& sub continua agitatione, pulve-
rem e sequentibus insperge:

Pulveris Aloës epaticæ,
Baccarum Mezerei,
Colocynthis, vel trochisco-
rum Alhandal,
Scammonei,
Turbethi ana unciam unam,
Euphorbii drachmas septem,
Salis gemmæ,

K k k

Pulveris

Pulveris Florum Chamomillæ,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zinziberis ana unciam semis;

tandem adde

Fellis tauri, ad mellis consistentiam inspissati,

Sagapeni in aceto soluti ana unciam unam.

Exactissime uniantur, reponatur unguentum.

Ob multa, quæ ad hoc unguentum contraindum accedunt, purgantia fortissima, abdomini illitum, album clausam referendi virtutem accipit, tumores ædematosos discutit, aquas hydropicorum expellit, menses retentos & suppressos provocat, vermes, abdomini applicitum, expellit; sed cave, ne pueris delicatioribus, sub emplastri specie, imponas, euphorbium enim rubefaciendi vim habet, & excoriationem excitat.

Sufficit, inunxisse abdomini unguentum semel in die.

UNGUENTUM AUREUM.

REC. Olei communis libras duas semis,
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ uncias duas,
Colophonii,
Resinæ pini ana unciam semis.

Lento igne colliquatis, colatis, & nonnihil refrigeratis, inspergantur

Pulveris Mastiches,
Thuris ana uncia una,
Croci drachma una.

Misce, fiat unguentum.

Vulnerarium est, & per excellentiam vocatur aureum, conducit in vulneribus, ubi nulla adest inflammatio, & præsertim membranarum & nervearum partium vulneribus sanandis inservit.

UNGUENTUM BASILICUM.

REC. Ceræ flavæ,
Sevi arietini,
Resinæ pini,
Picis navalis,
Terebinthinæ ana uncias tres,
Olei communis olivarum libram unam.

Fundantur, lento igne, cera, sebum, resina & pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, & per stupam colatis, adde

Pulveris Olibani unciam unam semis,

Misce.

Digerit, maturat, suppurationem promovet.

UNGUENTUM CALENDULÆ FLORUM.

REC. Florum Calendulæ recentium, excerptorum, uncias quatuor,
Butyri recentis, non saliti, libram unam.

Incisi flores coquantur cum butyro, ad humiditatis consumptionem, expressum, & colatum unguentum reponatur.

Emolliente & discutiente vi pollet, tumores mammarum lactantium resolvit, & a mulierculis ad ambusta, aliasve leves inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

REC. Florum recent. Chamomillæ uncias tres,
Meliloti,
Herbarum rec. Abrotani,
Hederæ terrestris,
Rutæ,
Menthæ crispæ,
Tanaceti ana unciam unam.

Contusis & conquassatis addatur

Olei Olivarum,

Adipis porcini recentis ana libra una;

Macerentur per dies aliquot, dein leniter ebulliant, ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur, adde

Ceræ citrinæ uncias duas,

Olei destillati Anisi,

Carvi,

Menthæ ana drachmam unam,

Lauri

UNGUENTUM.

Lauri expressi uncias duas.
Misce pro unguento.

In colica, torminibus infantum & flatulencia, distensione abdominis, utiliter abdomini illinitur.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

REC. Radicum Althææ recentium,
Liliorum alborum ana uncias duas,
Herbarum Parietarizæ,
Malvæ,
Mercurialis ana unciam unam semis,
Althææ,
Violarizæ,
Florum Chamæmeli,
Meliloti, omnium recentium, ana unciam unam.

Coquantur in
Butyri recentis, non saliti, libris duabus,
ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur.

Abdomini illitum alvum emollit; & clysteribus, eodem scopo, additur ad unciam semis, usque ad uncias tres.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

REC. Corticum mediorum Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris junioris,
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum ficcorum,
Mespilorum acerborum ficcatorum,
Foliorum Plantaginis,
Quercus,
Equiseti,
Pruni filvestris,
Radiciis Tormentillæ ana unciam unam semis.

Contundantur aliquantulum, coquantur in
Aquæ fontanæ &

UNGUENTUM.

221

Vini rubri ana libra una, donec media pars consumpta fuerit.

Colatura ulterius coquatur, cum

Olei Myrtillorum libra una semis,
ad humiditatis aquosæ consumptionem; postea in ea dissolvantur

Ceræ novæ unciz octo semis,
ab igne repositis addatur

Olei mastichini libra una semis,
atque inspergatur sequentium tenuissimus pulvis:

REC. Corticum Quercus arboris unciam unam,
Sanguinis Draconis,
Nucis Moschatæ,
Gallarum,
Succi hypocistidis,
Baccarum myrti,
Acinorum uvarum,
Sorborum immaturorum ana unciam semis,

Trochiscorum de carabe uncias duas.

Misce, fiat unguentum.

Unguentum hoc e meris adstringentibus & siccantibus paratum, laudatur ad abortum prohibendum, uteri, alvi & renum laxitatem, ad hernias, ani & uteri procidentias.

Applicatur lumbis, abdomini & femoribus, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

REC. Terebinthinæ Venetæ libram semis,
solve ac misce cum
Vitellis ovorum, numero quatuor,
adde
Olei Hyperici unciam unam semis
Pulveris Olibani,
Myrrhæ ana drachmas tres.

Misce.

Digerit & suppurationem promovet, in vulneribus ac abscessibus.

UNGUENTUM DIGITALIS.

REC. Florum Digitalis purpureæ vulgaris
uncias quatuor,

Kkk 2

Adipis

UNGUENTUM.

Adipis Suillæ libram unam.

Macerentur per aliquot dies, postea coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem, coletur & servetur in vase vitreo unguentum.

Commendatur ad ulcera scrophulosa humida, pure manantia. De digitali Itali dicere solent: Aralda tutte le piaghe calda. h.e. Digitalis sanat omnia vulnera.

UNGUENTUM ENULATUM.

REC. Radicum Enulæ recentium libram unam,

Pinguedinis porcinæ libram semis,
Olei Olivarum purissimi uncias quatuor.

Pinstantur in mortario lapideo, coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur; colaturæ adde

Ceræ flavæ,

Terebinthinæ puræ ana unciam unam.

Optime commixta fiant unguentum.

Laudatur ad scabiem & tineam, & bono cum effectu adhibetur, ubi mercurio & metallicis præparatis mixta unguenta locum non habent.

UNGUENTUM FUSCUM.

REC. Olei communis libram unam semis, in quo dissolve

Ceræ flavæ recentis uncias quatuor,
Colophonii,

Picis navalis ana uncias duas,

Mastiches electæ,

Terebinthinæ ana unciam unam.

Colentur, atque colaturæ refrigeratæ admisce

Gummi Galbani,

Sagapeni,

Thuris electi ana unciam unam,

Aristolochiæ rotundæ unciam semis.

Misce, fiat unguentum.

Est vulnerarium, emolliens, & mundificans; digerit & carnem generat.

UNGUENTUM.

UNGUENTUM DE HYOSCYAMO.

REC. Foliorum Hyoscyami recentium libram unam.

Contundantur cum

Axungiae porcinæ uncis decem;
coquantur ad humiditatis consumptionem, exprimantur & expressio addantur
Olei Hyoscyami, e semine expressi, unciae duæ.

Mixta ferventur.

Anodynum est, & egregium emolliens; cum unguento linariæ, hæmorrhoidum dolores sedat.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

REC. Olei rosati libram unam,
Ceræ albæ uncias tres.

Cera liquetur. & oleo permisceatur, ut fiat unguentum.

Nephriticis & hæticis. dorso & renum regioni inunctum commendatur.

UNGUENTUM DE LINARIA.

REC. Herbæ Linariæ, cum floribus,
Pinguedinis porcinæ ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad humiditatis consumptionem, & exprimantur.

Specificum creditur esse ad hæmorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

REC. Radicum Liquiritiæ recentis & succulentæ, incisarum,

Butyri recentis ana libram unam.

Pinstantur simul in mortario, postea frixentur in sartagine, ad humiditatis consumptionem, & prelo exprimantur, expressio adde.

Pompholygos drachmas sex,

Cerussiæ subtilissime tritæ uncias tres,

Camphoræ scrupulos duos.

Fiat unguentum.

Inflammationes partium leviores, vel potius excoriationes, a sero salso productas, ut & fissuras papillarum in mammis lactantium, sanat.

UN-

UNGUENTUM.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

REC. Lithargyrii libram semis,
Cerussæ unciam unam semis,
Aceti libram semis,
Olei rosati libram unam.

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Epuloticum & sarcoticum est, adversus scabiem, pruritus & alia cutis vitia, utiliter adhibetur.

UNGUENTUM MALVÆ.

REC. Herbæ Malvæ recentis libram unam semis,
Butyri recentis libras duas.

Contundantur infimul, & coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem, colentur cum expressione, & unguentum ad usum reponatur.

Cum unguento Clysmatico convenit, & eisdem usibus inservit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ recentis Majoranæ,
Butyri recentis ana libram unam.
Contusa & probe mixta coquantur lenissimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur & colentur, colaturæ adde
Olei destillati Majoranæ guttas triginta.

In narium infantum obstructione, a mucoviscido, expeditur; loco unguenti carminativi etiam abdomini illini potest.

UNGUENTUM MARTIATUM.

REC. Foliorum Lauri recentium libram unam,
Rutæ hortensis uncias decem,
Majoranæ uncias octo,
Rorismarini uncias sex,
Myrti veræ,
Ebuli,
Menthæ,
Basilici ana uncias duas.

Pars II.

UNGUENTUM.

223

Herbæ & folia recentia, minutim incisa, macerentur in

Vini albi libra dimidia, &
Olei Olivarum libris duabus, per aliquot dies digestis, adde
Butyri recentis,
Axungiae Ursi,
Gallinæ,
Medullæ Cervi ana unciam unam semis.

Coquantur lenissimo igne, ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur; in expresso dissolvantur

Ceræ flavæ unciae quindecim,
refrigerato unguento admisceantur
Styracis drachmæ decem,
Mastiches uncia una,
Thuris drachmæ quinque,
omnia in subtilem pulverem trita.

Cum unguento nervino convenit; & ad nervorum resolutionem, tumores a causa frigida ortos, infantum tormina & hydroperem commendari solet.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM.

REC. Olei rosati libram unam semis,
Lithargyrii uncias duas,
Minii uncias tres,
Cerussæ unciam unam semis,
Tutiae præparatæ,
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam lento igne ceram, oleum, & reliqua tenuissime trita, additis
Aceti destillati unciis tribus,
commisce, sub finem addendo camphoram spiritu vini solutam.

Refrigerantis & exsiccantis virtutis est, & ad ulcera, quæ ob humorum acrimoniam serpunt, conducit, & ambustis medetur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS STAHLII.

REC. Mercurii vivi,
Saturni ana unciam unam.
Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium, & spatula agita, quo uniantur, & fiat amalgama, quod, cum

LII

Terræ

UNGUENTUM.

Terræ Tripolitanæ uncia una,
subtilissime teratur. Qui pulvis
Unguenti albi camphorati unciis
octo
optime permisceatur.

*Ad efflorescentias cutis scabiosas, præsertim
siccas & pruriginosas, præmissis præmit-
tendis, utile est, si vel immediate loco
affecto inducatur, vel articulationibus ma-
num & brachiorum subinde affricetur.*

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

REC. Mercurii crudi uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam
semis.

Probe misceantur, ut Mercurius extingua-
tur, adde

Axungiae porcinae lotæ uncias de-
cem,

Olei Spicæ drachmam unam.

*Ufus est in lue venerea, ad salivationem
excitandam; modus applicandi e practi-
corum libris petendus.*

UNGUENTUM NERVINUM.

REC. Herbarum Salviæ,
Chamæpytis,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyseos, cum flore,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Hyperici,
Summitatum Anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi viridium ana
drachmas sex.

Incisa & contusa macerentur in
Olei Olivarum libra una,
per aliquot dies; postea lento igne,
ad humiditatis consumptionem, coquan-
tur, exprimantur & colentur. Colaturæ
adde

Terebinthinæ Venetæ uncias duas,

UNGUENTUM.

Ceræ citrinæ uncias quatuor & se-
mis,

Olei Terebinthinæ unciam unam,
Lumbricorum cocti,

Laurini ana uncias duas,

Benzoës, in unciis tribus spiritus
vini rectificatissimi soluti, unciam
unam.

Fiat unguentum.

*Ad frigidos nervorum affectus, paralyfin &
similes commendatur.*

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

REC. Foliorum Nicotianæ libras duas,
Succi Nicotianæ libram semis,
Axungiae vel pinguedinis porci
libram unam.

Herba incisa & contusa, cum succo &
adipe fuillo, per noctem maceretur;
mane lento igne, ad humiditatis con-
sumtionem, coquantur, exprimantur,
& colentur, addantur
Resinæ unciae duæ,
Ceræ uncia una,
Aristolochiæ rotundæ, subtilissime
tritæ, unciae duæ.

Fiat unguentum.

*Auctor Laurentius Joubertus miram huic
unguento, in scrophulis dissipandis, vim
adscribit; laudatur etiam ad ulcera, ad
morphæam & tineam capitis; cutim a
scabie sanat.*

UNGUENTUM NIGRUM.

REC. Olei olivarum libram unam,
Butyri recentis,
Sevi vervecini,
Axungiae porci,
Ceræ citrinæ,

Lithargyri ana uncias quatuor.
Oleo & reliquis lento igne liquatis li-
thargyrium tenuissime tritum addatur,
omnia deinde sub perpetua agitatione
ad nigredinem consistentiam & unguen-
ti coquantur.

*Tanquam digerens, maturans & suppara-
tionem promovens in Pharmacopœa Pa-
risiensi*

UNGUENTUM.

rifiensi describitur, in nosodochiis usitatum, titulo: **UNGUENTI DE LA MERE.**

UNGUENTUM NIHILI AD OCULOS.

REC. Tutiae præparatae,
Nihili albi ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris perlarum ana unciam semis,
Campherae drachmam unam,
Pinguedinis porcinae mundatae libram unam.

Fiat miscendo unguentum.

Ad ophthalmiam, a sero acri falso, & dolores inde natos, conducit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

REC. Aceti Lithargyrii libram unam,
adde, sub perpetua agitatione,
Olei rosati libram dimidiam, quantum sufficit ad formam linimenti vel unguenti.

Vires. Præstans est ad inflammationes, & convenit cum Unguento de Lithargyrio, & de Minio.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM St. YVEANUM.

Vid. sup. p. 28. **BALSAMUM OPHTHALMICUM.**

UNGUENTUM PECTORALE.

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Pinguedinis Gallinae,
Anatis ana uncias duas,
Ireos Florentinae drachmas duas,
Croci drachmam semis,
Cerae albæ uncias tres.

Cera & pinguedine in oleis liquatis, postea addito Ireos & croci pulvere, fiat unguentum.

Commendatur in pleuritide, ad tussim & difficilem respirationem infantum.

UNGUENTUM.

225

UNGUENTUM PEDICULORUM.

REC. Seminis Staphidis agriæ uncias duas,

Hellebori albi unciam unam,
Argenti vivi uncias duas,
Pinguedinis porcinae libras tres,
Olei laurini uncias sex,
Saponis Veneti uncias tres.

Sapo in lixivio solutus, cum pinguedine coquatur, ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea oleum Laurinum & pulveres, tandem Mercurius cum

Terebinthinæ Venetæ uncia una, extinctus

addatur.

Fiat unguentum.

Usus titulus indicat.

UNGUENTUM sive POMATUM FLORUM NAPHÆ, PHARM. PARIS.

REC. Adipis suilli, puri, libras quinque,
Florum Aurantiorum recentium & integrorum, libras sex.

Indantur fictili vasi, probe vitreato, atque Balneo Mariæ per unam aut alteram horam, ad digestionem, committantur. Exprimantur, &, ut cito citius refrigescant, & adeps concreascit, in cellam reponantur.

Repetatur processus tertia vice, adipi recentes flores addendo; ultima tamen uncia quatuor florum sufficiunt. Tandem fæces ab unguento, vel pomato separentur, & aquæ florum Naphæ fragrantissimæ uncia octo addantur, liquatum cum aqua unguentum supernatans, caute separetur, atque ab omni humiditate liberum, reponatur.

Pari methodo ex aliis floribus odoratis, Jasmino, Lavendula, Rosis &c. unguenta fragrantia parari possunt.

Usus omnibus est notus, cosmeticus, & ad capillamenta & capillos inungendos.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Rosarum uncias sex,
 Ceræ albæ,
 Succī baccarum Solani ana uncias
 quatuor,
 Cerussæ optime tritæ uncias duas,
 Plumbi usti,
 Pompholygos, sive Nihili albi,
 Thuris electi ana unciam unam.

Oleum rosarum, cum succo baccarum solani, ad humiditatis consumptionem, coquitur, & in colatura cera dissolvitur, quibus refrigeratis, reliqua, in subtilissimum pollinem trita, admiscuntur.

Commendatur ad ulcera exsiccanda atque consolidanda. A nonnullis etiam ad ophthalmiam adhiberi solet.

UNGUENTUM POPULEUM.

REC. Oculorum, sive gemmarum, Populi arboris recentium libram unam semis,
 Pinguedinis porcine depuratæ libras quatuor.

Oculi contundantur & macerentur in pinguedine, donec sequentes herbæ per æstatem colligi queant, scilicet

Cymarum rubi tenerrimarum,
 Foliorum Papaveris albi,
 Hyoscyami,
 Bardanæ, cum radicibus,
 Solani,
 Lactucæ,

Herbarum Violarie ana uncias tres,
 Sempervivi majoris uncias quatuor,
 Sempervivi minoris uncias tres.

Herbæ contundantur, & misceantur cum Oculis Populi & pinguedine, deinde coquantur lento igne, ad humiditatis aquæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Est paregoricum, refrigerans & emolliens; commendatur ad hæmorrhoidum dolores, ambusta, lac in mammis coagulatum dissol-

vendum, linteis impositum; & in febris, si temporibus, plantis pedum & pulsibus manuum applicetur, somnum conciliare perhibent.

UNGUENTUM PURPUREUM WURZII.

REC. Terræ Vitrioli dulcis uncias duas,
 Viridis Æris drachmas decem,
 Aceti vini,

in quo

Radices Scrophulariæ,

Folia Plantaginis, &

Chelidonii majoris, recentia, singulorum drachmæ tres,

per aliquot dies macerata, ac postea expressa fuerint, uncias quinque,

Mellis despumati uncias octo.

Inspissentur leni igne, continuo agitando, ad mellis consistentiam.

Convenit cum Ægyptiaco unguento; commendatur ad gangrænam & sphacelum, ulcera putrida sinuosa, & carnem luxuriantem auferendam.

UNGUENTUM RESOLVENS MAMMARUM TUMORES.

Vid. LINIMENTUM VOLATILE.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

REC. Seminum Lini,

Althææ,

Fœni græci,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ ana drachmas duas.

Macerentur & bulliant in

Aquæ simplicis libra semis,

eliciatur mucilago, quæ cum

Butyri recentis libra dimidia,

Pinguedinis Suillæ,

Gallinæ,

Anseris,

Anatis ana unciis duabus,

coquantur, ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea addantur

Sevi hircini uncia semis,

Olei

UNGUENTUM.

Olei Violarum,
Chamæmeli,
Amygdalarum dulcium ana
unciae duæ,
Medullæ vituli libra semis.

Fiat secundum artem unguentum.

*Hæticis, pleuriticis & tabidis, e longo morbo re-
surgentibus, membris a luxatione, vulneratione
& fractura rigidis conducit.*

UNGUENTUM ROSATUM.

REC. Axungiae porcinae albiſſimæ libram
unam.

Lavetur aliquoties Aqua rosarum fra-
grantissima, adde

Florum rosarum albarum, contusa-
rum, uncias quindecim;

coque lento igne, ad humiditatis
consumtionem, colentur & addantur.

Olei rosarum veri destillati grana
tria.

Misce.

*Ad hæmorrhoidum dolores, & unguento
infrigidanti & anodyno substitui potest.*

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

REC. Axungiae porci albiſſimæ libram
unam.

Lavetur sæpius aqua rosarum odoratissi-
ma, donec albiſſimum & odoratum
fuerit unguentum; adde

Olei ligni Rhodii guttas duodecim.

*Usus est ad capillos & capillamenta inun-
genda, quo pulvis ex amylo facilius ad-
hæreat.*

UNGUENTUM RUBRUM, AD LABIA ORIS.

REC. Radicum Alkannæ unciam unam
femis,

Ceræ albæ drachmas sex,

Olei amygdalarum dulcium recens
expressi, uncias duas,

Vini rubri uncias tres.

Radices minutim incisæ in vino rubro
macerentur, his adde oleum amygdala-

Pars II.

UNGUENTUM.

227

larum, & lenissimo igne, ad humidita-
tis consumtionem, in vase terreo vitrea-
to coquantur; addatur sub finem cera
alba, exprimantur, & in aquam rosa-
rum effundantur. Refrigerata denuo,
lenissimo igne liquentur,

Olei cinnamomi guttæ decem
addantur, & in capsulas papyraceas, sicut
ceratum citrinum, effusa, in vitro probe
clauso ferventur.

*Ad fissuras labiorum a calore nimio inter-
no, vel a frigore ortas, mulierculæ utun-
tur, & nocte, ante cubitum, labia oris
eo illinunt.*

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

REC. Radicum Alkannæ libram unam,

Vini rubri odorati libram semis.

Macerentur per dies aliquot, loco frigido,
cum

Butyri majalis recentis, non saliti,
libris sex.

Coquantur leni igne, ad consumtionem humi-
ditatis, colentur & exprimantur.

*Commendatur iis, qui ex alto ceciderunt, sangui-
nem spuentibus, & tussi ferinæ vexatis, atque
ad sanguinem intus coagulatum, a contusione,
resolvendum.*

*Datur ad unciam unam, cum jusculo & cerevisia,
calidis.*

UNGUENTUM SANDALINUM.

REC. Sandali albi,

citrini ana drachmas sex,
rubri drachmas decem,

Florum Papaveris erratici recen-
tium unciam unam se-
mis,

Rosarum rubrarum recen-
tium uncias duas semis.

Macerentur in

Olei rosacei libra una,

Vini albi unciis quatuor, per bi-
dium; postea, ad consumtio-
nem humiditatis, leni igne co-
quantur, exprimantur & co-
lentur. Expressis adde

Mmm

Boli

UNGUENTUM.

Boli Armenæ, in pulverem subtilissimum tritæ,
Ceræ albæ uncias tres,
Camphoræ drachmas duas.

Fiat unguentum.

*Virtute gaudet refrigerante & roborante;
hepati & lienī a veteribus dicatum est.*

UNGUENTUM SAPONACEUM.

REC. Saponis Veneti uncias duas,
Olei Laurini,
Lumbricorum terrestrium ana
unciam unam.

Ignē leni liquecant mixta, remotis ab
igne, & refrigeratis, admisce
Spiritus volatilī salis ammoniaci
drachmas duas.

Egregium & securum est resolvens in tu-
moribus tam inflammatoriis, quam fri-
gidis, arthriticis, quin & in pleuritide,
super linteo cerato vel tenui corio ex-
tensum, singulis duodecim horis impo-
nendum.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

REC. Terebinthinæ, in Aqua rosarum
lotæ, uncias duas semis;

Solvantur
Vitellis ovorum numero tribus,
adde

Butyri recentis uncias sex,
Olei laurini unciam unam,
Styracis liquidæ unciam semis,
Mercurii præcipitati albi drachmas
duas,
Cerussæ Venetæ optime pulverifa-
tæ, unciam unam.

Misce exacte, ut fiat unguentum.

*Usus titulus indicat. Inungantur hoc un-
guento vel articulationes in brachiis, ma-
nibus & pedibus, vel pustulæ scabiosæ
ipsæ; sufficit pro una vice drachmam
omnibus inungere.*

UNGUENTUM AD SCABIEM ZELLERI.

REC. Unguenti rosati uncias tres semis,
Mercurii præcipitati albi unciam
semis.

UNGUENTUM.

Misce.

*Proxime antecedentis usum & vires æquat,
odore vero gratius est.*

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti alabastrini,
rosati ana unciam semis,
populei uncias duas,
Olei Hyoscyami unciam semis,
Nucistæ expressi drachmam unam
semis,
Opii Thebaici, in Aqua rosarum solu-
ti, drachmam unam,
Croci Orientalis drachmam semis,
Ceræ albæ unciam semis.

Fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti titulus docet; temporibus &
carpis, non sine fructu, linteis applicatur.*

UNGUENTUM SPLENETICUM.

REC. Radicum Filicis,
Ari, cum herba, ana uncias
duas,
Foliorum Afari,
Hyoscyami,
Cicutæ,
Nasturtii aquatici ana unciam
unam semis,
Nicotianæ drachmas tres,
Florum Chamomillæ,
Hyperici,
Genistæ,
Sambuci ana unciam unam.

Omnia contusa macerentur cum
Axungie suillæ libra una semis,
postea coquantur lento igne, ad humiditatis
consumptionem; expresso colato adde
Ceræ citrinæ unciam unam semis,
refrigeratis adde

Gummi Ammoniaci,
Galbani subtilissime pulverisati ana
drachmas sex,

Olei destillati Cymini,
Anethi,
Ceræ ana drachmam unam.

Repo-

Reponantur ad usum.

Adhibetur ad inflationes abdominis, duritiem & infarctum lienis & epatis, prodest hypochondriacis, ictericis, & flatibus vexatis; Hypochondria, lumbi & totum abdomen, hoc unguento imungi debent.

UNGUENTUM STOMACHALE.

REC. Herbæ Absinthii,
Menthæ,
Salviæ ana uncias duas.
Florum rosarum unciam unam,
Olei olivarum uncias decem.

Herbæ & flores, recenter conquassati, coquantur lento igne, ad humidi exhalationem, exprimantur, in expresso dissolvantur

Ceræ citrinæ uncia duæ.

Misceantur exacte; refrigeratis adde
Styracis liquidæ unciam unam,
Olei destill. Menthæ,

Caryophyllorum,
Absinthii ana scrupulum unum.

Serventur.

Illinitur externe ventriculo & abdomini, ad vomitus & diarrhæas compefcendos, ubi insimul effectum carminativum præstat.

UNGUENTUM DE STYRACE.

REC. Styracis liquidæ,
Gummi Elemi,
Ceræ citrinæ, ana uncias septem & femis,

Colophonii uncias duas,
Olei Nucum libras duas & femis.

Misce, fiat secundum artem unguentum.

Virtute balsamica conducit in partibus ligamentosis & membranosis.

Convenit cum Unguento aureo.

UNGUENTUM AD TABIDA MEMBRA.

REC. Olei Laurini uncias tres,
Juniperi,
Laterini, five Philosophorum.
Castorei,
Spicæ,
Petræ rubri ana unciam femis,

Axungiae Caponis,

Cati filvestris,

Anatis,

Anseris ana unciam unam,

Hominis unciam unam femis,

Pulveris Euphorbii unciam femis,

Aluminis plumosi,

Herbæ sabinæ ana drachmas
duas,

Saponis Veneti,

Spiritus Vini rectificati ana uncias tres.

Fiat, saponem in spiritu vini solvendo, & cum reliquis commiscendo, unguentum.

Ad ariduram partium, e causa frigida, commendatur; prodest paralyticis.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

REC. Radicum Filicis,

Bryoniæ,

Allii ana unciam unam
femis,

Herbarum Abrotani,

Absinthii,

Tanacetii ana drachmas
duas,

Butyri recentis libram unam.

Contusa coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, ad humiditatis consumptionem. Exprimantur, in expresso dissolve

Ceræ flavæ unciam unam femis,
refrigescant; refrigeratis insperge

Pulveris Aloës epaticæ unciam
unam;

trochiscorum alhandal
unciam femis;

probe subactis adde

Fellis tauri, ad mellis consistentiam
inspissati, uncias duas.

Serventur.

Abdomini inunctum, vel linteis applicitum, vermes enecat, expellit, & alvum laxat.

UNGUENTUM VIRIDE POTABILE.

REC. Herbarum recent. Abrotani,
 Artemisizæ,
 Bellidis,
 Betonizæ,
 Fœniculi,
 Hyssopi,
 Menthæ,
 Matrisilvæ,
 Millefolii,
 Majoranæ,
 Plantaginis,
 Veronicæ,
 Verbenæ,
 Salviæ,
 Rutæ ana unciam unam.

Baccarum juniperi viridium uncias tres.

Butyri recentis, non saliti, libras tres.

Incisa & contusa misceantur & coquantur cum butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem, exprimantur & colentur.

Tam externus quam internus ejus est usus; datur ex alto lapsis, parturientibus & vulneratis, cochlear unum aut alterum, cum fusculo; externe ad sugillationes, & leniendos partium dolores, adhibetur.

UNGUENTUM DE UVIS.

REC. Succu uvarum nigrarum minorum,
 Aquæ rosarum fragrantis,

Butyri recentis ana uncias sedecim,

Ceræ flavæ odoratæ uncias quatuor.

Coquantur lento igne, in vase figulino, spumam sub coctura, cochleari ligneo, semper auferendo, donec spumare desierit; effundantur refrigerata. Unguentum, ab adhærentibus fecibus mundatum, denuo lenissimo igne liquetur, atque in patinas, vel vasa porcellana, antea aqua rosarum humectata, effundatur. Refrigeratum inter chartas in scatula, loco frigido, fervetur.

Refrigerat & leniter adstringit; ad fissuras labiorum oris, mammarum papillas, hæmorrhoides & intertrigines adhibetur.

UNGULA ALCIS PRÆPARATA.

Lima in scobem, & post in alcohol redigitur.

Pro specifico antepileptico habetur, & fere omnibus pulveribus antepilepticis ex præjudicata opinione & inani singularis efficaciz spe admiscetur.

Dosis grana quindecim ad viginti quinque.

UNICORNU MARINUM PRÆPARATUM.

Lima in scobem redactum in pulverem subtilissimum teritur.

Cordiale, antispasmodicum, nervinum præter rationem prædicatur.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.





I.
I N D E X
SIMPLICIUM ET COMPOSITORUM
QUÆ
T A M I N P R I O R I
QUAM
I N P O S T E R I O R I P A R T E
P H A R M A C O P O E Æ W I R T E N B E R G I C Æ
CONTINENTUR.

NB. *Lit. b. partem posteriorem denotat.*

Abelmosch	82	Æther, v. Liq. anod. min.	b. 95
Acaciæ Ægyptiacæ succus	133	Æthiops antimonialis	b. 4
Germanicæ fructus	96	mineralis	b. 4
muscus	140	vegetabilis	b. 5
succus	134	Aëtites	5
Acetum bezoardicum	b. 3	Agallochum; Lignum	116
Sylvii	b. 21	Agaricus albus	138
Colchicum	b. 3	mineralis	2
destillatum	b. 4	trochiscatus	b. 5
Lavendulæ	b. 3	Alabastrum	6
Lythargyrii	b. 3	Album græcum	141
odoratum	b. 3	Alcis cornu	141
Papaveris erratici	b. 3	ungulæ	141
Rosarum	b. 2	Alkekengi	96
Rubi idæi.	b. 3	Aloë caballina	134
Rutæ	b. 3	depurata	b. 5
Sambuci	b. 3	hepatica	134
saturninum	b. 3	insuccata	b. 3
scilliticum	b. 4	lota	b. 5
Tunicæ	b. 3	rosata	b. 5
Vini destillatum	b. 4	Succotrina	134
Acmella Zeylanica	48	violata	b. 5
Aconitum	48	Alumen Catinum	5
Ægagropilæ	140	crudum vulgare, album,	
Ærugo, f. Æs viride	15	glaciale	3
Æs viride crySTALLISATUM	b. 4	plumosum	6
ustum	b. 4	Romanum, rupeum, rubrum	3
Pharm. Wirt. Index.		Nnn	Alu-

INDEX I.

Alumen saccharinum	b. 5	Aqua cinnamomi	b. 13
scissile	6	cordialis	b. 13
ustum	b. 6	cydoniata	b. 13
Ambarum	15	spirituosa	b. 13
Ambra grisea	15	cum vino	b. 13
liquida	131	fine vino	b. 13
nigra, v. Mumia	149	confortativa, f. perlata	b. 13
Amethystus	8	cordialis frigida	b. 14
Amiantus	6	temperata	b. 14
Amomum. vid. Semen	83	cornu cervi citrata	b. 14
Ammoniacum. vid. Gummi	121	e corde Cervi	b. 15
Amygdalæ amaræ	97	cort. aurantior. cum vino	b. 14
dulces	97	destillatæ simplices	b. 7 & seq.
Anacardium	97	embryonum ordinaria	b. 15
Anatron	12	correctior	b. 15
Anima Rhabbarbari	b. 209	epidemica Londinensis	b. 16
Animi & Animæ Gummi	121	epileptica Langii	b. 16
Anisum laxativum	b. 35	florum omnium	b. 16
stellatum. vid. Semen	84	fortis	b. 16
vulgare. vid. Semen	84	ad gonorrhœam Hoffmanni	b. 17
Anthora. vid. Radix	20	Riverii	b. 19
Antihecticum Poterii	b. 6	grisea	b. 17
Antimonium crudum	10	hirundinum cum castoreo	b. 17
diaphor. martiale	b. 7	fine castoreo	b. 17
simplex	b. 7	Hungarica	b. 17
Antimonii Butyrum	b. 6	hysterica	b. 17
cinnabaris	b. 6	immortalis vid. Aq. carmi-	
clyffus	b. 7	nat. per infusionem	b. 12
Minera	10	laxativa Viennensis	b. 90
Anthophylli	106	ligni Sassafras composita	b. 18
Apalachine	50	liliorum convallium c. vino	b. 18
Apri dentes	141	Loch sani & experti	b. 18
Aqua acustica	b. 9	magnanimitatis	b. 18
Anhaltina	b. 9	mastichina	b. 18
anthysterica Melissæ	b. 19	anti melancholica	b. 19
anti-melancholica	b. 19	melissæ antihysterica	b. 19
anti-scorbutica temperata	b. 10	spirituosa compos.	
apoplectica spirituosa	b. 10	f. Eau des carmes	b. 19
minus spirit.	b. 10	cum vino	b. 19
asthmatica	b. 10.	mercurialis externa	b. 19
balsamica ad gonôr. Riverii	b. 11	myrrhæ	b. 19
benedicta Serpilli	b. 11	odorifera	b. 20
calcis vivæ	b. 11	ophthalmica sapphinea	b. 20
carbunculi	b. 11	panis	b. 20
carminativa ordinaria	b. 12	perlarum confortativa	b. 13
spirituosa	b. 12	phagedænica	b. 20
per infusionem	b. 12	physagoga	b. 20
caryophyllorum aromat.	b. 12	prophylactica	b. 21
cephalica Caroli V.	b. 12	Reginæ Hungariæ	b. 17
chamomillæ anisata	b. 13	Regis	b. 21
		Aqua	

INDEX I.

Aqua salviæ composita	b. 21	Axungia	Cuniculi	153
sapphinea	b. 21		Equi, e collo, f. juba	153
splenetica	b. 21		Gallinæ	153
stomachica	b. 21		Hominis	153
theriacalis composita	b. 21		Leporis	153
simplex	b. 22		Lucii, piscis	153
travmatica Thedenii	b. 22		Lunæ	2
typhorum cervi composita	b. 22		Lupi	153
simplex	b. 22		Muris Alpini, montani	153
vegeto-mineralis Goulardi.	b. 22		Porci	154
Veronicæ cum vino	b. 22		Serpentum	154
Viennensis laxativa	b. 90		Solis	2
visceralis Maucharti	b. 22		Taxi	154
vitæ mulierum	b. 15		Viperarum	154
vulneraria spirituosa, f. Eau			Uræ	154
d'arquebusade	b. 23		Vulpis	154
vinosa	b. 23			
Zedoariæ anisata	b. 24	Baccæ	Alkekengi	96
simplex	b. 24		Berberum	97
Arcanum corallinum	b. 24		Ebuli	100
duplicatum	b. 24		Halicacabi	96
Tartari	b. 25		Hederæ arboreæ	101
Argentum foliatum	10		Juniperi	102
vivum	10		Lauri	102
Arophi Paracelsi	b. 207		Myrti	103
Arsenicum album	10		Myrtillorum	103
citrinum, f. flavum	10		Paridis	103
rubrum	10		Sambuci	104
Asa dulcis	122		Sorbi torminalis	105
foetida	122		Spinæ cervinæ	105
Asbestus	6	Bacilli ad fornacem		b. 26
Aselli, five millepedes	141	de Liquiritia albi		b. 26
Asphaltum	15	citri		b. 26
Aurantia	97	Banillæ		106
Auricula Judæ	139	Balaustia. vid. Flores		77
Auripigmentum	11	Balsamum Ægyptiacum		132
Aurum foliatum	11	apoplecticum		b. 26
fulminans	b. 26	Arcæi		b. 27
Axungia Anatis	153	Canadense		131
Anguillæ	153	Caryophyllorum		b. 27
Anseris	153	cephalicum Saxonicum		b. 27
Ardeæ	153	Cinnamomi		b. 27
Aschii, f. Aschiæ, piscis	153	Commendatoris de Perne		b. 27
Canis	153	Copaivæ		131
Caponis	153	Embryonum ordinaria		b. 15
Castorei	153	correctior		b. 15
Castoris	153	Indicum album		131
Cati silvestris	153	nigrum		131
Ciconiæ	153	ficcum		132
Coturnicis	153	Lavendulæ		b. 28
		Nnn 2	Bal-	

INDEX I.

Balsamum Locatelli	b. 28	Bolus Armena, Armeniaca	1
Majoranæ	b. 28	præparata	b. 31
de Mecha	132	rubra vulgaris	1
Nucistæ	b. 28	Borax Veneta	3
Odontalgicum	b. 28	Botrytis	15
Opthalmicum St. Yvea-		Bovis fel inspissatum	143
num	b. 28	priapus	151
Orientale verum	132	Bovista chirurgorum	139
Peruvianum album	131	Brontias	6
nigrum	131	Bufones combusti	142
Rackasira	132	exsiccati	143
Rutæ	b. 28	Bufonites f. Bufonius lapis	6
saponis.	b. 29	Butyrum Antimonii	b. 6
somniferum	b. 29	Cacao. v. Olea expressa	b. 113
stomachicum	b. 29	Majoranæ. v. Unguent.	b. 223
succini	b. 29	rubrum. v. ibid.	b. 227
fulphuris amygdalatum	b. 29	viride. v. ibid.	b. 230
anifatum	b. 29		
Rulandi	b. 29	Caa-apia	24
Tolutanum	132	Cacao Butyrum. v. Olea expressa	b. 113
Vitæ Hoffmanni	b. 30	fructus	97
vulnerarium Dippelii	b. 30	Cadmia nativa metallica f. Cobaltum	11-15
liquidum	b. 30	fossilis. vid. Lap. Calamin.	6
min. Dippel.	b. 98	Calaminaris lapis.	6
Mindereri	b. 30	Caffee	99
Stablii	b. 30	Cajeput, Oleum	155
Banigliæ	106	Calamus aromaticus. vid. Radix	18
Batrachites	6	conditus. vid. Condita	b. 34
Bdellium	122	Calx	6
Been	97	Camphora	123
Belemnites	7	Cancamum	121 123
Belliculus marinus	18	Cancrorum Chelæ	143
Benzoë	122	Lapides f. Oculi	143
Berberes conditæ	b. 34	citrati	b. 110
exsiccatæ	97	præparati	b. 110
Bezetta coerulea. vid. Torna folis	15	Candelæ fumales	b. 31
rubra. vid. ibid.	15	Canella alba	108 115
Bezoar Coromandel	142	Cubana	107
Occidentalis	141	Zeylanica	108
Orientalis	142	Cantharides	144
porci	150	Canthum, saccharum	137
Bezoardicum animale	b. 30	Caoutchou	123
joviale	b. 30	Capita Papaveris	98
martiale	b. 31	Carabe	16
minerale	b. 31. 117	Caranna	123
Bismuthum. vid. Marcasita	13	Carbunculus	9
Bitumen Judaicum	15	Cardamomum maximum	109
Blatta Byzantina	17	minus	107
Boletus cervinus	139	Caricæ	98
Bolus alba	1	Carneolys	9
			Caro-

INDEX I.

Caroba	105	Chocolata	
Carpionum lapides	144	Chryfocolla f. viride montanum	b. 33
Carpobalsamum	98	f. Borax	2
Carthamus. vid. Flores	78	Chrysolithus, f. Chryfopafius	3
Caryophylli aromatici	107	Cineres clavellati	9
rotundi	83	Cinnabaris Antimonii	3
Cassiae flores	108	factitia	b. 6
Cassia caryophyllata	107	nativa	b. 33
fistula	98	præparata	12
lignea	108	rectificata	b. 33
extracta. vid. Pulpa	b. 129	Cinnamomum	b. 33
Cassio-berry-busch	50	Cipo de Cameras. vid. Radix	108
Cassumuniar. vid. Radix	25	Claretum e sex feminibus vid. Aqua	26
Castaneæ equinæ	101	carminat. per infusionem	b. 12
aquaticæ palustres	105	Clyffus Antimonii	b. 7
Castoreum	144	Cobaltum f. Cadmia nativa	11
Catechu, f. Terra Japonica	138	Coccinilla	145
Cauterium Antimoniale vid. Antimonii	b. 6	Coccognidium	87
Butyrum	b. 32	Cocculi Indi, Orient. f. de Levante	99
Cauterium potentiale	b. 32	Cochinilla	145
Cauterium potentiale mitius	141	Cochlearum opercula	146
Centipedes	155	testæ	146
Cera alba	b. 32	Coffée	99
arborea	155	Colcothar Vitrioli	b. 34
flava	b. 32	Colla piscium	147
figillaris rubra	b. 32	Colocynthis	99
viridis	b. 32.	Colophonia	124
Cerata. vid. Emplastra	b. 52 seq.	Conchæ citratæ	b. 34
Ceratum saturn. Goulardi	b. 32.	marinæ præparatæ	b. 34
Cerasa acida, exsiccata	99	Conditum Aurantiorum	b. 34
Cerasa dulcia	99	Berberum	b. 34
Ceraforum nuclei	99	Calami aromatici	b. 34
Ceratia	105	Caryophylorum	b. 34
Ceraunius	7	Ceraforum acidorum	b. 34
Cerussa alba Norica	11	Cichorei radicis	b. 34
Veneta	11	Citri corticum	b. 34
Antimonii. vid. Antimon.	b. 7	Cydoniorum	b. 34
diaphoret.	11	Enulæ	b. 34
citrina	145	Eryngii	b. 34
Cervi Cornu	145	Nucum Indicarum	b. 34
Priapus	145	juglandium	b. 34
Ceti Priapus	145	Ribium	b. 34
Sperma	145	Rubi idæi	b. 34
Chalybs limatus	11	Satyrii	b. 34
præparatus	b. 33	Zingiberis	b. 34
sulphuratus	b. 33	Confectio Alkermes	b. 34
Chelæ Cancrorum	143	Anisi laxativa	b. 35
Chelonites	6	de Hyacintho	b. 35
Chermes Grana. vid. Grana	101		Con-
China de China	112		
Pharm. Wirt. Index.			

I N D E X I.

Confectio			Cortex Mezerei	114
	Seminis cynæ	b. 35	Mori radices	115
Conferva	millepedum	b. 35	Peruvianus	112
	spagyrica f. visceralis	b. 36	Quercus	115
Copal		124	Salicis	115
Corallium	album	16	Sambuci	115
	nigrum	16	Simaruba	115
	rubrum	16	Tamarisci	116
Corallia præparata		b. 36	Thuris	116
	foluta	b. 156	Ulmi	116
Corallina		16	Winteranus	116
Corna exsiccata		100	Costus amarus. vid. Radix	27
Cornu Alcis		141	corticofus	108
	præparatum	b. 36	dulcis. vid. Radix	27
		145	hortensis	51
Cervi		b. 36	Cranium humanum	146
	auratum	b. 36	Cremor Tartari	b. 37
	philosoph. præp.	b. 37	Crëpitus Lupi, f. Bovista	139
	ustum	b. 37	Creta alba	1
		150	Crocus	108
Rhinocerotis		156	Martis adstringens	b. 37
Corrector Starckey		111	antimoniatus St.	b. 37
Cortex Acaciæ germanicæ radicum		112	aperitivus vulgar.	b. 38
	Antifebrilis	112	Metallorum	b. 38
	Antiquartius	111	Solis	b. 38
	Aurantiorum	112	Veneris	b. 37
	Cabbage	24	CrySTALLI Tartari	7
	Capparis. vid. Radix	112	CrySTALLUS montana	b. 39
	Cascarillæ	114		109
	Castanæ equinæ	112	Cubebæ	100
	Chinæ Chinæ	113	Cupressi Nuces	100
	Citri	113	Cydonia exsiccata	100
	Codagapala	113	Cynosbati fructus.	100
	Cropal,	113	Cyperus longus, rotundus. vid. Radix	28
	Culilavan, Culilawan	29		
	Ebuli. vid. Radix	30	Dactyli	100
	Efulæ. vid. Radix	112	Dactylus Idæus	7
	Febrifugus	113	Dentes apri	141
	Frangulæ	114		b. 39
	Fraxini	114	præparati	146
	Granatorum	114	Hippopotami	17
	Guajaci	114	Dentalia	
	Hippocastani	114	Diacodium crocatum. vid. Syrupus	b. 190
	Jujabæ	114	simplex. vid. ibid.	b. 190
	Kinkinæ	112	Diacrydium liquiritia edulcorat.	b. 39
	Ligni Sancti, f. Guajaci	114	rosatum	b. 39
	Sassafras	115	fulphuratum	b. 39
	Mali Punici	114	Diaphoreticum joviale	b. 39
	Mandragoræ, v. Radix	35	martiale	b. 39
	Maffoy	114	Diascordium liquidum Hoffmanni	b. 76
			Ebuli	

I N D E X I.

E buli Baccæ	89	Elixir Propriet. alb. Helmontii	b. 49
Ebur	146	c. acido Boerhaave	b. 50
fossile. vid. Unicornu	152	fine acido Boerh.	b. 50
ustum album	b. 39	fine acido f. dulce	b. 51
Elaterium	b. 39	Helvétii	b. 49
Elæosaccharum Anisi	b. 40	cum acido Paracelsi	b. 50
Aurantiorum	b. 40	cum Rhabarbaro	b. 51
cephal. v. Pulv. stern.	b. 143	Salutis	b. 51
Cinnamomi	b. 40	vitæ Matthioli	b. 51
Citri	b. 40	mulierum	b. 15
Errhinum	b. 40	Vitrioli Mynsichti	b. 52
Macis	b. 40	uterinum	b. 52
Succini	b. 40	Emplastrum adhæsivum Edinburg.	b. 52
Electrum	16	Wadstookii	b. 53
Electuarium de Acoro	b. 40	Emplastrum album coctum	b. 53
Catholicum	b. 40	de Ammoniaco	b. 53
Chalybeatum	b. 40	antipodagricum	b. 53
Diasatyrium	b. 41	pro apoplecticis	b. 53
Diascordii Fracastorii	b. 41	de baccis Lauri	b. 54
gingivale	b. 41	de Belladonna	b. 54
Hieræ picræ simplex.	b. 42	de Betonica	b. 54
lenitivum.	b. 42	Capucinatorum	b. 54
de Manna	b. 42	de Cerussa	b. 54
Meloës proscarabei con-		de Cicuta, cum ammo-	
tra rabiem caninam,	b. 42	niaco	b. 54
Mithridat. Damocrat.	b. 43	Citrinum	b. 55
f. Philon. Romanum	b. 43	ad clavos pedum	b. 55
f. Requies Nicolai	b. 44	de crusta panis	b. 55
resumptivum	b. 44	de Cumino	b. 55
sanans Fulleri	b. 44	Defensivum rubrum	b. 55
Tamarindorum	b. 45	Wepferi	b. 56
Theriacæ Androm.	b. 45	Fel. Wurz.	b. 55
Thebaicum.	b. 46	viride	b. 55
Elemi	124	Diabotantum Blondelli	b. 56
Elixir acidum Dippelii	b. 46	Diachalciteos	b. 57
anticolicum crocatum	b. 47	Diachylon composit.	b. 57
antifebrile	b. 47	simplex	b. 57
aperitivum Clauderi	b. 47	Diapalmæ	b. 57
balsamic. spirituof. Hoffm.	b. 47	Diaphoretic. Mynsicht.	b. 57
pectorale Edinb.	b. 47	Diapompholygos	b. 58
temperat. Hoffin.	b. 48	Diasulphuris Rulandi	b. 58
Cordiale, Garrus	b. 48	Divinum	b. 58
Fuliginis Claud. v. Essent.	b. 72	Filii Zachariæ	b. 58
mastichinum	b. 174	ad fracturas & luxat.	b. 58
Myrrhæ Londinense	b. 48	de Galbano croc. M.	b. 58
pectorale Regis Daniæ	b. 48	griseum	b. 59
balsam. Edinburg.	b. 47	ad herniam	b. 59
Wedelii	b. 49	de Hyoscyamo	b. 59
polychrestum	b. 49	incognitum	b. 59
Halense	b. 49	ischiatricum	b. 59
			Empla-

I N D E X . I.

Emplastrum de Lapide Calamin.	b. 59	Essentia Angelicæ	b. 68
de Lauri baccis	b. 59	anodyna officinalis	b. 68
malacticum c. Gummi	b. 59	Ludovici	b. 68
f. Gummi	b. 60	antarthrit. c. opio Hoffm.	b. 63
mammillare	b. 60	f. opio ejusd.	b. 68
matricale	b. 60	anthypodica Hoffmanni	b. 68
de Meliloto	b. 60	antiscorbutica	b. 69
Mercuriale	b. 60	asæ foetidæ	b. 69
de Minio rubrum	b. 61	Aurantior. spirituosa	b. 71
miraculosum	b. 61	c. vino Malv.	b. 72
nervinum Hoffmanni	b. 61	balsamica Gmelini	b. 69
Nicotianæ	b. 61	Hoffm. v. Elxir	b. 47
Noricum	b. 61	Balsami Peruviani	b. 69
odontalgicum	b. 61	Benzoës composita	b. 70
opodeldoch	b. 62	simplex	b. 70
oxycroceum	b. 62	Calami aromatici	b. 70
de panis crusta	b. 62	Cardamomi	b. 70
ad Podagram	b. 53	Cardui benedicti	b. 70
de Ranis c. Mercurio	b. 63	carminativa Wedeli	b. 70
f. Mercurio	b. 62	Castorei	b. 71
regium Burri	b. 63	Catechu	b. 71
sandalinum	b. 63	Centaurii minoris	b. 71
saponatum Barbette	b. 63	Cephalica	b. 71
faturninum Mynsichti	b. 64	Chacarillæ	b. 72
de scrophularia	b. 64	Chinæ Chinæ simplex	b. 72
de Spermate ceti	b. 64	composita	b. 72
ranarum	b. 64	Croci. vid. Tinctura	
spleneticum	b. 64	Culilawan	b. 72
stipticum	b. 65	dulcis	b. 72
de Tacamahaca	b. 65	Fuliginis Clauderi	b. 72
Triapharmacum	b. 65	Galangæ	b. 73
contra vermes	b. 65	Gentianæ	b. 73
ad verrucas	b. 55	Hyperici	b. 73
vesicatorium	b. 66	Levistici	b. 73
Emulsio externa e nucleis	b. 66	Ligni Aloës	b. 73
violata Mynsichti	b. 66	Sassafras composita	b. 73
Entalia	17	simplex	b. 73
Equi testes	146	Lignorum	b. 74
præparati	b. 202	Lumbricorum terrestrium	b. 74
marini dentes	146	Martiatæ aperitiva	b. 74
Erinaceus combustus	146	Millefolii	b. 74
Essentia Abietis	b. 84	Millepedum	b. 74
Abinthii composita	b. 66	Mumiæ purif. Clauderi	b. 74
simplex	b. 66	Myrrhæ	b. 75
Alexipharmaca Stahlî	b. 67	alcalifata	b. 75
temperat. ejusd.	b. 67	Pareiræ bravæ	b. 75
amara	b. 67	Pimpinellæ albæ	b. 75
Ambræ balsamic. Dippel.	b. 67	Pini f. Abietis	b. 75
liquida	b. 67	Populi vulneraria	b. 75
ficca	b. 67	Scillæ	b. 75
		Essen-	

I N D E X I

Essentia scordii simplex	b. 76	Extractum Esulæ	b. 81
composita	b. 76	Fumariæ	b. 79
Serpentariæ Virginianæ	b. 76	Gentianæ	b. 81
Spicæ Indicæ	b. 76	Guajaci f. Ligni sancti	b. 83
Splenetica Stahlii	b. 76	Hellebori nigri	b. 81
Stomachica polychresta	b. 76	Hederæ terrestres	b. 79
Succini alcalifata	b. 77	Hyoscyami	b. 82
simplex	b. 77	Hyperici	b. 80
G.	b. 77	Jalappæ	b. 83
Terræ Catechu	b. 77	Iridis Florentinæ	b. 81
Theriacalis	b. 77	nostratis	b. 81
Traumatica	b. 77	Lactucæ Sylvestris f. Vi-	
Trifolii fibrini	b. 78	rosæ.	b. 83
Valerianæ composita	b. 78	Ligni Aloës	b. 83
Vincetoxici	b. 78	Guajaci	b. 83
Euphorbium	124	Marocostinum	b. 83
correctum	b. 78	Martis pomatum	b. 84
Extractum Absinthii	b. 78	Millefolii	b. 79
Aconiti	b. 79	Myrrhæ aquosum	b. 84
Agarici	b. 79	Nicotianæ	b. 84
Aloës gummosum	b. 79	Opii	b. 84
Aloës Pœrneri	b. 5	cydoniatum	b. 84
Angelicæ	b. 79	Pæoniæ	b. 81
Anodynum	b. 80	Panchymagogum	b. 85
Aristolochiæ clemat.	b. 79	Phlegmagogum Querc.	b. 85
longæ	b. 79	Pimpinellæ	b. 80
rotundæ	b. 79	Pini	b. 79
Arnicæ	b. 78	Plantaginis	b. 79
Artemisiæ	b. 78	Rhabarbari	b. 81. 85.
Asari	b. 79	Ruthæ	b. 79
Belladonnæ.	b. 80	Sabinæ	b. 79
Bezoardic. Camerarii	b. 80	Sarsaparillæ	b. 81
Bryoniæ	b. 80	Sassafras	b. 80
Calami aromatici	b. 79	Saturni, v. Ceratum Saturni.	
Cardui benedicti	b. 78	Scordii	b. 79
Castorei	b. 81	Sennæ	b. 86
Catharticum	b. 81	Stramonii	b. 86
Catholicum	b. 81	Tanaceti	b. 79
Centaurii minoris	b. 78	Tormentillæ	b. 81
Chamomillæ romanæ	b. 79	Trifolii fibrini	b. 79
Cicutæ	b. 82	Turpethi	b. 80
Cnico-pharmacum	b. 82	Veronicæ	b. 79
Colocynthis	b. 82	Zedoariæ	b. 80
Corticum Chacarillæ	b. 80	Exuviæ serpentum	151
Chinæ Chinæ	b. 80	Faba S. Ignatii	100
Corticis Peruviani gum-		marina	18
mosum	b. 81	Piclurim	104
Crocii	b. 82	Fæcula Ari radicum	b. 86
Diacarthami	b. 82	Bryoniæ	b. 86
Enulæ	b. 80		
Pharm. Wirt. Index.		Ppp	Fæcula

INDEX L

Fæcula Pœoniæ		b. 86 Flores Liliorum convallium	79
Febrifugum Cranii		Linariæ	79
Fel Tauri inspissatum	b. 146	Lupuli salictarii	79
Vitri	143	Mali Persicæ	80
Ficus passæ	12	Malvæ arboreæ	79
Flores Acaciæ	98	Meliloti	80
Æris	76	Naphæ	77
Anethi	b. 4	Nymphææ albæ	80
Anthos	76	Origani	80
Aquilegiæ	76	Papaveris erratici	80
Arnicæ	76	Paralyseos	80
Aurantiorum	77	Perforatæ	79
Balaustiorum	77	Persicorum	80
Basilici	77	Pœoniæ	80
Bellidis minoris, filvestris	77	Primulæ veris	80
rubræ f. hortensis	77	Pseudonardi	81
Benzoës	b. 86	Rhœadis filvestris	80
Betonicæ	77	Rorismarini	76
Borraginis	77	Rosarum albarum	80
Buglossi angustifolii	77	pallidarum	80
latifolii veri	77	rubrar. finarum	80
Calcatrippæ	77	vulgarium	80
Calendulæ	77	Salis armoniaci martiales	b. 87
Calthæ fativæ	77	simplices	b. 87
Cardamines	77	Salviæ hortensis	81
Carthami	78	Sambuci	81
Centaurii minoris	78	Saxifragiæ	81
Chamomillæ Romanæ	78	Scabiosæ	81
vulgaris	78	Spicæ Celticæ	81
Cheiri f. Keyri	78	hortensis	81
Cichorii	78	Indicæ	81
Cnici fativi	78	Stœchadis Arabicæ purpur.	81
Consolidæ regalis	77	citrinæ	81
Convallariæ scapo nudo	79	Sulphuris compositi	b. 87
Cyani cœrulei	77	simplices	b. 87
Delphinii	77	Tanaceti	81
Farfaræ	78	Tiliæ	81
Ferri	12	Tunicæ	82
Galeopsidis	81	Tussilaginis	78
Genistæ	78	Verbasci	82
Granatorum	77	Violarum, purpur. odorat.	82
Hepaticæ nobilis	79	Viridis Æris. vid. Æs viride	
Humili	79	crystall	b. 4
Hyperici	79	Urticæ mortuæ	82
Jasmini	79	Zinci	b. 88
Keyri f. Cheiri	78	Folia Aurantiorum	52
Lavendulæ	79	f. opercula cochlearum	146
latifoliæ	81	Indi	58
Levcoji lutei	78	Lauri	61
Liliorum alborum	79	Lauro-cerasi	61
		Folia	

INDEX I.

Folia Quercus	68	Gummi Colophonia	124
Rubi vulgaris	69	Copal	124
Salicis	69	Elemi	124
Sennæ	71	Euphorbium	124
Vitis	75	Galbanum	125
Folliculi Sennæ	72	Galda	125
Fuligo	134	Guajacum	125
Fungus Bedeguar	140	Gutta	125
cervinus, f. Boletus	139	præparat	b. 89
Chirurgorum, f. Bovista	139	Hederæ	126
Cynosbati	140	Juniperi, v. Sandaracha	129
Melitenfis	139	Kikekunemalo	126
Salicis	139	Kino rubrum	126
Sambuci	139	Laccæ	126
Galanga major	109	Ladanum	127
minor	109	Look	127
Gallæ	101	Mastiche	127
Gallinæ ventriculi tunicæ interior.	146	Myrrha	127
Gelatina cornu cervi citrata	b. 88	Olampi	127
ribium	b. 88	Olibanum	128
Gilla Theophrasti	b. 88	Opopanax, f. Panacis	128
Glacies Mariæ vulgaris	7	Sagapenum	129
Glandes quercinæ	101	Sandaracha Arabum	129
Gleffum	16	Sanguis Draconis	129
Globuli bezoardici	b. 89	Sarcocolla	129
carminativi	b. 88	Senegal, Senica	121. 130
martiales	b. 89	Serapinum	129
moschati	b. 89	Styrax calamita	130
Glycyrrhizæ succus	135	liquida	133
Grana Actes	104	Tacamahaca	130
Kermes	101	Tragacantha	130
Paradifi	109	Guttæ Anglicanæ cephalicæ	b. 89
Tilli, f. Tigliæ	101	Hæmatites	7
Granatus	9	Halcyonium rotundum	16
Granatorum poma	114	Halicacabi baccæ	96
Grossularia nigra	104	Hederæ Baccæ	101
Gummi Ammoniacum	121	Helminthochordon	139
Animæ	121	Hepar Antimon. vid. Croc. Metall.	b. 38
Arabicum	121	Anguillæ præparatum	b. 90
Asæ dulcis	122	Canis rabidi præparatum	b. 90
foetidæ	122	Lupi	148
Asphaltum	15	præparatum	b. 90
Bdellium	122	Sulphuris	b. 90
Benzoë	122	Herba Abrotani maris	47
Camphora	123	foeminæ	56
Cancamum	121. 123	Abfinthii albin	47
Caouthou	123	Pontici	47
Caranna	123	vulgaris	48
Ceraforum	124	Acetofæ	48

INDEX I.

Herba Acetofellæ	48	Herba Cardiacæ	53
Acmellæ	48	Cardui benedicti	53
Aconiti	48	Mariæ	53
Adhatodæ.	48	tomentosi	54
Adianti albi	49	Cassinæ, v. Herb. Apalach.	50
aurei	49	Centaurii minoris	54
nigri	49	Centumnodiæ	54
Agrimoniæ	49	Cerefolii	54
Alceæ	49	Ceterach	54
Alchimillæ	49	Chærefolii	54
Alliariæ	49	Chamædryos	54
Alni	49	Chamæpityos	54
Alfines mediæ	49	Chelidonii majoris	55
Althææ	50	Cichorii hortensis	55
Anagallidis	50	Cicutæ majoris	55
aquaticæ	51	Clematidis	55
Anethi hortensis	50	Cochleariæ	55
Anserinæ	50	Consolidæ majoris	55
Antirrhini	50	mediæ f. Bugulæ	55
Argentiniæ f. Argentariæ	50	minoris	68
Apalachinæ	50	Saracenicæ	55
Aparines	50	Conyzæ cœruleæ	56
Aristolochiæ	51	pulicariæ	56
Arnica	51	Coronopi	56
Artemisiæ	51	Craffulæ majoris	56
tenuifoliæ	63	Crithmi	56
Asari	51	Cupressi	56
Asplenii	54	Cuscutæ majoris	56
Auriculæ muris	66	Cymbalaria	56
Ballotæ	63	Daturæ	73
Balsamitæ	51	Dentis leonis	73
Bardanæ	61	Dictamni Cretici	56
Basilici	51	Digitalis	57. 58
Beccabungæ	51	Doronici	57
Belladonnæ	52	Dracunculi	57
Bellidis	52	Ebuli	57
Betæ	52	Endiviæ	57
Betonica	52	Epaticæ, v. Herb. Hepaticæ	59
Bismalvæ	50	Epithymi	57
boni Henrici	52	Equiseti	57
Borraginis	52	Ericæ	57
Botryos	52	Erysimi	57
Brancæ urfinæ Germ. & Ital.	53	Eupatorii cannabini Avicenn.	57
lupinæ	53	veterum	49
Brunellæ	68	foliis digitatis	57
Buglossæ	53	Euphrasiæ	58
Bursæ pastoris	53	Farfaræ	58
Calaminthæ mont. & vulg.	53	Fœniculi	58
Capilli Veneris	49	f. Folia Indi	58
Caprifolii	53	Fragariæ	58
			Her-

I N D E X

Herba Fumarix	58	Herba Malvæ	63
Galegæ	58	Arboreæ	79
Galeopsidis, v. Lamium album	61	Mari veri Syriaci	63
Gallii	58	Marrubii albi & nigri	63
Gallitrichi	58	Cardiaca dicti	53
Gallium aparine	50	Matricariæ	62
Geranii Robertiani	59	Matrifilvæ	63
Gnaphalii montani	59	Meliloti	63
Gratiolæ Limnesii	59	coeruleæ	63
Hederæ arboreæ	59	Melissæ	63
terrestris	59	Turcicæ	64
Hepaticæ fontanæ	59	Melissophylli	64
nobilis	60	Menthæ	64
stellatæ	63	cattariæ	65
Herniariæ	60	Piperitidis	64
Hispidulæ	59	Mercurialis	64
Hormini	58	Millefolii	64
Hyoscyami	60	Millegranæ	60
Hyperici	60	Morus diaboli	64
Hyssopi	60	gallinæ	49
Jacæ tricoloris	60	Myrti Brabanticæ	65
Jasmini	79	Italicæ	64
f. fol. Indi	58	Napelli	48
Ivæ Artheticæ	54	Nardi silvestris	51
Junci odorati	70	Nasturtii aquatici	65
Juniperi	60	Indici	65
Jusquiami	60	Nepetæ	65
Lactucæ virosæ	61	Nicotianæ majoris	65
Lamii	61	Nummulariæ	65
flore albo	75	Ocymi	51
Lapathi unctuosii	52	vulgatioris	51
Lappæ majoris	61	Ophioglossi	65
Lappulæ hepaticæ	49	Ophthalmica	58
Lavendulæ angustifoliæ	61	Origani Cretici	66
latifoliæ	61	aquatici	57
f. Folia Lauri	61	vulgaris, silvestris	66
Lauro - Cerasi	61	Oxalidis	48
Leontopodii	49	Paraguay	50
Lichenis terrestris cinerei	61	Paridis	66
Islandici	61	Parietariæ majoris, vulgaris	66
arboræi	68	Parthenii	63
Ligustri vulgaris Germanici	62	Pedis leonis	49
Linariæ	62	Pentaphylli lutei	66
Lini cataractici	62	Perfoliatæ	66
Lunariæ racemosæ	62	Personatæ	61
Lupuli salictarii	62	Petroselini	66
Lyfimachiæ luteæ	62	Phytolaccæ	65
purpureæ	62	Pilosellæ f. Gnaphalii montani	66
Majoranæ	62		
Malabathri	58		

INDEX I.

Herba Pilosellæ majoris f. auriculæ muris	66	Herba Scordii nostratis	71
Pimpinellæ sanguisorbæ	67	Scrophulariæ aquaticæ	71
faxifragæ	67	minoris	71
Plantaginis angustifoliæ	67	Sedi	71
latifoliæ	67	Senecionis	71
Polii montani Cretici	67	f. Sennæ folia	71
lutei	67	folliculi	72
Polygalæ	67	Serpilli	72
Polygoni	54	Sideritidis	72
Polytrichi aurei	49	Solani lethalis	52
Populi	67	maniaci	73
Potentillæ	50	vulgaris	72
Praffi	63	Soldanellæ	72
Prunellæ	68	Spigeliæ	73
Ptarmicæ	68	Squinanti	70
montanæ	51	Stramonii	73
Pulegii hortensis, f. cervini	68	Succisæ	64
Pulmonariæ arboreæ	68	Tabaci	65
maculosæ	68	Tamarisci	73
Pulsatillæ	68	Tanaceti	73
Pyrolæ	68	Taraxaci	73
f. Folia Quercus	68	Theæ	73
Quinquæfolii	66	Tlaspi	74
Rorellæ	69	Thuyæ	74
Rorismarini	69	Thymi Cretici	74
Silvestris	69	vulgaris	74
f. Folia Rubi vulgaris	69	Tormentillæ	74
Rutæ capraræ	58	Tota - bonæ	52
hortensis	69	Trichomanis	74
lunariæ	62	Trifolii cervini	57
murariæ	49	fibrini	74
Sabinæ	69	fragiferi	58
f. Folia Salicis	69	pratensis	74
Salviæ hortensis	69	Trinitatis	60
silvestris	70	Tussilaginis f. Farfaræ	58
Sampsuchi f. Majoranæ	62	Verbasci	74
Sanguinariæ	53	Verbenæ	75
Saniculæ	70	fœminæ	57
Santolinæ	56	Veronicæ majoris	75
Saponariæ	70	vulgaris purpureæ	52
Saturejæ	70	Vincæ per vincæ	75
Saxifragiæ albæ	70	Violaræ	75
majoris	67	f. folia Vitis	75
Scabiosæ	70	Virgæ aureæ	55
Scariolæ	70	Viscago	75
Sclareæ	70	Urticæ urentis	75
Schoenanti	70	mortuæ	75
Scolopendrii veri	54	Uvæ urfi	75
vulgaris	71	Vulvariæ	76
Scordii Cretici	71	Uvulariæ	76

Herba

INDEX I.

Herba Xanthii	76	Lapis Auris ceti	148
Hermodactyli. v. Radix	32	Belemnites	7
Hiera picra v. Electuarium	b. 42	Bezoar Occidentalis	141
Hippocastanum vulgare	101	Orientalis	142
Hippopotami dentes	146	Porci	150
Hirci sanguis exsiccatus	147	Bufonites, f. Bufonius	6
Hirundines combustæ	147	Calaminaris	6
Hirundinum nidi	147	præparatus	b. 92
Hordeum. vid. Semen	90	Calcarius	6
Hyacinthus	9	Carbunculus	9
Hydromel simplex	b. 90	Carneolus, f. Sardius	9
Hypocistidis succus	135	Carpionis	144
		causticus Chirurgorum	b. 92
Jalappa	33	Ceraunius	7
Ichthyocolla	147	Chrysolithus, f. Chrysopasius	9
Ikan	33	Coromandel	142
Indigo	12	Crytallus montana	7
Infusum laxativum Mannagettæ	b. 90	Divinus	b. 92
Viennense	b. 90	f. Glacies Mariæ vulgaris	7
Jujaba. vid. Cortex	114	Moscovit.	6
Jujubæ	102	de Goa	b. 92
Juniperi baccæ	102	Granatus	9
gummi	129	Hæmatites	7
summitates	60	Histricinus Malacensis	150
Julapium e camph. acet.	b. 90	Hyacinthus	9
rosatum	b. 91	Infernalis	b. 93
sambucinum	b. 91	Judaicus	7
violarum	b. 91	Lazuli	7
		Lyncis	7
Kermes grana	101	Magnes	8
minerale	b. 91	Malacensis	150
		Manati	148
Lac	147	Medicamentosus	b. 93
Lunæ	2	Nephriticus	8
Sulphuris	b. 91	Ophthalmicus	b. 92
Virginis	b. 92	Osteocolla	8
Lacca coerulea	12	Percarum	150
Florentina	12	Porcinus	150
pictoria in globulis	12	Prunellæ	b. 92
Ladanum Gummi	127	Pumex	8
Lapides cancrorum	143	Rubinus	9
carpionum	144	Sapphirus	9
Lapis Aëtites	5	Sardius	9
Alabastrum	6	Selenites	8
Amethystus	8	Septicus	b. 32
Amiantus	6	Silex	8
Aquilæ	5	Smaragdus	9
Armenius	6	Smiris	8
Asbestus	6	Specularis	6
		Spongiorum	8
		Q q q 2	Lapis

INDEX I.

Lapis Talcum	8	Liquor f. Liguamen Myrrhæ vid.	
Topasius	9	Oleum	b. 114
Lafer foetidum, Syriacum	122	Nitri fixi	b. 97
Laudanum cydoniatum	b. 94	oleosus Sylvii	b. 156
diureticum	b. 93	probatorius	b. 97
hystericum	b. 93	Salinus laxativus	b. 97
liquidum Sydenhamii	b. 94	Stypticus Weberi	b. 97
Opiatum	b. 94	Tartari	b. 97
Lauri Baccæ	102	spleneticus	b. 98
Lemnochordon	139	Terræ foliatæ tartari	b. 98
Leporum tali	147	Visceralis	b. 98
Lepus combustus	147	vulnerar. Bilgueri seu potius	
Lignum Agallochum	116	Thedenii.	b. 98
Aloës	116	vulnerar. miner. Dippel.	b. 98
Aspalathum	117	veget. Dippel.	b. 99
Buxi arborescentis	117	Lithargyrium Auri	13
Colubrinum	117	Argenti	13
Cupressinum	117	Lithomarga	2
Ebenum	117	Loch ad Asthma	b. 99
Guajacum	118	de Farfara	b. 99
Juniperinum	118	de pulmone vulpis	b. 99
Lentiscinum	118	fanum & expertum	b. 100
Moluccense	118	saponatum	b. 100
Nephriticum	119	de Scilla	b. 99
Pavana	118	Lucii piscis mandibulæ	147
Quasiæ amaræ	119	præparatæ	b. 102
Rhodium	119	Lupi hepar	148
Sanctum	119	præparatum	b. 90
Sandalinum album	119	Lumbrici terrestres	148
citrinum	119	præparat.	b. 100
rubrum	120	Lycii succus	135
Sassafras	120	Lycopodium	91. 140
Serpentarium officinale	117	Macis	109
Solani Dulcamaræ	120	Macro-Piper	110
Suberis	120	Magisterium Antimon. diaphor. five	
Xyloaloës	116	Materia perlata	b. 102
Limatura Chalybis f. Martis	11	Coralliorum	b. 100
Lim. Mart. sulphurata	b. 95	Gummi guttæ	b. 100
Linimentum volatile	b. 95	Jalappæ. vid. Refina	b. 147
Liquid-ambra	131	Marcafitæ	b. 100
Liquiritia cocta alba. vid. Bacilli	b. 26	Margaritarum	b. 100
citrina. vid. ibid.	b. 26	Matris perlarum	b. 100
Liquiritiæ succus	135	Ocul. Cancrorum	b. 100
Liquor anodynus mineralis	b. 95	Saturni	b. 101
bellosti, vid. Aqua grisea		Scammonii. v. Refina	b. 147
cornu cervi succin. offic.	b. 96	Sulphuris. vid. Lac.	91
albus	b. 97	Magnes	8
ad gangrænam	b. 97	arsenicalis	b. 101
Manchini	b. 96	Magnesia alba	b. 101
		Magne-	

I N D E X I.

Magnesia calcinata. f. usta	b. 102	Mercurius vivus	10
Malabathrum. vid. Folia Indi	58	vivus depuratus	b. 106
Malicorium. vid. Cort. Granator.	114	Mespili exsiccati	102
Malta	90	Millepedes	141
Manati lapis	148	præparati	b. 106
Mandibulæ lucii piscis	147	Minera Martis solaris	13
præparatæ	b. 102	Antimonii	10
Manna calabrina	135	Minium rubrum	13
Manus Christi perlatæ. vid. Sacchar.		Mithridatium. vid. Electuarium	b. 43
perlatum	b. 148	Mixtura simplex alba	b. 107
Maranta Galangæ	109	antiscorbutica	b. 169
Marcafita	13	Ludovici	b. 107
Margaritæ	17	ordinaria	b. 107
præparatæ	b. 102	tonico nervina Stahlî	b. 107
Mars fulphuratus. vid. Chalybs	b. 33	topica Dippelii	b. 107
Martis minera solaris	13	Momordica balsamina	102
Massa Liquiritiæ alba	b. 102	Monoceros verum	152
fusca	b. 102	Mersuli antimoniales Kunkelii	b. 108
pro fornace, odorifera	b. 102	ad ardorem ventriculi, vel	
Mastiche	127	fodam	b. 108
Mater Perlarum	18	Imperatoris	b. 108
foluta	b. 157	purgantes	b. 108
Materia perlata	b. 102	contra vermes	b. 108
Mechoacana alba. vid. Radix	35	Moschus	148
nigra vid. ibid.	35	Mucharum Rosarum	b. 109
Meconium Thebaicum	136	Mucilago mercur. Plenckii	b. 109
Medulla Lunæ	2	Mumia	148
Solis	2	Persica nativa	149
Medulla Saxorum	2	Mures marini	149
Mel	135	Muscæ Hispanicæ	144
anthosatum	b. 103	Muscus Acaciæ	140
cannæ	137	arboreus	140
despumatum simplex	b. 103	corallinus, f. marinus	16
mercuriale	b. 103	quernus	140
rosatum simplex	b. 103	terrestris, clavatus	140
solutivum	b. 103	Mustelæ piscis vertebræ	149
sambuci	b. 103	Myristicæ	110
violarum	b. 103	Myrobalani Belliricæ, rotundæ	102
Melaguetta	109	Chebulæ	102
Meloe Profca rabæus	150	citrinæ	102
Melitochordon	139	Emblicæ	102
Mercurius alcalifatus	b. 104	Indæ	102
dulcis	b. 104	Myrrha	127
præcipit. albus	b. 105	Myrti baccæ	103
flav. v. Turpeth.		Myrtilli exsiccati	103
minerale	b. 215	Myxæ	104
ruber	b. 105		
viridis	b. 105	Nacra perlarum	18
sublimatus corrosiv.	b. 106	Napellus	48
vitæ	b. 106	Naphta nitri	b. 109
Pharm. Wirt. Index.		R r r	Naphta

I N D E X I.

Naphta vitrioli	b. 95	Oleum destill.	Camphoræ	b. 118
Nardus Celtica. vid. Radix	45		Cardamomi	b. 117
Indica vid. ibid.	45		Carvi	b. 117
Natrum fontanum L.	4		Caryophyllorum	
Nephrocatharticum Foresti	b. 163		aromat.	b. 117
Nidi hirundinum	147		Ceræ	b. 119
Nihilum album	13		Chamomillæ	b. 116
griseum	15		Chærefolii	b. 116
Nitri naphta	b. 109		Cinnamomi	b. 117
Nitrum	3		Citri	b. 119
alkalifat. vel fixum	b. 109		Coriandri	b. 117
antimoniatum	b. 109		Cornu Cervi	b. 119
crudum	3		Corticum Aurantio-	
crystallifat. & depurat.	b. 110		rum	b. 119
perlatus	b. 110		Citri	b. 119
rosatum	b. 110		Cumini	b. 117
saturninum	b. 110		Fœniculi	b. 117
tabulatum	b. 93		Galbani	b. 119
vitriolatum	b. 24		Guajaci	b. 118
Nuces Cupressi	100		Hyssopi	b. 116
Indicæ conditæ	b. 34		Juniperi e baccis	b. 117
Juglandes conditæ	b. 34		e Lateribus	b. 119
moschatæ	110		Lavendulæ	b. 116
Pineæ	103		Lauri baccarum	b. 117
Pistaciæ	104		Ligni Rhodii	b. 117
Vomicæ	103		Santal. citr.	b. 117
Nucistæ	110		Sassafras	b. 117
Nuclei Ceraforum	99		Macidis	b. 117
Perficorum	104		Majoranæ	b. 116
Pineæ, Pigneoli	103		Mastiches	b. 119
			Melissæ	b. 116
Ochra	2		Menthæ crispæ	b. 116
Oculi Cancrorum	143		Menthæ piperitidis,	b. 116
			Millefolii	b. 116
			Myrrhæ	b. 119
			Origani	b. 116
Oleum destill. Absinthii	b. 116		Philosophorum	b. 119
Ammoniaci	b. 119		Piperis	b. 117
Anethi	b. 117		Pulegii	b. 116
Angelicæ	b. 117		Rhodii	b. 117
Animale Dippelii	b. 117		Rorismarini	b. 116
Anifi	b. 117		Rutæ	b. 116
Antimon. vid. Anti-			Sabinæ	b. 116
mon. Butyrum	b. 6		Salviæ	b. 116
Artemisiæ	b. 116		Santali citrini	b. 117
Asphalti	b. 118		Saponis	b. 120
Aurantiorum	b. 119		Sassafras	b. 117
Benzoës	b. 118		Saturejæ	b. 116
Buxi	b. 130		Serpilli	b. 116
Cajeput	156			
Calami aromatici	b. 117			Oleum

I N D E X I.

Oleum destill. Succini	b. 120	Oleum Rutæ	b. 115
Sulphuris	b. 120	Scorpionum simplex	b. 115
Tacamahacæ	b. 119	compositum	b. 115
Tanaceti	b. 116	septem Florum	b. 116
Tartari foetidum	b. 179	Spermatis Ranarum	b. 116
Terebinthinæ	b. 120	Tartari per deliquium	b. 97
Thymi	b. 116	foetidum	b. 179
Vitrioli	b. 120	Terræ	b. 120
dulce	b. 95	Verbasci	b. 116
Zedoariæ	b. 117	Violarum	b. 116
Zinziberis	b. 117	Vulpinum	b. 116
express. Amigdal.	b. 110	Olibanum	128
Cacao	b. 113	Opercula cochlearum	146
Hyoscyami	b. 113	Opium	136
Lauri	b. 113	Opobalsamum	132
Lini	b. 114	ficcum	132
Nucis moschatae	b. 115	Opopanax	128
Nucum jugland.	b. 115	Orleana	14
Ovorum	b. 115	Orvietanum	b. 121
Papaveris	b. 115	Ossa de Cordibus Cervi	149
Abfinihii coctum	b. 110	Sepiæ	149
Anagallidis	b. 111	Osteocolla	8
Anethi	b. 111	Ova Struthionis	151
Bezoardicum Wedelii	b. 111	Ovorum testæ	150
Cajeput	156	Oxycoccus	103
Capparum	b. 111	Oxycroceum. vid. Emplastrum	b. 62
Carminativum	b. 111	Oxymel Æruginis, v. Unguentum	
Castorei	b. 111	Ægyptiacum.	b. 217
Chamomillæ	b. 112	colchicum	b. 121
Cheiri	b. 112	scilliticum	b. 121
Colocynthis	b. 112	simplex	b. 122
Costinum	b. 112	Oxyfaccharum scillit. Lond. v. Syrup.	
Euphorbii	b. 112	scillæ	b. 198
Florum Slotani	b. 112	Palampissa	128
Formicarum	b. 113	Panacea mercurialis	b. 122
Hyperici	b. 113	solutiva. vid. Magnesia	b. 101
Liliorum alborum	b. 114	Pancopal	124
Lumbricorum terrestr.	b. 114	Panis Cydoniorum cum aromat.	b. 122
Majoranæ	b. 114	Papaveris capita	98
Mastichinum	b. 114	Paradisi grana	109
Menthæ	b. 114	Paraguay	50
Momordicæ	b. 114	Pareira brava. vid. Radix	38
de Mucilaginibus. v. Emplast.		Paridis baccæ	103
diabot. Blondelli	b. 56	Passulæ majores	103
Myrrhæ per deliquium	b. 114	minores, Corinthiacæ	104
Nicotianæ	b. 115	laxativæ	b. 122
Petræ album	13	Pasta Altheæ	b. 122
nigrum	14	Pate de Reglisse	b. 123
rubrum	14	Pavonis stercus	149
Rosatum coctum	b. 115	Pedra	

I N D E X I.

Pedra de porco	150	Pineæ f. Pigneoli nuclei	103
Percarum lapis	150	Piper album, rotundum	110
Perlæ	17	Hispanicum	110
Perlarum mater	18	Jamaicum	83
foluta	b. 157	longum	110
nacra	18	nigrum, rotundum	110
Perficorum nuclei	104	Pistaciæ	104
Petroleum. vid. Oleum	13	Pix	128
Philonium Romanum	b. 123	navalis	128
Phoenicites	7	Plumbum ustum	b. 129
Phosphorus urinæ	b. 123	Pompholyx. vid. Nihilum	13
Phu vid. Radix	39	Porcinus lapis	150
Pichurim faba	104	Priapus cervi	145
Pila marina	16	ceti	141
Pilæ Damarum	140	tauri	151
Pilulæ Æthiopicæ	b. 123	Propolis	155
Aloëphanginæ	b. 123	Pruna Damascena	104
alterantes Plumeri	b. 123	agrestia	96
de Ammoniaco	b. 124	laxativa	b. 122
Angelicæ	b. 124	Pulmo vulpis	152
aperientes Stahlii	b. 124	præparatus	b. 129
aureæ	b. 124	Pulpæ Cassiæ	b. 129
Balsamicæ Mortonianæ	b. 124	Passularum	b. 130
cachecticæ	b. 125	Prunorum	b. 130
cephalicæ	b. 125	Tamarindorum	b. 130
Cochiæ Rhafis	b. 125	Pulvis contra abortum, c. Sacch.	b. 130
de Cynoglossò	b. 125	aborbens Wedelii	b. 130
c. castoreo	b. 125	contra acredinem	b. 132
Emanuelis	b. 125	albus Viennens.	b. 145
foetidæ majores	b. 125	alexipharmacus Camer.	b. 130
Hieræ cum agarico	b. 126	Rollwag.	b. 130
hydropicæ Bontii	b. 126	ruber	b. 130
hystericæ	b. 126	alterans Plumeri. v. Panacea	
Lucis majores	b. 126	mercurialis	b. 122
Marocostinæ vid. Extract.	b. 83	anodinus Camerarii	b. 131
Majores Hoffmanni	b. 127	Ludovici	b. 131
Mastichinæ	b. 127	anonymus	b. 131
Mercuriales	b. 127	antarthriticus Wepferi	b. 131
Opticæ	b. 126	anti-colicus Camerarii	b. 135
Polychrestæ balsamicæ	b. 127	antilyffus Lond.	b. 131
Starckey	b. 128	antispasmodicus nitrosus	b. 132
Scilliticæ	b. 128	bezoardicus alb. Ludov.	b. 132
solares Wildegansii	b. 128	Anglicus compl.	b. 132
spleneticæ	b. 128	incompl.	b. 132
de Styrace sine ambra	b. 128	Halenfis	b. 132
de Succino Cratonis	b. 129	Rollwagii	b. 130
auctæ	b. 128	Sennerti	b. 133
Tartareæ Bontii	b. 129	cachecticus Quercetani	b. 133
Schroederi	b. 129	ad calculum	b. 133
de Terebinthina	b. 129	Carthusianorum. v. Kerm. min.	b. 91
		Pulvis	

INDEX I.

Pulvis contra casum	b. 133	Pulvis resolvens Stahlii simplex	b. 141
Cephalicus albus	b. 133	compos.	b. 142
Camerarii	b. 134	Scillæ compositus Stahlii	b. 142
Winteri	b. 134	sternutatorius alb. Camerar.	b. 143
Cervinus Camerarii	b. 134	Gmelini	b. 143
e chelis cancror. pretios.	b. 134	Nopsii	b. 143
minus pretios.	b. 134	variegatus	b. 144
Comitis de Warwick	b. 135	viridis	b. 143
confortans Camerarii	b. 135	stomachicus Birckmanni	b. 144
Contrayervæ compositus	b. 135	ad strumas cum saccharo	b. 144
Cordialis Cellenf.	b. 135	temperans	b. 144
Cornachinus	b. 135	ad tormina infantum	b. 145
Cosmeticus ad manus	b. 136	Tunchinensis	b. 145
dentifricius	b. 136	contra vermes	b. 145
digestivus	b. 136	Viennensis albus	b. 145
Doweri	b. 136	niger	b. 138
dysentericus	b. 136	vitæ Imperatoris	b. 145
ad Dysuriam Wepferi	b. 136	Pumex	8
epilepticus Cellarii	b. 136	Quercus folia	68
ad Guttetam Riverii	b. 137	glandes	101
Holfaticus	b. 137	viscus	121
Marchionis	b. 137	Radix Acetosæ	18
mirabilis Mynsichti	b. 137	Acori veri	18
niger Viennensis	b. 138	vulgaris	19
ruber	b. 138	Alcannæ veræ	19
Viennensis niger	b. 138	Alceæ vulgaris	19
Erysipelatodes Mynsichti	b. 138	Allii fativi	19
ad flatum	b. 138	Althææ	19
fumalis odoratus	b. 138	Amaræ dulcis	19
Haugii	b. 138	Anchusæ	19
Galactopœus	b. 139	Angelicæ fativæ	20
Haly, contra Phthisin	b. 139	silvestris	20
hepaticus ruber	b. 139	Anthoræ	20
hystericus	b. 139	Apii hortensis	39
incidens Stahlii	b. 139	palustris	20
lenitivus tartarifatus	b. 140	silvestris	37
Mantuanus	b. 140	Aquilegiæ	20
Martialis Anglicus	b. 140	Ari	20
mitigans Wepferi	b. 136	præparata	b. 146
ad morsum canis rabidi	b. 140	Aristolochiæ clematitidis	20
nephriticus pretiosus	b. 140	fabaceæ	21
Pannonicus ruber ordin.	b. 141	longæ veræ	21
minus pretios.	b. 140	rotundæ veræ	21
ad partum	b. 141	vulg.	21
pectoralis balsam. Wedel.	b. 141	Arnicæ	21
resolv. Wedel.	b. 141	Artemisiæ	22
pleuriticus	b. 141	Asari	22
Mynsichti	b. 142	Asparagii	22
præcipitans Stahlii	b. 142		
purpureus Anglicus	b. 142		

I N D E X I

Radix Asphodeli	22	Radix Dentis leonis	46
Barbæ caprinæ	22	Diptamni f. Dictamni	29
Bardanæ	22	Dipsaci	29
Been albi	22	Doronici Romani	29
rubri	23	Dulc-amaræ	19
Betæ rubræ	23	Ebuli	29
Biftortæ	23	Elaterii	27
Borraginis	23	Ellebori albi	29
Brittanica	23	nigri	29
Brusci	23	Enulæ	30
Bryoniæ	23	Eryngii	30
Mechoacannæ albæ	35	Efulæ	30
Buglossi	24	Farfaræ	30
arvensis annui	19	Filicis	30
latifolii, veri urbani	23	Filipendulæ	31
Caa apia	24	Fœniculi	31
Calami aromatici	24	porcini	39
Calcitrapæ	24	Fragariæ	31
Capparis	24	Fraxinellæ	31
Cardopatii	24	Galangæ, majoris & minoris	109
Cardui benedicti, f. sancti	24	Gensing f. Ginseng	36
Caroli Sancti	24	Gentianæ albæ.	31
Caryophyllatæ	25	cruciatæ minoris	31
Cassumuniar	25	Indicæ	31
Cavæ. vid. Rad. Aristoloch. rot.	21	majoris luteæ	31
Chelidonii majoris	25	nigræ	32
minoris	25	Gladioli lutei	19
Chinæ	25	Glycyrrhizæ	34
Cichorei hortens. fativi	26	Graminis	32
agrest. f. silvestr.	26	Helenæ Sanctæ	32
Cipo de Cameras	26	Hellebori. vid. Rad. Ellebori	29
Colchici alba radice	32	Hermodactyli	32
communis, autumnal.	26	Hirundinariæ	32
Colombo	26	Hyoscyami	33
Colubrinæ. vid. Rad. Biftortæ	23	Hypocacuanhæ	33
Consolidæ majoris	26	Jalappæ	33
Contrajervæ	26	Ikan	33
novæ, albæ, major.	27	Imperatorix	34
Contrajervæ Virginianæ	45	Ipecacuanhæ	34
Costi amari	27	Iridis Florentinæ	34
dulcis	27	nostratis	34
Cucumeris silvestris f. asinini	27	Lapathi acuti	34
Curcumæ	27	latifolii hortensis	41
Cyclaminis	28	rotundifolii hortensis	41
Cynoglossæ majoris vulgaris	28	Levistici	34
Cyperi longi odorati	28	Liliorum alborum	34
odoris Peruviani	26	Liquiritiæ	34
rotundi	28	Lopez	35
Dentariæ majoris	28	Malvæ	35
minoris	28	Mandragoræ	35

Radix

INDEX. I.

SSS 2

I N D E X I.

Rhaponticum vid. Radix	42	Sal Cornu Cervi volatile	b. 151
Rhinocerotis cornu	150	Digestivum	b. 153
Ribes cond. vid. Condita	b. 34	Egranum	4
nigra	104	Ebshamenfe	4
Risigallum	14	Febrifugum Sylvii	b. 153
Roob Berberum	b. 147	Gemmæ	4
Ceraforum	b. 147	Herbarum	b. 150
Cydoniorum	b. 148	Lumbricorum terrestr. volat.	b. 154
Cynosbati	b. 148	Margaritarum	b. 151
Ebuli	b. 148	Marinum	4
Juniperi	b. 148	Martis, vid. Vitriolum Martis	b. 217
Mororum	b. 147	Matris perlarum	b. 151
Nucum	b. 148	Mirabile Glauberi	b. 153
Ribium	b. 147	Oculorum cancrorum	b. 151
Rubi idæi	b. 147	Petræ	3
Sambuci	b. 148	polychrestum e nitro & sulph.	b. 154
Rorella. vid. Herba	69	de Seignette	b. 154
Rosfolis des fix graines. vid. Aqua		sedativum Homberg.	b. 154
carm. per infus.	b. 12	Sedlizenfe	4
Rotulæ Berberum	b. 148	f. Soda Hispanica	5
Diaireos	b. 148	Succini volatile	b. 155
Manus Christi	b. 148	essentiale Tartari f. Acidum	
contra vermes	b. 149	Tartari crySTALLISATUM.	b. 152
Rubetæ terrestres majores	143	Tartari fixum	b. 155
Rubi Idæi fructus	104	volatile	b. 155
Rubinus	9	Tackenii	b. 155
Rubricafabrilis	2	vegetabile	b. 200
Rupicaprarum pilæ	140	Viperarum volatile	b. 156
Saccharum	137	Vitri	12
candisatum	137	Vitrioli narcoticum	b. 155
clarificatum	b. 149	vomitorium	b. 88
lactis	b. 149	Volatile cornu cervi	b. 151
liquidum	137	lumbric. terrestr.	b. 154
perlatum	b. 148	oleosum	b. 156
rosatum tabulatum	b. 149	Angelicæ	b. 156
Saturni crySTALLISAT.	b. 149	Sylvii	b. 156
Thomæ	137	ficcum Anglicum	b. 151
Sagapenum	129	fuccini	b. 155
Sagu	136	tartari	b. 155
Sal Absinthii	b. 150	Tackenii	b. 155
Acetosæ essentiale	b. 152	viperarum	b. 156
Acetofellæ essentiale	b. 152	urinæ	b. 156
alcali volatile	b. 150	Sandalum	119
vulgare	3	Sandaracha Arabum	129
Ammoniacum f. Armoniacum	4	Græcorum	14
depuratum	b. 150	Sandix, v. Minium	14
Anglicum laxativum	4	Sambuci bacæ exsiccatæ	104
Anglicum volatile	b. 151	Sanguis draconis	129
Coralliorum	b. 151	hirci præparatus	b. 155
		exsiccatas	147
		Sapo	

I N D E X I.

Sapo chymicus Dippelii	b. 107	Semen Citri	87
medicatus	b. 155	Citrulli	87
tartareus	b. 156	Cnici	86
Sapphirus	9	Coccognidii	87
Sarcocolla	129	Cochleariæ	87
Sarda	9	Colocynthis	87
Sarsaparilla. vid. Radix	43	Coriandri vulgaris	87
Sassafras. vid. Lignum	120	Cucumeris fativi	88
Scammonium, f. Scammonea	137	Cucurbitæ	88
Scarabæus unctuarius	150	Cumini	88
Schoenantum. vid. Herba	70	nigri	92
Scillæ præparatio	b. 156	Cydoniorum	88
Scinci marini	151	Cymini	88
Sebesten	104	Cynæ	87 b. 35
Sego	136	Cynosbati	88
Selenites	8	Dauci Cretici	88
Semen Abelmoschi	82	Germanici vulgaris	87
Acetosæ	82	Ebuli	89
Agni casti	82	Endiviæ albæ	89
Alkekengi	83	Erucae	89
Altheæ	83	Ervi veri	92
Ammeos	83	Fabarum	89
Amomi	83	Fagopyri	89
Anethi	84	Foeniculi Cretici, Romani	89
Angelicæ	84	vulgaris, German.	89
Anisi stellati, Indici	84	Fœni græci, f. Fœnugræci	90
vulgaris	84	Fraxini	90
Apii fativi	84	Genistæ angulosæ	90
Aquilégiæ	84	Gossypii frutescentis	85
Asparagi fativi	84	Halicacabi	83
Atriplicis hortensis	84	Hordei	90
Aurantiorum	85	Hyoscyami albi	90
Badianæ	84	Hyperici	90
Bardanæ	85	Ibisci	83
Basilici	85	Ketmiæ Ægyptiasæ	82
Berberum	85	Lacryma Job	91
Bombacis	85	Lactucæ	91
Brassicæ rubræ	85	Lapathi acuti	91
Buniadis	92	Lappæ majoris	85
Cannabis fativæ	85	Levistici	91
Cardui benedicti	85	Lini	91
Mariæ	86	Lithospermi. vid. Milii solis	92
Carthami	86	Lupinorum	91
Carvi	86	Lycopodii	91
Cataputicæ majoris	86	Mali Citrei	87
minoris	86	Malvæ	92
Chærefolii	86	Melonum	92
Cicerum rubrorum	87	Milii Solis	92
Cichorii hortensis, fativi	87	Napi fativi	92
Cinæ f. Cynæ	87	Nasturtii hortensis	92
Pharm. Wirt. Index.			

I N D E X I.

Semen Nigellæ	92	Sevum cervinum	153
Ocymi vulgationis	85	hircinum	153
Orobi	92	Sief album	b. 156
Oryzæ fativæ	92	Silex	8
Papaveris albi	93	Siliqua dulcis	105
nigri	93	purgatrix	98
Perfoliatæ	93	Sinopsis veterum	2
Petrofelini Macedonici	93	Smaragdus	9
vulgaris	93	Smiris	8
Phellandrii aquatici	93	Soda Hispanica	5
Plantaginis	93	Solutio Coralliorum	b. 156
Pœoniæ	93	Matris Perlarum	b. 157
Portulacæ	93	Oculorum Cancrorum	b. 157
Pfyllii	94	Sorbi torminalis baccæ	105
Pulicariæ	94	Sparadrap, f. tela Gualth.	b. 157
Raparum	94	Species Diambriæ	b. 157
Raphani	94	Dianisi	b. 157
Ricini vulgaris	86	Dianthos	b. 157
Rufci	94	contra Apoplexiam	b. 158
Rutæ	94	aromaticæ caryophyll.	b. 158
Sabadilli	94	rosatæ	b. 158
Sambuci	94	Diaboracis	b. 158
Sanctum f. Santonicum	87	cephalicæ pro cucuphis	b. 164
Saxifragiæ	94	epithem.	b. 164
Scariolæ	89	Diacinnamomi	b. 158
Sesami	95	cordiales temperatæ	b. 159
Seseli Cretici	95	Diacretæ Camerarii	b. 159
Massilensis	95	Mynsichti	b. 159
Sinapi albi, hortens	89	pro Epithemate cordis &	
Rapi folio, femine rufo	95	pulsuum	b. 164
Sophiæ Chirurgorum	95	de Gemmis frigidæ	b. 159
Staphidis agriæ	95	Hieræ picræ	b. 160
Sumach	95	de Hyacintho	b. 160
Tanaceti	96	Diajalappæ Mynsichti	b. 160
Thlaspios arvensis	96	Imperatoris	b. 160
contra Vermes	87	Diaireos simplices	b. 160
Violarum, purpur. martiar.	96	lætificantes Rhafis	b. 161
Vitidis	82	Diamargarithæ calidæ	b. 161
Urticæ Romanæ	96	frigidæ	b. 161
vulgaris	96	Diarrhodon Abbatis	b. 161
Zedoariæ	87	Tabaci profumo officin.	b. 162
Senegal, Senica	121. 130	Camer.	b. 161
Sennæ folia	71	Diatrion sandalon	b. 162
folliculi	72	Diatragacanthæ frigidæ	b. 162
Serapinum	129	Diaturbith, cum rhabarb.	b. 162
Sericum crudum	151	Decocti avenæ	b. 163
tostum	b. 156	carminativi	b. 164
Serpentaria Virginian. vid. Radix	45	emollientes	b. 164
Serpentum exuviae	151	florum & fruct.	b. 165
Sevum bovinum	153	ad gangrænam	b. 165
		Species	

I N D E X I.

Species Decocti pro gargarismate		Spiritus Formicarum	b. 172
adstring. & emoll.	b. 165	Fuliginis	b. 172
lignorum	b. 166	Juniperi	b. 173
antinephritici	b. 163	Lavendulæ	b. 173
nigri	b. 166	ligni Guajaci	b. 173
pectoralis	b. 166	Liliorum convallium]	b. 173
antipodagrici Vien-		Lumbricor. terr. vinosi.	b. 173
nensis	b. 163	volat.	b. 173
pro potu infant.	b. 166	massichinus	b. 174
vulner.	b. 167	matricalis	b. 174
corr. Parac.	b. 167	Melissæ comp. vid. Aqua	b. 19
Specificum Antatrophum Wepferi	b. 167	simplex	b. 174
antihect. Poterii. vid.		Mellis	b. 174
Antihecticum	b. 6	Menthæ	b. 174
cephalicum Michaëlis	b. 167	Mindereri	b. 174
febrifugum Craanii	b. 168	Nitri acidus	b. 174
antifebrile Crollii	b. 167	anticolicus	b. 175
jalappinum	b. 168	concentratus	b. 175
tartari pharyng. Zobel.	b. 168	dulcis	b. 175
Sperma Ceti	145	panis	b. 175
Sperniola Crollii	b. 168	rosarum per fermentat.	b. 176
Sphæra marina	16	cum vino	b. 176
Spica Celtica. vid. Radix	45	Salis Ammon. anisatus	b. 176
Indica. vid. ibid.	45	aromat.	b. 176
Spinæ cervinæ baccæ	105	simplex	b. 176
dorsi Mustelæ piscis	149	lacteus	b. 177
viperarum	151	volat. vin.	b. 177
Spiritus Æruginis	b. 168	causticus	b. 177
Angelicæ	b. 169	coagulatus	b. 177
Anisi	b. 169	commun. acidus	b. 177
Anthos	b. 169	concent.	b. 178
Antiscorbuticus Drawisii		dulcis	b. 178
f. Mixtum simplex anti-		Sambuci ex baccis	b. 171
scorbutica	b. 169	floribus	b. 178
aperitivus Penoti	b. 169	Serpilli	b. 178
Balsami Peruviani	b. 170	fulphuris per campanam	b. 179
Balsamicus albus	b. 169	Tartari simplex	b. 179
Bezoardicus Bussii	b. 170	volatilis. v. Sal.	b. 155
carminativus Sylvii	b. 170	Terebinthinæ	b. 179
de tribus	b. 170	Theriacalis	b. 180
Castorei comp. Lond.	b. 170	camphorat.	b. 180
Ceraforum nigrorum	b. 171	Trifolii fibrini	b. 180
Cochleariæ	b. 171	Veneris	b. 168
cornu Cervi	b. 171	Viridis æris	b. 168
ad usus externos	b. 172	Vini camphoratus	b. 180
corticum Aurantiorum	b. 172	rectificatus	b. 180
Citri	b. 172	tartarifatus	b. 180
Croci	b. 172	Vitrioli dulc. v. Liq. anodyn.	
Cydoniorum	b. 171	mineralis	b. 95
Ebuli	b. 171	coagulatus	b. 181
			Spiri-

INDEX I.

Spiritus Vitrioli philosophicus	b. 181	Syrupus Atriplicis Mexicanæ	b. 187
simplex f. vulg.	b. 181	balsamicus	b. 184
urinæ	b. 181	Bellidis e succo	b. 184
Spodium album	b. 39	Berberum	b. 185
Spongia cynosbati	140	Betonicæ	b. 185
marina	16	Borraginis	b. 185
tofta	b. 181	Buglossi	b. 185
Squilla. vid. Radix	44	Brunellæ	b. 185
Stella terræ	8	Bryoniæ	b. 186
Stercus caninum album	141	Capillor. veneris comp.	b. 186
pavonis	149	simpl.	b. 186
Stibium	10	Cardiacus	b. 186
Stincus marinus	151	Cardui benedicti	b. 186
Stipites Solani Dulcamaræ	120	Cascarillæ	b. 193
Storax calamita	130	Centaurei minoris	b. 186
liquida	133	Ceraforum acidorum	b. 187
Struthionis ova	151	Chacarillæ	b. 193
Succinum	16	Chamomillæ	b. 187
præparatum	b. 181	Chenopodii	b. 187
Succus Acaciæ Ægyptiacæ	133	Chinæ Chinæ	b. 193
Germanicæ	134	de Cichorio c. Rhabarb.	b. 187
Acetofellæ	b. 181	Cinnamomi	b. 187
Berberum	b. 181	Citri e toto	b. 188
Citri	b. 181	Cochleariæ	b. 188
Cydoniorum	b. 181	Contrayervæ	b. 188
Glycyrrhizæ	135	composit.	b. 188
Hypocistidis	135	Coralliorum	b. 188
Liquiritiæ	135	Corticum Aurantiorum	b. 189
Lycii	135	Citri	b. 189
Mororum	b. 181	lign. Sassafras	b. 193
Rubi idæi	b. 181	Crocii	b. 189
Sulphur auratum Antimonii	b. 147. 182	de Cucurbita, Mefues	b. 189
liquid.	b. 182	Cydoniorum	b. 189
caballinum	14	Diacodion Montani	b. 190
citrinum	14	crocatum	b. 190
rubrum Antimonii	b. 91	domesticus	b. 190
vivum griseum	14	Emeticus	b. 190
Summitates Juniperi	60	Angeli Salæ	b. 190
Origani	78	Enulæ	b. 191
Suppositorium compositum	b. 183	de Eryfimo Lobelii	b. 191
Syringites	17	Farfaræ e floribus	b. 191
Syrupus Absinthii	b. 183	Fragorum	b. 191
Acaciarum florum	b. 183	Fumarizæ	b. 191
Acetofæ	b. 184	Glycyrrhizæ	b. 191
Acetofellæ	b. 184	Granatorum	b. 192
acetositatis Citri	b. 184	Granorum Kermes	b. 192
de Agrestæ	b. 184	Hederæ terrestris	b. 192
de Althea Fernelii	b. 184	Hyperici	b. 192
de Ammoniaco	b. 184	Hyssopi	b. 192
de Artemisia	b. 184	de Jujubis	b. 192
		Syrupus	

INDEX I.

Syrupus Kinæ Kinæ	b. 193	Tartarus chalybeatus	b. 200
Ligni Sassafras	b. 193	crudus	138
Liquiritiæ	b. 191	emeticus	b. 200
de Manna laxativus	b. 193	tartarifatus	b. 200
Mastichinus	b. 193	vitriolatus	b. 201
Melissæ	b. 194	Tackeni	b. 201
Menthæ	b. 194	Tartari oleum per deliquium	b. 200
Mercurialis	b. 194	Terra foliata. v. Terra	b. 25
Mororum	b. 194	Tauri priapus	151
Musci querni	b. 194	fel inspissatum	143
Myrtillorum	b. 194	Tecolithus	7
Nicotianæ	b. 195	Tela Gualth	b. 157
Nucistæ	b. 195	Terebinthina cocta	b. 179. 201
Papaveris albi	b. 195	communis	133
erratici	b. 195	Cypria	133
de capit. ejusd.	b. 190	Veneta	133
Paralyseos, e floribus	b. 195	Terra Catechu	138
Perficorum e floribus	b. 196	foliata Tartari	b. 25
Plantaginis majoris	b. 185	Japonica	138
Pœoniæ florum	b. 196	Lemnia	2
Primulæ veris	b. 195	Orleana	14
Prophylacticus	b. 194	figillata alba Turcica	2
querni musci	b. 194	Goldbergensis	2
de Rhabarbaro Deodati	b. 196	Melitenensis f. St. Pauli	2
Ribium	b. 196	grisea Silesiaca vel lu-	
Rorellæ	b. 196	tea Strigoniensis	2
Rosarum ficcarum	b. 197	rubra Turcica	2
simplex	b. 197	Tartari foliata	b. 25
folutivus	b. 197	Tripolitana	2
Rubi idæi	b. 197	viridis	2
Sassafras, ligni	b. 193	Vitrioli dulcis	b. 216
Scelotyrbicus	b. 197	Testæ cochlearum	146
de Scilla	b. 198	ovorum	149
Scordii	b. 197	Testiculi equi	146
Sedi majoris	b. 198	præparati	b. 202
Sempervivi	b. 198	Theriaca Andromachi. v. Electuar.	b. 45
de Spina cervina	b. 190	Thus. vid. Olibanum	128
Stœchadis	b. 198	Thutia. vid. Tutia	15
Sulphuris	b. 198	Tinctura Aloës	b. 202
Symphyti Fernelii	b. 198	amara Londinenf.	b. 202
Tunicæ florum	b. 199	anodina. v. Effentia	b. 68
Veronicæ	b. 199	Antimonii acris Hoffm.	b. 202
Violarum	b. 199	tartarifata	b. 202
folutivus	b. 199	Antiphthifica Garmanni	b. 203
		Aquilegiæ	b. 203
		Aromatica Londinenf.	b. 203
		Bellidis florum	b. 203
		Bezoardica Michaëlis	b. 204
		Ludovici	b. 203
		officinalis	b. 204
		Tinctura	
Tacamahaca	130		
Talcum	8		
Tali leporum	147		
Talpæ combustæ	151		
Tamarindi	105		
Pharm. Wirt. Index.		Uuu	

INDEX I.

Tinctura Bezoardica Wedelii	b. 204	Trochisci Anthelmintici martiales	b. 213
Catharidum	b. 205	Bechici albi	b. 213
Coralliorum	b. 205	citrici	b. 213
Croci	b. 205	nigri	b. 213
vinosa	b. 206	rubri	b. 213
gingivalis balsamica	b. 206	de Carabe	b. 214
Hellebori composita	b. 206	Catechu	b. 214
Laccæ	b. 206	ad sput. cruent.	b. 214
Martis adstringens	b. 206	de cremore Tartari	b. 214
aper. spirituosa	b. 207	Escharotici	b. 214
Ludovici	b. 207	Galliæ moschatae	b. 214
coerulea Ettneri	b. 207	Hermetici Scretæ	b. 213
cydoniata	b. 207	muscerdæ	b. 214
helleborata	b. 208	de Myrrha	b. 215
pomata	b. 208	de Scilla	b. 215
c. vin. Malvat & po-		temperantes	b. 215
mis aurant.	b. 208	de vipera	b. 215
Zwœlfferi	b. 208	Tubera cervina	139
Metallorum	b. 208	Tunicæ interiores gallinæ ventriculi	146
odontalgica Hoffmanni	b. 209	Turbith. vid. Radix	46
Papaveris	b. 203	Turpethum minerale	b. 215
Proprietatis Mynsichti	b. 209	Tutia Alexandrina	15
Rhabarbari simplex	b. 209	præparata	b. 216
composita	b. 209	Vainigliæ, Vaniliæ	106
Rosarum	b. 203	Ventriculi Gallinarum	146
stomach. aromatica	b. 209	præparati	b. 216
Lipsiensis	b. 210	Vermis majalis	150
martial. Edinb.	b. 210	Vernix sicca	129
Succini. vid. Essentia	b. 77	Vertebræ Mustulæ piscis	149
Sulphuris	b. 210	Vinum Antimonii Huxhami	b. 216
Tartari	b. 210	Cydoniorum	b. 216
acris	b. 210	Granatorum	b. 216
Topasius	9	Rubi idæi	b. 216
Torna folis coerulea	15	Viperarum spinæ	151
rubra	15	Viride æris	15
Tragacantha	130	montanum	2
Tragea aromatica Gabelkoveri	b. 211	Viscus	120
officinalis	b. 211	Betulæ	121
granorum actes	b. 211	Corylinus	121
ophthalmica	b. 211	Quercinus	121
Tribuli aquatici	105	Salicis	121
Trichites	6	Tiliæ	121
Tripela offic.	2	Vitriolum album	5
Trochisci Alhandal	b. 211	Cyprinum, f. coeruleum	5
alipthæ moschatae	b. 212	Martis Factitium	b. 217
Alkekengi	b. 212	Veneris. v. Æs vir. crystall.	b. 4
cum opio	b. 212	viride Rom. Hungar. Angl.	5
Alkermes completi	b. 212	vulgare	5
de Ambra	b. 212	Vitrioli Gilla Theophrasti	b. 216
Anthelmintici Scretæ	b. 213	Vitrioli	

I N D E X I.

Vitrioli Ros f. Phlegma	b. 216	Unguentum Diapompholygos	b. 226
Terra dulcis	b. 216	populeum	b. 226
Vitrum Antimonii ceratum	b. 217	purpureum Wurzii	b. 226
Antimonii hyacinthinum	b. 217	resolvens mammarum	
Moscoviticum, v. Alumen scissile	6	tumores vid. Lini-	
Venetum	15	mentum volatile	b. 95
Umbilicus marinus	18	resumtivum	b. 226
Unguentum Ægyptiacum	b. 217	rosatum	b. 227
Agrippæ	b. 218	simplex	b. 227
alabastrinum	b. 218	rubrum ad labia	b. 227
album camphorat.	b. 218	potabile	b. 227
simplex	b. 218	Sandalinum	b. 227
Altheæ	b. 218	saponaceum	b. 228
ad Ambustâ	b. 219	ad scabiem officin.	b. 228
anodynum	b. 219	Zelleri	b. 228
Apostolorum	b. 219	somniferum	b. 228
de Arthanita	b. 219	spleneticum	b. 228
aureum	b. 220	stomachale	b. 229
basilicum	b. 220	de Styracæ	b. 229
Calendulæ, florum	b. 220	ad tabida membra	b. 229
carminativum	b. 220	contra vermes	b. 229
clysmaticum	b. 221	viride potabile	b. 230
Comitissæ	b. 221	de uvis	b. 230
digestivum	b. 221	Unguis odoratus	17
Digitalis	b. 221	Ungulæ Alcis	141
enulatum	b. 222	præparatæ	b. 230
fuscum	b. 222	cancrorum	143
Hyoscyami	b. 222	Unicornu fossile	152
infrigidans Galeni	b. 222	marinum f. verum	152
Linariæ	b. 222	præparat.	b. 230
Liquiritiæ	b. 222	Uniones	17
Lithargyrii	b. 223	Uvæ passæ majores	103
Majoranæ	b. 223	quercinæ	106
Malvæ	b. 223	Vulpis pulmões	152
Martiatum	b. 223	Xylo aloës	116
de minio camphorat	b. 223	Xylobalsamum	121
mundificans Stahlî	b. 223	Xylocaracta	105
Neapolitanum	b. 224	Xylo-cassia	108
nervinum	b. 224	Zagoe	136
Nicotianæ	b. 224	Zedoaria	111
nigrum	b. 225	Zibethum	152
Nihili ad oculos	b. 225	Zincus marinus	151
Nutritum	b. 225	Zingiber album	111
Ophthalmicum St. Yveanum,	b. 28	conditum: v. Conditâ	b. 34
vid. Balsamum &c.		vulgare	111
pectorale	b. 225	Zuccarum	137
pediculorum	b. 225		
pomatum Naphæ	b. 225		



II. TABLE DES NOMS FRANCOIS.

A bsinthe		48	Antimoine mine	10
	petit	47	Apalachine	50
	Romain ou Pontique	47	Arboufier	75
Acanthe		53	Archangelique	61
Aceteuse		48	Arêtes des Murene	149
Achiote		14	Argent fin en feuilles	10
Acmelle		48	vif	10
Aconyt.		48	Argentine	50
Adhatodæ		48	Aristolochie menue	51
Adiante blanche		49	Armoise blanche	51
Aëtites		5	rouge	51
Ægagropila		140	Arroche puante	76
Agaric		138	Arsemise. v. Armoise	51
	mineral	2	Arfenic blanc	10
Agripaume		53	jaune	10
Aigremoine		49	rouge	10
Ail		19	Afa foetida	122
Aiman		8	Asbeste	6
Albâtre		6	Asphalte	15
Alcée		49	Aspic	61
Alleluja		48	Aunée	49
Alliaire		49	Auronne le mâle	47
Aloë caballine		134	Axonge d'Anguille	153
	hepatique	134	de Barbote	153
	Succotrin	134	de Blaireau	154
Alun blanc, vulgaire		3	de Brochet	153
	de plume	6	de Caille	153
	de roche	3	de Canard	153
	Romain	3	de Castor	153
Aluine		48	de Castoreum	153
Amandes ameres		97	de Chapon	153
	douces	97	de Chat sauvage	153
Ambre gris		15	de Chien	153
	jaune	16	de Cicogne	153
	liquide	130	de Col de cheval.	153
Ametiste		8	de Couleuvre	154
Amiante		6	de Heron	153
Anacardes		97	humaine	153
Anagallis, le mâle		50	de Lapin	153
Anet		50	de Lievre	153
Anis étoilé		84	de Liron, de Loir	153
Antimoine		10	de Loup	153
			Axonge	

INDEX II.

Axonge de Marmotte	153	Bezoard de Coromandel	142
d'Ombre	153	Occidental	141
d'Ours	154	Oriental	142
d'Oye	153	de Porc - épi des Indes	150
du panne de Porc	154	Bismuth	13
de Poule	153	Bitume de Judée	15
de Renard	154	Blanc de baleine	145
de Taiffon	154	de plomb	11
de Thymallus	153	Blatté Byzantine	17
des Viperes	154	Blé noir	89
Azur	6	Bois d'Aloës	116
Bajes de Coqueret	83	d'Aspalat	117
Bardane grande	61	de Buis	117
Basilic	51	couleuvré	117
Batrachite	6	de Cypre	119
Baume de Canada	131	de Cyprès	117
de Capahu, de Copaiba	131	de Douce - amère	120
de Judée	132	Ebene	117
de Mecha	132	de Gayac	118
de Perou blanc	131	de Genevre	118
noir	131	de Lentisque	118
Rakasira	132	Liege	120
rouge sec	132	des Moluques	118
de Tolou	132	nephretique	119
Bayes d'Airelle	103	de Rhode	119
de Coqueret	83	de Roses	119
de Genevre	102	saint	114. 118. 119
de Laurier	102	de Santal blanc	119
de Lierre	101	citrin	119
de Myrte	103	rouge	120
de Myrtille	103	de Sassafras	120
de Noirprun	105	de Surinam	119
des raisins de Renard	103	Bol d'Armenie	1
de Sureau	104	blanc	1
Bdellium	122	rouge vulgaire	1
Beaume Herbe	64	Boletus cervinus	139
d'Eustaque	132	Bon Henri	52
Bec de grue	59	Homme	74
Béccabunge	51	Borax de Venise	3
Belemnite	7	Borrage	52
Belladonne, Belledame	52	Bouillon blanc	74
Ben	97	Bourrache	52
Benjoin	122	Bourse à berger	53
Berberis seché	97	Boufserole	75
Bête	52	Branche ou branque urfine	53
Bêterave	23	Brunelle	68
Betoine	52	Bruyere	57
Bezoard d'Allemagne	140	Bugle	55
Pharm. Wirt. Index.		Buglosse	53
		X x x	Caa

INDEX II.

Caa apia	24	Cheurefeuille	53
Cabaret	51	Cheveux de Venus	49
Cacao	97	Chicorée	55
Cachou	138	Chiennée	26
Cadmie	6	Chine Chine	112
Cadmie metallique	11	Chou marin	72
Caffé	99	Chryfocolle	2.
Cajeput, huile	155	Chrysolith	9
Caillelait	58	Ciguë	55
Caillou	8	Cinabre artificiel	12
Calamente	53	mineral	12
Calamine	6	Cire blanche	155
blanche	13	jaune	155
Camphre	123	Civette	152
Cancamum	123	Cloportes	141
Candi	137	Cloux de Girofle	107
Cannelle blanche	108	Cobalt	11
fine	108	Cochénille	145
Canneberge	103	Codagapala	113
Cantharides	144	Coins secs	100
Caoutchu	123	Coix	91
Capillaire	49	Colchique	26
Cappe de moine	48	Collechair	129
Capucine	65	Colle de poisson	147
Caragne	123	Colophone	124
Cardamome grand	109	Coloquinte	99
petit	107	Conife	56
Carouge	105	jaune	56
Carpobalsame	98	Confoudé, grande	55
Casse	108	moyenne	55
en bâton	98	Coq	51
Castorée ou Castoréum	144	Coquelourde	68
Cendre gravelée	3	Coquerets	96
Centauree, petit	54	Coques de Levant	99
Centinode	54	des œufs	149
Cerfeuil	54	Coquilles d'Escargots	146
Cerifes aigres seches	99	Corail blanc	16
Ceruse blanche	11	noir	16
jaune	11	rouge	16
de Venise	11	Coraline	16
Ceterac	54	de Corse, ou de Malthe	139
Chacarille	112	Cornaline	9
Chardon benit	53	Corne de cerf	56. 145
de nôtre Dame	54	d'Elan	141
sauvage.	54	de Rhinoceros	150
Chaffis	104	Corneille	62
Chaux	6	Cornouilles	100
Chelidoine grande éclairé	55	Couvercles d'Escargots	146
petite	71	Crane humain	146
Chêne, petit	54	Crapaudine. Pierre	6
			Cra-

INDEX II.

Crapaudine. Herbe	72	Ecorce de Sassafras	115
Crapaux secs	143	Simarouba	115
Craye blanche	1	Styrax Thymiana	116
rouge	2	moyen de Sureau	115
Cresson d'eau	65	de Tamaris	115
Cristal	7	de Winter	116
de roche	7	Ecoffes de Sené	72
Crotte de chien	141	Ecrevisses, pattes	143
de Paon	149	yeux	143
Cubebes	109	Emeraude	9
Culilavan	113	Emeri, ou Emeril	8
Cuscute	56	Encens	128
Cynorrhodon	100	Endive	57
		Entalies	17
Dactes, ou Dattes	100	Epine des viperes	151
Dent de Lion	73	Epithyme	57
Dentales	17	Eponge	16
Dents d'Hippopotame, ou de		de Cynorrhodon	140
Cheval marin	146	de faule	139
de sanglier	141	Escarbot	150
Depouilles de serpent	151	d'Escargots, couvercles	146
Dictam, Dictame ou Dictamne de		coquilles	146
Crete	56	Espargoutte	63
Digitale	57	Estragon	57
Dreche	90	Etain de glace	13
		Eupatoire bâtarde	57
Ebene	117	Eufraise ou Euphrase	58
Ecorce de bois gentil	114		
Bourgene	113	Ferret d'Espagne	7
faint	114	Fève de S. Ignace	100
Cabbage	112	Feves des Marais	89
Chacarille	112	Pichurim	104
de Chêne	115	Feuilles de chêne	68
Chine Chine	112	Indienne	58
des Citrons	113	de Laurier	61
Culilavan	113	cerise	61
de Frangula	113	de Ronce	69
de Frêne	114	de faule	69
de Garou	114	de Sené	71
de Guayac	114	de vignes	75
de Girofle	107	Fiel de bœuf épaissi	143
de Grenades	114	de verre	12
Jujabæ	114	Figues seches	98
de Maronnier d'Inde	114	Fleurs d'Ancolie	76
Maffoy	114	d'Anet	76
de Meurier	115	Balaustes	77
d'Orange	111	de Basilic	77
de Prunier sauvage	111	de Betoine	77
Quinquina	112	de Bluet	78
de Sâuls	115	de Bourrache	77
		Xxx 2	Fleurs

INDEX II.

Fleurs de Bouillon blanc	82	Fleurs de Stœchas citrin	81
de Buglosse	77	de Sureau	81
de Camomille Romaine	78	de Tanesie	81
des champs	78	de Tillau, Tilleul, ou Tillot	81
de Carthame	78	de Tussilage	78
de Chicorée	78	de Violettes de Mars	82
de Coquelicot	80	Follicules de Sené	72
Cresson des prés	77	Foye de Loup	148
de Genêt	78	Framboise	104
de Giroflée jaune	78	Fumeterre	58
d'Hepatique noble	79	Fungus Melitenfis	139
de Houblon	79		
de Jasmin	79	Galanga grand	109
de Lamium	82	petit	109
de Lavande	79	Galega	58
des Lis blancs	79	Garderobbe	47. 56
de marguerites petite	77	Genippi	47
rouge	77	Germandrée	54
de Mars	12	d'eau	71
de Mauve de jardin	79	Gingembre	111
de Melilot	80	blanc	111
de Millepertuis	79	Girofles	107
de Muguet	79	Girofle ecorce	107
de Muscade	109	Glands	101
de Nard commun	81	Gluteron, petit	76
de Nenuphar blanc	80	Gomme Adraganth, ou d'Adragan	130
de Nymphée blanche	80	Ammoniac	121
d'Oeuillets rouges	82	Animé	121
d'Orange	77	Arabique	121
d'Ortie morte	82	Afa foetida	122
de Paquerette	77	Asphalta	15
de Passevelours	81	Benjoin	121
de Pavot rouge	80	Bdellium	122
de pêcher	80	Camphre	123
de Pied d'Alouette	77	Cancamum	123
de Pivoine	80	Caoutchou	123
de Primevere	80	Caragne	123
de Prunier sauvage	76	des cerises	124
de Romarin	76	Collechair	129
de Roses blanches	80	Colophone	124
pâles	80	Copal	124
de Provins	80	Elemi	124
rouges	80	Encens	128
tremiere	79	d'Epine de bouc	130
de Safran bâtard	78	Euphorbe	124
de Sauge	81	Galbanum	125
de Scabieuse	81	Galda	125
de Soucy	77	de Guayac	125
de Spic	81	de Genevre	129
de Stœchas Arabique	81	Goutte	125
		Gomme	

INDEX II.

Gomme Kikekunemalo	126	Herniole	60
Kino rubrum	126	Hieble	57
Ladanum	127	Hirondelles calcinées	147
Lacque en baton	126	Huile Cajeput	155
en graines	126	de pétrole claire	13
en oreilles	126	noire, ou de Gabian	14
de Lierre	126	rouge	14
Look	127	de terre	14
Mastic	127	Hyacinthe	9
Myrrhe	127	Hysope	60
Olampi	127		
Opopanax	128	Inde, Indigo	12
Sagapenum	129	Jonc Oriental odorant	70
Sarcocolle	129	Jotte	52
de Senegal	130	Ivette	54
Seraphique	129	Jujabæ	114
Goutte de Lin	56	Jujubes	102
Graines du Canellier	108	Jusquame	60
Graines d'Ecarlate	101		
de Musc	82	Kermes	101
de Paradis	109		
de Tilli	101		
Graisse. v. Axonge.		Lacque colombine, en boules	12
Grappelles	76	de Florence, fine	12
Grateron.	50	Lactucæ virosæ	61
Gratiolle	59	Lait	147
Gratte - cu	100	Lait de Lune	2
Grenat	9	Langue de Cerf	71
Grenouille	150	de Serpent	65
Gui	120	Laque v. Lacque	
de Bouleau	121	Lavande	61
de Chêne	121	Lichenis Islandici	61
de Coudrier	121	Licorne veritable	152
de Saule	121	Liege	120
de Tillau	121	Lienne	55
Guimauve	50	Lierre	59
Gysieres	146	Lierre terrestre	59
Hanebane	60	Lievre calciné	147
Hepatique d'eau	59	talons	147
noble	60	Limaille d'acier, de fer, de Mars	11
Herbe des Aux	42	Lin cathardique	62
aux chats	53. 65	Linaire	62
aux cuillers	55	Linnaire de montagne	56
de fenouil	58	Litharge d'argent	13
de fraisier	58	d'or	13
de la goutte	69	Lunaire	62
a pauvre homme	59	Lurchal	49
Robert	59	Lyfimachie jaune	62
Herison calciné	146	rouge	62
Pharm. Wirt. Index.		Yyy	
			Machoi-

INDEX II.

Machoires de brochet
 Macis
 Manne de Calabre
 Marcaffite
 Marguerite, petite
 Marijolaine
 Marons d'Inde
 Marrube blanc
 noir, puant
 Marum
 Mastic
 Matricaire
 Mauron
 Mauve
 sauvage
 Melilot
 bleu
 Melisse
 de montagnes
 sauvage
 Turque
 Menthe crêpue
 Menyanthe
 Mercure
 Mercuriale
 Meres de Girofle
 Miel
 Millefeuille
 Mille-pertuis
 Mine d'Antimoine
 martial d'Hesse
 Minium
 Miroir d'Ane
 Moëlle de pierre
 Molene
 Momie v. Mumie
 Morelle
 Morgeline
 Mort au chiens
 Mouron
 Mouffe de chêne
 Coraline
 marin
 de Prunier sauvage
 terrestre
 Moutarde sauvage
 Muffle de lion, de veau
 Muguet de bois
 Mumie d'Egypte
 de Perse, naturelle

147	Musc	148
109	Muscades	110
	fleurs	109
135	Myrobalans	102
13	Belliries	102
52	Chebules	102
62	Citrides	102
101	Emblics	102
63	Indiens noirs	102
63	Myrrhe	127
63	Myrte	64
127	Nacre de perle	18
63	Napel	48
50	Narcaphte,	116
63	Nefles seches	102
49	Nids d'Hirondelles	147
63	Nitre	3
63	Noix de Cyrès	100
61	de Galle	101
64	vomiques	103
64	Nombril marin	18
64	Noyaux des Cerifes	99
74	des Pêches	104
10	Nummulaire	65
64	Ochre, Ocre	2
106	Oeufs d'Autruche	151
135	Oignon marin	44
64	Oliban	128
60	Ongle d'Elan	141
10	Opium de Thebes	136
13	Opopanax	128
13	Or fin en feuilles, Or battu	11
6. 7	Orcanette du Levant	19
2	Oreille d'Homme	22. 51
74	de Judas, ou de Juif	139
	de fouris	66
72	Origan	66
49. 50	de Crete	66
26	Orléan	14
50	Orme sauvage	116
140	Ormin	58
16	Orpiment	10
16	Orpin, Herbe	56
140	Orpin, ou Orpiment. Minéral	11
140	rouge	10
74	Orseille	12
50	Ortie commune	75
63	blanche ou morte	75
148	Os de cœur de cerf	149
149	Os	Os

INDEX II.

Os de Seiche	149	Pierre de vache marine	148
Oseille	48	Pignons	103
sauvage	48	d'Inde	101
Ostéocolle	8	Piloselle	66
Outre mer	7	Piment	52
Ozeille v. Oseille		Royal	65
P aquerette		Pimprénelle sanguisorbe	67
Parietaire	52	faxifrage	67
Pas d'Ane	66	Pissenlit	73
Pattes des Ecrevisses de mer	58	Pistaches	104
d'Oye	143	Plantain long	67
Pelote de mer	52	majeur	67
Penfée	16	des montagnes	51
Perce-boffe	60	Plomb rouge	13
Perce-feuille	62	Poirée	52
Perce-mouffe	66	Poivre blanc	110
Perles	49	d'Espagne	110
Perfil	17	long	110
Pervanche	66	noir	110
Pétrole blanc	75	Poix	128
noir	13	blanche	128
rouge	14	navale	128
Peuplier	14	noire	128
Phytolaccæ	67	Polium de Crête	67
Pied de Chat	66	de montagne	67
de Lion	59	Polygale	67
Pierre d'Aigle	49	Polytrichon	49
d'Aimant	5	Pomme épineuse	73
Armenienne	8	de Merouilles	102
d'Azur	6	Pompholyx	13
Belemnite	7	Potasse	3
Caillou	7	Poumons des Renards	152
calaminaire	8	Prêle	57
des carpes	6	Priape de baleine	145
à chaux	144	de cerf	145
Emeri	6	de taureau	151
d'éponge	8	Propolis	155
Hematite	8	Proscarabée	150
Judaique	7	Pruneaux doux	104
de Lynx	7	Prunelle. Herbe	68
de Malacco	7	Prunelles sauvages	96
nephretique	150	Ptarmica	68
Ostéocolle	8	Puliot	68
de perche	8	Pulmonaire	68
ponce	150	de chêne	68
Sanguine	8	Pyrole	68
Selénite	7	Queue de Cheval	57
speculaire	8	Quinquina	112
Talc	6. 7	Quinte-feuille	66
	8	Y y 2	Racine

INDEX II.

Racine d' Aceteuse	18	Racine de Chelidoine grande	25
d' Ache	20	petite	25
d' Acorus, le faux, le bâtard	19	de Chicorée	26
le veritable	18	fauvage	26
d' Alcée	19	de Chien - dent	32
d' Althé	19	Chiennée	26
d' Alkanna	19	Cipo de Cameras	26
d' Ancolie	20	Colchique	26
d' Angelique	20	de Concombre fauvage	27
fauvage	20	de Confoude grande	26
d' Anthore	20	de Contrayerve	26
d' Api	20	blanche de	
d' Aristolôche longue verit.	21	Mexique	27
ronde commune	21	de Coquelourde	40
petite	21	de Costus amér	27
verit.	21	doux	27
clémat. des vign.	21	de Couleuvrée	23
d' Armoise	22	de Curcuma	27
d' Arrête boeuf	37	de Dent de Lion	46
d' Asarum	22	de Dentaïre grande	28
d' Asclepias	32	petite	28
d' Asperge	22	de Dompte venin	32
d' Asphodele	22	de Doronic	29
d' Aunée, d' Aune	30	de Douce - amere	19
Barbe de Bouc	46	d' Ellebore blanc	29
de barbe de chevre	22	noir	29
de Bardane	22	du St. Esprit	20
de Been blanc	22	d' Enule campane	30
rouge	23	d' Esquine	25
de Benoite	25	d' Esule	30
de Betoinede montagne	21	de Fenouil	31
de Bistorte	23	de Filipendule	31
de Boucage	39	de Fougère aquatique	31
de Bourrache, Bourrage	23	femelle	30
de Bryone	23	de Fraïsier	31
de Buglosse	19. 24	de Fraxinelle	29
de Bugrade, ou Bigrane	37	de Frêlon	23
de Cabaret	22	de Galliot	25
de Calamus aromatique	18	de Garance	42
de Caprier	24	de Gentian	31
de Carline	24	Croifette	31
de Cassumuniar	25	d' Indes	31
de Celeri	20	de Gin - feng	36
de Chardon benit	24	de Glayeul	19. 34
de Chardon à foullons	29	de Glouteron	22
de Chardon Roland	30	de Guimauve	19
de Chardonnerette	24	d' Hannebane	33
de Chardouffe	24	de la St. Helène	32
de St. Charles	24	d' Hermès	32
Chausse Trappe	24	d' Hermodattes	32
		Racine	

Racine

INDEX II.

Racine de petit Houx	23	Racine des montagnes	32
de Jalap	33	de Pétafite	39
d' Jeble	29	de pied de veau	20
Ikan	33	de Pimprenelle	39
d' Imperatoire	37	blanche	39
d' Ipecacuanha	33	noire	39
d' Iris bleue	34	de Pisse en lit	46
de Florence	34	de Pivoine	40
de Jusquiame, blanche	33	de Plantain	39
de langue de chien	28	de Polypode	40
de Leveche ou Liveche	34	de Pyrethre	40
des Lis blancs	34	de Queue de pourceau	39
Lopez	34	de Quinquina	25
de Mandragore	35	de Quinte-feuille	38
de Mauve	35	de Radis	41
fauvage	19	de Raifort grande	41
de Méchoacan	35	de Rattelou	21
de Metalliste	35	de Rave	41
de Meum	35	de Récife	25
de Morelle rampante	19	de Réglisse	34
Moringa	35	de la Reine des prés	22
Mort aux-chiens	26	de Rhapontic veritable	42
Mungos	36	vulgaire	42
de Nard Celtique, des Indes	45	de Rhodus	42
Navett, Navou	41	de Rhubarbe	41
de Nenufar	37	des moines	41
de Ninzin	36	sentant les Roses	42
d' Olsnitium	37	de Rusc	23
d' Orcanette du Levant	19	Safran d' Indes	27
d' Orchanette	19	Salab	43
d' Oreille d' Ane	26	salivair	40
d' Ortie	47	de Salsepareille	43
d' Oseille	18	de Sanicle	43
d' Ostroloche	21	Sanley	43
d' Otruche	37	de Saponnaire	43
d' Ozeille	18	de Sarcepareille	43
de pain de pourceau	28	de Sarrafine ou Sarazene	21
de Palme de Christ	38	de Satyrion	43
Panais	38	de Savonniere	43
de Panicaut	30	de Saxifrage, blanche	44
de Pareira brava	38	rouge	31
de Parelle	34	de Sceau de Salomon	40
de Pas d' Ane	30	de Scille	44
de grand Pas d' Ane	39	de Scorzonnere	44
de Patience d'eau	23	de Scrophulaire	44
grande	42	Seneka	44
fauvage	34	Serpentaire	45
Pesaulina	38	de Souchet long	28
de Pempedula	38	rond	28
de Perfil	39	de Spica nard	54
Pharm. Wirt. Index.			Racine

INDEX II.

Racine de Squine	25	Sarcocolle	129
de Succife	36	Sardoine, Sardienne	9
de Tithymale	30	Sariette	70
de Tormentielle	46	Sarrafin	89
de Trefle de Castor	46	Sarrasine	51
Tue-chien	26	Sauge	69
de Turbit	46	fauvage	70
de Tuffilage	30	Sauverie	49
de Valeriane	46	Saxifrage	70
	39	Scabieuse	70
	46	Scamonée	137
de Victorialis grande	47	Scarabée onctueux	150
longue	23	Schoenant	70
ronde	45	Scinc marin	151
de Vigne blanche	104	Scordium	71
Viperine de Virginie	103	de Crete	71
Raisins de Corinthe	103	Scrophulaire	71
de Damas	66	Sebestes	104
gros	51	Sego	136
de Renard	10	Sel ammoniac ou armoniac	4
Ratelou	135	d'Epson	4
Réalgar	54	gemme, mineral, fossile, de roche	4
Reglisse en bâton	128	marin	4
Renouée	128	purgatif amer	4
Refine	128	d'Eger	4
blanche	128	de Sedliz	4
navale	130	de verre	12
noire	92	Selénite	8
de Storax	14	Semence d'Ache	84
Ris	69	d'Agnus castus	82
Rocou	69	d'Ammi	83
Romarin	69	d'Amome	83
de Boheme	14	d'Ancholie ou d'Ancolie	84
Ros folis	150	d'Anet	84
Roucou	9	d'Angelique	84
Roitelets brulées	69	d'Anis	84
Rubis	69	de la Chine, étoilé	84
Ruë	69	d'Arroche	84
Sabine	108	d'Asperge	84
Safran	78	de Basilic	85
bâtard	27	de Bardane	85
d'Indes	129	de Carotte fauvage	88
Sagapenum	136	de Carvi	86
Sagu	154	de Cerfeuil	86
Sain doux	3	de Chanvre	85
Salpetre	147	de Chardon benit	85
Sang de bouc fec	129	Marie	86
de Dragon	70	de Chassetaupe	86
Sanicle	9	de Chicorée	87
Saphir	70	de Chou rouge	85
Saponaire		Semence	

INDEX II.

Semence	Cigue des Marais	93	Semence	de Pavot noir	93
	de Citron	87		de Percefeuille	93
	de Citrouille	87		de Persil	93
	de Cochlearia	87		de Macedoine	93
	des Coins	88		de Pivoine	93
	de Coloquinte	87		de Plantain	93
	de Concombre	88		des pois chiches rouges	87
	de Coriandre	87		de Pourpier	93
	de Coton	85		de Raifort	94
	des Courges	88		de Rave	94
	de Cresson	92		de Ricin	86
	de Cumin	88		de Roquette	89
	de Daucus de Crète	88		de Ruë	94
	d'Eglantier	88		de Sabadillum	94
	d'Endive	89		de Saffran bâtard	86
	d'Epine vinette	85		de Sefame	95
	d'Epurge	86		de Sefeli de Candie	95
	de Fenouil commun	89		de montagne	95
	doux	89		de Sifymbrium	95
	de Fenugrec	90		de Staphis aigre	95
	de Frêne	90		de Sumach	96
	de Genêt	90		de Sureau	94
	de Guimauve	83		de Tanesie	96
	de Gremil	92		de Thlaspi	96
	d'Herbe aux perles	92		contre les vers	87
	de l'herbe aux puces	94		de Violettes	96
	de Houx-frelon	94		d'Yeble	89
	de Jugeoline	94	Sené		71
	de Jusquiame	90	Seneçon		71
	de Laitue	91	Serpolet		72
	de Lauréole	87	Sommitées de genevrier		60
	de Leveche	91	Sorbes sechées		105
	de Lin	91	Soude, d'Espagne en pierre		5
	de Lupin	91	Soufre grossier		14
	de Lycopodium	91	jaune, commun		14
	de Mauve	92	vif, gris		14
	de Melon	92	Souris marines		149
	de Millepertuis	90	Soye brulée		151
	de Moutarde	95	Sperme de baleine		145
	de Navet	92	Spigeliæ		73
	de Nielle	92	Storax. v. Resine		130
	d'Orange	85	liquide		133
	d'Orge	90	Styrax Thymiana		116
	d'Orobe	92	Suc d'Acacia veritable d'Egypte		133
	d'Ortie	96	d'Hypociste		135
	Romaine	96	de Lycium		135
	d'Oseille	82	des Prunelles sauvages		134
	de Panais	88	de Reglisse en bâton		135
	de Patience	91	Succin		16
	de Pavot blanc	93	Succise		64
			Zzz z		Sucre

INDEX II.

Sucre	137	Toute bonne	52
Candi	137	Treffe de Castor	74
liquide	137	des préés	74
Suie	134	Tribules aquatiques	105
Suif de Bœuf	153	Tripe Madame	71
de Bouc	153	Tripoli	2
de Cerf	153	Trœsne	62
Tabac		Turquette	60
Tabouret	65	Tue-chien	26
Tacamahac ou Tacamaque	53	Tuffilage	58
Talc	130	Tutie	15
transparent	8		
Talons de lievre	6	Vanilles	106
Tamarinds	147	Vedasse	3
Tamaris	105	Velar	57
Tanefie	73	Verd de gris	15
Tartre	73	de montagne	2
Taupes brulées	138	Verdet	15
Terebinthine de Chypre	151	Verge d'or	55
ordinaire	133	Vermillon artificiel	12
de Venise	133	mineral	12
Terre Cachou	133	Veronique	75
Lemnienne	138	Verre de Moscovie	6
figillée blanche de Malthe	2	Verre de Venise	15
de Silesie ou	2	Vers de terre secs	147
de Goldberg		Verveine	75
de Turquie	2	Vesse de Loup	139
grise de Silesie	2	Violette	75
rouge de Turquie	2	Viscago	75
verte	2	Vitriol d'Allemagne vulgaire	5
Terrette	59	d'Angleterre	5
Testicules de cheval	146	blanc	5
Têtes de Pavot	98	bleu de Chypre	5
Thée	73	d'Hongrie	5
de la mer du Sud	50	Romain	5
Thuyæ	74	Verd	5
Thym de Crete	74	Unicorne mineral	152
a feuille menue	74	Uvulaire	76
vulgaire	74		
Tigname	116	Xylobalsamum	121
Topaze, Topase	9		
Tormentille	74	Yeble	57
Tortelle	57	Yeux d'ecrevisses	143
Tournesol bleu	15	Yvoir	146
en drapeau	15		
en pâte, en pain, en pierre	12	Zedoire	111



III.

Teutsches Register.

Alatruppen = Gräte	149	Amperwurzel, wilde	34
Al = Schmalz	153	Anacardien	97
Abbiß, Kraut	64	Andivien, Kraut	57
Wurzel	36	Andorn schwarzer	63
Acacien = Saft, Egyptischer	133	weisser	63
teutscher	133	Angelick = Saamen	84
Ackelen s. A gelen		Wurzel	20
Acker = Holunderwurzel	29	wilde	20
mann	19	Angerblumen	77
rechter	18	Angurien = Saamen	87
Schwertel	47	Animi = Gummi	121
Ackmellen = Ceylanische	48	Anis, gemeiner	84
Acorus = Wurzel, falsche	19	Indianischer, Stern = Anis	84
Alder = Holz, s. Paradies, Holz	116	St. Antoni = Kraut	68
Stein	5	Apalachine	50
Aegyptisches Farberkraut	19	Apostem = Kraut	70
Alfodill = Wurzel	22	Blumen, Blütthe	81
A gelen = Blumen	76	Arabischer Gummi	121
Saamen	84	Stöchas = Blumen	81
Wurzel	20	Arlas = Beere	105
Agststein	16	Armenier = Stein	6
Ahl = Schmalz	153	Armenischer Bolus	1
Allabaster	6	Stein	6
Allant = Wurzel	30	Arnick	21
Allaun gemeiner, weisser	3	Aron = Wurzel	20
rother Römischer	3	Arsenic gelber	10
Allermannsharnisch = Wurzel	46	rother	10
Alloe, feine von Soccotora	134	weisser	10
gemeine	134	Stein	11
Leberfarbige	134	Asand, stinkender	122
Ros =	134	wohlriechender	122
Alloes = Holz, s. Paradies = Holz	116	Asbest	6
Alpschoß	7	Aschbaum = Rinde	114
Allaun = Wurzel	35	Saamen	90
Allthea = Wurzel	19	Aschen = Salz, Spanisches	5
Amber, flüssige	130	Schmalz	153
graue	15	Aschwurzel	29
Kraut	63	Asphalt	15
Americanische Griefswurzel	38	Asphodill = Wurzel	22
Amethist	8	Attich = Beer	100
Ammoniac = Gummi	121	Kraut	57
Ammi = Saamen, Cretischer	83	Saamen	89
Amomlein	83	Wurzel	29
Pharm. Wirt. Index.		Aaaa	
			Augen

III. Teutsches Register.

Augenstein	5	Benedict-Wurzel	25
trost	58	Bengelkraut	64
Wurzel	46	Benzoe	122
Murin-Kraut, wildes	59	Berg-Blau	6
Muripigment	11	Crystall	7
		Grün	2
	51	Kümmel	95
Bachbungen	34	Cretischer	95
Bad-Kraut-Wurzel	16	Berg-Münz, wohlriechende	53
Schwamm	35	Poley	67
Bär-Wurzel	35	Cretischer	67
Bären-Fenchel-Wurzel	53	Zinnober	12
Klauen, teutsche und italiänis.	154	Bernstein	16
Schmalz	53	Bersing-Stein	150
Taken	75	Bertram-Kraut	68
Tralube	39	Wurz	40
Baldrian, Garten-	39	Beruf- oder Beschrey-Kraut	56. 68. 72
grosser	46	Besen-Kraut-Saamen	96
kleiner	102	Bethonien-Blumen, oder Blüth	77
Balsam-Aepfel	131	Kraut	52
von Canada	131	Bettlerläuse	76
von Copaiwa	131	Bett-Stroh	58
Indianischer schwarzer	132	Beyfuß-Kraut, roth und weiß	51
trockener	131	Wurz	22
weisser	132	Bezoar von Coromandel	142
von Mecha	131	Occidentalischer	141
Peruvianischer	132	Orientalischer	142
Rakasira	132	vom Stachelschwein	150
von Tolu	121	Biber-Gail	144
Holz		Schmalz	153
Körner, die Frucht vom	98	Schmalz	153
Balsambaum	77	Klee	74
Basilic, Basilgen-Blumen	51	Wurz	46
Kraut	85	Bibernell-Kraut	67
Saamen	54	Wurzel, schwarze und weisse	39
Bathengel, klein	40	Bienenkraut	64
Baum-Farn-Wurzel	140	Bilsen-Kraut	60
Moos	59	Wurzel	33
Binde	85	Saamen, weisser	90
Wollen-Saamen	74. 95	Bimsen-Stein	8
Bauren-Genf	96	Birken-Mistel	121
Saamen	122	Bisam	148
Bdellium-Gummi	97	Saamen	82
Ben-Früchte	23	Bismuth	13
Wurzel, rothe	22	Bitter-Klee	74
weisse	91	Blackfisch-Bein	149
Beerlappen-Saamen	8	Blau-Wurzel	39
Behen s. Ben	26	Bleygelb	11
Beinbruch	102	Bleyweiß, gemeines, weisses	11
Beinbruchwelle		Benedisches	11
Bellirische Myrobalanen		Block-	

III. Teutsches Register.

Block-Zittwer	25	Laa-apia	24
Blut-Kraut	54. 67	Cacau	97
Wurzel	39. 46	Caffe-Bohnen	99
Kraut	74	Cajeput-Öel	155
Stein	7	Calmus	18
Bocks-Blut	147	Cameel-Stroh, oder Heu	70
Horn-Saamen	90	Campher	123
Hörnlein	105	Cancamum, Gummi	133
Inschlitt	153	Candel-Zucker	137
Peterlein	67	Canell	108
Bosist	139	Canessi-Rinde	113
Bohnen	89	Caninchen-Schmalz	153
St. Ignatius	100	Caoutschu, Gummi	123
Kraut	70	Capaunen-Schmalz	153
Bolus Armenischer	1	Cappern-Wurzel	24
rother, gemeiner	1	Caranna, Gummi	123
weisser	1	Cardamomen, Cardamemelen	109
Borax, Borrax	3	grosse	107
Boretzsch. s. Borrage		kleine	107
Borrage-Blüth, oder Blumen	77	Cardobenedicten-Kraut	53
Kraut	52	Saamen	85
Wurz	23	Wurzel	24
Brackendistel-Wurzel	30	St. Carls Wurzel	24
Brand-Lattich	58	Carmesin-Beer	101
Wurzel	30	Carneol, Carniol	9
Braun-Wurz	44	Cassia-Frucht oder Röhrlein	98
Kraut	71	Rinde	108
Brenn-Nesseln, Kraut	75	Cassio-Berry-Busch	50
Saamen	96	Cassumuniar, Cassamoniar	25
Wurz	47	Castanien, wilde, bittere	101
Brombeer-Laub	60. 69	Rinde	114
Bruch-Kraut	56. 70	Celtischer Nardus	45
Wurzel	43	Ceylanische Nckmellen	48
Stein	8	Chagrillen-Rinde	112
Brunnen-Kresse	65	Chamillen-Blumen, gemeine	78
Leberkraut	60	Römische, edle	78
Brusch-Wurz	23	China-Rinde	112
Brust-Beer, rothe	102	Wurzel	25
schwarze	104	Chocolade-Frucht	97
Wurz	20	Christ-Wurzel	29
Bubendistel	29	Chrysolith	9
Buch-Ampfer	48	Cipo de Cameras	26
Weizen	89	Cisten-Saft	135
Buck, rother	51	Citronen-Melissen	64
weisser	51	Saamen	87
Burzel-Kraut-Saamen	93	Schalen	113
Buxbaum-Holz	117	Citrullen-Kerne	87
dorn-Saft	135	Cobalt	12
Buzen-Kletten-Wurzel	22	Coccinell	145
		Coffe	99
		Aaaa 2	Coll-

III. Teutsches Register.

Collmarkraut	50	Dillen = Blumen, oder Blüth	76
Colophonium	124	Kraut	50
Coloquinten	99	Saamen	84
Saamen	87	Dinten = Gummi	121
Copal = Gummi	124	Diptam s. Dictam	
Corallen = Moos	16	Distel, gesegneter	54
rothe	16	Donnerstein	7
schwarze	16	Dorant	50
weisse	16	Dornholz, Rhodiser	117
Wurz	40	Dosten	66
Zincken	16	Cretische	66
Coriander = Saamen	87	Drachen = Blut	129
schwarzer	92	Dragun	57
Corinthen	104	Dreyfaltigkeit = Kraut	60
Cornel = Kirschen	100	Drupdenfinger	7
Costus = Wurz, bittere	27	Dürlüzen	100
süße	27	Dürrwurz, blaue	56
Cretischer Ammy = Saamen	83	Durchwachs, Kraut	66
Berg = Kummel	95	Saamen	93
Pelen	67	Eben = Holz	117
Diptam	56	Eber = Wurz	24
Dosten	66	Edel = Leber = Kraut	60
Lachen = Knoblauch	71	Blumen	79
Gesel = Saamen	95	Egel = Kraut	65
Thym = Seide	57	Egrisches Laxier = Salz	4
Thymian	74	Egyptischer Schottendorn, Saft	133
Vogelnest = Saamen	88	Ehrenpreis	75
Wohlgemuth	66	Eibisch = Kraut	50
Crenz = Beer	105	Saamen	83
Blumen	67	Wurz	19
Wurz	38	Eicheln	101
Wurz	28. 31. 71	Eichen = Laub	68
Crystall	7	Mistel	121
Cubeben	109	Moos	140
Cucumern = Saamen	88	Rinde	115
Curcuma	27	Traube	106
Cupressen = Holz	117	Eichfarn = Wurz	40
Nüsse	100	Einbeer	66. 103
Cambelkraut	56	Einhorn, gegrabenes	152
Cyper = Wurz, lange	28	wahres	152
runde	28	Eisen = Blüthe	12
Cypressen	56	gefeiltes	11
Cyprischer Terpentia	133	Hütlein	48
Vitriol	5	Kraut, Eisenhart	75
Dachs = Schmalz	154	Vitriol = Kieß, Hefischer	13
Datteln	100	Elends = Horn	141
saure	105	Klauen	141
Dictam Cretischer	56	Elephanten = Laus	97
weisser, gemeiner	29	Elfenbein	146
		Elfenich	

III. Teutsches Register.

Elfenich = Wurzel	37	Farb = Flecklein, blaue	15
Elster = Beer	105	rothe	15
Endibien, Kraut	57	Farben = Cobalt	11
Saamen	89	Farber = Baum = Saamen	96
Engelsüß!	40	Röthe = Wurzel	42
Engel = Wurzel	20	Farnkraut = Wurzel	30
Engels = Frank = Wurzel	21	Faulbaum = Rinde	113
Englisches = Laxier = Salz	4	Federweiß	6. 7
Vitriol	5	Feigbohnen	91
Enten = Schmalz	153	Feigen, durre	98
Enzian = Wurzel	31	Feig = Warzen = Kraut	71
Indianischer	31	Wurzel	25. 44
weisser	23	Gelbenblätter	69
Ephreu = Beer	101	Geld = Andorn	72
Blätter	59	Cypressen	55
Harz oder Gummi	126	Räzen	59
Eppich Garten = dessen Saamen	84	Geld = Münz	53
Wurzel	20	Woley	72
gemeiner, dessen Wurzel	20	Gellriß, Kraut	49
Wasser = dessen Wurzel	20	Wurzel	19
Erbfeln, Frucht	97	Fenchel = Holz	120
Saamen	85	Kraut	58
Erdäpfel	28	Rinde	115
Erdbeer = Kraut	58	Saamen	89
Wurzel	31	Römischer, süßer	89
Erde gesiegelte, graue Schlesiſche	2	Wurzel	31
rothe Türkische	2	Sette Henne	56
weiße Schlesiſche	2	Fichten = Harz	128
Türkische	2	Fieber = oder Biber = Klee	74
Malthesiſche	2	Wurzel	46
grüne	2	Kraut	54
Japonische	138	Rinde	112
Lemniſche	2	Filzkraut	56
Frippel =	2	Fingerhut, Kraut	57
Erd = Gallen, Kraut	54	Fisch = Wein, weißes	149
Kiefer	55	Körner	99
Del	14	Leim	147
rauch, Kraut	58	Flachs = Dotter	56
scheib = Wurzel	28	Saamen	95
Erlen	49	Purgier =	62
Erben = Saamen	92	Saamen	91
Eschbaum = Rinde	114	Seide	56
Saamen	90	Flecken = Lungen = Kraut	68
Esels = Kürbsen = Wurzel	27	Fleischleim = Gummi	129
Essig = Rosen	80	Glieder, f. Hollunder	
Euphorbium	124	Gliegen Spanische	144
Eyer = Schaalen	149	= Stein	11
Fall = Kraut		Flöh = Kraut = Saamen	94
Wurzel	51	Flor, Spanischer	15
Pharm. Wirt. Index.	21	Florentiner Lack	12
	Bbbb	Florentiner	

III. Teutsches Register.

Florentiner Viole = Wurz
 Fönugræc = Saamen
 Franzosen = Holz
 Rinde
 Gummi
 Frauen = Dosten
 Eis
 Glas
 Moscowitisches
 Haar
 Mantel
 Münz
 Freysam = Kraut
 Frosch
 Laich
 Fuchs = Lungen, getrocknete
 Schmalz
 Fünffinger = Kraut
 Wurz

 Gänse = Blumen
 Kraut
 Schmalz
 Gänserich
 Galban, Gummi
 Galda, Gummi
 Galgant, grosser
 Kleiner
 Galigen = Stein, blauer
 weisser
 Galläpfel
 Gallmey
 Gamanderlein = Kraut
 Garben = Kraut
 Garten = Baldrian
 Cypressen
 Dill
 Eppich, Saamen
 Wurz
 Isop
 Kressen = Saamen
 Nägelein
 Rauten
 Begwarten = Wurz
 Gartheyl
 Bauchheil
 Geigen = Harz
 Weissblatt
 Weiss = Bart = Wurz

34	Weiss = Rauten	58
90	Gelbsucht = Wurz	28
118	Gemsen = Kugeln	140
114	Wurz	29
125	Genisten = Blumen	78
66	Saamen	90
6. 7	Genzian	31
6	Gerber = Baum = Saamen	96
6	Gerste	90
49	Gertwurz	47
49	Gertkraut	47
51	Gewürz = Nelken oder Nägelein	107
60	Rinde, Winters Americ.	116
150	Gicht = Rosen	80
150	Saamen	93
152	Wurz	40
154	Gift = Kies	10
66	Mehl	10
38	Wurz, Indianische bittere	36
	Mexicanische weisse	27
	Peruvianische	26
77		20
52	Gistheil = Wurz	28
50	Gilb = Wurz	78
153	Ginster = Blumen	12
50	Glas = Galle	66
125	Kraut	15
125	Venedisches	72
109	Glied = Kraut	22
109	Weich = Wurz	76
5	Glocken = Blumen	84
5	Saamen	11
101	Gold = Blättlein, geschlagen Gold	77
6	Blumen	11
54	gelb	13
64	Glette	71
39	Kraut	22
56	Wurz	49
30	Golden = Wiederthron	59
84	Gottes = Gnaden = Kraut	68
20	Gotttheyl	9
70	Granat, Edelstein	77
92	Granaten = Blumen, oder Blüthe	114
82	Schalen	82
69	Gras = Blumen	32
26	Wurz	119
47	Gries = Holz	8
50	Stein	38
124	Wurz, Americanische	34
53	Grind = Wurz	71
22	Kraut	Grind

III. Teutsches Register.

Grind = Saamen	91	Hafel = Mistel	121
Grünspan	15	Wurz	22
Gürtel = Kraut = Saamen	91	Kraut	51
Gulden = Günsel	55	Hauhechel = Wurz	37
Klee	60	Hausen = Blasen	147
Wundkraut	55	Haus = Wurz, klein	71
Gummi = Ammoniac	121	Hechts = Kiefer	147
Animi	121	Schmalz	153
Arabischer	121	Heidel = Beer	103
Bdellium	122	Heiden = Korn	89
Caneamum	123	Kraut	57
Caranna	123	Heidnisch Wund = Kraut	55
Copal	124	Heilig Geist = Wurz	20
Dinten	121	Heil aller Schädelt	75
Euphorbium	124	Kraut	50
Franzosen = Holz	125	Heinrich, guter, stolzer	52
Galban	125	St. Helenen = Wurz	32
Gut	125	Helfenbein	146
Kirschen	124	Helminthochorton	139
Lack	126	Herbst = Rosen	79
Ladan	127	Hermödattel	32
Loof	127	Herz = Freud	63
Mutter	125	Herz = Gespan = Kraut	53
Nelbaum	124	Klee	48
Nlampi	127	Wurz	20, 21. 35
Senegal	130	Heßischer Eisen = Vitriol = Kieß	13
Gundel = Neben	59	Heylkraut	50
Gunder = Mann	59	Himbeere	104
Gurken = Saamen	88	Himmel = Brand	74
Guter Heinrich	52	Schlüssel	80
Haarstrang = Wurz	39	Hindläusten = Blumen	78
Haase, gebrannter	147	Kraut. f. Wegwartenkr.	55
Haasen = Fett, Schmalz	153	Wurz	26
Pappeln	63	Hinsch = Kraut = Holz	120
Pfötlein, Kraut	59	Wurz	19
Sprünge	147	Hirnschale, menschliche	146
Habicht = Saamen	95	Hirsch = Brunst	139
Hagenbutten, Frucht	100	Crauz	149
Saamen	88	Herz = Wein	149
Schwamm	140	Horn	145
Hahnen = Fußlein	53	Inschlitt	153
Hanf = Saamen	85	Klee	58
Harn = Kraut	60, 62	Ruthe	145
Indianisches	48	Wurz, grosse, weisse	31
Harthei = Blumen	79	Zungen = Kraut	71
Hartriegel	62	Hirtentäschlein	53
Harz	128	Hohl = Wurz	21
Kirschen	124	Holunder = Beer	104
Nelbaum	124	Bluthe	81
	124	Rinde	115
	Bbbb 2	Holunder	

III. Teutsches Register.

Holunder = Saamen	94	Indig	12
Schwamm	139	Ingwer, Zimber, gemeiner	111
Wurz, Acker	29	gelber	28
Holz = Mangold	68	teutscher	20
Honig	135	weisser	111
Klee	63	Ingrün	75
Hopfen	79	Inchlitt = Bock	153
Spanischer	66	Hirsch	153
Hußlattich = Blumen	78	Kinder	104
Kraut	58	Johannes = Beeren, schwarze	79
Wurzel	30	Johannes = Blumen	105
Hüften	100	Brod	22
= Saamen	88	Gürtel = Wurz	60
Hüner = Darm, Kraut	50	Kraut	90
Magen = Häutlein	146	Saamen	40
Scherben	49	Wurz	34
Schmalz	153	Ipecacuanha	60
Hüttenrauch	10	Isop	60
Hunds = Baum = Rinde	113	Isfen, Kraut	139
Fett	153	Judas = Ohr	96
Gras = Wurz	32	Juden = Kirschen	83
Kohl	64	Saamen	15
Koh	141	Pech	7
Kürbsen = Wurz	23	Stein	116
Rippe, Kraut	67	Weihrauch	
Schmalz	153	Kaß = Pappeln	63
Zungen = Wurz	28	Saamen	92
Hyacinth, Edelstein	9	Kalbs = Nase	50
Hypecaeanha	33	Kalch = Stein	6
Hypocisten = Saft	135	Kameel = Stroh, oder Heu	70
Hyssopp	60	Kamm = Fett	153
Ialappen = Wurz, schwärzlichte	33	Kampfer, Kampher	123
weisse	35	Kapuzinerlein	65
Japanische Krautwurz	37	Karpfen = Stein	144
Japonische Erde	138	Kartendistel	29
Je länger, je lieber	19. 55	Kastanien f. Castanien	150
Jerichorosen	53	Kaulpersich = Stein	57
Jigel, gebrannter	146	Kayser = Salat	37
St. Ignatius = Bohnen	100	Kaysers = Wurz	65
Jkan, Wurz	33	Käsen = Münz	153
Indianischer Balsam, schwarzer	131	Schmalz, wild	7
weisser	131	Stein	71
Blatt	58	Träublein	57
Harnkraut	48	Wedel	46
Kraft = Wurz	37	Wurzel	76
Muschel = Schaalen		Kehlblatt	141
wohlriechende	17	Keller = Esel	87
Myrobalanen, schwarze	101	Saamen	103
Spicanard	45	Kesselbeeren	Kreusch

III. Teutsches Register.

Reuschlamm = Reuschbaum = Saamen	82	Kröten = Stein	6
Richern, Richer = Erbsen	87	Kropfwurz	40
Riesel = Stein	8	Kugel = Lack	12
Rikfunemalo, Gummi	126	Kübel = Harz	129
Rino, Gummi	126	Kuchenschelle	68
Kirschen, saure, oder Wein = Kirschen	99	Küchen = Schell = Wurzel	40
Harz oder Gummi	124	Kümmel	86
Kern	99	Römischer, langer	88
Loorbeer = Blätter	61	schwarzer	92
Klapper = Rosen	80	Künlein, Kraut	72
Schlangen = Wurzel, Virginische	44	Künschotten = Blumen	78
Klee	74	Saamen	90
Kleeb = Kraut	50	Kürbis = Saamen, Kerne	88
Kletten = Blätter	61	Kunigunden = Kraut	58
Saamen	85	Kupfer gebranntes. vid. Æs ustum.	
Wurzel grosse	22	Wasser. s. Vitriol	5
Knaben = Kraut	56	Kuttelfisch = Wein	149
Wurz	43	Kützenell	145
Knoblauch	19		
Kraut	49	Lachen = Knoblauch	71
Knopf = Rosen	80	Cretischer	71
Kobalt	11	Lack blauer	12
Köckel = Körner	99	Florentiner	12
Köhl = Saamen, rother	85	Gummi	126
Köhlbleins = Kraut	67	Kugel =	12
Wurzel	39	Muß	12
Königs = Kerzen	74	Ladan = Gummi	127
Körfel = Kraut	54	Lakizen = Saft	135
Saamen	86	Lasur = Stein	7
Kohl = Saamen	85	Lattich = Saamen	91
Kork	120	Läuchelkraut	49
Korn = Blumen, blaue	78	Lavendel = Blumen	79
rothe	80	welsche	81
Münze	53	Kraut	61
Rosen	80	Laus = Körner	95
Krähen = Augen	103	Saamen, Mexicanischer	94
Krähenfuß	56	Laxier = Salz, Englisches	4
Krägheyl, Kraut	58	Leber = Kletten	49
Kraft = Wurz, Indianische	37	Kraut, edel	60
neue	39	Blütze	79
Krausmünz	64	Leindotter = Saamen	95
Krebs = Augen	143	Lein = Kraut, groß und klein	62
Scheeren	143	Saamen	91
Steine	143	Lemnische Erde	2
Kreide weisse	1	Lendenwurz	34
Kressen = Kraut, weisses	65	Jerchen = Klauen = Blumen	77
Saamen	92	Schwamm	138
Kreuzblume	40	Lieb = Stöckel = Saamen	91
Kreuzmünz	64	Wurzel	34
Kröten gedörnte	143	Lilien = Blätter, weisse	79
Pharm. Wirt. Index.		Cccc	Liliens

III. Teutsches Register.

Lillen = Wurzel, blaue	34	Maulbeer = Baum = Rinde	115
weisse	34	Maulwürfe, gebrannte	151
Linden = Blüth	81	Maus = Dorn = Saamen	94
Mistel	121	Wurzel	23
Löffel = Kraut	55	Gift	10
Saamen	87	Dehrlein	66
Löwen, Fuß	49	Zwiebel	44
Kraut = Wurzel	46	Mayenblumen	79
Maul	50	Maykäfer	150
Zahn; Kraut	73	Maywurm	150
Wurzel	46	Meer = Ballen	16
Loof, Gummi	127	Bohnen	18
Lorbeer	102	Glöcklein	72
Blätter	61	Hirse	92
Luchs = Stein	7	Kohl	72
Lucians = Kraut	21. 51	Krebs = Scheeren	143
Lungen = Kraut	52. 68	Moos	16
fleckichtes	68	Nabel	18
		Kettich	41
Macedonischer Petersil = Saamen	93	Salz	4
Mägdebaum	69	Sting	151
Magdalenen = Blumen = Kraut	45	Winde	72
Magnetstein	8	Zwiebel	44
Magsaamen schwarzer	93	Meger = Kraut	58
weisser	93	Meister = Wurzel	37
Majoran = Kraut	62	Melissen	63
Malthesische Siegel = Erde	2	Türkische	64
Malz	90	Wald =	64
Mandel = Blätter	61	Melonen = Kern, Saamen	92
Mandeln, bittere	97	Melten = Saamen	84
süsse	97	Mengel = Saamen	91
Mangelwurzel	34	Mennig, rother	13
Mangold	52	Menschen = Hirnschale	146
Manna	135	Schmalz	153
Manns = Treu = Wurzel	30	Merzen = Viole	82
Margarethen = Blumen	77	Kraut	75
Kraut	52	Mespeln, gedörrte	102
Marien = Distel = Kraut	54	Mettrich	63
Saamen	86	Mexicanischer Laus = Saamen	94
Marum verum	63	Milch	147
Maseran	62	Milz = Farn	54
Maslieben = Kraut	52	Kraut	54
Blumen, rothe	77	Mini, rothe	13
Mastich, Mastix	127	Mistel	120
Holz	118	Birken =	121
Kraut	63	Eichel =	121
Mauer = Epheu	59	Hasel =	121
Esel	141	Linden =	121
Pfeffer	71	Weiden =	121
Rauten	49	Mistmelten, kleine	76
			Model

III. Teutsches Register.

Modelgeertwurzel	31	Nägelein = Gewürz	107
Möhren = Saamen, wilder	88	Mutter =	106
Mohn = Häupter, Köpfe	98	Rinde	107
Saamen, schwarzer	93	Zimmet	107
weisser	93	Nardus, wilder	22
Saft	136	Celtischer	45
Möhren = Kummel	88	Nashorn = Horn	150
Moluckisches Purgier = Holz	118	Nattern = oder Vipern = Rückgrat	151
Mond = Kraut	62	Wurz	23
Rauten	62	Zünglein	65
Mon = Milch	2	Nelken. s. Nägelein	
Moos	140	Nessel = Blumen, taube	82
Moosbeern	103	Kraut	75
Moringa, Wurz	35	Saamen	96
Moscowitisches Frauen = Glas	6	Römischer	96
Motten = Kraut	52. 69	todte, weisse	75
Blumen	81	Wurz	47
Mücken = Gift, oder Stein	11	Nichts, weisses	13
Münchs = Rhabarbara	41	Nieß = Wurz schwarz	29
Münze Berg	53	weisse	29
Geld =	53		
gelbe	56	Occidentalischer Bezoar	141
Krause	64	Ochergelb	2
Mumien, Egyptische	148	Ochsen = Brech = Wurz	37
Persianische, natürliche	149	Galle, eingetrocknete	143
Mundholz	19. 62	Ruthe, Senne	151
Mürmelthier = Schmalz	153	Zungen, Blumen, oder Blüth	77
Muscaten = Blüthe	109	Kraut	53
Nüsse	110	Wurz	19. 24
Muschel = Schalen, wohlriechende	17	rothe	19
Mutter = Gummi	125	Odermenig	49
Kraut	53. 63	Del = Baum = Gummi, Harz	124
Nägelen	106	Delmagensaamen, weisser	93
Wurz	21. 35	schwarzer	93
Zimmet	108	Delniz = Wurz	37
Myrobalanen, aschfarbe	102	Olampi, Gummi	127
Bellirische	102	Opermert	11
gelbe	102	Opium	136
Indianische, schwarze	102	Orientalischer Bezoar	142
schwarzbraune, grosse	102	Orlean	14
Myrrhen	127	Oster = Blumen = Wurz	40
Myrrthen = Beer	103	Osterlucy = Kraut	51
Blätter	64	Wurz	21
Nabelstein	18	Päonien = Wurz	40
Nacht = Kraut	66	Panax = Gummi	128
Schatten	52. 72	Pantoffel = Holz	120
Holz	120	Pappelbaum	67
Nägelein = Benedictwurz	25	Pappel = Blumen	79
Blumen	82	Kraut	63

III. Teutsches Register.

Pappel = Saamen	92	Poley = Kraut	68
Wurzel	35	wilbes	53
Paradies = Holz	116	Pomeranzen = Blüth	77
Körner	109	Saamen, oder Kerne	85
Paraguay, Kraut	50	Schaalen	111
Pech	128	Porst, Kraut	65. 73
Pesaulina, Wurzel	38	Portulac = Saamen	93
Pensylvanische Klapperschlangen,		Post, Kraut	65
Wurzel	44	Potasche	3
Perlen = Hirse	92	Prunellen = Kraut	68
Mutter	18	Psilien = Kraut = Saamen	94
Occidentalische	17	Purgier = Glachs	62
Orientalische	17	Holz, Moluckisches	118
Perfichsteine	150	Körner	86. 87. 101
Peruvianischer Balsam	131	Moos	61
Gift = Wurzel	26	Purpur = Schnecken	17
Pestilenz = Wurzel	39		
Pestkraut	69	Quassienholz	119
nagel	38	Quecken = Wurzel	32
Petersilien = Kraut, Peterlein	66	Queck = Silber	10
Saamen	93	Quendel	72
Macedonischer	93	Quetschen	104
Wurzel	39	Quitten gedörte	100
St. Peters = Kraut	66	Kerne, Saamen	88
Schlüssel	80		
Pfaffen = Vint	20	Naden = Distel = Wurzel	30
Röhrlein, Kraut	72	Nakasira, Balsam	132
Wurz	46	Ratten = Pulver, oder Gift	10
Pfauen = Roth	149	Räusch = Gelb	10. 14
Pfeffer, langer	110	Rauten, Kraut	69
Spanischer	110	Saamen	94
schwarzer	110	Regen = Würmer, getrocknete	147
weisser	110	Reiber = Schmalz	153
Wurz	39	Reinweide	62
Pfennig = Kraut	65	Reis	92
Pferd = Geylen	146	Retrich	41
Schmalz	153	Rettig = Saamen	94
Pfersich, Blüth	80	Rhabarbara, edle, wahre	41
Kern	104	Münchs	41
Pfingst = Rosen = Wurzel	40	weisse	35
Pfriemenkraut, Blumen	78	wilde	23
Saamen	90	Rhapontic, gemeine	42
Pimpernell = Kraut	67	wahrhafte, gerechte	42
Wurzel	39	Rhein = Blumen	81
Pimper = Nüßlein, Syrische	104	Farn, Blüthe oder Blumen	81
Pinien = Nüßlein	103	Kraut	73
Pistacien	104	Saamen	96
Pocken = Holz	119	weisser, spiziger	68
Wurzel	25	Rhinoceros = Horn	150
Pöonien = Wurzel	40	Rhodiser Dorn = Holz	117
			Rin-

III. Teutsches Register.

Rinder = Inschlitt	153	Safran = Saamen wilder	86
Ringel = Blumen	77	Sagapen = Gummi	129
Ritter = Sporn	77	Sagu	136
Römischer Alaun	3	Salab, Wurzel	42
Chamillen	78	Salbey = Blumen, Blüthe	81
Fenchel	89	Kraut	69
Kümmel	88	wilde	70
Nessel = Saamen	96	Saliter, Salniter	3
Nitriol	5	Salmiac	4
Wermuth	47	Salpeter	3
Rosen = Holz	119	Salz Egrisches Laxier	4
Klapper	80	Englisches Laxier	4
Knopf	80	Meer	4
rothe	80	Sedlizer	4
Ulmer, bleiche	80	Spanisches, Soda	5
weisse	80	Stein	4
Wurz	42	Sammet = Rosen	80
Zucker	80	Sandarach	129
Rosinen, grosse	103	Sandbeere	75
kleine	104	Sandel = Holz, blaues	119
Ros = Aloe	134	gelbes	119
Casten, Castanien	101	rothes	120
Rinde	114	weisses	119
Schwefel	14	Sanickel, Kraut	49. 70
Rosshub = Blumen	78	Wurzel	43
Kraut	58	Sanley, Wurzel	43
Rosmarin = Blüth	76	Sapphir	9
Kraut	69	Sarsaparill = Wurzel	43
Röthe = Wurzel	42	Sassafras = Holz	120
Röthel = Stein	2	Rinde	115
Rothlauffen = Kraut	59	Saturey	70
Roth = Wurz	46	Sau = Brod = Wurz	28
Rübe	41	Sau = Fenchel = Wurzel	39
Rüben, rothe	23	Kraut	72
Saamen, weisser	94	Wurzel	34. 44
Rubin	9	Sauerampfer = Kraut	48
Rueß	134	Saamen	82
Ruhr = Kirschen	100	Wurzel	18
Kraut	56	Sauer = Klee	48
Wurz Indianische	33	Saurach = Beer, gedörte	97
Teutsche	46	Saamen	85
Ruprechts = Kraut	59	Scabiosen = Blumen	81
Rusten weisse	116	Kraut	70
Saamen, wohlriechender, Amömlin	83	Scammonium	137
Sade = Baum	69	Schabenkraut = Blumen	81
Saslor = Blumen	78	Schaf = Garben = Kraut	64
Samen	86	Schafmüllen = Saamen	82
Safran	108	Schaft = Heu	57
wilder,	78	Schampanierwurzel	29
Pharm. Wirt. Index.		Scharbocks = Klee	74
		D d d d	Schar

III. Teutsches Register.

Scharbocks = Klee = Wurzel	46	Schwefel lebendiger, grauer	14
Kraut	71	Ros =	14
Wurzel	25	Wurz	39
Scharlach = Beer	101	Schweins = Brod = Wurz	28
Kraut	58	Schmalz	154
Schellkraut = Wurzel, grosse und kleine	25	Zähne, wilde	141
Schieferweiß	11	Schweifswurz	39
Schierling = Kraut	55	Schwertel = Wurz, blaue	34
Schiff = Pech	128	gelbe	19
Schlaf = Aepfel	140	Schwindel = Körner	109
Kraut	60	Wurz	29
Wurzel	33	Scordien, Lachen = Knoblauch	71
Runzen	140	Scorzonera = Wurzel	44
Schlag = Kräutlein	55	Sebesten	104
Schlangen = Häutlein, Bälge	151	Seckel = Kraut	53
Holz	117	Sedlizer Salz	4
Knoblauch = Wurzel	46	See = Blumen, weisse	80
Kraut	65	Wurz weisse	37
Schmalz	154	Ruhe = Stein	148
Wurzel	23. 44	Mäuse	149
Virginianische	44	Pferds = Zähne	146
Schlehen, gedörte	96	Sego	136
Blüth	76	Seidel = Bast = Rinde	114
Dorn = Rinde	111	Saamen	87
Moos	140	Seiden = Bälglein, gebrannte	151
Saft, eingetrockneter	134	Seiffen = Kraut	70
Schlesische Siegel = Erde	2	Wurzel	43
Schlüsselblumen	80	Selenit	8
Schmeer = Wurzel	26	Selery = Saamen	84
Schmergel	8	Wurz	20
Schminck = Flecklein	15	Senegal = Gummi	130
Wurzel	40	Seneka, Senegar, Wurzel	44
Schmirgel	8	Senf = Saamen rother	95
Schnallenblumen	80	weisser	89
Schnecken = Decklein	146	Sennet = Bälglein	72
Häutlein	146	Blätter	71
Schöll = Kraut = grosses	55	Sesel = Saamen	95
kleines	71	Cretischer	95
Wurzel	25	Seven = Baum	69
Schotten = Dorn = Saft, Egyptischer	133	Siebenfinger = Kraut	74
Schuppenwurzel	28	Siebenzeit	63
Schusswasser	b. 109	Siegel = Erde. f. Erde	2
Schwalben, gebrannte	147	Siegmar = Kraut	19. 49
Kraut	55	Sigmunds = Wurzel	19
Nester	147	Sieg = Wurzel, lange und runde	46
Wurzel	32	Silber = Blättlein, geschlagen Silber	10
Schwamm	16	Glette	13
Stein	8	Kraut	50
Schwarzwurzel	26	Simaruba, Rinde	115
Schwefel = gelber	14	Simeons = Kraut	49
		Singrün	

III. Teutsches Register.

Singrün	75	Stein = Klee weisser	63
Sinnau, Kraut	49	Blumen	80
Smaragd	9	Leber = Kraut	59
Smerbel	52	Mark	2
Sonnen = Thau	69	Del, roth	14
Sonnen = Wend = Kraut	55	schwarz	14
Good = Brod	105	weiß	13
Sophien = Kraut = Saamen	95	Peterlein, Kraut	67
Spangrün	15	Saamen	93
Spanisches Aschen = Salz	5	Wurzel	39
Fliegen, Mücken	144	Rauten	49
Flor	15	Saamen	92
Grün	15	Salz	4
Hopfen	66	Wurz	49
Pfeffer	110	Stendel = Wurz	43
Spargel = Saamen	84	Stengelwurz	43
Wurz	22	Sterk = Kraut	50
Speichel = Wurz	40	Stern = Anis	84
Speyerling	105	Leber = Kraut	63
Spey = Wurz, Indianische	33	Stick = Wurz	23
Spicanard, Indianischer	45	Stöchas = Blumen, Arabische	81
Spick = Blumen	81	gelbe	81
Celtischer	45	Stolzer Heinrich	52
Kraut	61	Storax, Gummi, in Körnern	130
Spiegel = Harz	124	flüssiger	133
Spieß = Glas	10	Storchen = Schmalz	153
Erz	10	Schnabel, Kraut	59
Spinnblumen = Wurz	26	Strausen = Eyer	151
Spinnendiesel	54	Streibelmurz	28
Wurz	24	Surinamisch Bitter = Holz	119
Spizkletten	76	Wurzel	34
Spring = Körner	86	Suß = Holz	34
Kürbis = Wurz	27	Saft	135
Staab = Wurz	47. 56	Syrische Pimpernüsslein	104
Stachel = Schwein = Stein	150	Syrup = Zucker	137
Stahlseil	11		
Stall = Kraut	62	Taback	65
Wurzel	37	Tacamahac = Gummi	130
Staphis = Körner	95	Täschelkraut	53
Stech = Apfel	73	Tag und Nacht = Kraut	66
Nüsse	105	Talch, Talf	8
Rüben = Saamen	92	Tamarinden	105
Steeß = Rüben = Saamen	92	Tamarisken = Kraut	73
Stein = Brech, rother, Wurz	31	Rinde	115
weisser, Kraut	70	Tauben = Kraut	75
Wurzel	28. 44	Kropf, Kraut	58
Eppich = Saamen	93	Tausend = Blatt	64
Glachs	6	Tausend = Gulden = Kraut, klein	54
Klee, blauer	63	Knoten	54
gelber	63	Terpentin Cyprischer, wahrer	133
		Dddd 2	Terpen

III. Teutsches Register.

Terpentin gemeiner	133	Violen-Kraut	75
Benedischer	133	Merzenz	82
Teufels-Abbiß, Kraut	64	Wurz, Florentinische	34
Wurzel	36	gemeine	34
Dreck	122	Wippern-Rückgrat	151
Teutscher Ingwer	20	Schmalz	154
Thee	73	Virginische Klapper-Schlangen Wurzel	44
Thomas-Zucker	137	Schlangen-Wurzel	45
Thymian, Cretischer	74	Vitriol, blauer	5
gemeiner	74	Cyprischer	5
Thym-Seide	57	Englischer	5
Toll-Beere	52	gemeiner	5
Wurzel	33	grüner	5
Tormentill-Kraut	74	Rieß, Heßischer Eisen	13
Wurz	46	Römischer	5
Traganth	130	Ungrischer	5
Trauben-Blätter	75	weisser	5
Kraut	52	Uline gemeine breit blatterichte	116
Treib-Körner, grosse	86	Ulmer Rosen	80
kleine	86	Ungrischer Vitriol	5
Tripel-Erde	2	Unschlitt, s. Inschlitt.	
Truttenfuß-Saamen	91	Vogel-Kraut	49. 50
Türkische Melissen	64	Nest-Saamen, Cretischer	88
Siegel-Erde	2	gemeiner	88
Turbit-Wurzel	46	Zungen	90
Tutia	15	Vögelein im Nest	89
Vanilien	106	Wachholder-Beer	102
Vehe-Distel, Kraut	54	Gummi, Harz	129
Saamen	86	Holz	118
Veilgen wohlriechende	82	Lympe	60
Veil-Kraut	75	Sprossen	60
Wurz, Florentinische	34	Wachs gelbes	155
gemeine	34	Stopf-	155
Venedisches Bleyweiß	11	weisses	155
Borax	3	Wachtel-Schmalz	153
Glas	15	Wald-Kirschen	99
Terpentin	133	Mangold	68
Venus-Haar	49	Meister	63
Violen-Blumen, blaue	82	Melissen	64
Saamen	96	Nachtschatten	52
gelbe	78	Wald-	

III. Teutsches Register.

Wald, Rüben	28	Wein = Kirschen	99
Stroh	58	Laub, Trauben = Blätter	75
Wallfisch = Ruthe	145	Nägelen	97
Wallrath	145	Rauten	69
Wallroß = Zähne	146	Wurzel	25
Wall = Wurz	26	Stein	138
Kraut	55	Weißes Nichts	13
Wanzenkraut	69	Weiß = Wurz	40
Wasser = Bathenig	71	Well = Saamen	95
Bungen	51	Welscher Wermuth	47
Dosten	57	Wermuth, gemeiner	48
Eppich = Wurz	20	Römischer	47
Farn = Wurz	31	Wiederstoß	22
Klee, Kraut	74	Wiesen = Klee	74
Wurz	37	Kreße	77
Knoblauch	71	Kümmel	86
Lilien = Wurz	37	Wild = Urin	59
Melonen = Saamen	87	Wilde Schweins = Zähne	141
Nüsse	105	Winden = Saft, purgierender	137
Schierling	93	Winter = Blumen	81
Wegerich, Kraut	67	Endivien = Saamen	89
Saamen	93	Grün	68. 75
Wurz, breite	2	Rosen	79
Weg, Dorn = Beer	105	Winters Americ. Gewürz = Rinde	116
Gras	54	Wismuth	13
Senf, wilder	57	Wohlgemuth	66
Eritt	54	Cretischer	66
Warten = Blumen	78	Wolfs = Beere	66. 75. 103
Kraut	55	Bohnen	91
Saamen	87	Leber	148
Wurz	26	Milch = Wurz	30
Wegweiß	26	Schmalz	153
Weichseln	99	Wolverley	21
Weiderich, gelber	62	Wullkraut	74
rother	62	Blumen	82
Welden = Laub	69	Wundkraut	56. 72. 75
Mistel	121	gulden	55
Schwamm	139	heydnisch	55
Weihrauch	128	Wurm = Farn	73
Rinde	116	Kraut = Blumen	81
Wein = Beerlein	104	Saamen	87
Pharm. Wirt. Index.		Wurz	23
		Eeee	Zahn

III. Teutsches Register.

Zahn = Purpur = Schnecken	17	Zimmet Mutter =	108
Schnecken	17	Nägelein = Nessel =	107
Wurzel	28. 40	weisser	108
Zapfen = Holz = Rinde	113	Zinnober	12
Zäpflein = Kraut	67	Berg =	12
Zaun = Könige, gebrannte	150	Zirbel = Nüßlein	103
Neben = Wurzel	23	Zittwer, falscher runder	25
Rüben = Wurzel	23	Saamen	87
Zaunschlüpfferlein	150	Wurz	111
Zeher = Kraut	52	Zucker	137
Wurz	20	Candi	137
Zeitlosen = Wurzel	26	Rosen	80
fremde	32	Syrup =	137
Zibeben	103	Thomas =	137
Zibeth	152	Zungenkraut	76
Ziesern	87	Zwetschgen	104
Zimmet	108	Zwiebel Meer =	44
bitterer	113		



